

**2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)
考前压轴密卷**

妇科护理学

模拟试卷(一)

金英杰国家医学考试研究中心 编



答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷(一)

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 关于巨幼细胞贫血的实验室检查结果,不妥的是
 - 属大细胞性贫血
 - 白细胞、血小板增生显著
 - 骨髓检查见红系增生活跃,可见各阶段巨幼红细胞
 - 血清维生素 B 低于正常
 - 血清叶酸低于正常值
- 欲衡量小儿营养状况,首先应做下列哪项检查
 - 头围
 - 测体重
 - 身长的测量
 - 上、下部量
 - 坐高
- 我国流行性乙脑的流行季节主要是
 - 春季
 - 春夏季
 - 夏秋季
 - 秋冬季
 - 冬季
- 用农历计算预产期,应如何推算
 - 月份减 3 或加 9,日期加 7
 - 月份减 3 或加 9,日期加 8
 - 月份减 3 或加 9,日期加 10
 - 月份减 3 或加 9,日期加 13
 - 月份减 3 或加 9,日期加 15
- 初乳具有下列特点,但除外
 - 是产后 5~7 天分泌的乳汁
 - 量足
 - 含蛋白质多,脂肪少
 - 富含免疫物质
 - 有生长发育调节因子
- 支气管自哪级开始参与气体交换
 - 支气管
 - 终末细支气管
 - 呼吸性细支气管
 - 肺泡管
 - 肺泡囊
- 中央型肺癌一般是指发生在
 - 主支气管
 - 叶支气管
 - 段支气管
 - 段支气管以下主支气管
 - 段支气管以上主支气管
- 高钾血症的原因不包括
 - 静脉补钾过快
 - 急性肾功能衰竭
 - 输入大量库存血
 - 持续胃肠减压
 - 代谢性酸中毒
- 下列不属于冠心病危险因素的是
 - 高血压
 - 血脂异常
 - 女性绝经期前
 - 40 岁以上
 - 吸烟
- 对胰腺癌有定性诊断意义的是
 - 超声波
 - CT

- C. 癌胚抗原测定
 D. 细胞学检查
 E. X 线造影
11. 慢性胃炎的确诊依据是
 A. 胃液分析
 B. X 线钡餐
 C. 胃镜检查
 D. 腹部 B 超
 E. 腹部 CT
12. 新生儿出生后, 开始喂哺母乳时间是
 A. 15~30 分钟
 B. 3~4 小时
 C. 6~8 小时
 D. 12 小时
 E. 24 小时
13. 下列属于临产标志的是
 A. 见红, 规律宫缩, 胎头下降
 B. 规律宫缩, 破膜, 胎头下降
 C. 见红, 破膜, 宫口扩张
 D. 见红, 破膜, 规律宫缩
 E. 规律宫缩, 胎头下降, 宫口扩张
14. 新生儿胎粪的特点是
 A. 褐色、干厚
 B. 金黄色、糊状
 C. 陶土色、软膏状
 D. 淡黄色水样便
 E. 墨绿色、黏稠状
15. 结肠癌最常见的组织学类型是
 A. 黏液癌
 B. 腺癌
 C. 未分化癌
 D. 黏液腺癌
 E. 类癌
16. 引起再生障碍性贫血最多见的药物是
 A. 阿司匹林
 B. 柔红霉素
 C. 氯霉素
 D. 保泰松
- E. 环磷酸胺
17. 麻疹的主要传播途径是
 A. 血液传播
 B. 呼吸道传播
 C. 消化道传播
 D. 皮肤接触传播
 E. 间接传播
18. 好发于儿童的卵巢肿瘤是
 A. 无性细胞瘤
 B. 内胚窦瘤
 C. 畸胎瘤
 D. 颗粒细胞瘤
 E. 勃勒纳瘤
19. 乳腺淋巴结转移的常见部位是
 A. 锁骨上淋巴结
 B. 锁骨下淋巴结
 C. 患侧腋下淋巴结
 D. 健侧腋下淋巴结
 E. 胸骨旁淋巴结
20. 大便潜血持续阳性多提示
 A. 浅表性胃炎
 B. 萎缩性胃炎
 C. 胃溃疡
 D. 十二指肠壶腹部溃疡
 E. 胃癌
21. 属于特异性感染的是
 A. 金黄色葡萄球菌感染
 B. 大肠埃希菌感染
 C. 铜绿假单胞菌感染
 D. 乙型溶血性链球菌感染
 E. 破伤风芽胞梭菌感染
22. 女性生命中可发育成熟的卵泡数目是
 A. 200 个或以下
 B. 200~300 个
 C. 300~400 个
 D. 400~500 个
 E. 500 个以上
23. 心肺复苏后, 最常见的继发性病理改

变是

- A. 心肌缺氧性损伤
- B. 肺透明膜形成
- C. 脑缺氧性损伤
- D. 急性胃黏膜糜烂
- E. 肾小管上皮细胞大量坏死

24. 诊断外伤性血气胸最简便可靠的依据是

- A. 病人出现呼吸困难及低血容量症状
- B. 胸腔穿刺抽出血液和气体
- C. X线检查患侧大片密度增高阴影
- D. 叩诊患侧为浊音,呼吸音减弱
- E. 胸部超声探查见有液平面

25. 颅内压的正常范围是

- A. 0.4~0.6 kPa (40~60 mmH₂O)
- B. 0.7~2.0 kPa (70~200 mmH₂O)
- C. 2.1~2.8 kPa (210~280 mmH₂O)
- D. 2.8~3.6 kPa (280~360 mmH₂O)
- E. 3.7~4.6 kPa (370~460 mmH₂O)

26. 属于高渗性脱水病理生理特点的是

- A. 失钠>失水
- B. 失水>失钠
- C. 失水=失钾
- D. 失钾<失水
- E. 失钠>失钾

27. 肠梗阻时,肠腔积液主要来自

- A. 经口饮入尚未被吸收的水
- B. 梗阻近端的胃肠分泌物
- C. 肠腔渗出液
- D. 肠壁血管漏出液
- E. 肠壁炎症渗出液

28. 肝癌特异性的血清标志物是

- A. 谷氨酰转肽酶
- B. 甲胎蛋白
- C. 谷丙转氨酶
- D. 乳酸脱氢酶同工酶
- E. α -抗胰蛋白酶

29. 有家族史的卵巢癌患者为

- A. 8%~12%

- B. 15%~20%

- C. 20%~25%

- D. 25%~30%

- E. 35%以上

30. 卵巢良性肿瘤中临床最常见的是

- A. 脂肪瘤
- B. 黏液性囊腺瘤
- C. 纤维瘤
- D. 浆液性囊腺瘤
- E. 成熟畸胎瘤

31. 与胆道蛔虫病发病无关的是

- A. 胃肠道功能紊乱
- B. 恶心、呕吐
- C. 体温升高
- D. 运动
- E. 驱虫不当

32. 主动脉瓣狭窄引起心功能代偿最主要的是

- A. 心脏节律改变
- B. 左心室肥厚
- C. 回心血容量增加
- D. 左心室腔扩大
- E. 右心房扩张

33. 引起左心室后负荷增加的主要因素是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 静脉回流增加
- C. 相对性主动脉瓣狭窄
- D. 外周血管阻力增加
- E. 动脉血容量增加

34. 急性胃炎按病因及病理变化的不同,分为不同类型,其中最常见的是

- A. 溃疡型
- B. 糜烂型
- C. 单纯型
- D. 出血型
- E. 感染型

35. 慢性支气管炎病情加剧的重要因素是

- A.大气污染
 B.粉尘刺激
 C.吸烟
 D.反复感染
 E.过敏
- 36.临床诊断新生儿低血糖标准为:血糖<
- A.1.2 mmol/L
 B.1.67 mmol/L
 C.2.2 mmol/L
 D.3.2 mmol/L
 E.3.67 mmol/L
- 37.引起上呼吸道感染的最常见病原体是
- A.革兰阳性细菌
 B.病毒
 C.肺炎支原体
 D.肺炎衣原体
 E.真菌
- 38.常见引起胃泌素升高的疾病是
- A.十二指肠球部溃疡
 B.单纯型胃炎
 C.胃溃疡
 D.糜烂型胃炎
 E.慢性萎缩性胃体胃炎
- 39.典型心绞痛的诱因中,应该除外
- A.情绪激动
 B.贫血
 C.体力劳动
 D.睡眠
 E.甲亢
- 40.患者被诊断为子痫前期轻度,其 24 小时尿蛋白定量超过
- A.0.15 g
 B.0.3 g
 C.0.4 g
 D.0.5 g
 E.0.7 g
- 41.先天性巨结肠的发病机制主要由于
- A.结肠的平滑肌发育不良
 B.结肠交感神经丛发育不良
 C.扩张结肠部分的平滑肌和弹力纤维发育不良
 D.结肠肠壁的肌间神经节细胞缺失
 E.病变发生在结肠近端
- 42.对判断新生儿缺血缺氧性脑病的预后有一定参考价值的检查是
- A.神经元特异性烯醇化酶
 B.脑电图
 C.头颅 B 超
 D.CT 扫描
 E.核磁共振
- 43.妊娠期 B 超监护不能显示的项目是
- A.胎肺成熟度
 B.胎方位
 C.有无胎心搏动
 D.胎头双顶径
 E.胎盘位置
- 44.可提示功血的发生是由于黄体功能不足的检查为
- A.基础体温呈单相型
 B.基础体温呈双相型,但上升缓慢,高温相 10 天
 C.经前宫颈黏液结晶检查出现羊齿植物叶状结晶
 D.经前血清孕酮值处在卵泡期水平
 E.经前阴道脱落细胞涂片表现为中高度雌激素作用
- 45.关于复方短效口服避孕药避孕机制的说法,错误的是
- A.抑制排卵
 B.通过异物的局部效应发挥作用
 C.改变子宫内膜形态与功能,不适于受精卵着床
 D.改变宫颈黏液性状使黏液量少、黏度增高,不利精子穿透
 E.受持续的雌、孕激素作用,输卵管的正常分泌和蠕动频率发生改变,从而改变受

精卵正常的运行速度

46.患者,女性,47岁。因子宫内膜癌行全子宫、双附件切除术及盆腔淋巴清扫术,术后48小时拔除尿管后自行排尿,第3天起阴道有尿液流出,同时仍可自行排尿,临床诊断为尿瘘,为明确瘘孔,不需做的辅助检查是

- A.宫腔镜检查
- B.靛胭脂试验
- C.输尿管镜检查
- D.排泄性尿路造影
- E.肾显像

47.吸气性呼吸困难严重者可出现三凹征,三凹征是指

A.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

B.胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙在呼气时明显下陷

C.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在吸气时明显下陷

D.胸骨下窝、锁骨上窝和肋间隙在吸气时明显下陷

E.胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙在呼气时明显下陷

48.形成慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A.慢性支气管炎
- B.支气管哮喘
- C.支气管扩张
- D.肺结核
- E.肺间质纤维化

49.抗结核化学药物治疗的治疗原则是

- A.早期、联合、足量、规律、全程
- B.早期、联合、足量、规律、长期
- C.早期、联合、适量、规律、全程
- D.早期、联合、适量、规律
- E.早期、联合、适量、全程

50.诊断呼吸衰竭的正确依据是

- A.发绀,呼吸困难

B.肺通气功能明显减退

C.呼吸的节律、频率和幅度发生改变

D.结膜充血、水肿和精神、神经症状

E. $\text{PaCO}_2 > 6.6 \text{ kPa}$ (50 mmHg)、 $\text{PaO}_2 <$

8.0 kPa(60 mmHg)

51.干性支气管扩张的唯一症状是

- A.慢性咳嗽
- B.大量脓痰
- C.咯血
- D.咳痰与体位变化有关
- E.呼吸困难

52.可以导致心脏压力负荷加重的疾病是

- A.主动脉瓣关闭不全
- B.室间隔缺损
- C.甲状腺功能亢进
- D.肺动脉高压
- E.慢性贫血

53.室性期前收缩的心电图特征不包括

- A.提前出现的QRS波群
- B.QRS波群时限超过0.12秒
- C.QRS波宽大畸形
- D.QRS前有P波
- E.代偿间歇完全

54.急性心肌梗死最基本的病因是

- A.体力活动
- B.情绪激动
- C.血压剧升
- D.冠状动脉张力增高
- E.冠状动脉粥样硬化

55.目前最佳的系统性红斑狼疮筛选试验是

- A.狼疮细胞检查
- B.皮肤狼疮带试验
- C.抗核抗体检查
- D.血清补体测定
- E.毛细血管镜检查

56.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性

- A. 不变
 B. 升至正常人的 70% 以上
 C. 降至正常人的 70% 以下
 D. 升至正常人的 90% 以上
 E. 降至正常人的 90% 以下
57. 患者, 男性, 被汽车撞伤右胸部, 呼吸 20 次/分, 胸部 X 线检查示: 右侧气胸, 肺受压 20%, 处理原则是
- A. 胸穿排气
 B. 观察病情
 C. 胸腔闭式引流
 D. 牵引固定
 E. 手术治疗
58. 诊断膀胱肿瘤最重要、不可或缺的方法是
- A. 膀胱镜检查
 B. 膀胱造影
 C. 双合诊检查
 D. 尿脱落细胞检查
 E. 尿道超声检查
59. 骨巨细胞瘤属于
- A. 骨瘤样病损
 B. 良性肿瘤
 C. 继发性肿瘤
 D. 恶性肿瘤
 E. 潜在恶性肿瘤
60. 擦伤的特点是
- A. 皮下淤血、肿胀
 B. 皮肤水肿
 C. 表皮破损
 D. 皮肤呈多数小裂口及浆液渗出
 E. 创缘较平整, 出血可渗可涌
61. 供移植器官的保存原则是
- A. 常温保存
 B. 低温原则
 C. 延长热缺血时间
 D. 变冷缺血为热缺血
 E. 中断血流后不应立即降温
62. 乳腺癌最常见的病理类型是
- A. 非浸润性癌
 B. 早期浸润性癌
 C. 浸润性特殊癌
 D. 浸润性非特殊癌
 E. 其他罕见癌
63. 腺病毒肺炎的发病年龄多见于
- A. 新生儿
 B. 2~6 个月婴儿
 C. 6~12 个月婴儿
 D. 6~24 个月婴儿
 E. 任何年龄
64. 猩红热治疗首选抗生素是
- A. 红霉素
 B. 青霉素
 C. 新霉素
 D. 庆大霉素
 E. 四环素
65. 符合正常卵巢临床特征的是
- A. 成年女性卵巢约 4 cm × 3 cm × 1 cm 大小
 B. 卵巢由骨盆漏斗韧带与子宫相连
 C. 卵巢髓质内有数以万计的原始卵泡
 D. 位于阔韧带内
 E. 卵巢白膜是一层立方上皮
66. 胎儿纵轴与母体纵轴的关系称为
- A. 胎姿势
 B. 胎儿位置
 C. 胎产式
 D. 胎先露
 E. 胎方位
67. 软产道裂伤多见于
- A. 阴道手术操作不当
 B. 胎盘植入
 C. 凝血功能障碍
 D. 软产道充分扩张
 E. 产程延长
68. 可以早期鉴别葡萄胎和侵蚀性葡萄胎的检查是
- A. 胸部 X 线摄片

- B.刮宫葡萄胎标本
C.B超及彩色多普勒
D.子宫输卵管造影术或宫腔镜
E.血清 β -hCG检测
- 69.引起支气管扩张的最常见病因是
A.支气管先天性发育缺陷
B.支气管外部纤维的牵拉
C.支气管-肺组织感染和阻塞
D.遗传因素
E.机体免疫功能失调
- 70.不属于非特异性感染病原体的是
A.大肠杆菌
B.结核杆菌
C.金黄色葡萄球菌
D.乙型溶血性链球菌
E.铜绿假单胞菌
- 71.患者,男性,77岁。高血压数年,近月来睡眠不佳,排尿困难,体重下降,且有腹部不适感,左侧腹股沟区出现肿块并逐渐增大,可进入阴囊,考虑该患者可能是腹股沟疝,与发病有关的因素是
A.高血压数年
B.睡眠不佳
C.排尿困难
D.腹部不适
E.体重下降
- 72.肾病综合征最根本的病理生理特点是
A.水肿
B.蛋白尿
C.低蛋白血症
D.血清胆固醇增高
E.低密度脂蛋白增高
- 73.膀胱炎的特征性表现不包括
A.尿频
B.尿急
C.尿痛
D.排尿困难
E.晨尿有氨臭味
- 74.患者,女性,55岁。行ECG检查示:P波消失,代之是400次/分左右的f波,QRS波形态正常,QRS波群间隔绝对不规则,心室率通常在每分钟110次,从心电图可诊断
A.房扑
B.室扑
C.房颤
D.室上速
E.室速
- 75.患者,男性,56岁。半年前因原发性肝癌行右半肝切除术,手术后建议其门诊定期随访。最能早期预测癌肿复发的检查是
A.ALT
B.GGT
C.B型超声检查
D.选择性肝动脉造影
E.动态监测AFP的变化
- 76.我国引起慢性肾衰竭的最常见疾病是
A.慢性肾盂肾炎
B.慢性肾小球肾炎
C.狼疮性肾炎
D.高血压肾病
E.糖尿病肾病
- 77.诊断贫血时血红蛋白含量正确的是
A.男性 <160 g/L,女性 <150 g/L
B.男性 <150 g/L,女性 <140 g/L
C.男性 <140 g/L,女性 <130 g/L
D.男性 <130 g/L,女性 <120 g/L
E.男性 <120 g/L,女性 <110 g/L
- 78.确诊CO中毒最主要的依据是
A.CO接触史
B.口唇颜色
C.血液中碳氧血红蛋白含量
D.昏迷的深度
E.缺氧的程度
- 79.对休克的认识正确的是
A.休克就是动脉血压下降的情况
B.休克就是心排出量减少的情况

C. 休克就是各种原因引起的组织灌注不足和细胞缺氧的结果

D. 休克就是心力衰竭

E. 休克是遭受打击后意识丧失

80. 应用复苏药物的目的不包括

A. 防治感染

B. 防治心律失常

C. 纠正急性酸中毒

D. 补充血容量和电解质

E. 防治脑水肿

81. 判断甲状腺功能亢进患者病情程度的主要指标是

A. 食欲亢进程度

B. 脉率增快和脉压增大的程度

C. 突眼程度

D. 甲状腺肿大程度

E. 体重减轻程度

82. 腹膜刺激征是指

A. 压痛、反跳痛、肌紧张

B. 肠鸣音亢进、压痛、反跳痛

C. 肠鸣音消失、腹痛、腹泻

D. 板状腹、压痛、腹泻

E. 反射性呕吐、恶心、腹泻

83. X 线检查可见气液平面及胀气肠袢的时间在肠梗阻发生后

A. 1~2 小时

B. 2~4 小时

C. 4~6 小时

D. 6~8 小时

E. 8~10 小时

84. 不符合肺炎克雷伯杆菌肺炎临床特点的是

A. 白红细胞正常或增加

B. 咳嗽, 咳红棕色胶冻状痰

C. 青壮年多见, 预后良好

D. 起病急、胸痛、畏寒

E. 对庆大霉素及第三代头孢菌素敏感

85. 患者, 男性, 54 岁。于晚餐后突发上腹持续性剧痛。考虑急性胰腺炎, 其血清淀粉酶升高的规律是

A. 发病后 2 小时开始升高, 12 小时达高峰

B. 发病后 1~2 小时开始升高, 24 小时达高峰

C. 发病后 24 小时开始升高, 48 小时达高峰

D. 发病后 12 小时开始升高, 72 小时达高峰

E. 发病后 48 小时开始升高, 72 小时达高峰

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(86~87 题共用备选答案)

A. 脐部

B. 呼吸道

C. 消化道

D. 皮肤

E. 胎盘

86. 新生儿感染性肺炎出生前的常见感染途径是

87. 新生儿感染性肺炎出生后的常见感染途径是

(88~90 题共用备选答案)

A. 游离移植

B. 带蒂移植

C. 吻合移植

D. 输注移植

E. 联合移植

88. 游离皮片移植属于

89. 肾移植属于

90. 骨髓移植属于

(91~92 题共用备选答案)

- A.尿培养
B.痰培养
C.血培养
D.粪便培养
E.骨髓培养
- 91.确诊伤寒最常用的方法是
92.细菌性痢疾的确诊依据是
(93~95 题共用备选答案)
- A.窦前
B.窦后
C.窦内
D.肝前
E.肝后
- 93.肝炎后肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
94.血吸虫肝硬化所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
95.肝静脉阻塞综合征所致门静脉高压症的主要阻塞部位在
(96~97 题共用备选答案)
- A.血红蛋白 30~60 g/L
B.血红蛋白<120 g/L
C.血红蛋白<110 g/L
D.血红蛋白 90~120 g/L
E.血红蛋白 145 g/L
- 96.6 个月至 6 岁小儿贫血的诊断标准是
97.6~14 岁小儿贫血的诊断标准是
(98~100 题共用备选答案)
- A.圆韧带
B.主韧带
C.阔韧带
D.宫骶韧带
E.骨盆漏斗韧带
- 98.固定子宫颈于正常位置的韧带是
99.间接保持子宫呈前倾位置的韧带是
100.维持子宫在盆腔正中央的韧带是



相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 不属于艾滋病传播途径的是
 - A. 同性性接触
 - B. 异性性接触
 - C. 同桌进餐
 - D. 输血
 - E. 分娩
2. 移位菌群失调的原因不包括
 - A. 使用抗菌药物不恰当
 - B. 外科手术
 - C. 插管或介入治疗
 - D. 免疫功能降低
 - E. 细菌结构变化
3. 治疗鹅口疮错误的是
 - A. 2%碳酸氢钠液擦洗口腔
 - B. 积极治疗原发病
 - C. 局部涂甲紫
 - D. 加大抗生素剂量
 - E. 局部应用抗真菌药物
4. 无菌物品的保存方法不当的是
 - A. 储物架及运送车要保持干净
 - B. 无菌物品应有合格标志,并标明灭菌日期
 - C. 快速压力蒸汽灭菌物品不论是否潮湿,均可保存 7~14 天
 - D. 储藏房间要保持湿式清扫,避免扬尘
 - E. 无菌物品应与未无菌物品分开存放
5. 下列沟通障碍的原因中不属于发送者障碍的有
 - A. 目的不明,导致信息内容的不确定性
 - B. 表达模糊,导致信息传递错误
 - C. 选择失误,导致信息误解的可能性增大
 - D. 言行不当,导致信息理解错误
 - E. 过度加工,导致信息的模糊或失真
6. 传染病区设置隔离室的主要目的是
 - A. 为病人提供良好的休息环境
 - B. 便于对病人进行监护
 - C. 将感染源与传播的途径分开
 - D. 将感染源与易感宿主从空间上分开
 - E. 方便家属探视
7. 医院感染暴发中流行病学处理的基本步骤,前三步是
 - A. 证实流行或暴发→查找感染源→查找引起感染的因素
 - B. 证实流行或暴发→组织落实有效的控制措施→写出调查报告
 - C. 查找感染源→证实流行或暴发→查找引起感染的因素
 - D. 查找引起感染的因素→证实流行或暴发→查找感染源
 - E. 查找感染源→查找引起感染的因素→证实流行或暴发
8. 口腔科的牙钻属于
 - A. 高度危险性物品
 - B. 中度危险性物品
 - C. 低度危险性物品
 - D. 高度水平消毒物品
 - E. 中度水平消毒物品
9. 当为某冠心病病人进行健康教育时,病人向你表达了他认为吸烟对他的健康不会产生影响,所以即使在患病期间,他仍然不想戒烟,病人的这种行为受到了哪类因素的影响
 - A. 倾向因素
 - B. 促成因素
 - C. 强化因素
 - D. 环境因素
 - E. 学习因素
10. 资源评估属于
 - A. 管理与政策诊断

- B.组织诊断
C.环境诊断
D.社会诊断
E.行为诊断
- 11.下列化学消毒剂中,可用于空气消毒的是
- A.2%戊二醛
B.75%乙醇
C.2%过氧乙酸
D.3%过氧化氢
E.0.5%氯己定
- 12.不耐热、不耐湿的物品消毒宜选用
- A.环氧乙烷气体熏蒸
B.紫外线照射法
C.高压蒸汽法
D.消毒液浸泡法
E.电离辐射法
- 13.关于控制的叙述,错误的是
- A.监视各项活动以保证它们按计划进行并纠正各种重要偏差的过程
B.控制的重要性包括在执行组织计划中的保障作用和和管理职能中的关键作用
C.控制的类型包括前馈控制、同期控制和反馈控制
D.控制的基本过程包括建立标准、衡量绩效和纠正偏差
E.控制的基本方法包括预算控制、质量控制、进度控制和数据控制
- 14.对病人最后的护理结果的质量评价属于
- A.基础质量管理
B.成效管理
C.环节质量管理
D.过程质量管理
E.终末质量管理
- 15.近中期效果评价是指
- A.形成评价
B.过程评价
C.效应评价
D.结局评价
E.总结评价
- 16.注射后处理针头的方法错误的是
- A.用过的针头采用双手“复帽”
B.不将针尖指向身体任何部位
C.使用后不用手去除针头
D.将针头放入防水耐刺穿的容器内
E.用过的针头不再重复使用
- 17.属于原位菌群二度失调的是
- A.正常菌群在原有部位发生了数量的暂时性变化
B.正常菌群在原有部位发生了种类结构的暂时性变化
C.正常菌群在原有部位比例发生了病理性波动
D.正常菌群转移到另一部位定植或定居
E.可逆性失调
- 18.连续使用的氧气湿化瓶应
- A.每周消毒2次,用后终末消毒,干燥保存
B.每日清洁,用后消毒,干燥保存
C.每日消毒,用后终末消毒,干燥保存
D.每周1次消毒,用后终末消毒,干燥保存
E.专人专用,用后进行终末消毒
- 19.护理管理的实践性下列哪句不妥
- A.护理工作时间性强,要按时完成护理服务
B.护理工作面广量大,护士常处于劳累状态
C.护理工作要保证24小时连续不间断
D.护理工作责任性强,护士常处于紧张状态
E.护士为护理对象提供健康服务就是管理过程
- 20.微生物从外界环境落到人体,并在一定部位不断生长、繁殖后代,这种现象称为
- A.植入
B.转移
C.定植

- D.定居
E.易位
- 21.根据标准预防的概念,下列不被看作具有传染性的物质是
- A.粪便和尿液
B.体液
C.分泌物
D.血液
E.汗液
- 22.科学管理理论的基本出发点为
- A.提高劳动生产率
B.实行科学化管理
C.调动人的积极性
D.体现公平的分配制度
E.建立健全的管理系统
- 23.护理部根据护理专业的发展变化及时调整工作模式,遵循的动态管理原则是
- A.系统原则
B.效益原则
C.弹性原则
D.人本原则
E.价值原则
- 24.感染病人使用后的器械,正确的处理程序是
- A.消毒、去污、清洗、灭菌
B.去污、清洗、消毒、灭菌
C.清洗、去污、消毒、灭菌
D.去污、消毒、清洗、灭菌
E.清洗、灭菌、消毒、去污
- 25.在确定健康教育的计划目标时错误的是
- A.总体目标必须最终得以实现
B.具体目标是由三个“W”和两个“H”组成
C.总体目标是宏观的,较为笼统的
D.总体目标可分解为多个具体目标
E.具体目标是一些具体的量化的指标
- 26.危害健康的行为不包括
- A.高脂高糖低纤维素饮食
B.A型行为
C.不良生活习惯
D.戒烟
E.C型行为
- 27.除下列哪项外,均是采用观察法收集的资料
- A.测量患者的体温
B.听右下肺有无湿啰音
C.触摸皮肤温度、湿度
D.阅读患者的查体记录
E.查看患者尿液的颜色
- 28.可达到高水平消毒法的是
- A.聚维酮碘
B.苯扎溴铵
C.过氧化氢
D.氯己定
E.乙醇
- 29.喹诺酮类抗菌药的主要作用机制是
- A.干扰细菌细胞壁合成
B.损伤细胞膜
C.影响细菌蛋白质的合成
D.抑制细菌核酸的形成
E.抑制固醇类药物的合成
- 30.真菌引起的医院感染中,最常见的致病菌是
- A.毛霉菌
B.隐球菌
C.光滑念珠菌
D.白色念珠菌
E.李斯特菌
- 31.社交距离通常是指
- A.1.2~4 m
B.4 m 以外
C.50~120 cm
D.50 cm 以内
E.100 cm 以内
- 32.基础护理合格率的评价属于
- A.基础质量评价
B.服务质量评价
C.环节质量评价
D.过程质量评价

- E. 终末质量评价
33. 下列属于高度危险物品的是
- A. 胃镜
B. 体温表
C. 便盆
D. 导尿管
E. 压舌板
34. 经粪-口途径传播的肝炎病毒有
- A. 甲型、丙型肝炎病毒
B. 甲型、戊型肝炎病毒
C. 乙型、丙型肝炎病毒
D. 丙型、戊型肝炎病毒
E. 甲型、乙型肝炎病毒
35. 下列区域物体表面消毒不合格的是
- A. 普通手术室, 细菌总数 ≤ 5 cfu/cm², 未检出致病菌
B. 急诊抢救室, 细菌总数 ≤ 10 cfu/cm², 未检出致病菌
C. 肝炎病房, 细菌总数 ≤ 15 cfu/cm², 未检出致病菌
D. 注射室, 细菌总数 ≤ 15 cfu/cm², 未检出致病菌
E. 新生儿室的工作人员, 细菌总数 ≤ 5 cfu/cm², 未检出致病菌
36. 手术前需预防性使用抗生素的是
- A. 经阴道子宫切除术
B. 甲状腺手术
C. 疝修补术
D. 子宫肌瘤切除术
E. 扁桃体摘除术
37. 我国护理管理标准规定一级医院医师与护理人员之比为
- A. 1 : 2
B. 1 : 3
C. 1 : 4
D. 1 : 1
E. 2 : 3
38. 被公认为“科学管理之父”的管理学家是
- A. 卢因
B. 泰勒
C. 韦伯
D. 亚当斯
E. 梅奥
39. 医疗用品污染后的危害程度可分为几类
- A. 1类
B. 3类
C. 5类
D. 7类
E. 9类
40. “爱探究、好攻击、易激惹、喜欢自我表现”属于哪一行为发展阶段的主要表现
- A. 被动发展阶段
B. 主动发展阶段
C. 自主发展阶段
D. 巩固发展阶段
E. 自我发展阶段
41. 不属于目标管理局限性的是
- A. 目标制定有难度
B. 限制管理者能力发挥
C. 缺乏灵活性
D. 常忽视成本估计
E. 缺乏连续性
42. 随着计算机技术的日益成熟和广泛应用, 管理幅度管理层的理论也发生着革命性的变化, 不符合目前变化的是
- A. 中层管理功能正逐渐由计算机完成
B. 组织管理幅度变宽
C. 组织管理层级变少
D. 组织日益由扁平化走向高耸型
E. 信息传递加快
43. 组织图不能提供的信息是
- A. 指挥关系
B. 人、财、物的流向
C. 管理幅度
D. 集中与分散
E. 组织规模
44. 护理人才结构的群体结构不包括
- A. 专业结构

- B.能级结构
C.年龄结构
D.知识结构
E.智能结构
- 45.“条条大路通罗马”描述的有效沟通的策略是
- A.避免一味说教
B.使用恰当的沟通方式
C.考虑接受者的观点和立场
D.以行动强化语言
E.充分利用反馈机制
- 46.不属于协调基本要求的是
- A.及时协调与连续协调相结合
B.从根本上解决问题
C.调动当事者的积极性
D.以大多数人的利益为主
E.相互尊重
- 47.病房护士长最有效的监督方法是
- A.听取所有护士的汇报
B.直接观察
C.指派专人监督
D.护士之间相互尊重
E.护士之间相互监督
- 48.质量观的演变过程中,提出“全面顾客满意”概念的阶段是
- A.“符合性质量”阶段
B.“适用性质量”阶段
C.“满意性质量”阶段
D.“卓越性质量”阶段
E.“全面质量满意”阶段
- 49.在护理质量管理中树立“第一次把事情做对”观念的护理质量管理基本原则是
- A.以患者为中心原则
B.预防为主原则
C.工作标准“零缺陷”原则
D.全员参与原则
E.基于事实的决策方法原则
- 50.按教育目的或内容进行分类,不属于健康教育研究领域范畴的是
- A.学校健康教育
B.防治疾病健康教育
C.营养健康教育
D.环境保护健康教育
E.生殖健康教育
- 51.对信息和讯息的界定不正确的是
- A.讯息是一种信息
B.信息泛指人类社会传播的一切内容
C.讯息传播产生传、受双方有意义的交换
D.讯息传播产生传、受双方之间的互动
E.讯息是由信息符号构成的抽象信息
- 52.小组讨论时,一般适宜的小组人数为
- A.2~5人
B.3~6人
C.6~10人
D.10~15人以上
E.15~20人
- 53.患者在门诊诊疗过程中接受的健康教育称为
- A.住院教育
B.病房教育
C.随访教育
D.门诊教育
E.入院教育
- 54.在实施患者健康教育时,首先要进行的是
- A.确定患者教育目标
B.分析患者的需求
C.制订患者教育计划
D.考虑患者教育的形式
E.评价教育需求
- 55.属于医院获得性感染的是
- A.新生儿呕吐
B.新生儿水痘
C.新生儿红斑
D.新生儿黄疸
E.新生儿脐红
- 56.影响人体微生态平衡的因素不包括
- A.免疫系统疾病
B.腰穿

- C.长期服用抗生素
D.慢性咽炎
E.长期静脉输液
- 57.紫外线灯照射强度监测至少应
- A.每月一次
B.每季度一次
C.每半年一次
D.每年一次
E.每一年半一次
- 58.医务人员应立即洗手的条件是
- A.接触患者的分泌物前
B.接触患者的血液前
C.脱去污染手套后
D.接触同一个患者身体的同一部位时
E.接触污染器械前
- 59.甲型肝炎传播途径不包括
- A.粪-口途径
B.密切接触
C.垂直传播
D.粪便污染食物
E.粪便污染水源
- 60.乙型肝炎的传播途径是
- A.通过共同就餐传播
B.通过拥抱传播
C.通过共用牙刷和剃刀
D.通过空气传播
E.通过握手传播
- 61.系统的特性不包括
- A.整体性
B.目的性
C.相关性
D.内部适应性
E.层次性
- 62.护理仪器设备的维护计划是
- A.战略性计划
B.战术性计划
C.综合性计划
D.长期计划
E.短期计划
- 63.目标管理的基本精神是

- A.以自我管理为中心
B.员工参与管理
C.重视成果
D.强调自我评价
E.以共同制定的目标为依据
- 64.沟通障碍中属于接受者障碍的是
- A.目的不明
B.表达模糊
C.选择失误
D.过度加工
E.言行不当
- 65.有效沟通策略中不正确的是
- A.使用正式沟通的方式
B.考虑接受者的观点和立场
C.充分利用反馈机制
D.以行动强化语言
E.避免一味说教
- 66.正确的谈话技巧是
- A.善于掌控下属发言内容
B.善于启发下属聆听,控制情绪
C.善于启发下属讲真情实话
D.善于抓住所有问题
E.善于规避敏感话题
- 67.医疗护理所用材料及药品购买控制,其控制的对象类型是
- A.作业
B.人员
C.信息
D.财务
E.组织绩效
- 68.不属于护理管理控制关键点的是
- A.高危时间
B.高危患者
C.高危护士
D.关键制度
E.所有科室
- 69.获取患者满意程度的最佳方式是
- A.问卷调查
B.电话随访
C.患者投诉

- D. 与患者直接沟通
E. 第三方调查
70. 健康促进的三个基本策略是
A. 提倡、协调、控制
B. 提倡、赋权、协助
C. 控制、赋权、协调
D. 控制、赋权、倡导
E. 倡导、赋权、协调
71. 不属于健康促进活动领域的是
A. 制定促进健康的公共政策
B. 描述人群的健康状况
C. 发展个人技能
D. 加强社区行动
E. 调整卫生服务方向
72. 人的行为的基本构成要素有行为主体、行为客体、行为环境、行为手段和
A. 行为动机
B. 行为目的
C. 行为计划
D. 行为过程
E. 行为结果
73. 人类的行为因遗传、环境以及学习经历的不同而千差万别, 丰富多彩, 表现出较大的
A. 目的性
B. 可塑性
C. 一致性
D. 差异性
E. 规律性
74. 危害健康行为的主要特点是危害性、明显和稳定性以及
A. 连续性
B. 单一性
C. 危险性
D. 多样性
E. 习得性
75. 健康信息应具有的特点中, 针对性是指
A. 健康信息的选择、制作、传递必须针对传播者的需求和特点
B. 健康信息的选择、制作、传递必须针对传播媒介的特点
C. 健康信息的选择、制作、传递必须针对受者的需求和特点
D. 健康信息的选择、制作、传递必须针对传播环境的特点
E. 健康信息的选择、制作、传递必须针对主管部门的需求和特点
76. 健康传播中受者在接触信息时普遍存在的心理特点不包括
A. 求异
B. 求真
C. 求短
D. 求新
E. 求近

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- (77~78 题共用备选答案)
- A. 胃炎
B. 痰中培养大肠埃希杆菌
C. 阑尾炎
D. 新生儿腹泻
E. 产后乳腺炎
77. 通过消毒、灭菌、隔离、无菌技术等措施可有效地预防和控制的是
78. 通过合理使用抗菌药物和免疫抑制
- 类药物降低感染风险的是
(79~81 题共用备选答案)
- A. 高压蒸汽灭菌
B. 干热灭菌
C. 滤过除菌
D. 紫外线
E. 煮沸消毒
79. 空气的消毒宜采用
80. 动物免疫血清的除菌宜采用

- 81.手术用金属器械宜采用
(82~83 题共用备选答案)
- A.戴清洁手套
B.戴一次性手套
C.戴医用口罩
D.戴口罩
E.穿隔离衣
- 82.医务人员接触血液及污染物品时应
- 83.进行手术等无菌操作时应
(84~86 题共用备选答案)
- A.信息源
B.编码
C.传递信息
D.解码
E.反馈
- 84.信息被译成能理解的一系列符号的过程属于沟通步骤中
- 85.包括接受、译码和理解三个环节的沟通步骤是
- 86.信息沟通属于沟通步骤中的
(87~89 题共用备选答案)
- A.目标控制
B.进度控制
C.预算控制
D.质量控制
E.技术控制
- 87.将实际情况与预算计划对比检查,及时发现问题、纠正偏差的控制方法是
- 88.对生产和工作的进程在时间上进行控制的方法是
- 89.把执行结果与预期目标及标准进行对照检查,以发现问题,采取纠偏措施的控制
(90~91 题共用备选答案)
- A.呼吸机相关性肺炎
B.呼吸衰竭
C.肺癌
D.新生儿腹泻
E.结肠癌
- 90.属于医院感染的是
- 91.不属于医院感染的是
(92~94 题共用备选答案)
- A.碘伏消毒液原液局部擦拭 2 遍
B.碘伏消毒液原液局部擦拭
C.20 000 mg/mL 葡萄糖酸氯己定擦拭
D.有效含量>1 g/L 氯己定乙醇溶液局部擦拭 2~3 遍
E.3%过氧化氢冲洗
- 92.适用于穿刺部位的皮肤消毒的方法为
- 93.适用于手术切口部位的皮肤清洁方法为
- 94.适用于伤口创面消毒的冲洗方法为
(95~97 题共用备选答案)
- A.管理的科学性
B.管理的自然属性
C.管理的广泛性
D.人和时间
E.能源和信息
- 95.管理的基本特征
- 96.护理管理的特点
- 97.管理二重性的体现
(98~100 题共用备选答案)
- A.倒放
B.竖放
C.平放
D.斜放
E.侧放
- 98.手术器械包、硬式容器应
- 99.盆、盘、碗类物品应
- 100.纸袋、纸塑包装应

专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 关于孕妇泌尿系统变化的描述, 不正确的是
 - A. 夜尿量多于日尿量
 - B. 妊娠末期出现尿频
 - C. 饭后可出现糖尿
 - D. 肾脏负担加重
 - E. 易患急性肾盂肾炎, 以左侧多见
2. 骨盆外测量值在正常范围内的是
 - A. 坐骨结节间径 7 cm
 - B. 髂嵴间径 26 cm
 - C. 出口后矢状径 7 cm
 - D. 骶耻外径 16 cm
 - E. 髂棘间径 22 cm
3. 关于第一产程分期的描述, 正确的是
 - A. 潜伏期是指从临产规律宫缩至宫口扩张 4 cm, 约需 8 小时
 - B. 活跃期是指从宫口扩张 4 cm 至宫口开全 10 cm, 约需 4 小时
 - C. 加速期是指宫口扩张 4 cm 至 5 cm, 约需 1.5 小时
 - D. 最大加速期是指宫口扩张 5 cm 至 9 cm, 约需 2 小时
 - E. 减速期是指宫口扩张 9 cm 至宫口开全 10 cm, 约需 0.5 小时
4. 不是新生儿特殊生理现象的是
 - A. 生理性体重下降
 - B. 生理性黄疸
 - C. 阴道有少量血性黏液流出
 - D. 乳房肿大
 - E. 皮肤有散在红疹
5. 急性胎儿窘迫最明显的表现是
 - A. 胎动改变
 - B. 胎心率改变
 - C. 羊水胎粪污染
 - D. 胎儿头皮血 pH 下降
 - E. 胎儿头皮血氧分压的改变
6. 硫酸镁在先兆早产患者中的主要用途是
 - A. 降压作用
 - B. 解除痉挛
 - C. 消肿作用
 - D. 促胎肺成熟
 - E. 抑制宫缩
7. 急性羊水过多大多发生于
 - A. 妊娠 12~16 周
 - B. 妊娠 20~24 周
 - C. 妊娠 26~28 周
 - D. 妊娠 30~34 周
 - E. 妊娠 36~38 周
8. 关于妊娠合并重度缺铁性贫血对胎儿的影响, 不正确的是
 - A. 当孕妇患有重度贫血时可导致胎儿窘迫
 - B. 当孕妇患有重度贫血可引起胎盘缺血而发生胎儿发育畸形
 - C. 当孕妇患有重度贫血时可导致早产
 - D. 当孕妇患有重度贫血时可导致死胎
 - E. 当孕妇患有重度贫血时可导致胎儿生长受限
9. 胎膜早破并发症不包括
 - A. 早产
 - B. 感染
 - C. 前置胎盘
 - D. 脐带脱垂
 - E. 胎儿宫内窘迫
10. 产后出血的治疗原则中, 首先考虑子宫切除止血的是
 - A. 子宫收缩乏力

- B.胎盘粘连
C.胎盘嵌顿
D.胎盘植入
E.凝血功能障碍
- 11.产褥感染可表现为
A.急性乳腺炎
B.急性子宫内膜炎
C.急性尿道炎
D.急性肾盂肾炎
E.上呼吸道感染
- 12.关于产褥感染的防治,不妥的是
A.正确处理产程
B.产时尽量少做肛查
C.产前、产时常规使用抗生素
D.产褥期保持外阴清洁
E.孕期加强卫生宣教
- 13.X连锁显性遗传病;母亲为患者,父亲正常,子代中女儿患病风险为
A.1/16
B.1/8
C.1/4
D.1/2
E.1
- 14.女性青春期开始的最重要标志是
A.阴毛、腋毛开始生长
B.声音变得高尖
C.骨盆变宽
D.乳房发育
E.月经初潮
- 15.关于母体妊娠中期常见心理社会反应的描述,错误的是
A.在胎动出现后,孕妇开始接受妊娠的事实
B.出现爱恨交加的矛盾心理
C.给未出生的孩子起名字、猜性别
D.孕妇的注意力集中于自己和胎儿身上
E.关心孩子的喂养和生活护理等方面的知识
- 16.骨盆测量值低于正常值的是
A.骶耻外径 18 cm
B.髂棘间径 23 cm
C.髂嵴间径 25 cm
D.坐骨结节间径 8.5 cm
E.出口后矢状径 7.5 cm
- 17.关于临产后宫颈的变化,正确的是
A.初产妇多是宫颈管消失与宫颈口扩张同时进行
B.经产妇一般是宫颈管先消失,宫颈口后扩张
C.宫颈管消失过程是先形成漏斗状,逐渐缩短直至消失
D.前羊水囊的形成阻碍宫颈口扩张
E.破膜后胎先露直接压迫宫颈,可减慢宫颈口扩张速度
- 18.关于重型胎盘早剥的临床表现,正确的是
A.主要症状为突发持续性腹痛
B.子宫软,有间歇
C.剥离面不超过胎盘的 1/3
D.以外出血和混合性出血为主
E.贫血程度与外出血量成正比
- 19.关于双胎妊娠的处理,正确的是
A.第一胎娩出后,若第二胎为臀位则剖宫产
B.第一胎娩出后,立即静脉滴注缩宫素助第二胎娩出
C.第一胎娩出后,立即肌注缩宫素预防产后出血
D.第一胎娩出后,立即人工破膜娩出第二胎
E.第二胎娩出后,立即使用缩宫素预防产后出血
- 20.重度子痫前期孕妇孕晚期出现腹痛伴阴道流血,最可能的疾病是
A.胎盘早剥
B.前置胎盘
C.子宫颈癌

- D.子宫破裂
E.先兆流产
- 21.关于缺铁性贫血对妊娠影响的描述,错误的是
- A.重度贫血可导致孕妇发生贫血性心脏病
B.轻度贫血对胎儿影响不大
C.重度贫血可导致妊娠期高血压疾病发生率增高
D.重度贫血可导致产褥感染发生率增高
E.铁可以通过胎盘双向运转,但在一般情况下胎儿摄取占主要优势
- 22.关于妊娠期糖尿病的描述,不正确的是
- A.妊娠期胎盘分泌的激素具有抗胰岛素作用
B.妊娠期肾糖阈降低,尿糖不能恰当反映病情
C.妊娠期母体对胰岛素的需要较非孕时增加,分娩后胰岛素的用量应与妊娠期相同
D.妊娠期糖尿病容易合并酮症酸中毒
E.妊娠中晚期受胰岛素抵抗的作用,可使隐性糖尿病显性化,既往无糖尿病的孕妇发生糖尿病
- 23.持续性枕后位不易发生的并发症是
- A.宫缩乏力
B.羊水栓塞
C.胎儿窘迫
D.软产道裂伤
E.产后出血
- 24.关于先兆子宫破裂的体征,正确的是
- A.胎心无变化
B.迅速出现贫血
C.子宫体部肌肉菲薄
D.出现病理性缩复环
E.出现全腹压痛、反跳痛
- 25.关于在第一产程发生羊水栓塞患者的治疗,错误的是
- A.等待自然分娩
B.应用肾上腺皮质激素抗过敏
C.应用解痉药物解除支气管痉挛
D.及时治疗凝血功能障碍
E.预防与治疗肾衰竭
- 26.关于慢性盆腔炎的病理改变,正确的是
- A.卵巢浆液性囊肿
B.急性输卵管卵巢炎
C.宫颈腺囊肿
D.输卵管卵巢囊肿
E.卵巢巧克力囊肿
- 27.关于妊娠期常见症状的描述,不正确的是
- A.妊娠后期常有跟部及小腿下半部轻度水肿,经休息后消退,属正常现象
B.妊娠6周左右出现恶心、晨起呕吐等早孕反应,12周左右消失
C.尿频、尿急、阴道分泌物增多症状于妊娠初3个月及末3个月明显
D.下肢肌肉痉挛是孕妇缺钙的表现
E.血容量减少易出现生理性贫血
- 28.妊娠期容易发生心衰的时间是
- A.妊娠20~24周
B.妊娠24~28周
C.妊娠28~30周
D.妊娠32~34周
E.妊娠34~38周
- 29.美国学者鲁宾(Rubin, 1984)认为孕妇为接受新生命的诞生,维持个人及家庭的功能完整,必须完成的心理发展任务不包括
- A.确保自己及胎儿能安全顺利地度过整个孕产期
B.促使家庭重要成员接受新生儿及对母亲角色的认可
C.学习为孩子奉献自己
D.学习为丈夫奉献自己
E.情绪上与胎儿连成一体

30.临产后,肛门检查或阴道检查用来确诊胎方位的颅缝是

- A.额缝
- B.矢状缝
- C.冠状缝
- D.人字缝
- E.颞缝

31.产后宫缩痛自然消失的时间是

- A.产后 2~3 天
- B.产后 6~7 天
- C.产后 8~10 天
- D.产后 7~10 天
- E.产后 10~11 天

32.急性胎儿窘迫的主要处理原则为

- A.必须立即行剖宫产终止妊娠
- B.尽早人工破膜
- C.积极改善缺氧状态,尽快终止妊娠
- D.加强宫缩,尽快分娩
- E.以上都不是

33.关于胎盘早剥的处理原则,正确的是

- A.一经诊断,立即剖宫产
- B.缩宫素促使及早分娩
- C.应及早使肝素预防凝血功能障碍
- D.重型胎盘早剥患者可给予期待疗法
- E.纠正休克,及时终止妊娠

34.以下哪项是双胎妊娠分娩时正确的处理措施

- A.第一胎娩出后立即断脐
- B.第一胎娩出后立即人工破膜娩出第一胎
- C.第一胎娩出后,肌注缩宫素防止产后出血
- D.第二胎为横位,即行剖宫产
- E.第二胎娩出后宜用腹带紧裹腹部以预防产后出血

35.关于妊娠合并心脏病的描述,错误的是

- A.法洛四联症患者不宜妊娠
- B.妊娠 32~34 周,分娩期及产后的最初

3 天内,是患有心脏病的孕妇最危险的时期

C.心功能 III~IV 级孕妇分娩期行剖宫产终止妊娠

D.不宜再妊娠者,分娩后应立即行绝育术

E.产时产后应用抗生素

36.关于妊娠合并糖尿病对胎儿的影响,错误的是

- A.畸形儿发生率高
- B.胎儿胰岛素分泌减少
- C.新生儿易发生反应性低血糖
- D.围生儿病死率高
- E.新生儿抵抗力弱,均需按早产儿处理

37.关于妊娠合并乙型肝炎患者分娩期的处理原则,不正确的是

- A.产钳助产缩短第二产程
- B.胎儿娩出后立即注射缩宫素
- C.临产后备新鲜血
- D.产后肌内注射维生素 K
- E.严密监测病情,防止产程延长

38.关于胎膜早破的治疗原则,不正确的是

- A.破膜 12 小时后应给予抗生素预防感染
- B.避免不必要的肛诊与阴道检查
- C.胎膜早破均应选择剖宫产终止妊娠
- D.期待疗法适用于孕 28~35 周不伴感染、羊水池深度>3 cm 者
- E.孕期达 35 周以上并有分娩发动者,可自然分娩

39.宫缩乏力导致的产后出血可表现为

- A.胎盘未剥离前即出血
- B.胎儿娩出后立即出现阴道持续性流血,鲜红色
- C.胎盘娩出后阴道流血多,血不凝
- D.胎盘娩出后阴道多量流血,宫体软,轮廓不清
- E.按摩子宫时宫底升高,出血减少

40.某女,35 岁。平素月经规律,周期为

32天,其排卵时间为

- A.两次月经中期
- B.本次月经来潮后14天
- C.本次月经干净后14天
- D.下次月经来潮前14天
- E.以上都不是

41.患者,女性,29岁。孕1产0,孕36周,胎心135次/分,胎动监测正常,现来医院做产前咨询,想了解自身生理和心理的变化情况。关于该孕妇循环及血液系统变化的描述,不正确的是

- A.心脏向左、向上、向前移位
- B.血容量平均增加2500 mL
- C.易发生下肢、外阴静脉曲张和痔
- D.血液处于高凝状态
- E.血液稀释,白蛋白减少

42.患者,女性,34岁。孕26周,胎动减少1天。检查宫高20 cm,胎心132次/分,子宫敏感性高。B超检查羊水指数:5 cm,胎儿外观无畸形。关于该患者的处理措施,恰当的是

- A.静脉滴注缩宫素促进宫缩
- B.高危门诊随访治疗
- C.立即剖宫产结束分娩
- D.立即人工破膜
- E.增加羊水量期待疗法

43.患者,女性,28岁。孕1产0,孕40+2周,经阴道分娩一男活婴,体重3400 g,胎盘、胎膜娩出完整。分娩后半小时阴道流血约700 mL,诊断为宫缩乏力性产后出血。针对该情况,首选的止血方法是

- A.按摩子宫
- B.应用宫缩剂
- C.宫腔填塞纱条
- D.盆腔血管结扎
- E.子宫次全切除术

44.患者,女性,30岁。左侧大阴唇下1/3处见囊性包块,触之有波动感,压痛明显,直径4 cm,诊断为左侧前庭大腺囊肿。首选的

治疗方法是

- A.前庭大腺囊肿剥除术
- B.前庭大腺囊肿造口术
- C.前庭大腺囊肿抽液术
- D.抗生素治疗
- E.卧床休息

45.患者,女性,32岁。因痛经4年,进行性加重半年就诊。妇科检查:子宫后位,活动性差,子宫直肠陷凹散在多个痛性结节,附件未见异常。该患者最可能的诊断是

- A.子宫肌瘤
- B.子宫直肠陷凹癌肿
- C.子宫内膜癌
- D.子宫内膜异位症
- E.子宫颈癌

46.患者,女性,30岁。结婚6年,孕0产0。经夫妻双方检查证实男方一切正常,女方双侧输卵管阻塞,要求治疗,当医院缺乏实验室培养条件时,建议选择的治疗方案是

- A.人工授精
- B.体外授精与胚胎移植
- C.配子输卵管内移植
- D.配子宫腔内移植
- E.诱发排卵

47.患者,女性,28岁。主诉停经8周,感觉疲乏,乳房触痛明显。患者平素月经规律,3~4天/28天。若考虑怀孕,除以上体征外,此时常见的临床表现是

- A.妊娠纹
- B.胎动感
- C.恶心
- D.妊娠斑
- E.以上均是

48.患者,女性,32岁。孕2产1,孕32周。孕期进展顺利,来社区医院进行产前检查,手测子宫底高度是

- A.脐上1横指
- B.脐上2横指

- C.脐上3横指
- D.脐与剑突之间
- E.剑突下2横指

49.患者,女性,28岁。停经40天,剧烈腹痛2小时,T 37.6℃,BP 90/50 mmHg,下腹有明显的压痛、反跳痛,宫颈举痛明显,宫体稍大、软,宫口闭合,右附件区有一边缘不清的包块,触痛明显。最可能的诊断是

- A.宫颈粘连
- B.急性阑尾炎
- C.输卵管妊娠
- D.子宫内膜异位症
- E.右侧附件炎

50.患者,女性,30岁。孕29周,半夜睡醒突然发现自己睡在血泊之中,到达医院时已接近休克状态。此患者最可能的诊断是

- A.完全性前置胎盘
- B.部分性前置胎盘
- C.边缘性前置胎盘
- D.胎盘早剥
- E.胎膜早破

51.患者,女性,产程中因胎盘滞留行人工剥离胎盘术。产后1周,出现寒战、高热、下腹部疼痛。妇科检查:下腹软,有压痛,子宫在脐耻之间,血性恶露有臭味。该患者可能为

- A.子宫内膜炎
- B.阴道炎
- C.盆腔炎
- D.盆腔结缔组织炎
- E.血栓性静脉炎

52.患者,女性,14岁。13岁初潮,尚未建立规律月经。此次月经来潮持续约2周,量一直较多,有血块。查体:面色苍白,子宫稍小,双附件(-),血红蛋白75 g/L。为此患者首选的止血方法是

- A.大量雌激素
- B.大量孕激素
- C.刮宫产术

- D.大量止血药
- E.雄激素制剂

53.患者,女性,30岁。停经45天,阴道少量流血2天,右下腹剧烈疼痛4小时。T 37℃,P 101次/分,BP 90/60 mmHg,宫颈有举痛,宫体稍大,右附件区可触及一鸭卵大肿物,质软,界不清,压痛明显。首先考虑的诊断是

- A.输卵管妊娠
- B.急性阑尾炎
- C.先兆流产
- D.子宫内膜异位症
- E.右侧附件炎

54.患者,女性,28岁。孕1产0,孕35周合并重度妊娠期高血压疾病,需要终止妊娠,提示胎儿未成熟的是

- A.卵磷脂与鞘磷脂比值(L/S) ≥ 2
- B.羊水肌酐测定 ≥ 2 mg%
- C.羊水胆红素类物质用: ΔOD_{450} 测值 >0.02
- D.羊水中脂肪细胞出现率 20%
- E.B超测胎头双顶径值 >8.5 cm

55.患者,女性,经阴道分娩一男婴现产后1周患者出现头痛、头晕、胸闷,体温上升至40℃,无汗、尿少,考虑为

- A.上呼吸道感染
- B.产褥中暑
- C.子宫内膜炎
- D.盆腔结缔组织炎
- E.败血症

56.患者,女性,16岁。近半年经期下腹剧烈疼痛,持续约2日,伴腹泻、头晕、乏力需卧床并服用镇痛药。平日:月经周期规律,经量正常,基础体温呈双相型,妇科检查未见异常。该患者最有可能的诊断是

- A.原发性痛经
- B.子宫内膜炎
- C.子宫肌瘤
- D.输卵管炎

E. 子宫内脱垂位症

57. 患者, 女性, 65岁。孕4产3。在家庭分娩, 产后即开始工作, 自感阴道有脱出物多年, 加重半年, 妇科检查: 宫颈重度糜烂, 子宫及子宫颈均脱出于阴道口外, 判断为

- A. 子宫脱垂 I 度轻型
- B. 子宫脱垂 I 度重型
- C. 子宫脱垂 II 度轻型
- D. 子宫脱垂 II 度重型
- E. 子宫脱垂 III 度

58. 患者, 女性, 40岁。已婚, 孕3产1。既往月经规律, 现停经50天。与他人争吵后突发腹痛、呕吐、腹泻, 阴道点滴流血就诊。查体: BP 80/50 mmHg, P 120次/分。右下腹压痛, 移动性浊音(+), 尿hCG(+). 有助于简单、快速明确诊断的检查措施是

- A. 阴道后穹窿穿刺
- B. 血hCG测定
- C. 宫腔镜
- D. 阴道镜
- E. B超

(59~60题共用题干)

患者, 女性, 28岁。孕4产0, 孕40+5周。见红5小时入院。检查: 骨盆外测量径线正常, 枕右前位, 胎心率140次/分, 偶有宫缩。肛查: 宫口未开, 先露头, S-3, 胎膜未破

59. 关于该患者的诊断, 正确的是

- A. 孕4产1
- B. 流产
- C. 先兆临产
- D. 临产
- E. 过期产

60. 判断该患者临产开始的标志是

- A. 规律宫缩、宫口扩张、破膜
- B. 规律宫缩、胎儿下降感、尿频
- C. 规律宫缩、宫口扩张、破膜、胎儿下降感
- D. 规律且逐渐增强的宫缩、胎儿下降

感、破膜

E. 规律且逐渐增强的宫缩、进行性宫口扩张和胎先露下降

(61~63题共用题干)

患者, 女性, 28岁。平素月经规律, 现停经42天。阴道流血2天, 突发腹痛, 伴恶心、呕吐、晕厥就诊。检查: T 36.4℃, P 120次/分, BP 85/55 mmHg, 面色苍白, 表情痛苦。双合诊: 阴道后穹窿饱满, 宫颈举痛明显, 子宫未查清, 左侧宫旁有触痛。

61. 对该患者进一步确诊最适宜的方法是

- A. 阴道后穹窿穿刺
- B. B超检查
- C. 妊娠试验
- D. 腹腔镜检查
- E. 血常规检查

62. 该患者最可能的诊断是

- A. 阑尾炎
- B. 先兆流产
- C. 输卵管妊娠破裂
- D. 子宫内膜异位症
- E. 附件炎

63. 对于该患者, 最恰当的处理方法是

- A. 中药治疗
- B. 中西医结合疗法
- C. 输血
- D. 纠正休克的同时手术
- E. 纠正休克后手术

(64~65题共用题干)

患者, 女性, 30岁。先天性心脏病, 心功能II级。现孕39周入院待产。

64. 关于该患者的处理措施, 不正确的是

- A. 尽量缩短第二产程
- B. 胎儿娩出后立即在产妇腹部放置沙袋
- C. 产后预防性使用抗生素, 无感染征象时停药
- D. 产褥期摄取清淡饮食, 少量多餐, 预

防便秘,必要时使用缓泻剂

E.禁止母乳喂养

65.关于该患者产后24小时内的护理措施,正确的是

- A.协助产妇室内活动
- B.新生儿按需哺乳
- C.指导产妇学习护理新生儿
- D.严格控制静脉输血量及速度
- E.鼓励产妇自我护理

(66~68题共用题干)

患者,女性,30岁,已婚。人工流产后反复下腹疼痛1年多,月经规律,量多,无痛经。妇科检查:子宫颈轻度糜烂,子宫后位,正常大小,活动受限,双附件区增厚,深压痛。

66.该患者最可能的诊断是

- A.急性盆腔炎
- B.盆腔结核
- C.输卵管妊娠
- D.子宫内膜异位症
- E.慢性盆腔炎

67.对该患者的处理,不恰当的是

- A.中药治疗
- B.加强营养
- C.物理疗法
- D.剖腹探查
- E.加强锻炼

68.若处理不当,该患者不会出现

- A.慢性盆腔炎急性发作
- B.子宫腺肌病
- C.输卵管妊娠
- D.输卵管卵巢炎性包块
- E.继发不孕

(69~71题共用题干)

患者,女性,28岁。孕2产0。孕33周,阴道少许流血2天,规律腹痛3小时,肛查子宫颈管消退,宫口未开。

69.此患者最可能的诊断是

- A.临产

B.先兆流产

C.晚期流产

D.先兆早产

E.前置胎盘

70.对该患者,最首要的处理措施是

- A.人工破膜
- B.缩宫素引产
- C.抗生素预防感染
- D.再次肛查确认宫口开大情况
- E.静脉滴注硫酸镁抑制宫缩

71.治疗期间宫缩越来越频繁,达到1次/3分钟,中等强度,肛查宫口开大3cm。处理正确的是

- A.继续硫酸镁治疗抑制宫缩
- B.立即剖宫产结束分娩
- C.新生儿出生后即结扎脐带
- D.产程中尽量避免会阴侧切
- E.以上均不对

(72~74题共用题干)

患者,女性,24岁。孕20周。因外阴瘙痒、烧灼痛就诊,妇科检查:会阴口、肛周见散在的粉红色乳头状突起,右侧大阴唇上方有灰白色融合成片的鸡冠状突起,顶部感染溃疡。

72.该患者最可能的医学诊断是

- A.尖锐湿疣
- B.淋病
- C.慢性宫颈炎
- D.梅毒
- E.外阴阴道假丝酵母菌病

73.对该患者进行治疗,不包括

- A.配偶若有感染需同时接受治疗
- B.必须住院隔离治疗
- C.会阴部病灶行冷冻疗法
- D.大阴唇病灶可手术切除
- E.分娩时应行剖宫产术

74.治疗过程中,该患者需注意

- A.首选青霉素药物
- B.每晚阴道上药

- C. 最好终止妊娠
 D. 治疗期间禁止性生活
 E. 每天 2 次阴道冲洗
 (75~76 题共用题干)

患者,女性,31 岁。葡萄胎刮宫术后 3 个月,阴道流血 20 余日,术后一直无月经来潮,2 日前突然下腹剧痛,出冷汗昏倒。检查:贫血貌, BP 80/50 mmHg, HR 108 次/分, T 36.8 ℃,腹部移动性浊音(+),阴道左侧壁有 1.5 cm 紫蓝结节,子宫大小不清,双侧附件有 6~8 cm 直径囊性包块,尚活动,下腹有压痛及反跳痛。

75. 该患者的诊断是

- A. 输卵管妊娠破裂
 B. 黄素囊肿破裂
 C. 卵巢囊肿破裂
 D. 卵巢囊肿扭转
 E. 侵蚀性葡萄胎并发子宫穿孔

76. 对该患者的紧急处理不包括

- A. 建立静脉通道,补充血容量及输血
 B. 立即给予化疗
 C. 开腹探查
 D. B 超或腹腔穿刺进一步明确诊断
 E. 测定静脉血 P-hCG 水平,留给日后疗效比较

(77~78 题共用题干)

患者,女性,28 岁。平素月经规律,停经 2 个月,阴道不规则流血 10 余天,偶有轻微阵发性腹痛,妇科检查:双附件区均扪及肿物。

77. 本例双附件区肿物可能诊断为

- A. 输卵管结核
 B. 输卵管积水
 C. 卵巢畸胎瘤
 D. 卵巢纤维瘤
 E. 卵巢黄素化囊肿

78. 治疗方案应是

- A. 清除宫腔内容物
 B. 静脉滴注缩宫素使宫腔内容物排出

- C. 预防性化疗
 D. 行子宫切除术
 E. 行子宫切除术,随后化疗
 (79~80 题共用题干)

患者,女性,42 岁。性交后出血半年。妇科检查:宫颈中度糜烂,前唇见直径 2 mm 大小菜花样肿物,宫旁组织未触及异常。

79. 目前该患者最可能的问题是

- A. 子宫肌瘤
 B. 子宫颈癌
 C. 子宫颈息肉
 D. 宫颈腺囊肿
 E. 子宫内膜癌

80. 需要确诊,目前首选的辅助检查手段是

- A. 宫颈细胞学检查
 B. 宫颈活组织检查
 C. 阴道镜检查
 D. 盆腔 CT 检查
 E. 腹部 X 线摄影

(81~83 题共用题干)

患者,女性,26 岁。体检发现右侧卵巢肿瘤,B 超提示为畸胎瘤,直径约 6 cm;无腹痛、腹胀、无大小便异常。妇科检查:右侧附件区肿块,边界清楚,活动欠佳。

81. 适合该患者的治疗手段应是

- A. 子宫切除术
 B. 子宫+右附件切除术
 C. 双附件切除术
 D. 右侧囊肿剥除术
 E. 肿瘤细胞减灭术

82. 若患者未进行治疗,8 年后出现腹胀、下坠感,查体:移动性浊音(+),妇科检查:右侧附件区肿块约 10 cm。患者可能出现

- A. 囊性变
 B. 蒂扭转
 C. 恶变
 D. 囊肿

- E.破裂
- 83.若上述诊断成立,该患者应该进行的治疗是
- A.全子宫切除

- B.全子宫及双附件切除
- C.右附件切除术+放疗
- D.右附件切除术+化疗
- E.囊肿剥除术

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方格涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(84~86 题共用备选答案)

- A.甲硝唑
- B.酮康唑
- C.干扰素
- D.青霉素
- E.头孢曲松钠
- 84.滴虫阴道炎选用
- 85.外阴阴道假丝酵母菌病选用
- 86.急性淋病选用

(87~89 题共用备选答案)

- A.子宫切除
- B.肺叶切除术
- C.放射治疗
- D.生物治疗
- E.化疗
- 87.一般妊娠滋养细胞肿瘤患者首选
- 88.妊娠滋养细胞肿瘤经多次化疗未能

吸收的孤立肺转移耐药病灶应采取

89.妊娠滋养细胞肿瘤子宫大病灶、耐药病灶或病灶穿孔出血时,应在化疗基础上采用

(90~92 题共用备选答案)

- A.妊娠期高血压
- B.轻度子痫前期
- C.重度子痫前期
- D.子痫
- E.妊娠合并慢性高血压

90.患者,女性,35岁。孕23周,发现血压升高1周,血压最高150/90 mmHg,查体尿蛋白(-),最恰当的诊断是

91.患者,女性,26岁。孕30周,自觉头晕2天,血压150/100 mmHg,尿蛋白(+),孕

早期检查正常,最恰当的诊断是

92.患者,女性,36岁。孕34周,头痛、眼花一周,血压180/100 mmHg,尿蛋白(++),眼底动静脉比为1:2,视网膜水肿,最恰当的诊断是

(93~94 题共用备选答案)

- A.分娩24小时内体温超过38℃
- B.产后6周后,体温超过38℃
- C.分娩24小时以后至10天内,每日测口温4次,有2次达到或超过38℃
- D.产后6周内,每4小时测一次体温,体温超过38℃,且白细胞高于 $10 \times 10^9/L$
- E.产褥期内,出现发热、恶露异常及疼痛

93.产褥感染表现为

94.产褥病率表现为

(95~96 题共用备选答案)

- A.试产
- B.静脉滴注缩宫素
- C.阴道助产
- D.继续待产
- E.剖宫产

95.轻度头盆不称者应采取

96.中骨盆平面狭窄者,双顶径达坐骨棘水平以下,宫口开全1小时,胎心好,应采取

(97~98 题共用备选答案)

- A.妊娠8周末
- B.妊娠16周末
- C.妊娠20周末
- D.妊娠28周末
- E.妊娠32周末

97.胚胎初具人形,超声现象可见早期心

脏形成并有搏动,可推断妊娠周数是

98.外生殖器可辨男女,头发长出,部分孕妇开始自觉胎动,可推断妊娠周数是

(99~100 题共用备选答案)

A.排尿困难

B.贫血

C.月经过多

D.扭转

E.白带增多

99.子宫下段前壁外突肌瘤可引起

100.子宫底部浆膜下肌瘤易发生



专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 关于孕期营养指导,内容不妥的是
 - 多吃蔬菜、水果
 - 最好摄入优质蛋白
 - 饮食应多样化
 - 孕期可适当补铁、钙
 - 粗粮不好消化,避免摄入
- 第二产程行阴道检查时,发现胎头矢状缝在母体骨盆左斜径上,小囟门在母体骨盆的右前方,胎方位是
 - 枕左前位
 - 枕左后位
 - 枕右前位
 - 枕右后位
 - 正枕前位
- 新生儿沐浴时间应在喂奶后
 - 0.5 小时
 - 1 小时
 - 1.5 小时
 - 2 小时后
 - 2.5 小时
- 关于胎心率早期减速的描述,正确的是
 - 是脐带受压的表现
 - 下降幅度 <60 次/分
 - 它的发生与子宫收缩几乎同时进行
 - 持续时间长
 - 受孕妇体位或吸氧而改变
- 关于双胎妊娠的护理措施,正确的是
 - 第一胎儿娩出后,稍等片刻再断脐
 - 注意多卧床休息,右侧卧位为宜
 - 增加产前检查次数,监测宫高和腹围
 - 第一胎儿娩出后 30 分钟无宫缩即应报告医生
 - 告知双胎妊娠不属高危妊娠,孕妇不必担心
- 妊娠合并心脏病孕妇,分娩时应做到
 - 宫口开全后,鼓励产妇屏气用力以尽快结束分娩
 - 第二产程中应肌注吗啡
 - 胎儿娩出后,产妇腹部放置沙袋
 - 为预防分娩期心力衰竭,产前应达到洋地黄饱和量
 - 急性心力衰竭时应即刻剖宫产结束分娩
- 关于产道异常对母儿的影响,说法错误的是
 - 骨盆入口狭容易发生胎位异常
 - 中骨盆狭窄可发生持续性枕后位
 - 使胎头长时间嵌顿而导致生殖道瘘
 - 胎头发育不良
 - 使手术产机会增多而导致新生儿产伤和感染发生率增多
- 当孕妇出现胎膜早破时,护士应指导孕妇采取的体位是
 - 仰卧位抬高臀部
 - 左侧卧位抬高臀部
 - 右侧卧位抬高臀部
 - 半卧位抬高臀部
 - 膝胸卧位
- 关于产褥感染的描述,正确的是
 - 感染来源只来自自身感染
 - 血栓性静脉炎多于产后 3 天发病
 - 急性子宫内膜炎可使子宫增大、质地变硬
 - 产褥病率只由产褥感染引起,不会由生殖道以外的其他感染引起
 - 急性盆腔腹膜炎及弥漫性腹膜炎时,检查可发现下腹部有压痛、反跳痛、腹肌

紧张

10.关于产后泌尿系统感染的描述,错误的是

- A.通常出现在产后 2~3 天
- B.以革兰阳性菌为主的上行感染
- C.可突发寒战高热
- D.给予敏感有效抗生素治疗
- E.每日饮水量在 3 000~4 000 mL

11.产前诊断的对象不包括

- A.分娩过染色体异常儿的孕妇
- B.有肾病史的孕妇
- C.有致畸因素接触史的孕妇
- D.羊水过多孕妇
- E.夫妇之一有遗传性代谢缺陷者

12.关于梅毒的描述正确的是

- A.一种全身病变的性传播疾病
- B.病原体抵抗力较强,对化学消毒剂不敏感

C.病原体在体外干燥条件下易生存

D.主要为性传播,不通过污染的衣物间接传播

E.可经产道传播,但不经胎盘

13.确诊侵蚀性葡萄胎和绒毛膜癌的主要依据是

- A.距良性葡萄胎后发生时间的长短
- B.子宫大小程度不同
- C.hCG 水平的高低
- D.有无黄素囊肿
- E.有无绒毛结构

14.化疗前需要准确测量患者体重的理由是

- A.精确计算补液量
- B.精确计算摄入量
- C.精确计算饮食需要量
- D.精确计算药物剂量
- E.确定化疗的疗效

15.妊娠早期孕妇产生尿频症状的原因是

- A.头先露进入盆腔

B.液体摄入量增多

C.盆底肌肉松弛

D.增大的子宫压迫膀胱

E.体内肾素-血管紧张素系统分泌紊乱

16.妊娠期间关于补充维生素的作用,说法正确的是

A.维生素 A 能预防孕妇皮肤过分干燥和乳头皲裂

B.维生素 D 对胎儿机体抵抗力有促进作用

C.维生素 B 能预防孕妇阴道上皮细胞角化

D.维生素 C 对胎儿骨、牙齿的正常发育有促进作用

E.维生素 E 能促进造血系统的健全

17.关于正常分娩涉及的相关概念,错误的是

A.缩复作用:宫缩时子宫体部肌纤维缩短变窄,间歇时,肌纤维松弛,能完全恢复原来的长度

B.骨盆轴:为连接骨盆各假想平面中点的曲线

C.骨盆倾斜度:妇女直立时骨盆入口平面与地平面形成的角度

D.衔接:胎头双顶径进入骨盆入口平面,胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平

E.着冠:第二产程时,胎头双顶径已超过骨盆出口,宫缩间歇期胎头不再回缩

18.关于新生儿 Apgar 评分的五项依据,正确的是

A.心率、呼吸、体重、哭声、皮肤颜色

B.心率、呼吸、喉反射、皮肤颜色、哭声

C.心率、呼吸、肌张力、皮肤颜色、喉反射

D.心率、呼吸、喉反射、哭声、脐血管充盈度

E.心率、呼吸、体重、脐血管充盈度、皮肤颜色

19.关于流产患者的护理措施,正确的是

A.完全流产患者需常规应用抗生素避免感染

B.难免流产患者需先做凝血功能检查

C.习惯性流产患者治疗期不必超过以往发生流产的妊娠月份

D.宫颈内口松弛者必须在未妊娠前做宫颈内口松弛修补术

E.先兆流产患者需卧床休息,禁止性生活,避免刺激

20.有关过期妊娠的说法,正确的是

A.羊水胎粪污染较少见

B.常伴有羊水过多

C.较出现胎儿生长受限多

D.胎盘物质交换与转运能力下降

E.胎儿过度成熟说明胎盘功能良好

21.可以妊娠的心脏病妇女是

A.一般体力活动时有心悸和轻度气短,休息时无症状者

B.既往有心力衰竭史者

C.严重二尖瓣狭窄伴有肺动脉高压的风湿性心脏病患者

D.风湿性心脏病心率快难于控制者

E.伴有严重的内科并发症如慢性肾炎、肺结核等的患者

22.关于协调性子宫收缩乏力患者的心理调适,内容不包括

A.增强产妇的信心

B.告知产妇产程进展

C.讲明对母儿的影响

D.建议剖宫产

E.缓解恐惧心理

23.可出现病理性缩复环的情况是

A.巨大儿

B.羊水过多

C.梗阻性难产

D.双胞胎

E.胎盘早剥

24.有关产褥感染的护理,不妥的是

A.予以高热患者物理降温

B.卧床休息,宜取平卧位

C.床旁隔离

D.高热产妇暂停母乳喂养

E.患者出院后严格消毒用物

25.关于产褥感染的护理,错误的是

A.高蛋白、高热量、高维生素饮食

B.卧床休息

C.根据细菌培养和药敏试验选择合适的抗生素

D.提供母婴接触机会

E.产后7天,血性恶露,量多,行温水坐浴

26.外阴炎健康教育内容不包括

A.积极治疗原发病

B.经期每天清洗外阴

C.选用皂类洗剂清洗外阴

D.着棉织内衣裤

E.不能搔抓局部皮肤

27.关于梅毒的描述,错误的是

A.病原体是苍白密螺旋体

B.患一、二期梅毒孕妇的传染性最强

C.性传播为主,间接传播多见

D.早期以皮肤黏膜损害为主

E.晚期侵犯心血管和神经系统

28.关于HIV的健康教育,错误的是

A.全民动员提倡禁毒

B.避孕套可预防HIV

C.HIV可通过胎盘垂直传播

D.新生儿需作HIV筛查

E.HIV感染产妇可对其新生儿进行母乳喂养

29.关于孕妇妊娠期小腿下半部出现水肿的护理措施,正确的是

A.严格限制盐的摄入

B.严格限制水的摄入

C.适当限制盐的摄入

D.适当限制水的摄入

E.不做任何限制

30.关于孕妇下肢痉挛的护理,错误的是

- A.增加钙的摄入
 B.避免腿部受凉
 C.走路时脚尖先着地
 D.伸腿时避免脚趾伸向前
 E.可局部热敷
- 31.行会阴左侧后-侧切开术的方法是
 A.自会阴前联合中线向左 30°方向切开会阴,长约 2~3 cm
 B.自会阴后联合中线向左 30°方向切开会阴,长约 4~5 cm
 C.自会阴前联合中线向左 40°方向切开会阴,长约 2~3 cm
 D.自会阴后联合中线向左 45°方向切开会阴,长约 4~5 cm
 E.自会阴后联合中线向左 45°方向切开会阴,长约 6~8 cm
- 32.关于高危妊娠的处理,不妥的是
 A.应用胎儿监测仪及时发现异常情况
 B.间断吸氧
 C.发生胎儿窘迫者均行剖宫产结束分娩
 D.指导孕妇避免猛烈的运动或活动
 E.做好新生儿窒息抢救工作
- 33.输卵管妊娠非手术治疗的护理中,正确的是
 A.患者可随意活动
 B.阴道流血不多时不必严密观察
 C.避免增加腹压的活动
 D.应暂停饮食
 E.以上均不对
- 34.妊娠期高血压疾病的护理中,正确的是
 A.胎肩娩出后立即静推缩宫素预防产后出血
 B.胎肩娩出后可肌注麦角新碱预防产后出血
 C.产后硫酸镁的应用时间不超过 24 小时
 D.患者均应严格限制食盐摄入
 E.轻度妊娠期高血压疾病患者需绝对卧床休息
- 35.关于妊娠合并心脏病患者的分娩期处理,正确的是
 A.心功能Ⅱ级者应行剖宫产术
 B.经阴道分娩者应缩短第二产程
 C.禁用哌替啶
 D.无感染者不需使用抗生素
 E.为预防产后出血,应肌注麦角新碱
- 36.关于妊娠合并缺铁性贫血的防治,恰当的是
 A.治疗贫血最好静脉滴注或肌内注射铁剂
 B.妊娠中晚期需要常规应用硫酸亚铁
 C.常规应用右旋糖酐铁或山梨醇铁
 D.口服硫酸亚铁一般需 1 个月才能纠正贫血
 E.严重贫血有心功能代偿失调而迫近分娩者,严禁输血
- 37.关于子宫破裂,正确的是
 A.子宫破裂均发生在妊娠期
 B.按破裂的程度可分为自发性子宫破裂和损伤性子宫破裂
 C.先兆子宫破裂多见于宫缩乏力导致的产程延长患者
 D.按疾病发展过程可分为先兆子宫破裂和子宫破裂两个阶段
 E.发生子宫破裂的患者应积极进行全子宫切除术
- 38.预防产褥感染的措施,错误的是
 A.加强孕期宣教
 B.妊娠末期禁止性交
 C.正确处理产程,防止产程延长
 D.避免不必要的阴道检查和肛查
 E.破膜超过 4 小时仍未分娩者,预防性使用抗生素
- 39.关于外阴阴道假丝酵母菌病患者的健康指导,不正确的是
 A.内裤应煮沸消毒

B.孕妇无需治疗,选择剖宫产终止妊娠即可

C.2%碳酸氢钠坐浴后阴道用药效果更好

D.月经前复查阴道分泌物

E.性伴侣无症状者无需治疗

40.关于慢性子宫颈炎症的物理治疗,正确的是

A.治疗前肉眼检查排除子宫颈癌

B.物理疗法是目前治疗宫颈糜烂最常用的有效方法

C.物理治疗后阴道分泌物增多,可行阴道冲洗

D.病变较深者物理治疗后需1~2周治愈

E.除月经期外都可进行治疗

41.围绝经期综合征性激素替代疗法的护理措施中,不正确的是

A.指导患者根据自身症状随时调整用药

B.向患者解释药物作用、用药方案

C.指导患者睡前服用雌激素

D.教会患者自我监测药物的不良反应

E.嘱患者有异常阴道出血应及时就诊

42.关于子宫肌瘤月经改变的描述,不正确的是

A.是肌壁间肌瘤的常见症状

B.与子宫内膜面积增大有关

C.经期多延长

D.周期多延长

E.经量可增多

43.患者,女性,14岁。12岁月经初潮,月经周期一直无规律性且量较多,描述正确的是

A.初具生育能力,生殖系统发育完善

B.雌激素水平较低,不足以引起高峰出现

C.初潮后2年无排卵性月经属病理状态

D.该患者不需药物治疗

E.考虑有生殖器官器质性病变

44.患者,女性,30岁。孕3产2,无难产史,孕39+4周。规律宫缩3小时。急诊检查:宫缩持续45秒,间歇3分钟,胎心140次/分。肛查:宫口开4cm,先露头,羊膜囊明显膨出,骨盆内诊正常。此时最恰当的处理是

A.急诊室观察

B.破膜后住院

C.立即住院待产

D.急送产房消毒接生

E.肥皂水灌肠

45.患者,女性,30岁。孕36周,无痛性少量阴道流血3天,无宫缩。对此患者进行产科检查时,最可能出现的体征是

A.子宫硬如板状

B.子宫大于孕周

C.胎方位不清楚

D.胎心遥远

E.胎先露高浮

46.患者,女性,30岁。孕34周。超声检查为前置胎盘,无宫缩,宫口未开,胎心率140次/分,血压100/80mmHg。对此患者应该采取的护理措施是

A.人工破膜

B.阴道检查

C.立即做好剖宫产的术前准备

D.绝对卧床休息

E.立即输血

47.患者,女性,27岁。孕37周,阴道流血3小时入院。患者诊断为胎膜早破,那么采用pH试纸测定的结果应该是

A.pH 1~3

B.pH 3~4

C.pH 4.5~5.5

D.pH 5~6

E.pH >6.5

48.患者,女性,25岁。孕2产0,孕30周,胎心胎动消失2周入院,经处理后娩

出一死婴,即开始持续不断地阴道出血,人工剥离胎盘及使用宫缩剂后仍无效果,出血不止,无凝血块。考虑该患者产后出血的原因可能是

- A.子宫收缩乏力
- B.软产道损伤
- C.子宫破裂
- D.宫腔内感染
- E.凝血功能障碍

49.患者,女性,23岁。经阴道分娩一女婴,产后第3天体温38℃,经抗生素治疗后热退。现为产后2周,突然阴道流血,多于月经量,血压100/70 mmHg,无其他不适,首选的处理方式是

- A.输血
- B.刮宫术止血
- C.子宫切除术
- D.先给予抗生素及子宫收缩剂
- E.查尿妊娠试验

50.患者,女性,27岁。阴道分泌物增多,外阴瘙痒2周。3周来常服用罗红霉素。妇科检查:外阴潮红,阴道黏膜充血,上覆白色膜状物,宫颈轻度糜烂,阴道分泌物查滴虫(-)。对该患者的处理错误的是

- A.制霉菌素治疗
- B.行阴道分泌物真菌检查
- C.达克宁栓阴道上药
- D.改用先锋霉素治疗
- E.治疗期间避免性生活

51.患者,女性,24岁。白带呈黄色脓性,伴尿急、尿痛和排尿困难。妇科检查:外阴、阴道和尿道口红肿充血,从阴道前壁压迫尿道和尿道旁腺,有脓液外溢,最可能患了

- A.淋病
- B.尖锐湿疣
- C.外阴炎
- D.前庭大腺炎
- E.急性宫颈炎

52.患者,女性,31岁。孕2产1。因葡萄胎清宫术后入院随访,其血P-hCG恢复至正常的时间通常在术后

- A.3周
- B.4周
- C.6周
- D.7周
- E.9周

53.患者,女性,40岁。腰硬联合麻醉下行子宫肌瘤剔除术后返回病房,护士嘱咐患者去枕平卧6小时,其主要目的是

- A.预防呕吐
- B.预防头痛
- C.预防伤口裂开
- D.预防静脉血栓
- E.预防血压下降

54.某女婴,出生后72小时,体重3.6 kg,面部出现黄疸,吸吮力强,大小便正常,微量胆红素测定值为215 μmol/L,根据该新生儿的情况,正确的处理方法是

- A.蓝光治疗
- B.静脉输液
- C.密切观察
- D.抗生素治疗
- E.静脉滴注白蛋白

55.患者,女性,36岁。孕1产0,孕34周。头痛、头晕1周,今晨剧烈头痛并呕吐4次。查体:BP 180/110 mmHg, P 120次/分,尿蛋白(++)。针对该患者,对估计病情及决定处理方案最有价值的辅助检查方法是

- A.眼底检查
- B.全血黏度比值
- C.血小板计数
- D.血细胞比容
- E.尿雌激素/肌酐值

56.患者,女性,28岁。孕30周,无痛性少量阴道流血2天,胎心胎动好,无明显宫缩,B超检查提示前置胎盘。对此患者最首要的护理措施是

- A.绝对卧床休息,左侧卧位为佳
B.高危门诊继续随访观察
C.立即做好终止妊娠的术前准备
D.阴道检查
E.立即行人工破膜
- 57.患者,女性,28岁。孕1产0,合并先天性心脏病,胎儿娩出后应立即采取的措施是
- A.腹部放置沙袋
B.静注麦角新碱
C.鼓励下床活动
D.抗感染
E.行绝育手术
- 58.患者,女性,孕2产0,孕40周。估计胎儿体重4000g, BP 140/90~160/100 mmHg,尿蛋白(++),水肿(+),NST无反应型,骨盆出口狭窄。最恰当的处理是
- A.静脉滴注缩宫素促进阴道分娩
B.左侧卧位,吸氧,等待自然分娩
C.刺激乳头诱发宫缩
D.人工破膜
E.行剖宫产术结束分娩
- 59.患者,女性,24岁。孕1产0,孕39+5周。经阴道分娩一女活婴,第二产程用时2小时30分,胎盘娩出后,有间歇性阴道流血并有血块排出,出血量超过500 mL,查:子宫轮廓不清。首先应考虑的原因是
- A.阴道静脉破裂
B.子宫收缩乏力
C.胎盘残留
D.凝血机制障碍
E.宫颈裂伤
- 60.患者,女性,26岁。产后3天,诉下腹隐痛,体温38.5℃,子宫体轻压痛,宫底平脐,恶露量多有臭味,不正确的护理措施是
- A.严密观察体温、脉搏、呼吸、血压
B.遵医嘱给予敏感、足量、高效抗生素
C.禁用缩宫素,避免感染扩散
D.床边隔离,防止交叉感染
E.用0.1%苯扎溴铵擦洗外阴,每日4次
- 61.某产妇,25岁。自然分娩,哺乳期应采取的避孕措施是
- A.哺乳期内禁止性交
B.哺乳期内卵巢停止排卵不必避孕
C.自然避孕
D.工具避孕
E.药物避孕
- 62.患者,女性,30岁。孕39周来院产检,与胎心听诊结果无关的指标是
- A.胎儿成熟度
B.胎儿是否存活
C.胎儿是否宫内缺氧
D.胎心强弱
E.胎心节律
- 63.患者,女性,35岁。孕1产0。孕36周,重度子痫前期,突然剧烈腹痛,伴恶心、呕吐。检查:血压60/40 mmHg,子宫硬,宫底剑突下1横指。患者最有可能发生了
- A.子痫
B.前置胎盘
C.胎盘早剥
D.子宫破裂
E.羊水栓塞
- 64.患者,女性,26岁。孕1产1,孕20周,主诉日常活动后感乏力,心悸,气急。经检查确诊为妊娠合并心脏病,心功能Ⅲ级。为防止心衰,该患者妊娠期重点监测时间应放在
- A.24~26周
B.28~30周
C.32~34周
D.35~36周
E.37~40周
- 65.患者,女性,孕1产0。孕40周,宫口开大3 cm,协调性子宫收缩乏力,胎位正常,胎心146次/分,其护理措施不包括
- A.保证休息
B.加强子宫收缩

- C. 补充营养
- D. 立即行剖宫产术前准备
- E. 避免膀胱长时间充盈

66. 患者, 女性, 28岁。孕1产0。临产后采用缩宫素静脉滴注, 破膜后不久突然出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、发绀, 数分钟后死亡。该患者最可能的诊断是

- A. 子痫
- B. DIC
- C. 胎盘早剥
- D. 羊水栓塞

E. 子宫破裂

67. 患者, 女性。尿频、尿急、尿痛2天, 阴道检查发现大量脓性分泌物。分泌物涂片检查发现白细胞内有大量成对的、肾形的革兰阴性双球菌。最可能的诊断为

- A. 急性尿道感染
- B. 急性宫颈炎
- C. 急性淋病
- D. 急性盆腔炎
- E. 急性膀胱炎

二、以下提供若干组考题, 每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(68~69题共用题干)

患者, 女性, 27岁。孕1产0, 孕40+2周。临产16小时, 宫缩持续25秒, 间歇6~8分钟。肛查: 宫口开大3cm, 先露头, S⁻4, 胎膜未破, 患者因宫缩痛一直未进食。检查发现患者下腹部耻骨联合上方有一包块, 嘱其自解小便不能自解。

68. 针对该患者疼痛给予的护理措施, 错误的是

- A. 耐心听取患者有关疼痛的诉说
- B. 评估患者疼痛的部位和程度
- C. 告知患者疼痛是正常的, 耐心等待, 不必处理
- D. 给予患者心理支持
- E. 可给患者按摩、热敷等方法减轻疼痛

69. 针对该患者的病情给予的护理措施, 错误的是

- A. 鼓励患者进食, 必要时遵医嘱补液
- B. 可用物理方法帮助患者排尿
- C. 协助患者作好基础护理
- D. 勤听胎心, 发现异常及时告诉医生
- E. 指导患者屏气加快产程进展

(70~71题共用题干)

患者, 女性, 25岁。孕足月分娩一女婴, 出生第2天, 尿布上有白色黏液和少量血性

分泌物, 乳房略肿大。

70. 最可能的原因是

- A. 内分泌发育不健全
- B. 神经系统发育不完全
- C. 母体激素的影响
- D. 发育过早
- E. 胆红素破坏过多

71. 应给予的护理措施是

- A. 立即喂糖水, 促进排泄
- B. 立即去医院检查
- C. 不予特殊处理
- D. 挤净乳房分泌物
- E. 用皂液清洗会阴

(72~74题共用题干)

患者, 女性, 26岁。孕1产0, 孕40周。产前检查无异常, 孕期无合并症。检查: 骨盆外测量径线正常, 枕左前位, 估计胎儿体重3500g。现临产10小时, 宫口开全1小时, 因羊膜囊突出行人工破膜术。破膜后患者突然出现烦躁不安, 呛咳、呼吸困难、发绀, 血压为0, 数分钟后患者死亡。

72. 该患者的诊断是

- A. 子痫
- B. 胎盘早剥
- C. 子宫破裂

- D.羊水栓塞
E.急性心力衰竭
73.不是该病病理生理变化的是
A.肺动脉高压
B.全身小动脉痉挛
C.过敏性休克
D.多脏器功能衰竭
E.DIC

- 74.关于羊水栓塞的预防,错误的是
A.加强产前检查,注意诱发因素
B.正确掌握缩宫素的使用方法
C.严格掌握破膜时间,人工破膜宜在宫缩期进行
D.钳刮时,应先刺破胎膜,羊水流出后再钳夹
E.掌握剖宫产指征,注意预防子宫切口的裂伤,子宫切开后先及时吸净羊水,再娩出胎儿

(75~77 题共用题干)

患者,女性,33 岁。停经 40 天,左下腹撕裂样疼痛 1 小时,腹痛逐渐加重,并出现心悸、气促、畏寒。查体:BP 80/40 mmHg, P 120 次/分,满腹压痛、反跳痛,移动性浊音(+). 妇科检查:宫颈有举痛,子宫稍大、软,有漂浮感,双附件均有压痛,左侧明显,未扪及肿块。

- 75.该患者最可能的诊断是
A.急性输卵管炎
B.急性阑尾炎
C.输卵管妊娠破裂
D.先兆流产
E.流产合并感染
76.对于该患者最恰当的处理方法是
A.输液
B.纠正休克后手术
C.输血
D.纠正休克的同时手术
E.中药活血化瘀
77.对于该患者,最首要的护理措施是

- A.高蛋白、高胆固醇饮食
B.立即开放静脉通道,交叉配血
C.做好常规阴道手术准备
D.心理护理,减轻患者焦虑
E.保持病室安静整洁

(78~79 题共用题干)

患者,女性,33 岁。孕 2 产 0。孕 26+2 周,体重 92 kg,其母患有糖尿病。

78.患者应进行的检查为

- A.测定空腹血糖
B.做口服糖耐量试验
C.行糖筛查试验
D.常规产前检查
E.以上都不是

79.该患者确诊为妊娠期糖尿病,应给予的护措施为

- A.及早人工终止妊娠
B.无需控制饮食,加强产前监测
C.根据孕妇体重计算每日所需热量,制订合理饮食,监测血糖
D.加用胰岛素可不必控制饮食
E.控制饮食,主要是控制糖类的摄入量
(80~82 题共用题干)

患者,女性,51 岁。2 年前月经开始紊乱,10~15 天/2~3 个月,经量大,重度贫血,常感烦躁、心悸。1 年来反复发作阴道炎。诊断为围绝经期综合征。

80.为该患者进行内分泌化验,不大可能见到的结果是

- A.孕激素下降
B.FSH 上升
C.雌激素下降
D.FSH 下降 LH 下降
E.LH 下降

81.若患者再次出现大量阴道流血,应采取的治疗措施是

- A.大量雌激素止血
B.诊断性刮宫
C.大量孕激素止血

- D.雌孕激素联合应用止血
E.大量止血药止血
- 82.为该患者采取的护理措施中不正确的是
- A.提供心理护理,解除患者思想顾虑
B.指导患者子宫出血停止后立即停止服用性激素
C.指导患者摄入含钙丰富的食物
D.向患者家属介绍女性围绝经期的相关知识
E.鼓励患者坚持体育锻炼
(83~85 题共用题干)
- 患者,女性,24 岁。孕 1 产 0,孕 41 周,头位,临产 18 小时,宫口开大 8 cm,2 小时产程无进展,因宫颈扩张活跃期停滞,行缩宫素静脉滴注引产,产程仍无进展,初步诊断为“子宫破裂”。
- 83.体检中发现的最可靠的诊断依据是
- A.产妇疼痛难忍,烦躁不安
B.胎心减慢
C.可见阴道有较多鲜血流出
D.脐下病理性缩复环随宫缩上升
E.子宫轮廓不清,腹壁下可清楚扪及胎体
- 84.该患者此时最适宜的处理方法是
- A.输血输液观察
B.行阴道检查明确破裂口部位及大小
C.迅速经阴道助产娩出死胎
D.行剖宫产取胎,对破裂口小、时间短、无感染者可行修补术
E.即行剖宫产取胎,同时行子宫次全切除术
- 85.关于预防子宫破裂,降低其发生率的措施错误的是
- A.建立健全三级保健网,有异常分娩史者提前住院待产
B.遵守各种阴道手术操作规程
C.严格掌握宫缩剂使用方法和指征,可用于胎儿娩出前肌肉注射缩宫素

- D.密切观察产程识别先兆子宫破裂征象
E.有剖宫产史的产妇试产时间一般不应超过 12 小时
(86~88 题共用备选答案)
- A.宫缩乏力
B.胎盘嵌顿
C.胎盘粘连
D.软产道裂伤
E.凝血功能障碍
- 86.产程延长可导致
87.多次人工流产可导致
88.子宫收缩过强可导致
(89~90 题共用备选答案)
- A.月经周期缩短,月经频发,经前诊刮子宫内膜为分泌反应不良
B.月经周期缩短,月经频发,经前诊刮子宫内膜呈增生期变化
C.月经周期正常,经期延长,月经第 5 天诊刮子宫内膜呈混合型变化
D.月经周期正常,经期延长,月经第 5 天子宫内膜呈蜕膜样改变
E.月经周期正常,经血量正常,经前诊刮子宫内膜呈分泌型变化
- 89.黄体功能不足的表现是
90.子宫内膜不规则脱落的表现是
(91~93 题共用备选答案)
- A.子宫收缩乏力
B.胎盘、胎膜残留
C.胎盘部分剥离
D.宫颈裂伤
E.凝血功能障碍
- 91.胎儿娩后,立刻压迫宫底,牵拉脐易导致
92.宫口尚未开全,采用阴道助产手术娩出胎儿易导致
93.隐性性出血的原因是
(94~95 题共用备选答案)
- A.4%NaHCO₃ 冲洗阴道

- B.综合治疗
C.激光治疗
D.1 : 5 000 高锰酸钾溶液坐浴
E.抗生素治疗
- 94.外阴炎患者宜选择的治疗方式是
- 95.慢性盆腔炎患者宜选择的治疗方式是

(96~97 题共用备选答案)

- A.妊娠 11~13 周
B.妊娠 14~20 周
C.妊娠 20~24 周
D.妊娠 18~24 周
E.妊娠 24~32 周
- 96.B 超进行胎儿结构畸形检查的最佳期间

- 97.疑有心脏畸形行胎儿超声心动检查一般宜选择在

(98~100 题共用备选答案)

- A.1 个月
B.3 个月
C.6 个月
D.12 个月
E.24 个月

- 98.子宫全切术后禁盆浴及性生活的时间是

- 99.子宫瘤剔除术后禁盆浴及性生活的时间是

- 100.卵巢囊肿剔除术后禁盆浴及性生活的时间是



考前点睛班