

1.按计划免疫接种程序，半岁以内需接种的疫苗不包括

A.百-白-破三联混合疫苗

B.乙肝疫苗

C.卡介苗

D.麻疹疫苗

E.脊髓灰质炎减毒活疫苗|综

2.常伴有 AFP 升高的卵巢肿瘤是|B.

A.卵黄囊瘤

B.颗粒细胞瘤舍|D.

C.成熟性畸胎瘤

D.无性细胞瘤

E.上皮性肿瘤

3.下列关于胎方位的描述正确的是

A.指最先进入母体骨盆入口的胎儿部分

B.指胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系

C.指每体纵轴与胎儿纵轴的关系

D.指胎儿头部与母体骨盆的关系

E, 指胎儿在腹腔中的各种姿势

4.有先兆偏头痛最常见的先兆是

A.听觉先兆

B.视觉先兆

C.感觉先兆

D.言语先兆

E.运动先兆

金英杰教育

5. 小儿生长发育的规律不包括

- A. 个体差异
- B. 各器官系统发育不平衡
- C. 连续性、非匀速性、阶段性
- D. 自下而上
- E. 两个高峰期

6. 妊娠剧吐不能进食者，为预防 Wernicke

综合征，应补充的维生素是

- A. 维生素 E
- B. 维生素 A
- C. 维生素 B:
- D. 维生素 B6
- E. 维生素 C

7. 下列提示胎盘功能正常的情况是

- A. 血清胎盘生乳素突然降低 50%
- B. NST 试验无反应型
- C. 胎动 < 10 次 / 12 小时
- D. OCT 试验阳性
- E. 尿雌激素 / 肌酐比值 > 15

8. 外阴阴道假丝酵母菌病最主要传染途径是

- A. 直接传染
  - B. 血行传染
  - C. 间接传染
  - D. 内源性传染
- 金英杰教育

E.性交传染

9.下列提示颅后窝骨折的临床表现是

A.视神经损伤

B.Battle 征

C.嗅神经损伤

20.关于子宫内膜癌的描述，正确的是

A.透明细胞癌是最常见的病理类型

B.非激素依赖型比激素依赖型预后差

C.早期患者首选治疗方法是放射治疗

D.肿瘤侵及直肠黏膜时，分期为 IVB

E.血行转移是最常见的转移途径

21.下列导致胎儿生长受限的因素最常见的是

A.妊娠期糖尿病

B.多次刮宫导致宫腔粘连

C.妊娠期高血压疾病

D.合并卵巢小囊肿

E.羊水过多

22.脑血栓形成最常见的病因是

A.高血压病

B.脑动脉粥样硬化

C.血压偏低

D.各种脑动脉炎

金英杰教育

E.红细胞增多症

23.含铜 IUD 的主要作用机制不包括

- A.压迫局部子宫内膜产生炎症反应
- B.影响子宫内膜细胞糖原代谢和雌激素摄入
- C.使受精卵运行速度与子宫内膜发育不同步
- D.铜离子使精子头尾分离，不得获能
- E.使宫颈黏液稠厚，不利于精子穿透

24.苯丙酮尿症患儿主要的神经系统异常

表现是

- A.智能发育落后
- B.肌张力增高
- C.腱反射亢进
- D.行为异常
- E.惊跃

25.出生后即有且终生存在的神经反射是

- A.拥抱反射
- B.膝腱反射
- C.握持反射
- D.觅食反射
- E.腹壁反射

26.Fisher 综合征的最主要临床特征是

- A.眼外肌麻痹、共济失调、腱反射消失
- B.四肢弛缓性瘫痪伴眼外肌麻痹
- C.双侧对称性眼外肌和面肌麻痹

金英杰教育

D.由下肢逐渐向上肢进展的对称性弛缓性瘫痪

E.四肢对称性弛缓性瘫痪伴双侧面斑

27.超低出生体重新生儿的出生体重低于

A.1000g

B.2500g

C.1500g

D.800g

E.2000g

28.既往月经规律，妊娠 42 周，下列情况最不可能出现的是

A.羊水增多

B.羊水粪染

C.胎儿生长受限

D.胎盘功能正常

E.胎儿过熟综合征

29.健康育龄妇女出现恶心、食欲减退等消化道症状，问诊时不应忽视的是

A.月经史

B.传染病史

C.肝炎病史

D.不洁饮食史

41.女，22 岁，半年前诊断为精神分裂症平时服用利培酮治疗，病情稳定。半月前与男朋友分手，情绪低落、话少。近 3 天加重，整日躺在床上，不语不动，拒绝进食，常双眼含泪。家人反复询问下有时能用点头、摇头表示。患者目前首要的处理方法是

A.暗示治疗

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- B. 认知治疗
- C. 电抽搐治疗
- D. 抗精神病药加量
- E. 加用抗抑郁药

42. 女，31岁。月经不规律3年，闭经7月，溢乳2个月。对诊断最有价值的测定项目是

- A. 孕激素
- B. 促甲状腺素
- C. 雌激素
- D. 催乳素
- E. 雄激素

43. 女，24岁，经产妇。阴道分娩后72小时，自觉乳房胀痛，发热。T37.5℃，下腹部阵发性疼痛伴阴道少量流血。正确的处理是

- A. 局部理疗
- B. 排空乳房
- C. 静脉滴注缩宫素
- D. 应用抗生素

44. 女，28岁，初产妇。双胎妊娠，妊娠39周临产。P90次/分，BP140/80mmHg。规律宫缩10小时后宫口开全，第一胎儿头位娩出，新生儿体重2600g。第二胎儿为单臀先露，已衔接，胎心正常。本例恰当的处理措施是

- A. 行外转胎位术
  - B. 产钳牵引术
  - C. 等待臀助娩
- 金英杰教育

- D.行内转胎位术
- E. 立即剖宫产术

45.男孩，6岁。咳嗽伴喘息1天，无发热。既往有反复喘息发作4~5次。其外祖父患有支气管哮喘。查体：呼吸急促，可见轻度三凹征，呼气相延长，双肺满布哮鸣音。自前应首选的治疗是

- A.吸入沙丁胺醇
- B.静脉滴注青霉素
- C.口服白三烯调节剂
- D.静脉注射地塞米松
- E.口服西替利嗪

54.女，56岁。下腹不适、腹胀半年，发现腰部包块1个月，3年前行胃癌根治术，病理为胃窦部腺癌。妇科检查：外阴、阴道正常，宫颈光，萎缩，子宫正常大小，双侧附件区各触及一个约8cm×6cm×5cm大小的椭圆形包块，移动性浊音（一）。最可能的诊断是

- A.卵巢无性细胞瘤
- B.卵巢畸胎瘤
- C.卵巢上皮性癌
- D.卵巢纤维瘤
- E.库肯勃瘤

55.男，28岁。近1年来认为自己的五脏六腑已经腐烂、变空了。患者的症状是

- A. 幻觉
- B. 虚构
- C. 虚无妄想

- D. 感知综合障碍
- E. 错觉

56. 男孩，1岁，因身材矮小，智能发育迟缓就诊。查体：身高63cm，表情呆滞，四肢肌张力低下，眼距宽，鼻梁低平，眼外眦上斜，四肢短，手指短，小指内弯。对明确诊断最有意义的检查是

- A. 血氨基酸分析
- B. 染色体核型分析
- C. 血T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、TSH测定
- D. 尿三氯化铁试验
- E. 血钙、磷、碱性磷酸酶检测

57. 女，35岁。妊娠35<sup>+2</sup>周，2周前血压升高至160/100mmHg，未治疗。现突然持续腹

痛、逐渐加重，感头晕、恶心，阴道有少量流血。查体：T36.8℃，P120次/分，BP 100/60mmHg，呼吸急促。面色苍白，腹部隆起，板状腹，胎方位不清，未闻及胎心。最可能的诊断是

- A. 胎盘早剥
- B. 先兆子宫破裂
- C. 早产临产
- D. 临产伴急性阑尾炎
- E. 妊娠合并急性胰腺炎

93. 女，28岁，初孕妇。妊娠40周，规律宫缩8小时，查体：P90次/分，

BP140/80mmHg，宫口7cm，先露S=+1，胎心140次/分。10分钟后胎膜破裂，流出湾清亮液体。正确的处理方法是

- A.立即静脉滴注地塞米松
- B.立即行剖宫产术
- C.立即听胎心
- D.立即静脉滴注硫酸镁
- E.立即静脉滴注缩宫素

58.女, 40岁。当听到家中房子因洪水倒塌的消息后, 突然顿足哭喊, 表情恐惧而紧张, 拿砖头打砸旁边的房子, 反复喊叫“我没有房子啦, 我没有房子啦……”, 1天后开始逐渐恢复平静。该患者最可能的诊断是

- A.分离(转换)性障碍
- B.急性短暂性精神病性障碍
- C.适应障碍
- D.急性应激障碍
- E.创伤后应激障碍

66.男, 20岁, 大二学生。两周来突然兴奋话多, 言语夸大, 说自己是中国的乔布斯, 然开很多家公司, 每个都可以进入世界500强。连夜搞发明创造, 吃饭都狼吞虎咽, 说要分秒必争, 家人朋友劝阻他就发脾气, 说他们弱智, 不配与自己说话。针对该患者直首选的药物是

- A.米氮平
- B.布普品
- C.曲唑酮
- D.碳酸锂
- E.氯氮平

67.女。31岁。停经21周。剧烈腹痛、发热1天，伴恶心、呕吐，无阴道流血。查体：宫底平脐，子宫前壁压痛，胎心156次/分。血WBC $13 \times 10^9/L$ ，N0.78。彩色超声提示单胎妊娠合并子宫肌瘤，肌瘤直径7cm。最可能是子宫肌瘤发生

- A.感染
- B.肉瘤样变
- C.玻璃样变
- D.红色样变
- E.囊性变

68.女，45岁。车祸中头部受伤后出现短暂昏迷。1.5小时后剧烈头痛，频繁呕吐。急诊查体：神志清楚，双侧瞳孔大小多变对光反射迟钝，肢体活动正常。行头颅CT检查过程中，发生呼吸骤停。其呼吸骤停最可能的原因是

- A.脑挫裂伤
- B.急性颅内血肿并发小脑幕切迹疝
- C.急性颅后窝血肿并发枕骨大孔疝
- D.脑干损伤
- E.脑震荡

69.男，45岁，行脊柱肿瘤切除术，术中给予输血，输注悬浮红细胞15分钟后，血压下降到70/40mmHg，导尿管中的尿液呈酱油色，患者最可能发生的不良反应是

- A.严重过敏反应
- B.输血相关急性肺损伤
- C.细菌污染反应
- D.急性溶血性输血反应
- E.输血相关循环超负荷

70.女, 31岁, GoPo。停经 85 天, 阴道不规则流血 10 余天。恶心、呕吐较重, 伴下腹隐痛, 无咳嗽、咯血。妇科检查: 阴道黏膜未见异常, 宫颈光滑, 宫口可见血液流出, 宫底平脐, 质软, 未触及胎体, 未闻及胎心。血 hCG 100,000U/L。应首先考虑的诊断是

- A.先兆流产
- B.葡萄胎
- C.侵蚀性葡萄胎
- D.绒癌
- E.死胎

94.女婴, 8 个月。母乳喂养, 未添加辅食。查体: 面色苍白, 肝脾肿大。外周血象: Hb 75g/L,RBC  $3.5 \times 10^{12}/L$ ,MCV 70fl,MCH26pg, MCHC30%。其贫血的细胞形态是

- A.大细胞性
- B.正细胞正色素性
- C.正细胞低色素性
- D.小细胞低色素性
- E.单纯小细胞性

95.女婴, 10 天。拒乳 4 天。查体: 周身使肤明显黄染, 所部少许脓性分泌物, 前凶平软。实验室检查: 血白细胞  $25.0 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 0.80, 淋巴细胞 0.20。该患儿最重要的诊断是

- A.新生儿肝炎
- B.新生儿颅内出血
- C.新生儿脐炎
- D.新生儿化脓性脑膜炎
- E.新生儿败血症

96. 女，31岁，G<sub>3</sub>P<sub>1</sub>，剖宫产史。因妊娠50天行人工流产负压吸引术，术中患者突感胸闷、头晕、大汗淋漓、下腹坠痛伴恶心。查体：P49次/分，BP90/60mmHg，面色苍白，阴道少量流血。首先应考虑的诊断是

- A. 子宫穿孔
- B. 羊水栓塞
- C. 人工流产综合反应
- D. 失血性休克
- E. 急性腹膜炎

97. 男孩，5岁。持续高热1周。查体：T39℃，P128次/分，R36次/分。热病容，双眼结合膜出血，口唇干裂，可见草莓舌，皮肤呈弥漫性红斑，颈部浅表淋巴结肿大，心音有力，手足指趾硬性水肿。最可能的诊断是

- A. 败血症
- B. 手足口病
- C. 川崎病
- D. 风湿热
- E. 猩红热

98. 女，22岁。一年来反复洗手、洗衣服，总担心洗不干净或者碰到脏东西。明知道担心过分却不能自己。为此不能正常工作和做家务，苦恼万分。该患者最可能的诊断是

- A. 广泛性焦虑障碍
- B. 强迫障碍
- C. 疑病障碍
- D. 恐惧性焦虑障碍

E.妄想性障碍

99.男, 31 岁。精神分视症急性发作入院, 因兴奋躁动、敌对攻击严重, 给予氯碱啉第 5mg 一天 2 次肌肉注射。次日患者出现双眼上翻、斜颈、面肌座挛、角弓反张。此时首选的处理方法是

- A、口服普萘洛尔
- B.口服苯二氮草类药物
- C.电抽搐治疗
- D.立即停药
- E.肌肉注射东莫若碱

(100~102 题共用题干)

男, 45 岁。车祸致左枕部着地, 当即意识丧失, 送至附近医院途中右侧肢体间断性抽搐伴喷射状呕吐 3 次。查体: P56 次/分, BP160/95mmHg, 浅昏迷、躁动, 右侧瞳孔直径约 4mm, 左侧 2mm; 对光反射: 左侧存在, 右侧消失; 左侧肌力 3 级, 右侧肌力 5 级; 左枕部头皮血肿, 颈项强直。

100.最主要的诊断是

- A.右额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝
- B.左额广泛脑挫裂伤伴左小脑幕切迹疝
- C.右额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝
- D.左额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝
- E.左额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝

101.颅内出血的来源是

- A.脑表面小血管
- B.板障静脉
- C.硬脑膜中动脉

金英杰教育

www.jinyingjie.com

D.横窦

E.下矢状窦

102.优先采取的处理措施是

A.维持呼吸道通畅

B.注射止血剂和输血

C.制动并注射镇静剂

D.给予消炎药和神经营养药

E.适量输液和给予脱水剂

(103~105 题共用题干)

男孩, 1岁。发热3天, 呕吐1次, 抽搐1次。既往6个月时曾热性惊厥1次。按时预防接种, 出生史无特殊。查体: T38.2°C, R30次/分, BP90/55mmHg, 颈抵抗(+), 双肺听诊未见异常, 心率130次/分, 律齐, 腹软, 肝脾肋下未触及, 四肢暖, 肌力、肌张力正 Babinski征(+)

103.初步诊断首先考虑

A.手足搐搦症

B.中毒型细菌性痢疾

C.热性惊质

D.感发育不全

E.中枢神经系统感染

104.为明确诊断, 首先直进行的检查是

A.要穿检查脑脊液

B.粪镜检及培养

C.脑电图

D.血培养加药物敏感试验

E.血钙、磷测定

金英杰教育

105.【假设信息】抗生素静脉滴注 3 年热退，精神好转。但 1 周后又发热至 38.5 左右，并呕吐，惊觉 1 次，最可能出现的情况是

- A.并发脑室管膜炎
- B.并发硬膜下积液
- C.院内上呼吸道感染
- D.并发脑脓肿
- E.并发脑积水

(106~108 题共用题干)

上.女，45 岁，G4P2。月经规律，白带增多半年，性交后阴道流血 2 个月。近 3 年未体检。妇科检查发现宫颈重度糜烂状，触血 (+)，子宫附件未见明显异常。宫颈活松组织病理报告为宫颈鳞状细胞癌，浸润深度为 7mm。

106.该患者的临床分期是

- A.IB1
- B.IA2
- C.IB2
- D.IA1
- E.I1A

107.宜选择的手术方案是

- A.筋膜内全子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- B.筋膜外全子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- C.改良广泛子宫切除术+盆腔淋巴结切除术
- D.广泛宫颈切除术+盆腔淋巴结切除术
- E.广泛子宫切除术+盆腔淋巴结切除术

金英杰教育

www.jinyingjie.com

108.如术后组织病理学证实右侧信外淋巴结转移，最恰当的处理是

- A.放化疗
- B.观察随访
- C.生物治疗
- D.物理治疗
- E.性激素治疗

109 — 112 题共用题干)

女孩，3岁。生后发现口唇青紫，活动后加剧。平时喜蹲踞，哭吵时有突发呼吸急促，青紫加重，严重时伴晕厥，曾半年内晕厥2次，均于清晨或哭吵后发作，经2~分钟自行恢复。今晨又出现晕厥，持续5分钟，既来诊，查体：T37.0℃，P100次/分，R22次/分，BP82/55mmHg。神志不清，双肺听诊未见异常，胸骨左缘第2~4肋间闻及收缩期杂音，无震颤，肺动脉第二心音减弱。口唇青紫，指、趾甲青紫。杵状指、趾，颈软，神经系统查体无异常

109.最可能的诊断为

- A.房间隔缺损伴轻度肺动脉瓣狭窄
- B.室间隔缺损伴重度肺动脉高压
- C.法洛四联症
- D.完全性大动脉转位
- E.单纯肺动脉瓣狭窄

110.该疾病最典型的心电图改变是

- A.右心房扩大
- B.左心室肥厚
- C.右心室肥厚

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- D. 预激综合征
- E. 不完全性右束支传导阻滞

111. 患儿晕质的原因是

- A. 长期缺氧
- B. 脑血栓形成
- C. 血液粘稠
- D. 肺动脉漏斗部痉挛
- E. 血流缓慢

112. 下列抢救措施中不合适的是

- A. 皮下注射吗啡
- B. 静脉注射普耐洛尔
- C. 静脉滴注碳酸氢钠
- D. 口服普耐洛尔
- E. 取胸膝位

(113~115 题共用题干)

男孩，3岁。水肿1周。尿中有泡沫，尿量减少。查体：T36.7℃，P120次/分，R25次/分，BP90/60mmHg，眼睑水肿，双下肢凹陷性水肿，双肺呼吸音粗，未闻及啰音，心前区未闻及杂音，腹膨隆，移动性浊音(+)。尿常规：蛋白(3+)，尿沉渣镜检：RBC0~3/HP，WBC0~3/HP。血清白蛋白20g/L，胆固醇8.7mmol/L。

113. 最可能的诊断是

- A. 泌尿道感染
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 肾炎型肾病综合征
- D. 单纯型肾病综合征

金英杰教育

E.急性肾小球肾炎

114.以下治疗方式不合适的是

A.降脂治疗

B.少盐饮食

C.给予泼尼松治疗

D.给予氢氯噻嗪利尿

E.给予青霉素抗感染

115.患儿在治疗中出现发热，最常见的原因是

A.胃肠炎

B.尿路感染

C.皮肤丹毒

D.腹膜炎

E.呼吸道感染

(116~118 题共用题干)

女，28岁，初孕妇，平素月经规律。妊娠40周，孕期检查正常，今自觉胎动减少。查体：  
T36.0℃，P70次/分，R20次/分，BP110/70mmHg。超声检查：羊水最大暗区2.5cm，指数  
7.0cm。检查：宫颈管未消，宫口未开，先露-3，胎心率120次/分。

116.应进行的检查中不包括

A.胎儿生物物理评分

B.胎儿电子监护

C.MRI

D.尿雌激素/肌酐比值

E.B超复查

117.对该孕妇首选的处理措施是

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- A. 静脉注射地西洋
- B. 催产素激惹试验 (OCT)
- C. 米索前列醇引产
- D. 人工破膜
- E. 静脉滴注缩宫素引产

118. 该孕妇临产开始后, 胎心监护示有频繁晚期减速, 最恰当的处理措施是

- A. 加压给氧
- B. 待宫口开全产钳助产

(119~120 题共用题干)

女, 22 岁, 在读大学生。于半年前觉得其身材不够苗条, 开始极端的限制饮食, 每餐只吃青菜、水果及极少量米饭, 喝水较少, 称水喝多了会浮肿。体型日渐消瘦, 但其仍认为偏胖。近 1 个月暴饮暴食, 进食后为避免体重反弹而自自行催吐, 每周 4~5 次并出现失眠整夜难以入睡情绪低落, 不能坚持上课。

119. 该患者最可能的诊断是

- A. 抑郁症伴贪食
- B. 非器质性失眠症
- C. 神经性呕吐
- D. 神经性贪食症
- E. 神经性厌食症

120. 对患者的治疗措施不包括

- A. 小剂量抗精神病药物治疗
- B. 认知行为治疗
- C. 抗抑郁药物治疗

D. 电抽搐治疗  
金英杰教育

E. 躯体支持治疗

(121~122 题共用题干)

女，28岁。婚后4年未孕。月经周期4~5天/2~3个月，量偏少，身高156cm，体重75kg，面部可见痤疮，阴毛分布呈男性型。妇科检查：子宫未见异常，双侧卵巢稍大。基础体温单相。

121. 该患者最可能的诊断是

- A. 生殖器结核
- B. 多囊卵巢综合征
- C. 子宫内膜异位症、
- D. 黄体功能不足
- E. 卵巢早衰

122. 该患者用氯米酚治疗，最需要注意防止的并发症是

- A. 卵巢过度刺激综合征
- B. 肝肾功能损害
- C. 黄素化卵泡不破裂综合征
- D. 卵巢早衰
- E. 盆腔炎性疾病

(123~125 题共用题干)

女，31岁。产后5个月，哺乳期，阴道不规则流血半月余，胸间咳嗽10天。妇科检查：宫颈前唇有一个2cm×1cm×1cm的紫蓝色结节，子宫如50天妊娠大小，质软，无压痛。双侧附件区各触及一囊性包块，均约6cm×5cm×5cm大小，表面光滑。胸部X线片示双肺中下部多发棉絮状阴影。

123. 对诊断意义最大的辅助检查是

- A. 胸腔镜检查

- B. 盆腔 B 超检查
- C. 血清 hCG 测定
- D. 腹部 CT 检查
- E. 血、尿常规检查

124. 最可能的诊断是

- A. 胎盘残留
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 绒癌
- D. 卵巢肿瘤
- E. 肺癌

125. 首选的治疗方案是

- A. 卵巢肿瘤切除术
- B. 清宫术
- C. 化学治疗
- D. 子宫切除术
- E. 放射治疗

(126~127 题共用题干)

男，56 岁。饮酒史 30 余年。20 年前下岗后饮酒量逐渐增加，每天白酒 1 斤，从未间断，进食少，体型消瘦。能间断外出打零工，生活基本正常。10 余年前常无故怀疑妻子有外遇。近 2 年记忆力明显下降，易忘事。4 天前患者被摩托车撞伤致胫骨骨折，住院拟行手术治疗，顾停酒 3 天。昨晚患者看见地板上有各种虫子在爬，大喊大叫称床底下着火了，紧张害怕。不认识爱人，不知道自己在什么地方。

126. 该患者目前处于

- A. 瞻望状态

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- B. 幻觉状态
- C. 躁狂状态
- D. 妄想状态
- E. 痴呆状态

127. 对患者的治疗不正确的是

- A. 输液营养支持治疗
- B. 苯二氮卓类药物替代治疗
- C. 补充大量 B 族维生素
- D. 大剂量抗精神病药物治疗
- E. 给予保护性约束

(128~130 题共用题干)

女孩, 1 岁。腹泻 4 天。每日大便 10 余次, 蛋花汤水样便, 伴呕吐、尿少。查体: T38.5°C, 前囟、眼窝凹陷, 皮肤弹性差。实验室检查: 血 WBC  
6.0×10<sup>9</sup>/L, Na<sup>+</sup>127mmol/L, K<sup>+</sup>3.7mmo/L, BEmmol/L。

128. 最可能的诊断是腹泻病伴

- A. 轻度等渗性脱水, 代谢性酸中毒
- B. 中度低渗性脱水, 代谢性酸中毒
- C. 中度等渗性脱水, 代谢性碱中毒
- D. 轻度低渗性脱水, 代谢性碱中毒
- E. 重度等渗性脱水, 代谢性碱中毒

129. 最可能的病原体是

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- A.产毒性大肠埃希菌
- B.侵袭性大肠埃希菌
- C.白色念珠菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.轮状病毒

130.补液过程中，患儿突然惊厥，此时首选的辅助检查是

- A.头颅 CT
- B.头颅 MRI
- C.血电解质
- D.脑脊液
- E.血糖

(131~133 题共用题干)

男，56岁。2年来表现为烦渴多食、多饮、多尿，体重下降，疲倦无力，注意力不集中，失眠，情绪低落，主动性差，反应迟钝。1周前出现兴奋不安、言语紊乱而住院。

131.下列最有诊断价值的检查是

- A.血常规
- B.尿常规
- C.血糖测定
- D.T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、TSH 测定
- E.ACTH 兴奋试验

132.该患者最可能的诊断是  
金英杰教育

- A. 肾上腺皮质功能亢进所致精神障碍
- B. 甲状腺功能减退所致精神障碍
- C. 糖尿病所致精神障碍
- D. 肾上腺皮质功能减退所致精神障碍
- E. 甲状腺功能亢进所致精神障碍

133. 该患者最重要的治疗是

- A. 控制血糖
- B. 补充雌激素
- C. 补充甲状腺素
- D. 控制精神症状
- E. 应用肾上腺皮质激素

(134~136 题共用题干)

女，28岁，经产妇，人工流产2次。妊娠37周，晨起发现阴道流血，多于月经量，无腹痛。查体：P80次/分，BP 110/70mmHg，胎方位LOA，头浮，胎心率150次/分，耻骨联合上可闻及血管音。

134. 最可能的诊断是

- A. 前置胎盘
- B. 子宫破裂
- C. 先兆临产
- D. 胎盘早剥
- E. 先兆早产

135.为明确诊断应首先进行的检查是

- A.肛门指诊
- B.MRI 扫描
- C.催产素激惹试验 (oCT)
- D.超声检查
- E.阴道双合诊

136.本例最适合的处理是

- A.行剖宫产术
- B.给予子宫收缩剂
- C.产钳助娩
- D.人工破膜
- E.严密观察, 等待自然临产

(137~138 题共用备选答案)

- A.猩红热
- B.水痘
- C.川崎病
- D.麻疹
- E.幼儿急疹

137.男婴, 6 个月。发热 4 天, 热退后出疹。查体: 精神好, 咽部轻度充血, 躯干有较密集  
的红色小丘疹, 疹间皮肤正常, 左侧颈部可触及一个 0.5cm×0.5cm 大小的淋巴结。诊断是

138.男孩, 6 岁。发热伴皮疹 2 天。查体: 咽部充血, 双扁桃体 II 度肿大, 可见脓性分泌物,

金英杰教育

www.jinyingjie.com

杨梅舌，全身红色鸡皮样疹，疹间皮肤潮红，双颌下各可触及一个 1.0cm×0.5cm 大小的淋巴结，有触痛。诊断是

(144~146 题共用备选答案)

- A. 出生后 2 个月
- B. 出生后 10-12 个月
- C. 出生后 7-9 个月
- D. 出生后 4-6 个月
- E. 出生后 2 周

144. 足月儿开始添加维生素 D 的时间是

145. 足月儿开始添加米粉的时间是

146. 足月儿开始添加肉末、菜末的时间

(147~148 题共用备选答案)

- A. 盆腔炎性疾病能腔交性族腐
- B. 子宫内膜异位症
- C. 卵巢上皮癌
- D. 生殖器结核
- E. 输卵管妊娠

147. 女，31 岁。取环后 10 天，发热 3 天。查体：T38.6℃，P98 次/分，R23 次/分，BP100/80mmHg，宫颈举痛(+)，子宫压痛，右侧附件区可触及腊肠型肿物，触痛明显，活动度差。该患者最可能的诊断是

148. 女, 31 岁。婚后 2 年未孕, 性生活正常。既往痛经 5 年。妇科检查: 子宫后倾后屈位, 正常大小, 活动度差, 后穹隆有触痛结节, 子宫左侧可触及直径 5cm 包块。该患者最可能的诊断是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 保胎治疗
- B. 肌肉注射麦角新碱
- C. 肌肉注射苯巴比妥钠
- D. 立即行清宫术
- E. 肌肉注射缩宫素

149. 女, 35 岁, 已婚。停经 70 天, 阴道中等量流血 1 天。妇科检查, 宫口可见组织物堵塞, 子宫稍大、软, 双侧附件区未触及异常, 本例首选的处理措施是

150. 女, 31 岁, 已婚。停经 58 天, 阴道少量流血、下腹隐痛 4 天。妇科检查: 宫口闭, 子宫如孕 50 天大, 质软, 双附件区