

全国卫生专业技术资格考试护理学(师)

模拟试卷



考生姓名：_____

准考证号：_____

考场号：_____



北京金英杰图书有限公司

答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2. 在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3. 在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。

4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。

6. 答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。

7. 考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。

8. 考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。

9. 监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。

10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 自发性气胸以继发于下列疾病为多的是

- A. 肺脓肿
- B. 肺癌
- C. 肺炎
- D. 支气管哮喘
- E. 肺结核

2. 正常成人的二尖瓣口的面积为

- A. $<1.0 \text{ cm}^2$
- B. $1.0 \sim 1.5 \text{ cm}^2$
- C. $1.5 \sim 2.0 \text{ cm}^2$
- D. $2.0 \sim 4.0 \text{ cm}^2$
- E. $4.0 \sim 6.0 \text{ cm}^2$

3. 肉眼血尿反复发作，最常见于

- A. 急进性肾小球肾炎
- B. 过敏性紫癜肾炎
- C. IgA 肾病
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 狼疮性肾小球肾炎

4. 腰穿后病人应去枕平卧

- A. 10 小时
- B. 3~4 小时
- C. 4~6 小时
- D. 24 小时
- E. 2 小时

5. 血浆占体重的比例为

- A. 10%
- B. 20%
- C. 5%
- D. 15%

E. 30%

6. 急性肠套叠多见于

- A. 2~10 岁的儿童
- B. 青壮年
- C. 2 岁以内的儿童
- D. 6 个月婴儿
- E. 老年人

7. 局麻药中毒中期表现为肌肉震颤，其常见部位是

- A. 颈部肌肉
- B. 腹部肌肉
- C. 颜面肌肉
- D. 肩颈部肌肉
- E. 躯干肌肉

8. 通常认为下列是休克存在的表现的是

- A. 收缩压 $<90 \text{ mmHg}$ 、脉压 $<30 \text{ mmHg}$
- B. 收缩压 $<90 \text{ mmHg}$ 、脉压 $<20 \text{ mmHg}$
- C. 收缩压 $<80 \text{ mmHg}$ 、脉压 $<30 \text{ mmHg}$
- D. 收缩压 $<80 \text{ mmHg}$ 、脉压 $<20 \text{ mmHg}$
- E. 收缩压 $<70 \text{ mmHg}$ 、脉压 $<20 \text{ mmHg}$

9. 开放性气胸的主要病理生理变化是

- A. 反常呼吸运动
- B. 皮下气肿
- C. 纵隔扑动
- D. 纵隔移动
- E. 肺萎陷

10. 术后早期出现恶心、呕吐的最常见原因

- A. 低钾血症
- B. 颅内压增高

- C.尿毒症
D.麻醉反应
E.麻痹性肠梗阻
11. 肝脓肿最易好发的部位是
A.肝右外叶
B.肝左外叶
C.左肝顶部
D.右肝顶部
E.肝脏面
12. 子宫峡部的上端是
A.组织学外口
B.组织学内口
C.解剖学外口
D.解剖学内口
E.鳞柱状上皮交界处
13. 产褥期禁止性生活的时间是产后
A.2周
B.4周
C.6周
D.8周
E.10周
14. 心脏病孕妇最危险的时期是
A.妊娠24~27周
B.妊娠28~31周
C.妊娠32~34周
D.妊娠35~38周
E.产褥期7天之后
15. 新生儿期内需接种的疫苗是
A.卡介苗和麻疹疫苗
B.乙肝疫苗和麻疹疫苗
C.卡介苗和乙肝疫苗
D.乙肝疫苗和乙脑疫苗
E.乙脑疫苗
16. 腭扁桃体在小儿几岁时发育达到高峰
A.1~4岁
B.4~8岁
C.4~10岁
D.6~11岁
E.14~15岁
17. 冬季感染化脓性脑膜炎的主要病原菌为
A.脑膜炎双球菌
B.流感嗜血杆菌
C.肺炎链球菌
D.大肠杆菌
E.葡萄球菌
18. 胸片可见“哑铃状”双极阴影的是
A.原发综合征
B.粟粒性肺结核
C.肺动脉高压
D.支气管淋巴结结核
E.室间隔缺损
19. 6个月~6岁小儿血红蛋白正常值的下限是
A.80 g/L
B.90 g/L
C.110 g/L
D.120 g/L
E.130 g/L
20. 成人24小时正常尿量为
A.500~1 000 mL/d
B.1 000~1 500 mL/d
C.1 000~2 000 mL/d
D.1 500~2 000 mL/d
E.1 500~2 500 mL/d
21. 病毒性心肌炎的病因是
A.遗传
B.细菌
C.病毒
D.运动过度
E.饱餐
22. 诊断急性肾小球肾炎最重要的依据是
A.高血压
B.水肿
C.血尿
D.中等量以上的蛋白尿

- E.尿比重下降
- 23.膀胱癌组织类型最多见的是
- A.单纯癌
 - B.移行细胞癌
 - C.鳞癌
 - D.腺癌
 - E.硬癌
- 24.下列属于低平面蛛网膜下腔阻滞的平面范围是
- A.胸2~胸4
 - B.胸4~胸10
 - C.胸10以下
 - D.胸6~胸12
 - E.颈5~胸6
- 25.肛裂常发生在肛管的
- A.前正中线
 - B.后正中线
 - C.左正中线
 - D.右正中线
 - E.左后位
- 26.下列哪个选项属于不完全骨折
- A.青枝骨折、斜行骨折
 - B.螺旋骨折、裂缝骨折
 - C.凹陷骨折、压缩骨折
 - D.嵌插骨折、裂缝骨折
 - E.裂缝骨折、青枝骨折
- 27.当妊娠危及胎儿母亲的生命时,可允许行人工流产或引产,这符合
- A.行善原则
 - B.不伤害原则
 - C.公正原则
 - D.尊重原则
 - E.自主原则
- 28.酸中毒时,血钾浓度变化趋向是
- A.升高
 - B.下降
 - C.无变化
 - D.先高后低
 - E.先低后高
- 29.关于阴道的说法正确的是
- A.上端包绕子宫颈,下端开口于阴道前庭前部
 - B.后穹隆顶端与子宫直肠凹陷贴近,后者是腹腔最低部分
 - C.后壁短于前壁
 - D.阴道壁仅由黏膜与弹力纤维构成
 - E.黏膜由复层鳞状上皮细胞所覆盖,有腺体
- 30.末次月经第1天是2007年9月26日,计算预产期应是
- A.2008年7月2日
 - B.2008年7月1日
 - C.2008年7月3日
 - D.2008年7月4日
 - E.2008年7月5日
- 31.人体维生素D的主要来源是
- A.植物中的麦角固醇
 - B.皮肤合成的胆固化醇
 - C.蛋黄中的维生素D
 - D.猪肝中的维生素D
 - E.母乳中的维生素D
- 32.慢性肺炎的病程为
- A.<3个月
 - B.>1个月
 - C.<1个月
 - D.>3个月
 - E.1~3个月
- 33.下列关于血红蛋白的描述正确的是
- A.成人男性:110~150 g/L
 - B.成人女性:170~200 g/L
 - C.新生儿:120~160 g/L
 - D.妊娠中后期孕妇可增多
 - E.病理性减少可由造血原料不足造成
- 34.关于上呼吸道的描述错误的是
- A.由鼻、咽、喉组成上呼吸道
 - B.咽是呼吸系统和消化系统的共同通路
 - C.咽在咳嗽中起重要作用

D.鼻对吸入气体有过滤、保湿、加温作用

E.吞咽时,会厌覆盖喉口,防止食物进入下呼吸道

35.阿米巴肺脓肿的痰液性状为

- A.果酱样痰
- B.粉红色泡沫样痰
- C.红褐色或巧克力色痰
- D.黄色黏痰
- E.红棕色黏痰

36.肝硬化患者出现全血细胞减少的最主要原因是

- A.脾功能亢进
- B.骨髓造血功能下降
- C.营养状况差
- D.内分泌紊乱
- E.侧支循环的建立与开放

37.发热是血液病常见症状之一,发热最主要的原因是

- A.中性粒细胞减少致机体抵抗力低下
- B.嗜酸性粒细胞减少
- C.嗜碱性粒细胞减少
- D.单核-吞噬细胞减少
- E.红细胞减少

38.一氧化碳中毒病情严重的危重信号是

- A.意识障碍
- B.神志不清
- C.浅昏迷
- D.昏迷
- E.持续昏迷

39.脑干损伤瞳孔表现常是

- A.一侧瞳孔散大,对光反射减弱
- B.双侧瞳孔散大,对光反射减弱或消失
- C.双侧瞳孔时大时小,对光反射消失,伴眼球运动障碍
- D.一侧瞳孔缩小,对光反射减弱或消失
- E.双侧瞳孔缩小,对光反射正常

- D.一侧瞳孔缩小,对光反射减弱或消失
- E.双侧瞳孔缩小,对光反射正常

40.胆汁内的主要成分为

- A.胆盐、磷脂酰胆碱、胆红素
- B.胆盐、磷脂酰胆碱、胆固醇
- C.胆盐、胆红素、胆固醇
- D.磷脂酰胆碱、胆红素、钙盐
- E.磷脂酰胆碱、胆固醇、钙盐

41.中心静脉压(CVP)代表右心房或者胸腔段腔静脉内压力的变化,下列提示血容量不足的是

- A.<5 cmH₂O
- B.5~10 cmH₂O
- C.11~15 cmH₂O
- D.16~20 cmH₂O
- E.>20 cmH₂O

42.下列是营养疗法适应证的是

- A.体液失调
- B.出血
- C.凝血功能障碍
- D.高分解代谢应激状态
- E.休克

43.体外循环装置不包括

- A.血泵
- B.人工肺
- C.滤器
- D.变温器
- E.除颤器

44.产生性激素的器官是

- A.阴道
- B.子宫体
- C.子宫颈
- D.卵巢
- E.输卵管

45.正常新生儿的呼吸特点是

- A.胸式呼吸为主
- B.张口呼吸
- C.腹式呼吸为主
- D.鼻式呼吸为主
- E.呼吸节律深度正常为主

46.前庭大腺炎的主要病原体为

- A.葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌、白色念

珠菌、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体

B. 葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌、棒状杆菌、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体

C. 葡萄球菌、大肠杆菌、链球菌、肠球菌、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体

D. 葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肠球菌、淋病奈瑟菌、沙眼衣原体

E. 葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肠球菌、棒状杆菌、沙眼衣原体

47. 正常新生儿每日共需热能量约为

A. 318~410 kJ/kg

B. 358~420 kJ/kg

C. 378~442 kJ/kg

D. 418~502 kJ/kg

E. 458~552 kJ/kg

48. 猩红热传染性最强的时间为

A. 发病 24 小时内

B. 自发病前 12 小时至疾病高峰

C. 自发病前 24 小时至疾病高峰

D. 自发病前 24 小时至病愈

E. 出疹前 1 日至皮疹结痂

49. 肾综合征的患儿突发腰痛、血尿、少尿,可能的原因是

A. 肾静脉血栓

B. 急性肾衰竭

C. 血压增高

D. 感染加重

E. 肾衰竭

50. 痰液静置后出现分层现象的疾病是

A. 支气管哮喘

B. 慢性支气管炎

C. 慢性阻塞性肺气肿

D. 肺结核

E. 肺脓肿

51. 脑血栓形成的最常见原因是

A. 高血压

B. 动脉粥样硬化

C. 各种脑动脉炎

D. 血压偏低

E. 红细胞增多症

52. 嵌顿疝与绞窄疝的鉴别要点是

A. 疝块是否有压痛

B. 疝块不能回纳的时间长短

C. 有无肠梗阻表现

D. 疝内容物有无血循环障碍

E. 疝块的大小

53. 地西洋类药物在术前用药中属于

A. 镇静催眠类

B. 镇痛类

C. 抗胆碱能类

D. 抗组胺类

E. 稳定内环境类

54. 引起开放性气胸患者休克的主要原因是

A. 血容量不足

B. 纵隔扑动,回心血量减少

C. 伤侧肺完全萎陷

D. 健侧肺部分受压

E. 心脏受压

55. 产后腹部检查时,如果在耻骨联合上方扪不到子宫底,此产妇大约在产后的

A. 第 1 天

B. 第 2~3 天

C. 第 4~6 天

D. 第 8~9 天

E. 第 10~14 天

56. 妇科腹部手术肠蠕动在手术后开始恢复的时间是

A. 10 小时

B. 12~24 小时

C. 36 小时

D. 48 小时

E. 72 小时

57. 营养不良患儿皮下脂肪最先减少的部位

A. 面部

B. 腹部

C. 四肢

- D.臀部
E.躯干
- 58.2岁以后的小儿动脉收缩压可用下列公式计算
- A.年龄 \times 0.15+9.7 kPa
B.年龄 \times 0.20+10.2 kPa
C.年龄 \times 0.25+10.26 kPa
D.年龄 \times 0.27+10.6 kPa
E.年龄 \times 0.30+11 kPa
- 59.最简单的杀灭结核杆菌的方法是
- A.冰冻
B.漂白粉处理
C.苯酚处理
D.将痰吐在纸上直接焚烧
E.高压灭菌
- 60.肝性脑病的重要发病机制是
- A.假性神经递质学说
B.胺、硫醇的短链脂肪酸的协同毒性作用
C.氨中毒学说
D. γ -氨基丁酸
E.氨基酸代谢不平衡学说
- 61.出生后的主要造血器官是
- A.骨髓
B.肝、脾
C.淋巴结
D.扁骨
E.长骨的骺端
- 62.急性阑尾炎易发生坏死穿孔的主要原因是
- A.阑尾淋巴丰富
B.阑尾动脉是终末动脉
C.阑尾系膜短
D.阑尾位置多变
E.阑尾蠕动较慢
- 63.正常成人胃排空水的时间为
- A.1小时
B.1.5~2小时
C.0.5小时

- D.2~3小时
E.3~4小时
- 64.小儿尿路感染主要途径是
- A.上行感染
B.直接感染
C.从输尿管周围淋巴管感染
D.血行感染
E.从肠道经淋巴管感染
- 65.患者,女性,53岁。高血压3年,今日血压急剧升高,收缩压达200 mmHg,并且出现头痛、心悸,首先考虑
- A.高血压危象
B.高血压脑病
C.高血压性脑出血
D.急性左心衰竭
E.短暂性脑缺血发作
- 66.患者,女性,足月妊娠,规律性腹痛10小时,检查宫口开大5 cm。先露部头居棘上1 cm。大囟门位于8点,小囟门位于2点,下述胎位最正确的是
- A.枕左前位
B.枕左后位
C.枕右前位
D.枕右后位
E.高直后位
- 67.患儿,女,12岁。5天前受凉后,流涕,发热。3天后四肢乏力逐渐不能行走,最可能的诊断为
- A.病毒性肌炎
B.吉兰-巴雷综合征
C.急性脊髓炎
D.肌无力
E.周期性瘫痪
- 68.患者,男性,60岁。肝硬化5年,少量腹水,口服利尿剂,近日为补充营养口服蛋白粉,今日其家属发现其表情淡漠,回答问题准确,但吐字不清,有双手扑翼样震颤,初步诊断肝性脑病,其发病诱因为
- A.上消化道出血

- B. 高蛋白饮食
- C. 感染
- D. 大量排钾利尿
- E. 放腹水

69. 患者, 男性, 50 岁。颈部急性蜂窝织炎, 该病人最易引起

- A. 休克
- B. 肾衰竭
- C. 窒息
- D. 败血症
- E. 脓血症

70. 某女士, 25 岁。G1P0, 末次月经不清。产科检查量宫高 32 cm, 腹围 94 cm, 宫底在剑突下 24 横指, 胎头未入盆, 胎心位于脐下左下方, 其孕周可能为

- A. 孕 34 周
- B. 孕 36 周
- C. 孕 40 周
- D. 孕 30 周
- E. 孕 42 周

71. 患者, 男性, 64 岁。突感胸骨后闷胀窒息感, 伴恶心、呕吐及冷汗, 含服硝酸甘油不能缓解, 最大可能是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胃炎
- D. 急性心肌梗死
- E. 心肌炎

72. 患者, 女性, 26 岁。初孕妇, 末次月经记不清, 自觉 3 周前开始胎动, 检查子宫长度为 23 cm, 比较符合实际的妊娠周数应是

- A. 14~16 周
- B. 17~19 周
- C. 20~22 周
- D. 23~25 周
- E. 26~28 周

73. 患儿, 女, 10 岁。给宠物犬洗澡后即出现咳嗽、咳痰伴喘息发作, 诊断为哮喘。

引起该患儿哮喘发作最可能的过敏原是

- A. 花粉
- B. 尘螨
- C. 毛屑
- D. 病毒感染
- E. 细菌感染

74. 患者, 女性, 35 岁。有风湿性心脏病史多年, 近日出现胸闷、气促伴下肢浮肿, 诊断为慢性心力衰竭。引起慢性心力衰竭最常见的诱因是

- A. 严重脱水
- B. 呼吸道感染
- C. 严重心律失常
- D. 输液过多过快
- E. 精神过度紧张

75. 患者, 女性, 32 岁。甲亢患者。近 2 周来, 眼球突出, 眼裂增宽, 瞬目减少, 突眼 18 mm, 辐辏反射减弱, 双眼聚合不良。出现上述表现的原因最可能是

- A. 眶内继发肿瘤
- B. 球后组织水肿
- C. 球后淋巴细胞浸润
- D. 上、下睑肌麻痹
- E. 眼外肌和上睑肌张力增高

76. 患者, 男性, 36 岁。突发高热, 严重贫血及皮肤广泛瘀斑, 最有助于确诊的检查是

- A. 大便潜血
- B. CT
- C. 尿化验
- D. 骨髓象
- E. B 超

77. 患儿, 男, 8 个月。室间隔缺损, 因咳嗽 3 日收治, 半小时前患儿突发面色灰白, 烦躁不安, 呼吸困难, 心率 180 次/分, 呼吸 60 次/分, 肝脏肋下可触及。最可能的原因是

- A. 急性呼吸衰竭
- B. 急性心力衰竭

- C.肺水肿
- D.病毒性心肌炎
- E.急性重型肝炎

78.患者,男性,20岁。车祸后呼吸窘迫,来医院急诊。查体:右胸饱满,呼吸音消失,叩诊呈鼓音,右胸部有骨擦音、皮下气肿。首要的急救措施是

- A.输血、输液抗休克
- B.镇静、吸氧抗感染
- C.闭式胸腔引流
- D.剖胸探查
- E.胸腔穿刺排气减压

79.患儿,男,1岁。高热惊厥入院,治疗1周痊愈出院。出院前对其家长进行健康教

育的重点是

- A.合理的喂养方法
- B.体格锻炼的方法
- C.惊厥预防及急救措施
- D.预防接种的时间
- E.门诊复查的时间

80.患者,女性,24岁。未婚。面部有较严重蝶形红斑,且长期不规则低热。其首选护理诊断是

- A.体温过高
- B.皮肤完整性受损
- C.有感染的危险
- D.相关知识缺乏
- E.思维过程改变

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(81~83题共用备选答案)

- A.安静休息时
- B.活动及情绪激动时
- C.不定
- D.饮食时
- E.运动时

81.一般患者脑血栓形成的起病方式是

82.一般患者脑出血的起病方式是

83.一般患者蛛网膜下腔出血的起病方式是

(84~86题共用备选答案)

- A.隆突性皮纤维肉瘤
- B.带状纤维瘤
- C.毛细血管瘤
- D.纤维黄色瘤
- E.脂肪瘤

84.好发于躯干,呈深咖啡色丘疹

85.突出体表,表面形似瘢痕疙瘩,好发于躯干,低度恶性

86.腹壁肌修复性增生所成,无明显包膜

(87~88题共用备选答案)

- A.单纯型中度糜烂

B.颗粒型中度糜烂

C.乳突型重度糜烂

D.乳突型中度糜烂

E.颗粒型重度糜烂

87.患者,女性,35岁。白带多呈脓性伴腰痛,妇科检查:宫颈表面凹凸不平呈乳头状,糜烂面占宫颈2/3以上

88.患者,女性,32岁。白带多呈乳白色黏液状,妇科检查:宫颈表面糜烂平坦,占宫颈面积的1/3~2/3

(89~91题共用备选答案)

A.不超过6小时

B.不超过2小时

C.不超过12小时

D.不超过24小时

E.不超过8小时

89.城市甲类传染病的上报时间

90.城镇乙类传染病的上报时间

91.农村甲类传染病的上报时间

(92~94题共用备选答案)

A.腹膜炎

B.低血压

- C. 肾乳头坏死
D. 肾功能不全
E. 消化道出血
92. 急性肾盂肾炎的并发症是
93. 血液透析的并发症是
94. 腹膜透析并发症是
(95~97 题共用备选答案)
- A. 腹股沟斜疝
B. 腹股沟直疝
C. 股疝
D. 睾丸鞘膜积液
E. 脐疝
95. 青壮年男性, 右侧腹股沟区肿块, 可下降至阴囊, 平卧后消失, 见于
96. 中年女性, 腹股沟韧带内侧的下外方突然出现包块, 疼痛不能回纳
97. 老年男性, 腹股沟内侧半球形肿块, 压住内环仍可突出
(98~100 题共用备选答案)
- A. $Hb < 145 \text{ g/L}$
B. $Hb < 120 \text{ g/L}$
C. $Hb < 110 \text{ g/L}$
D. $Hb < 100 \text{ g/L}$
E. $60 \text{ g/L} < Hb < 90 \text{ g/L}$
98. 6~14 岁小儿中度贫血的诊断标准是
99. 6 个月~6 岁小儿贫血的诊断标准是
100. 6~14 岁小儿贫血的诊断标准是



相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 肺结核诊断最可靠的依据是
 - A. 结核菌素试验
 - B. 红细胞沉降率
 - C. 胸部 X 线片
 - D. 痰结核菌检查
 - E. 肺部 CT 检查
2. 上消化道出血伴休克时,首要的治疗措施是
 - A. 禁食
 - B. 积极补充血容量
 - C. 内镜止血
 - D. 介入治疗
 - E. 气囊管压迫止血
3. 确定蛛网膜下腔出血的病因,最好的辅助检查是
 - A. 脑血管造影
 - B. CT 检查
 - C. 磁共振成像
 - D. 脑电图
 - E. 腰椎穿刺脑脊液检查
4. 格拉斯哥昏迷计分法进行评分的根据是
 - A. 瞳孔反应、言语反应、运动反应
 - B. 睁眼反应、言语反应、运动反应
 - C. 瞳孔反应、睁眼反应、言语反应
 - D. 表情反应、瞳孔反应、言语反应
 - E. 表情反应、睁眼反应、言语反应
5. 下列检查有助于泌尿系结石成分的分析是
 - A. 逆行肾盂造影
 - B. 尿常规
 - C. 血常规检查
 - D. 排泄性尿路造影
 - E. 尿液生化检查
6. 甲亢术前准备中,为抑制甲状腺素的释放,使腺体缩小变硬减少腺体充血的药物是
 - A. 普萘洛尔
 - B. 复方碘化钾溶液
 - C. 甲硫氧嘧啶
 - D. 阿托品
 - E. 丙硫氧嘧啶
7. 直肠癌手术能否保留肛门主要取决于
 - A. 肿瘤离肛门缘的距离
 - B. 患者的性别、年龄
 - C. 患者的胖瘦
 - D. 肿瘤的大小
 - E. 肿瘤占据直肠的周径比
8. 急性胆囊炎时体征项呈阳性的是
 - A. Murphy 征
 - B. Charcot 三联征
 - C. Rovsing 征
 - D. Blumberg 征
 - E. Mirizzi 征
9. 呼吸性酸中毒首先应解决的问题是
 - A. 抗生素控制肺部感染
 - B. 进行人工呼吸
 - C. 应用呼吸兴奋剂
 - D. 解除呼吸道梗阻,改善肺换气功能
 - E. 给予碱性液体
10. 关于过期妊娠,下列正确的是
 - A. 所有孕妇超过预产期两周未临产者为过期妊娠
 - B. 妊娠过期越久,胎儿体重越大
 - C. 易发生胎儿窘迫
 - D. 与孕妇孕激素相对过少有关
 - E. 过期妊娠,孕妇尿中雌三醇均有明显下降

11. 苍白密螺旋体对下列哪项具有抵抗力

- A. 干燥
- B. 消毒剂
- C. 潮湿
- D. 肥皂水
- E. 高温

12. 新生儿颅内出血, 首选诊断方法

- A. 血常规
- B. 侧脑室穿刺
- C. 头颅 CT
- D. 腰椎穿刺
- E. 硬脑膜穿刺

13. 法洛四联症病情轻重起决定性作用的病变是

- A. 室间隔缺损
- B. 主动脉骑跨
- C. 右心室肥大
- D. 肺动脉狭窄
- E. 房间隔缺损

14. 不常用于麻疹患者的检查

- A. 鼻咽分泌物涂片
- B. 痰涂片
- C. 尿沉渣涂片
- D. 血清特异性 IgM 抗体
- E. 脑脊液检查

15. 引起结核性脑膜炎的主要传播途径是

- A. 粟粒性结核经血行播散
- B. 脑实质结核灶
- C. 脑膜结核干酪病变破溃
- D. 中耳结核灶
- E. 支气管播散

16. 急性感染性多发性神经根炎患者多采用的治疗是

- A. 血浆置换疗法或免疫球蛋白治疗
- B. 抗感染治疗
- C. 抗凝治疗
- D. 扩血管治疗

E. 脱水治疗

17. 关于膀胱癌辅助检查不正确的是

- A. CT 可了解肿瘤浸润深度
- B. 膀胱造影可见充盈缺损
- C. 膀胱镜可直接观察肿瘤位置、大小、数目、形态、浸润范围
- D. 尿脱落细胞检查可找到肿瘤细胞
- E. KUB 可了解肿瘤浸润范围及深度

18. 呕吐物为棕褐色或血性提示的疾病是

- A. 机械性肠梗阻
- B. 麻痹性肠梗阻
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 单纯性肠梗阻
- E. 高位肠梗阻

19. 当腹部闭合性损伤尚未明确, 在观察期间下列措施不正确的是

- A. 不随便搬动患者, 以免加重病情
- B. 禁饮食, 胃肠减压
- C. 给予灌肠, 减轻腹胀
- D. 禁止使用止痛剂, 以免掩盖病情
- E. 使用抗生素

20. 化疗患者应避免出现便秘, 原因是

- A. 用力排便消耗体力
- B. 潜在性颅内压升高发生脑出血
- C. 诱发心肌梗死
- D. 导致肛裂
- E. 导致痔疮出血

21. 急性心肌梗死心力衰竭的病人, 24 小时内禁止使用的是

- A. 利尿剂
- B. 升压药
- C. 扩血管药物
- D. 吗啡
- E. 洋地黄制剂

22. 同步电复律适用于

- A. 心室颤动
- B. 心房颤动
- C. 房室传导阻滞

- D.心室扑动
E.心脏骤停
- 23.急性肾炎的饮食原则为
A.低盐
B.低盐低蛋白质
C.高钙低磷
D.高糖高钾
E.限制蛋白质
- 24.下列辅助检查对鉴别吉兰-巴雷综合征和脊髓灰质炎有价值的是
A.血常规
B.CT扫描
C.脑脊液检查
D.磁共振成像
E.肌肉活检
- 25.蛛网膜下腔出血应绝对卧床休息
A.4~5周
B.3~4周
C.1~2周
D.2~3周
E.4~6周
- 26.压力蒸汽灭菌要求敷料包的重量不超过
A.4 kg
B.5 kg
C.6 kg
D.7 kg
E.8 kg
- 27.诊断休克的主要依据是
A.临床表现
B.脉率变快
C.血压下降
D.动脉血氧分压 <60 mmHg
E.尿少
- 28.高渗性缺水输液治疗的首选液体是
A.等渗盐水
B.5%葡萄糖液
C.复方氯化钠溶液
D.1.25%碳酸氢钠溶液
E.50%葡萄糖液
- 29.羊水栓塞的处理,正确的是
A.解除肺动脉高压,纠正缺氧
B.立即终止妊娠,可提高治愈率
C.出血不止时,立即应用肝素抗凝
D.慎用肾上腺皮质激素
E.休克早期禁用低分子右旋糖酐
- 30.关于双合诊检查,下列不正确的是
A.双合诊是盆腔检查最常用的方法
B.方法是一手入阴道,另一手按下腹部,双手配合进行
C.检查前须排空膀胱
D.正常情况下可摸到卵巢
E.正常输卵管不能打到
- 31.目前对脑胶质瘤常用且诊断价值最大的检查手段是
A.头颅X线平片检查
B.脑血管造影
C.脑室造影
D.放射性同位素扫描
E.强化CT或MRI
- 32.依沙吖啶引产用药量为
A.不超过20 mg
B.不超过30 mg
C.不超过40 mg
D.不超过50 mg
E.不超过100 mg
- 33.X线检查呈“白肺”的是
A.新生儿肺炎
B.新生儿湿肺
C.新生儿窒息
D.新生儿肺透明膜病
E.新生儿呼吸暂停
- 34.下列由腹膈式呼吸转为胸腹式呼吸的因素是
A.膈肌活动明显
B.呼吸肌发育差
C.肋骨呈水平位
D.肺间质发育旺盛

- E.胸廓前后径和横径增大
35. 营养性缺铁性贫血,服用铁剂停药的时间应是
- A.血红蛋白量恢复正常
 - B.血红蛋白量恢复正常后 1 周
 - C.血红蛋白量恢复正常后 2 周
 - D.血红蛋白量恢复正常后 1 个月
 - E.血红蛋白量恢复正常后 2 个月
- 36.异烟肼的主要毒性反应是
- A.肾损害
 - B.周围神经炎
 - C.白细胞下降
 - D.球后视神经炎
 - E.血小板下降
- 37.下列关于氨茶碱的应用描述不正确的是
- A.有松弛支气管平滑肌作用
 - B.常用给药途径为肌肉注射
 - C.静脉注射应使用葡萄糖稀释后慢推
 - D.主要不良反应是胃肠道、心血管症状
 - E.严重不良反应可导致抽搐,甚至死亡
- 38.脾脏轻度肿大为
- A.深吸气时,不能触及
 - B.深吸气时,脾下缘在左侧肋下不超过 3 cm
 - C.深吸气时,脾下缘在左侧肋下超过 3 cm
 - D.深吸气时,脾下缘在肋缘 3 cm 至脐水平线
 - E.深吸气时,脾下缘超过脐水平线
- 39.下列不支持缺铁性贫血诊断的是
- A.血红蛋白降低,红细胞呈小细胞低色素
 - B.血细胞比容减少
 - C.骨髓细胞铁染色强阳性
 - D.血清铁降低
 - E.铁蛋白降低
- 40.全血胆碱酯酶活力测定有助于明确诊断的急性中毒是

- A.一氧化碳中毒
 - B.有机磷中毒
 - C.有机氮中毒
 - D.肉毒类中毒
 - E.亚硝酸盐中毒
- 41.内囊病变常引起
- A.偏瘫
 - B.交叉瘫
 - C.截瘫
 - D.四肢瘫
 - E.肌肉性瘫痪
- 42.患者,男性,31 岁。发现皮肤紫癜 2 周,口腔血泡 1 周,多次查血小板减少,目前血小板 $1.0 \times 10^9/L$,本病可能诊断是 ITP,但需进一步做相关检查,检查除外
- A.凝血检查
 - B.血小板相关免疫球蛋白的测定
 - C.骨髓检查
 - D.血管造皿
 - E.束臂试验
- 43.患者,女性,22 岁。因体检时发现梅毒血清学试验阳性,前来就诊,确诊为梅毒二期,首选治疗原则是
- A.青霉素
 - B.链霉素
 - C.头孢三代
 - D.红霉素
 - E.庆大霉素
- 44.2 个月小儿一直牛乳喂养,检查发现血清铁蛋白下降。另一名同龄小儿一直母乳喂养则无此改变,原因是
- A.牛乳中含铁量低
 - B.母乳中含铁量高
 - C.母乳中铁吸收率高
 - D.牛乳中铁吸收率高
 - E.母乳中含矿物质多
- 45.患儿,男,7 岁。先天性心脏病,已用地高辛维持治疗近 5 个月,因上感并发充血性心力衰竭,按医嘱使用毛花苷 C(西地

兰),出现恶心、呕吐、视力模糊,上述临床表现的原因可能是

- A.上感加重病情
- B.胃肠道感染
- C.急性心力衰竭加重
- D.强心苷中毒的反应
- E.先心病的表现

46.患者,女性,孕36周,1个月前血压正常,近1周双下肢水肿,伴头晕、眼花、视物不清,血压160/110 mmHg,尿蛋白(++),尿雌三醇10 mg/24小时,胎心好,应采取的处理措施是

- A.积极治疗1周考虑终止妊娠
- B.积极治疗24~48小时,上述症状不缓解,考虑终止妊娠
- C.积极治疗等待自然临产分娩
- D.立即剖宫产
- E.立即人工破膜及静滴缩宫素引产

47.患者,女性,70岁。主诉因“慢性咳嗽、咳痰30年,活动后气促15年,双下肢水肿5年,加重20天”入院,患者下肢水肿应考虑

- A.肺心病右心衰
- B.低蛋白血症
- C.摄盐过多
- D.合并肾炎
- E.冠心病

48.患者在上班途中发生车祸,当即昏迷,持续时间约30分钟,醒后主诉有轻微头痛,四肢活动好,次日感到头痛加重,呕吐数次,嗜睡而就诊,最恰当的处理方式是

- A.给予止呕处理,休息1周
- B.给予镇痛处理,休息1周
- C.给予脱水利尿治疗,同时进一步检查
- D.立即行脑室穿刺外引流术
- E.给予口服脱水、利尿药随诊

49.患者,女性,40岁。重型颅脑损伤行“血肿清除术”后20小时,患者清醒后,继而出现呕吐,意识障碍,GCS评分11分。急诊

CT检查,见右颞顶不规则阴影。患者可能出现了

- A.颅内感染
- B.皮下血肿
- C.颅内血肿
- D.颅内急性脓肿
- E.帽状腱膜血肿

50.患儿,男,1岁。高热、惊厥入院,治疗1周痊愈出院。出院前对其家长进行健康教育重点是

- A.合理的喂养方法
- B.体格锻炼的方法
- C.门诊复查的时间
- D.预防接种的时间
- E.惊厥预防及急救措施

51.患者,男性,36岁。突发高热,严重贫血及皮肤广泛淤斑,最有助于确诊的检查是

- A.CT
- B.尿化验
- C.大便潜血
- D.B超
- E.骨髓象

52.患者,女性,30岁。甲状腺功能亢进病史半年,妊娠3个月,甲状腺功能亢进症状加重,治疗宜选用

- A.碘剂
- B.放射性
- C.丙基硫氧嘧啶
- D.普萘洛尔
- E.甲状腺次全切除术

53.患儿,男,5岁。幼儿园老师反映上课时不停摇椅,多跑动,不专心,不能完成手工作业,但智力正常。最可能的诊断是

- A.脑性瘫痪
- B.癫痫小发作
- C.多发性神经根神经炎
- D.注意缺陷多动障碍
- E.大脑发育不全

54.患者,男性,38岁。左足麻木、疼痛,走路时小腿酸胀、易疲劳,足底有硬胀,初步诊断为血栓闭塞性脉管炎。可确诊的辅助检查是

- A.肢体抬高试验
- B.静脉注射硫酸镁 10 mL
- C.仔细检查肢体各种脉搏动情况
- D.行交感神经阻滞
- E.行动脉造影

55.患者,女性,30岁。诊断类风湿关节炎入院,经使用药物治疗后患者关节疼痛减轻,但出现体重增加、满月脸、向心性肥胖。提示存在何种药物的副作用

- A.泼尼松
- B.环磷酰胺
- C.硫唑嘌呤
- D.吡罗美辛
- E.阿司匹林

56.患者,女性,21岁。发热,多处关节炎,面部有蝶形红斑,诊断为系统性红斑狼疮。下列最具特征性的发现是

- A.红细胞花环形成
- B.类风湿因子(+)
- C.抗核抗体(+)
- D.抗 Sm 抗体(+)
- E.血沉快

57.患者,男性,32岁。贫血、出血及发热,经化验确诊急性白血病,患者发热最常见原因是

- A.血小板少
- B.骨髓被破坏
- C.出血被吸收
- D.红细胞破坏多
- E.细菌感染

58.患者,女性,38岁。血红蛋白 40 g/L,诊断为缺铁性贫血,给予口服铁剂治疗。饮食护理不正确的是

- A.补充铁剂的同时补充蛋白
- B.补充铁剂的同时补充维生素

- C.每天饮食中必须有含铁丰富的食物
- D.餐后饮浓茶可以利于铁的吸收
- E.消化不良者要少量多餐

59.患者,女性,38岁,干部。间断四肢关节肿痛7个月,加重2周入院。患者7个月前无明显诱因出现左手环指和右手示指近端指间关节肿胀、疼痛,伴晨僵,时间约10分钟,实验室检查:血沉 65 mm/h, RF(+)。关节 X 线检查:双手骨密度减低。最可能的诊断是

- A.类风湿关节炎
- B.干燥综合征
- C.系统性红斑狼疮
- D.骨性关节炎
- E.银屑病关节炎

60.患者,女性,36岁。患慢性肾炎,有眼睑水肿,血压高,大量蛋白尿,但肾功能正常。饮食应采用

- A.低盐饮食
- B.高磷饮食
- C.高蛋白饮食
- D.高脂饮食
- E.不限制饮食

61.患儿,男,2岁。人工喂养,4天前咳嗽、发热、腹泻。体格检查:体温 38.6℃,中度脱水。患儿在补液中突发抽搐,持续约1分钟。抽搐最可能的原因是

- A.高热惊厥
- B.急性心力衰竭
- C.低钙血症
- D.低钠血症
- E.中毒性脑病

62.患者,男性,40岁。近几天来上腹部疼痛不适反复发作,2小时前在睡眠时突感上腹刀割样剧痛,继之波及全腹,既往有十二指肠溃疡病史,根据临床表现和辅助检查结果,拟诊为十二指肠穿孔。肠穿孔的重要诊断依据为

- A.既往病史

- B. 腹膜炎和腹腔积液体征
- C. B 超示腹腔液性暗区
- D. X 线示膈下游离气体
- E. 患者自觉症状

63. 患者, 女性, 45 岁。以有机磷中毒住院, 表现头晕、头痛、多汗、流涎、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、瞳孔缩小、视物模糊、支气管分泌物增多、呼吸困难等。考虑可能是患者出现毒蕈碱样症状, 严重者出现

- A. 肌纤维颤动
- B. 共济失调
- C. 肺水肿
- D. 呼吸肌麻痹
- E. 抽搐和昏迷

64. 患者, 女性, 68 岁。因颅内压增高, 头痛逐渐加重, 行腰椎穿刺脑脊液检查。术后突然呼吸停止, 血压下降。该患者最可能发生

- A. 小脑幕切迹疝
- B. 枕骨大孔疝
- C. 大脑镰下疝
- D. 脑干缺血
- E. 脑血管意外

65. 右上胸叩诊呈实音应多考虑

- A. 气胸
- B. 轻度胸膜炎
- C. 大空洞
- D. 肺部炎症
- E. 正常

66. 患儿, 男, 3 个月。腹泻 2 天, 呈黄绿色稀便, 有奶瓣和泡沫。为纠正轻度脱水, 应选择

- A. 少量多次饮温开水
- B. 少量多次给予糖水
- C. 静脉补充林格液
- D. 少量多次喂服 ORS 液
- E. 静脉补充 10% 葡萄糖液

67. 患者, 男性, 48 岁。皮肤黏膜均有散在性小红点, 不高出皮肤表面, 直径约 1~

2 mm, 加压时不褪色, 称之为

- A. 皮疹
- B. 出血点
- C. 瘀斑
- D. 蜘蛛痣
- E. 小红痣

68. 患儿, 男, 3 岁。住院第 2 天晨起突然神志不清, 面色苍白, 脉搏细弱, 呼吸表浅, 出冷汗, 首先应静脉注射的是

- A. 氨茶碱
- B. 洛贝林
- C. 地西洋
- D. 葡萄糖
- E. 地高辛

69. 患者, 女性, 35 岁。已婚, 近 3 周来无明显诱因出现情绪低落, 兴趣缺乏, 动作缓慢, 自觉“脑子笨, 没有以前聪明, 好像一块木头”, 给予百忧解等治疗。护士需要向患者说明该药物的不良反应是

- A. 过度出汗
- B. 嗜睡
- C. 胃肠功能紊乱
- D. 口唇发干
- E. 心血管系统的紊乱

70. 患者, 男性, 46 岁。建筑工人, 入院时诊断为破伤风。以下与本病最有关的既往史是

- A. 糖尿病病史
- B. 工作时被钉子扎伤过
- C. 高血压家族史
- D. 吸烟 20 年
- E. 对花粉过敏

71. 患者, 男性, 65 岁。高血压, 在未服用降压药的情况下, 三次非同日所测血压的平均值是 170/106 mmHg, 该患者的血压分级属于

- A. 正常高值
- B. 1 级高血压
- C. 2 级高血压

- D.3 级高血压
- E.单纯收缩期高血压
- 72.患者,女性,20 岁。寒战、发热,右小腿内侧皮肤出现鲜红色片状疹,烧灼样疼痛,附近淋巴结肿大疼痛。错误的护理措施是
- A.遵医嘱使用抗生素
- B.嘱患者勿抬高患肢
- C.局部温热敷
- D.给予物理降温
- E.嘱患者卧床休息
- 73.患者,女性,28 岁。诊断为系统性红斑狼疮,双面颊和鼻梁有紫红色蝶形红斑,表面光滑,有时可见鳞屑。皮肤护理措施不正确的是
- A.出门穿长袖衣裤
- B.禁忌日光浴
- C.保持皮肤的清洁卫生
- D.碱性肥皂水洗浴
- E.避免使用化妆品
- 74.患者,男性,43 岁。胃、十二指肠溃疡病多年,合并瘢痕性幽门梗阻,其主要的病理生理改变是
- A.低钾低氯性酸中毒
- B.高钾低氯性酸中毒
- C.高钾低氯性碱中毒
- D.低钾低氯性碱中毒
- E.低钾高氯性酸中毒
- 75.患者,女性,25 岁。因双肘、腕、手指近端指间关节肿痛 3 年,加重 2 个月,以类风湿关节炎收入院。经休息、药物治疗后,现在病情缓解,准备出院,护士应进行的健康教育是
- A.避免劳累,预防感冒
- B.每日进行运动锻炼 4 小时
- C.吃高蛋白、高热量饮食
- D.每日饮水控制在 500 mL
- E.在家承担所有家务劳动
- 76.患者,男性,66 岁。胸痛 2 小时,诊

- 断为急性心肌梗死,给予急诊溶栓治疗。下列对直接诊断冠脉再通最有价值的是
- A.胸痛 2 小时内基本消失
- B.出现心律失常
- C.心电图抬高 ST 段回降 >50%
- D.血清心肌酶峰值提前
- E.冠脉造影示闭塞动脉再通
- 77.患者,女性,30 岁。经常出现劳力性呼吸困难、晕厥等症状。体检:胸骨右缘第二肋间可闻及响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音。为明确诊断,最有价值的检查是
- A.CT 检查
- B.X 线检查
- C.心电图检查
- D.心肌酶学检查
- E.超声心动图检查
- 78.患者,女性,35 岁。缺铁性贫血,口服硫酸亚铁 0.3 g,每日 3 次进行治疗,护士通知患者采取以下哪种方法
- A.每间隔 8 小时一次
- B.三餐饭前服用
- C.三餐饭后服用
- D.早晨 10 时,下午 3 时和睡前
- E.在一天中任选时间服用
- 79.患者,男性,42 岁。肾病综合征,水肿明显,血红蛋白 26 g/L,尿蛋白定量 5.1 g/L,血尿素氮 9.3 μmol/L,血肌酐 136 μmol/L,应给予的饮食是
- A.低盐、高糖
- B.低盐、低蛋白
- C.低盐、高蛋白
- D.低盐、禁蛋白
- E.低盐、正常量优质蛋白
- 80.患者,女性,28 岁。风湿性心脏病、二尖瓣狭窄病史 3 年,平时不用药,爬至三楼无明显不适。孕 5 个月起活动时常有轻度心慌、气促。现孕 38 周,因心悸、咳嗽,夜间不能平卧,心功能 III 级而急诊入院。在制订治疗计划时,最佳的方案是

- A. 积极控制心力衰竭后终止妊娠
- B. 积极控制心力衰竭,同时行剖宫产术
- C. 积极控制心力衰竭,同时行引产术
- D. 适量应用抗生素后继续妊娠
- E. 纠正心功能,等待自然临产

(81~83 题共用题干)

患者,女性,56 岁。因乳腺癌在全麻下行乳癌根治术,手术顺利,术后返回病房。

81. 手术前皮肤准备的范围,不正确的是

- A. 上至锁骨上窝
- B. 下至剑突
- C. 健侧至腋前线
- D. 同侧腋窝部腋毛需剃去
- E. 包括患侧上臂 1/3 和腋窝

82. 为患者准备麻醉床,不符合节力原则的是

- A. 动作平稳
- B. 使用肘部力量
- C. 铺床时身体靠近床铺
- D. 上身保持一定的弯度
- E. 两脚分开,两膝稍屈

83. 患者返回病房应采取的卧位是

- A. 半坐卧位
- B. 去枕仰卧位
- C. 头高足低位
- D. 健侧卧位
- E. 患侧卧位

(84~85 题共用题干)

患者,男性,35 岁。午后低热、盗汗、乏力 2 个月。近 1 周高热、咳嗽、咳痰,痰中带血。痰涂片查结核分枝杆菌阳性。给予链霉素抗结核治疗。

84. 链霉素出现皮肤过敏的常见表现不包括

- A. 斑丘疹

- B. 荨麻疹
- C. 猩红热样皮疹
- D. 紫癜
- E. 溃疡

85. 长期应用链霉素,最常见的毒性反应是

- A. 周围神经炎
- B. 肝损害
- C. 眩晕、听力障碍
- D. 高尿酸血症
- E. 视神经炎

(86~87 题共用题干)

患者,男性,25 岁。反复发作性上腹痛 5 年。午饭后突然剧烈腹痛,迅速遍及全腹。查体:腹肌紧张,压痛,反跳痛,肝浊音界缩小。

86. 护理措施错误的是

- A. 禁食
- B. 禁止使用麻醉止痛剂
- C. 禁止灌肠
- D. 禁止导尿
- E. 禁止口服导泻药物

87. 最可能的诊断是

- A. 慢性阑尾炎急性发作
- B. 慢性胃肠炎
- C. 急性胃肠炎
- D. 十二指肠球部溃疡穿孔
- E. 慢性胆囊炎急性发作

88. 下列处理措施错误的是

- A. 解痉止痛
- B. 补液
- C. 抗感染
- D. 胃肠减压
- E. 口服中药

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(89~90 题共用备选答案)

- A.应用胺碘酮
- B.非同步直流电复律
- C.安置永久起搏器
- D.起搏器临时起搏
- E.应用阿托品

89.急性心肌梗死时发生室颤尽快应用

90.急性心肌梗死时发生第三度房室传导阻滞宜用

(91~95 题共用备选答案)

- A.屈曲、短缩、内收、内旋
 - B.屈曲、外展、外旋
 - C.屈曲、短缩、内收、外旋
 - D.肘后三角关系失常
 - E.“方肩”畸形
- 91.股骨颈骨折患肢出现
- 92.髋关节脱位患侧肢体出现
- 93.肩关节脱位出现
- 94.股骨干上 1/3 段骨折,近端出现
- 95.肘关节脱位出现

(96~97 题共用备选答案)

- A.儿茶酚胺大量增高
- B.高血糖素增高
- C.胰岛素降低
- D.肾上腺皮质激素增多
- E.抗利尿激素和醛固酮增加

96.休克早期,使心跳加快,心排血量增加,外周和内脏小血管收缩,保证重要脏器血液供应的激素是

97.使水钠潴留以保证血容量的激素是

(98~100 题共用备选答案)

- A.腰部各棘突间隙之间穿刺
 - B.胸 6~胸 12 之间穿刺
 - C.骶裂孔
 - D.颈 5~胸 6 之间穿刺
 - E.胸 8~腰 3 之间穿刺
- 98.高位硬膜外阻滞
- 99.中位硬膜外阻滞
- 100.骶管阻滞



专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这这母所属的方框涂黑。

1. 下列表现仅见于原发性甲亢的是
 - A. 杂音及震颤症
 - B. 手颤及舌颤
 - C. 眼球突出
 - D. 脉压大
 - E. 食欲亢进
2. 胸部外伤后出现严重皮下气肿和极度呼吸困难首先应考虑为
 - A. 血胸
 - B. 肺挫伤
 - C. 肋骨骨折
 - D. 张力性气胸
 - E. 开放性气胸
3. 诊断消化性溃疡合并穿孔最具价值的临床表现是
 - A. 上腹部剧烈疼痛
 - B. 有溃疡病史
 - C. 肝浊音区消失
 - D. 上腹部饱胀
 - E. 尿量减少
4. 门静脉高压症的主要表现为
 - A. 恶心、呕吐
 - B. 出血倾向和贫血
 - C. 脾大、侧支循环建立与开放、腹水
 - D. 蜘蛛痣和肝掌
 - E. 肝病面容
5. 肝性脑病的主要临床表现为
 - A. 肝病面容、消瘦乏力
 - B. 恶心、呕吐、黄疸出现
 - C. 出血倾向、贫血
 - D. 肝掌、蜘蛛痣
 - E. 意识障碍、行为失常
6. 急性出血坏死型胰腺炎常出现的酸碱平衡紊乱是
 - A. 呼吸性酸中毒
 - B. 呼吸性碱中毒
 - C. 代谢性酸中毒
 - D. 代谢性碱中毒
 - E. 混合性酸中毒
7. 右半结肠癌的临床表现为
 - A. 全身症状
 - B. 便秘
 - C. 肠梗阻
 - D. 腹泻
 - E. 便意频繁
8. 关于结肠造口护理措施不正确的是
 - A. 术后 2~3 日肠蠕动恢复后开放
 - B. 开放时行右侧卧位
 - C. 保护造口周围的皮肤
 - D. 造口袋内充满 1/3 排泄物时应更换
 - E. 造口拆线后每日扩张肛门 1 次
9. 晚期肝癌最常见的并发症是
 - A. 上消化道出血
 - B. 肝性脑病
 - C. 肝脓肿
 - D. 癌肿破裂出血
 - E. 继发性感染
10. 婴幼儿颅内压增高的表现是
 - A. 头痛
 - B. 意识障碍
 - C. 呕吐
 - D. 囟门饱满
 - E. 惊厥
11. 镜下血尿是指离心沉淀后的尿沉渣在每高倍视野中平均见到的红细胞数为
 - A. 3 个以上
 - B. 4 个以上
 - C. 5 个以上

- D.6 个以上
E.7 个以上
- 12.慢性阻塞性肺气肿患者长期氧疗,每日持续吸氧时间应超过
- A.7 小时
B.9 小时
C.10 小时
D.12 小时
E.15 小时
- 13.肝-颈静脉回流征阳性是
- A.压迫患者颈静脉,肝脏变大
B.肝脏变大时颈静脉回流减少
C.压迫患者肝脏,颈静脉回流减少
D.压迫患者肝脏,颈静脉怒张更明显
E.压迫患者颈静脉,肝脏会感觉不适
- 14.糖尿病患者失明的主要原因是
- A.脑血管意外
B.白内障
C.视网膜病变
D.青光眼
E.虹膜睫状体病变
- 15.对系统性红斑狼疮患者做健康指导,下列不妥的是
- A.活动期应卧床休息
B.慢性期或病情稳定的患者可适当活动或工作
C.应避免日晒
D.有感染时应积极治疗
E.育龄妇女可口服避孕药,以防止病情恶化
- 16.热射病典型临床特征是
- A.高热、无汗、意识障碍
B.高热、多汗、意识障碍
C.高热、无汗、循环衰竭
D.高热、多汗、呼吸衰竭
E.高热、眩晕、肌肉痉挛
- 17.硬膜外麻醉并发全脊髓麻醉时,下列不正确的是
- A.过量麻药误注入蛛网膜下腔
B.短时间内神志、呼吸和脉搏相继消失
C.因严重缺氧可致继发心跳停止
D.必须先注入试验剂量,待排除腰麻后再继续注药
E.万一发生,应立即应用鼻导管高浓度吸氧,并给予升压药
- 18.病理改变主要在肾脏,但临床表现主要在膀胱的疾病是
- A.肾结石
B.肾结核
C.肾肿瘤
D.肾积水
E.多囊肾
- 19.关于全胃肠外营养置管后护理不正确的是
- A.密切观察生命体征及置管有无并发症
B.穿刺部位每日换药
C.营养液应匀速输入
D.每周更换一次输液管
E.静脉置管不得用于抽血、输血、给药
- 20.肾癌的三大典型症状是
- A.血尿、疼痛、肿块
B.尿频、尿急、尿痛
C.血尿、脓尿、肾区疼痛和肿块
D.排尿突然中断,并感到疼痛
E.排尿困难,点滴状排尿,尿痛,急性尿
- 21.肝浊音界扩大见于
- A.肝癌、肝脓肿
B.肝硬化
C.急性肝炎
D.胆道疾病
E.心肌炎
- 22.肺炎球菌患者使用抗生素后热退,但又复升,应首先考虑
- A.机体免疫力低下
B.机体营养状况不佳
C.出现并发症
D.细菌产生耐药

- E.感冒
- 23.脑出血患者急性期应绝对卧床休息
- A.24 小时
B.48 小时
C.1~2 周
D.4~6 周
E.2~4 周
- 24.短暂性脑缺血发作患者的最佳饮食安排是
- A.高肉类饮食
B.高蛋白、高脂肪、高维生素饮食
C.高盐低钙饮食
D.粗纤维饮食
E.低盐、低脂、高蛋白饮食
- 25.胃肠道手术前禁饮食的主要目的是
- A.预防术后便秘
B.避免术后腹胀
C.防止术后吻合口瘘
D.促进肠蠕动恢复
E.防止麻醉后呕吐造成窒息
- 26.肠外营养周围静脉输注一般不超过
- A.2 周
B.1 周
C.2 天
D.3 天
E.5 天
- 27.丹毒的临床特点,下列不正确的是
- A.起病急
B.病变处皮肤鲜红
C.一般不化脓
D.下肢丹毒可致橡皮肿
E.病变部位与周围皮肤界限不清
- 28.椎管内麻醉发生血压急剧下降,首先采取的措施为
- A.快速输液
B.立即静脉注麻黄碱 15~30 mg
C.改变体位
D.去甲肾上腺素静滴
E.多巴胺
- 29.骨折固定晚期功能锻炼主要是
- A.骨折部位以上关节活动
B.伤肢肌肉进行舒缩活动
C.骨折部位以下关节活动
D.全身各部位肌肉及关节活动
E.重点关节为主的功能锻炼
- 30.膝部术后膝关节应屈曲
- A.15°
B.30°
C.45°
D.60°
E.90°
- 31.皮肤干燥无汗见于
- A.结核病
B.风湿热
C.休克
D.维生素 A 缺乏
E.肺炎
- 32.正常人瞳孔直径为
- A.1~2 mm
B.2~2.5 mm
C.2.5~3 mm
D.2~5 mm
E.4~5 mm
- 33.少尿是指 24 小时尿量少于
- A.100 mL
B.200 mL
C.300 mL
D.400 mL
E.500 mL
- 34.右心衰竭水肿患者饮食应注意
- A.低盐高蛋白
B.高盐高蛋白
C.高蛋白高热量
D.高盐高热量
E.低盐低蛋白
- 35.心源性水肿的特点
- A.早期出现于身体低垂部位及组织疏松部位

- B.早期出现于颜面、双眼睑
C.早期出现于双上肢
D.早期出现于躯干及双上肢
E.早期不明显
- 36.结核性腹膜炎热型多见的是
A.弛张热
B.稽留热
C.中等热
D.间歇热
E.不规则热
- 37.再生障碍性贫血的主要临床表现
A.进行性贫血、出血、感染及外周全血细胞减少
B.黄疸、贫血、脾大
C.发热、贫血、出血、肝脾淋巴结肿大
D.进行性贫血、出血
E.感染、出血
- 38.护理白血病化疗患者中,下列不妥的是
A.药物必须新鲜配制
B.饮食宜清淡
C.鼓励患者多喝水
D.化疗药外渗予局部热敷
E.指导患者预防感染、出血的相关知识
- 39.绞窄性肠梗阻的腹痛特点
A.持续性胀痛
B.持续性剧烈腹痛伴阵发性加重
C.阵发性剧烈腹痛
D.阵发性绞痛
E.阵发性胀痛
- 40.急性阑尾炎的最典型临床表现
A.胃肠功能紊乱
B.全身乏力
C.腹膜炎体征
D.转移性右下腹痛
E.白细胞升高
- 41.瞳孔缩小见于
A.视神经萎缩
B.阿托品药物中毒
C.深昏迷患者
D.吗啡中毒
E.颅内病变
- 42.肝硬化患者补充血容量时,为防止诱发肝性脑病应输注
A.新鲜血
B.库存血
C.白蛋白
D.血小板
E.洗涤红细胞
- 43.肝硬化最常见的并发症是
A.感染
B.上消化道出血
C.肝性脑病
D.肝肾综合征
E.肝肺综合征
- 44.晚期肝硬化最严重的并发症是
A.上消化道出血
B.肝性脑病
C.肝肾综合征
D.肝肺综合征
E.肝癌
- 45.Graves病的典型临床表现有
A.基础代谢率升高,甲状腺肿
B.基础代谢率升高,突眼,甲状腺肿
C.突眼,甲状腺肿,心率增快
D.突眼,甲状腺肿,多食,消瘦
E.高代谢综合征,甲状腺肿,突眼征
- 46.关于胰岛素注射下列说法错误的是
A.常用注射部位有臀大肌、上臂外侧、腹部、股外侧
B.胰岛素可以冷冻保存
C.混合注射胰岛素时,应先抽普通胰岛素
D.1周内同一部位不应注射两次
E.使用前1小时自冰箱取出
- 47.急性有机磷农药中毒经皮肤吸收一般出现症状常在接触农药
A.1~2小时内

- B.2~3 小时内
 C.2~4 小时内
 D.2~5 小时内
 E.2~6 小时内
- 48.骨折固定中期功能锻炼的重点是
 A.完全依靠外力做被动运动
 B.伤肢肌肉进行舒缩活动
 C.骨折部位上、下关节活动
 D.全身各部位肌肉及关节活动
 E.重点关节为主的功能锻炼
- 49.急性胆囊炎、胆结石疼痛常放射的部位是
 A.右肩背部
 B.左肩背部
 C.左胸部
 D.右胸部
 E.下腹部
- 50.在使用人工呼吸机时,若通气过度可出现
 A.皮肤潮红、出汗
 B.表浅静脉充盈消失
 C.呼吸浅快
 D.呼吸性酸中毒
 E.呼吸性碱中毒
- 51.患儿,男,9 个月。舌左侧面有片状白色乳凝块样物,此时首位的护理诊断为
 A.疼痛
 B.口腔黏膜改变
 C.营养失调:低于机体需要量
 D.家属知识缺乏
 E.体液不足
- 52.患者,男性,50 岁。主因头晕、乏力,来医院就诊,实验室检查: $RBC\ 3.95 \times 10^{12}/L$,
 $Hb\ 90\ g/L$,疑诊为
 A.贫血
 B.神经衰弱
 C.肾炎
 D.脑水肿
 E.白血病
- 53.患者,男性,60 岁。突然头痛、呕吐,右侧肢体活动不灵,血压为 192/120 mmHg,患者曾有高血压病 10 年,行头颅 CT 检查,发现有高密度病灶,患者可能是
 A.蛛网膜下腔出血
 B.急性感染性多发性神经根炎
 C.短暂性脑缺血发作
 D.脑出血
 E.脑梗死
- 54.患者,女性,50 kg,硬膜外麻醉下行子宫肌瘤切除术,用 1.6%利多卡因 550 mg,患者出现躁动,复视,头晕,血压上升,心率增快,最可能的原因是
 A.一次用量过大
 B.误入血管
 C.未加肾上腺素
 D.贫血
 E.注药速度过快
- 55.患者,女性,32 岁。孕 36 周,血压 180/115 mmHg,现腹痛剧烈,面色苍白,血压下降到 105/65 mmHg,阴道少量出血,子宫较妊娠月份大,硬如板状,胎心不清,应考虑为
 A.前置胎盘
 B.先兆子宫破裂
 C.重型胎盘早剥
 D.先兆早产
 E.羊水过少
- 56.患者,女性,65 岁。以肺心病、II 型呼衰收入院,入院第一天晚上,因咳嗽、痰多、呼吸困难,并对医院环境不适应而不能入睡,不正确的护理措施是
 A.给镇咳和镇静药,帮助入睡
 B.减少夜间操作,保证患者睡眠
 C.给低流量持续吸氧
 D.减少白天睡眠时间和次数
 E.和患者一同制定白天活动计划
- 57.患者,女性,40 岁。甲亢行甲状腺大部切除术,术后第 2 天,护士在与其交流时

发现声音嘶哑,可能是由于

- A. 喉上神经内外支损伤
- B. 喉上神经内支损伤
- C. 喉上神经外支损伤
- D. 两侧喉返神经损伤
- E. 一侧喉返神经损伤

58. 患者,女性,26岁。孕40周,因胎动减少入院,查宫高35 cm,LOA,先露头,胎心132次/分钟,无宫缩,入院后测尿雌三醇7 mg/24 h,应考虑为

- A. 脐带受压
- B. 胎头受压
- C. 过期妊娠
- D. 胎儿入盆
- E. 胎盘功能不全

59. 患者,女性,29岁。孕33周,突然阴道流血如经量,无腹痛,此时,需诊断是否前置胎盘,应建议进行

- A. 腹部触诊
- B. 阴道检查
- C. B超检查
- D. 血常规检查
- E. 后穹窿穿刺

60. 患者站立中突然短暂意识丧失,头部撞击在地,脑后部出血,继之出现喷射状呕吐,进行性意识障碍,诊断颅内压增高原因待查,该患者不合适的护理措施应该为

- A. 床头抬高 $15^{\circ}\sim 30^{\circ}$
- B. 每天静脉输液量在1 500~2 000 mL
- C. 保持病室安静
- D. 保持呼吸道通畅
- E. 如有便秘,立即高压灌肠

61. 患者,女性,左下肢大腿外侧烧伤,经局部换药、抗生素治疗后医生决定为其行植皮手术。对此患者的术后护理正确的是

- A. 保持包扎敷料清洁干燥,24小时换药
- B. 植皮的肢体要制动,并保持平卧位
- C. 不可抓摸创面,必要时加约束
- D. 观察创面,如皮下有积脓,应立即用

尖头剪刀剪开小口挤压排出脓液

E. 供皮区若无污染,术后7天更换敷料

62. 患儿,女,6天。主因哭声弱,拒乳2天,查体:体温 38.2°C ,全身皮肤黄染,臀部皮肤有 $1\text{ cm}\times 2\text{ cm}$ 感染灶,血常规白细胞数 $22\times 10^9/\text{L}$,该患儿可能为

- A. 新生儿败血症
- B. 新生儿肺炎
- C. 新生儿溶血症
- D. 新生儿肝炎
- E. 新生儿化脓性脑膜炎

63. 患者,男性,48岁。测得总胆红素为 $100\ \mu\text{mol/L}$,其黄疸程度为

- A. 隐性黄疸
- B. 轻度黄疸
- C. 中度黄疸
- D. 重度黄疸
- E. 阻塞性黄疸

64. 患者,男性,原有慢支、阻塞性肺气肿,近日咳嗽加剧,突然发生右侧胸痛后呼吸困难加剧,患侧胸壁叩诊呈鼓音,听诊呼吸音消失。可能发生了

- A. 自发性气胸
- B. 肋间神经痛
- C. 膈下脓肿
- D. 腹水
- E. 肋骨骨折

65. 患者,女性,宫内妊娠39周。产程进展顺利,现宫口开全,下列是第二产程的首要护理目标的是

- A. 每5~6分钟听胎心一次
- B. 消毒外阴
- C. 做好接生准备
- D. 指导产妇正确使用腹压
- E. 新生儿窒息复苏的准备工作

66. 患者,女性,28岁。宫内妊娠39周,G1P0,骨盆外测量:髂棘间径21 cm,髂嵴间径23 cm,骶耻外径16 cm,坐骨结节间径7 cm,正确的诊断为

- A.漏斗骨盆
- B.扁平骨盆
- C.正常骨盆
- D.横径狭小骨盆
- E.均小骨盆

67.患者,女性,30岁。发现血压高3年,发热伴咽喉痛3天,肉眼血尿1天,体检:血压20/14 kPa(150/105 mmHg),咽稍红,扁桃体肿大,双下肢无水肿,查尿蛋白(+++),红细胞满视野,尿比重1.027,无高血压家族史。最可能的诊断是

- A.急性肾小球肾炎
- B.急进性肾小球肾炎
- C.肾病综合征
- D.慢性肾小球肾炎
- E.隐匿性肾小球肾炎

68.患者,女性,38岁。血红蛋白40 g/L,诊断为缺铁性贫血,已给予口服铁剂治疗2天,因胃部不适不能耐受口服铁剂,改为右旋糖酐铁肌内注射,护理不正确的是

- A.宜深层肌内注射
- B.不要在皮肤暴露处注射
- C.抽取药液后,要更换针头注射
- D.首次剂量为100 mg/d
- E.采用Z字法注射,以免药液溢出

69.患者,男性,40岁。左小腿皮肤鲜红,烧灼样疼痛,全身寒战,发热,初步考虑是

- A.急性蜂窝织炎
- B.丹毒
- C.疖
- D.疔
- E.气性坏疽

70.患者,女性,25岁。宫内妊娠12周,需做产前检查,下列检查不正确的是

- A.腹部B超检查
- B.测体重
- C.骨盆外测量
- D.测血压

E.CT
(71~72题共用题干)

患者,女性,26岁。足月分娩后3个月,阴道出血3天,头痛1天,抽搐1次,脑CT显示转移灶,血和脑脊液 β -hCG值比例 $<20:1$ 。

71.本病例最可能的诊断是

- A.产后出血
- B.侵蚀性葡萄胎
- C.绒毛膜癌
- D.癫痫
- E.产后子痫

72.该病确诊后处理方法应首选

- A.切除子宫
- B.化疗
- C.放疗
- D.止血
- E.切除转移病灶

(73~74题共用题干)

患儿,男,孕32周早产。生后第2天出现反应差,哭声弱,吸吮无力,查体:体温 34°C ,双下肢臀部皮肤水肿。

73.该患儿首优的护理问题是

- A.体温过低
- B.营养失调:低于机体需要量
- C.有感染的危险
- D.皮肤完整性受损
- E.潜在并发症:DIC

74.为该患儿实施的主要的护理措施是

- A.逐渐复温
- B.合理喂养
- C.预防感染
- D.减轻皮肤水肿
- E.备齐抢救药物

(75~76题共用题干)

患者,女性,58岁。高血压病1年,2小时前发现血压急剧升高,剧烈头痛、呕吐、大汗,医生确诊为高血压危象,给予降压药硝普钠治疗。

75.关于药物护理不正确的是
A.应避免光输液
B.根据血压水平调节速度
C.严密监测血压,1~2小时测血压一次
D.严密监测血压,15~30分钟测血压一次

E.药物要现配现用

76.若患者发生烦躁不安时,应该采取的护理措施是

- A.尽早协助患者外出检查
- B.等患者平稳时再测血压
- C.应用脱水剂速度宜慢
- D.有人陪伴,避免受伤
- E.应用硝酸甘油制剂速度宜快

(77~78题共用题干)

患者,男性,25岁。发热、咽痛2周后,尿蛋白(++),红细胞15~20个/HP,血Cr 180 μmol/L,血清C₃降低,肾活检符合急性肾小球肾炎。

77.血清C₃可能恢复正常的时间为

- A.发病2周内
- B.发病4周内
- C.发病6周内
- D.发病8周内
- E.发病10周内

78.本病治疗原则应除外

- A.对症治疗
- B.休息
- C.不用细胞毒药物
- D.可用糖皮质激素治疗
- E.急性肾衰竭可透析

(79~81题共用题干)

患者,男性,26岁。全身皮肤散在瘀斑,口腔黏膜大片的血泡急诊入院,入院查体:神志清,胸骨压叩痛(+),急查血常规:血小板为 $7 \times 10^9/L$,白细胞为 $11 \times 10^9/L$,外周血出现幼稚细胞,凝血检查不正常。

79.从现在的临床特点提示本患者最可能的诊断是

- A.急性白血病
- B.慢性白血病
- C.急性型ITP
- D.慢性型ITP
- E.再生障碍性贫血

80.护士对患者评估后认为目前最可能发生的并发症是

- A.内脏出血
- B.脑出血
- C.肺部感染
- D.尿酸性肾病
- E.肝功能的损害

81.目前采取的护理措施不妥的是

A.嘱患者绝对卧床休息,协助做好日常生活护理

B.注意保持大便通畅

C.避免头部震荡、剧烈咳嗽

D.注意观察有无头痛、喷射性呕吐、精神烦躁不安等症状

E.嘱患者活动可以不受限制

(82~84题共用题干)

患者,男性,58岁。有长期饮酒史40年,10年前开始出现中上腹部疼痛,并逐渐加重,向两侧腰背部放射,伴有饱胀,食欲不振,大便次数增多、内含脂肪滴。体格检查:体温37℃,腹平软,左上腹轻压痛,无包块。血白细胞数 $9.8 \times 10^9/L$,中性粒细胞68%,血糖10.2 mmol/L。

82.该患者最可能的诊断是

- A.胃溃疡
- B.慢性肠炎
- C.糖尿病
- D.慢性胰腺炎
- E.急性胰腺炎

83.该患者最可能的发病诱因是

- A.酒精中毒
- B.胆石症
- C.肠道感染
- D.遗传因素

E.精神因素

84.该患者首先要做的健康教育是

- A.情绪放松
- B.控制肠道感染
- C.戒酒
- D.消炎利胆
- E.积极锻炼

(85~86 题共用题干)

患者,女性,46岁。入院前1个月发热、咽痛,热退4天后感乏力、恶心、呕吐、少尿,体检:血压168/100 mmHg,贫血貌,双下肢水肿,呼吸深长,心脏临界大,实验室检查:血红蛋白50 g/L,尿蛋白(++),血尿素氮41 mmol/L,肌酐1002 μmol/L,血磷3.2 mmol/L,血钾6.0 mmol/L,血钠122 mmol/L,血氯89 mmol/L,血清白蛋白28 g/L,动脉血气pH 7.18。

85.最可能的诊断是

- A.急进性肾小球肾炎
- B.急性肾衰竭,少尿期
- C.恶性高血压
- D.慢性肾衰竭晚期
- E.链球菌感染后肾小球肾炎(重型)

86.支持该患者诊断最主要的临床表现是

- A.高血压
- B.贫血
- C.少尿
- D.双下肢水肿
- E.恶心、呕吐

(87~88 题共用题干)

患者,男性,35岁。主因“急性中毒6小时”急诊入院,患者早上7点因与家人生气回到卧室休息,当午饭时叫其吃饭发现呼之不应,闻及蒜臭味,即送医院,查体:T 36.5℃,P 100次/分,R 18次/分,BP 110/70 mmHg,瞳孔直径约0.1 cm,对光反应迟钝,皮肤潮湿,中度昏迷,多汗、流涎,轻度呼吸困难,意识障碍。立即洗胃、输液,应用解毒剂等抢救措施。

87.此患者最可能的临床诊断是

- A.一氧化碳中毒
- B.安眠药中毒
- C.有机磷中毒
- D.急性酒精中毒
- E.砷化物中毒

88.应用特效解毒剂阿托品应

- A.早期、足量、反复给药
- B.早期、少量、反复给药
- C.早期、足量、间断给药
- D.早期、少量、间断给药
- E.定期、少量、间断给药

(89~92 题共用题干)

患者,男性,65岁。有高血压病史6年,情绪激动后突然头痛,呕吐,右侧肢体偏瘫,失语,伴有大小便失禁,当时测血压为190/120 mmHg。

89.患者可能的诊断是

- A.脑梗死
- B.短暂性脑缺血发作
- C.急性感染性多发性神经根炎
- D.重症肌无力
- E.脑出血

90.为明确诊断,建议患者做的最佳检查是

- A.腰椎穿刺脑脊液检查
- B.肌电图
- C.头颅CT
- D.头颅X线摄片
- E.脑电图

91.常见引起本病的诱因有

- A.腹泻
- B.血压骤然升高
- C.感冒
- D.疼痛
- E.营养失调

92.如果该患者意识障碍加重、呕吐频繁、血压升高、心率减慢,应该给与下列哪种治疗

- A. 静滴硝普钠
- B. 静滴硝酸甘油
- C. 口服阿托品
- D. 静滴氨茶碱
- E. 静滴 20% 甘露醇

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(93~95 题共用备选答案)

- A. 卡介苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 脊髓灰质炎疫苗
- D. 百白破混合制剂
- E. 麻疹疫苗

93. 2 个月小儿应接种

94. 8 个月小儿应接种

95. 6 个月小儿应接种

(96~97 题共用备选答案)

- A. 安静时无症状,活动后出现吸气性喉鸣,呼吸困难
- B. 肺部呼吸音几乎消失,仅有气管传导音
- C. 嗜睡

D. 安静时可出现吸气性呼吸困难,心率 120 次/分

E. 烦躁不安,发绀

96. I 度喉梗阻

97. IV 度喉梗阻

(98~100 题共用备选答案)

A. 产后 7 天内

B. 产后 14 天后

C. 产后 7~14 天

D. 产后 3~7 天

E. 产后 7~10 天

98. 成熟乳是指

99. 初乳是指

100. 过渡乳是指



实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这这母所属的方框涂黑。

1. 林某, COPD 入院, 医嘱: 血气分析 qd, 下列有关标本采集过程中的说法不恰当的是
- 常规碘酒、乙醇消毒皮肤
 - 注射器内加入一定量枸橼酸钠抗凝
 - 穿刺后, 无菌纱布加压迫止血 5~10 min
 - 垂直或与动脉走向呈 40°角进针
 - 标本采集后注意隔绝空气送检
2. 王某, 肠梗阻, 在急诊观察室留观, 护士的护理工作不包括
- 预检分诊
 - 入室登记
 - 处理医嘱
 - 建立病历
 - 观察病情
3. 下列不宜行大量不保留灌肠的患者是
- 高热
 - 急腹症
 - 腹部手术前
 - 习惯性便秘
 - 结肠镜检查前
4. 下列输液速度宜快的患者是
- 心衰抢救的患者
 - 严重脱水的患者
 - 静脉补钾的患者
 - 输入升压药物的患者
 - 静脉补充高渗液体的患者
5. 下列可使用热敷的患者是
- 牙痛的患者
 - 静脉炎的患者
 - 脑水肿的患者
 - 胃出血的患者
 - 踝关节扭伤早期的患者
6. 某病室, 长 6 米, 宽 3.5 米, 病床要平行摆放, 该病房摆放的病床不可超过
- 2 张
 - 1 张
 - 3 张
 - 4 张
 - 5 张
7. 发生空气栓塞时, 应防止空气阻塞
- 主动脉入口
 - 肺静脉入口
 - 肺动脉入口
 - 腹主动脉入口
 - 上腔静脉入口
8. 下列有关脉搏测量方法的描述不恰当的选项是
- 诊脉时, 如有异常, 再重复测 1、2 次, 以求准确
 - 护士用不指、中指和无名指的指端按在动脉上, 计数 1 分钟脉率
 - 当脉搏细弱数不清时, 可用听诊器听心尖搏动, 数 1 分钟心率代替诊脉
 - 如患者心率和脉率不一致时护士应先测心率, 再测脉率, 各测 1 分钟
 - 诊脉时不可用拇指, 因拇指小动脉搏动易与患者脉搏相混淆
9. 给患者插胃管时, 胃管插入长度相当于患者
- 眉心至胸骨柄的长度
 - 眉心至胸骨剑突的长度
 - 前发际至胸骨剑突的长度
 - 前发际至胸骨柄的长度
 - 鼻尖至胸骨剑突的长度
10. 超声波雾化吸入后, 不需消毒的物品是
- 螺纹管

- B.雾化罐
C.口含嘴
D.水槽
E.面罩
- 11.林先生在输液过程中由于输液过快,短时间内输入大量液体引起急性肺水肿,以下有利于减轻肺内液体渗出的措施是
- A.加压给氧
B.停止输液
C.30%乙醇湿化给氧
D.头低脚高位
E.给予扩血管药物
- 12.下列关于煮沸消毒灭菌法的说法中,不恰当的是
- A.物品的盖子或轴节应该打开
B.物品应全部浸没在水中
C.煮沸法不能用于消毒橡胶类物品,以免高温使其变形
D.玻璃类物品用纱布包好
E.大小相同的物品不能重叠放入
- 13.处于气温较低环境时,人体散热量占总散热量比例最大的散热方式是
- A.辐射
B.对流
C.传导
D.蒸发
E.寒战
- 14.抢救链霉素过敏反应时,为了减轻链霉素的毒性可以静脉注射
- A.扑尔敏
B.氯丙嗪
C.乳酸钙
D.氯化钙
E.异丙肾上腺素
- 15.尿常规检查的目的不包括
- A.测定尿比重
B.观察尿液颜色
C.尿糖定量
D.尿蛋白定性
E.检查尿中是否有管型
- 16.王某,因脑血栓需长期卧床,为了防止患者出现肌肉挛缩,应采取的护理措施是
- A.定时更换体位
B.温水拭浴
C.局部热敷
D.支被架防止局部受压
E.肢体被动运动
- 17.在自然光线下,瞳孔直径约为
- A.0.5~1 mm
B.1~1.5 mm
C.2~2.5 mm
D.1.5~2 mm
E.2.5~4 mm
- 18.下列不符合无痛注射原则的一项是
- A.患者侧卧位时上腿伸直
B.进针快、拔针快
C.注射刺激性强的药物时,进针要深
D.推注药物的速度宜慢
E.多种药物同时注射时,先注射刺激性强的药物再注射无刺激性的药物
- 19.在体表触摸颈动脉搏动的位置是
- A.喉结下1~2 cm处
B.喉结上1~2 cm处
C.喉结旁开1~2 cm处
D.喉结上3~4 cm处
E.喉结旁开3~4 cm处
- 20.可在口腔部位测量体温的患者是
- A.呼吸困难者
B.腹泻患儿
C.昏迷者
D.痔疮术后患者
E.精神病患者
- 21.全麻术后未清醒的患者采用去枕仰卧位的目的是
- A.防止颅内压降低
B.有利于静脉回流
C.防止呕吐物流入气管
D.减轻伤口疼痛

- E.减少局部出血
- 22.下列不属于超声雾化吸入法的目的的是
- 解除支气管痉挛
 - 减轻呼吸道的炎症
 - 胸部手术后止痛
 - 镇咳、祛痰
 - 湿化呼吸道
- 23.头皮静脉的特点是
- 外观呈浅红色
 - 管壁薄易被压瘪
 - 回血时呈冲击状
 - 易滑动
 - 推药时阻力大
- 24.秦先生,高血压病,近期血压波动较大,为该患者测量血压时应做到
- 定血压计、定听诊器、定部位、定时间
 - 定听诊器、定部位、定护士、定时间
 - 定护士、定血压计、定听诊器、定体位
 - 定听诊器、定部位、定体位、定时间
 - 定血压计、定部位、定时间、定体位
- 25.采集便标本查寄生虫虫卵时应
- 取中段大便
 - 取全部粪便
 - 用竹签取少量异常粪便
 - 取不同部位的异常粪便 10 g 左右
 - 置于加温便盆内送检
- 26.通过分散患者的注意力达到解除疼痛并增加患者的自我控制能力目的的方法,被称为
- 皮肤刺激
 - 心理治疗
 - 运动治疗
 - 松弛术
 - 控制术
- 27.护士巡视病房时,发现破伤风患者殷某,角弓反张,四肢抽搐,牙关紧闭,应立即采取的护理措施是
- 通知医生配合抢救
 - 纱布包裹压舌板放于上下臼齿间
 - 给予氧气吸入
 - 口对口人工呼吸
 - 注射破伤风抗毒素
- 28.杨某,在加压输液时由于未及时更换液体发生空气栓塞,此时患者应取的体位是
- 左侧卧位,头高脚低
 - 右侧卧位,头高脚低
 - 端坐位,双腿下垂
 - 左侧卧位,头低脚高
 - 右侧卧位,头低脚高
- 29.心肺疾病引起的呼吸困难采用半坐卧位的原因是
- 使膈肌位置下降,胸腔容积扩大,使呼吸困难得到改善
 - 可以使渗出液流入盆腔
 - 有利于逐渐向站立过渡
 - 方便医生检查病情
 - 有利于气道通畅,改善缺氧症状
- 30.石膏固定病人预防骨筋膜室综合征,应注意
- 注意观察
 - 石膏包扎不要过紧,密切观察,及时发现,迅速减压
 - 保持石膏清洁
 - 禁止搬动
 - 等长肌肉收缩
- 31.ROM 练习指的是
- 关节活动力量练习
 - 关节活动范围练习
 - 关节活动角度练习
 - 关节活动灵敏度练习
 - 关节活动强度练习
- 32.盆底肌锻炼适用于
- 尿潴留病人
 - 尿失禁病人
 - 肠胀气病人
 - 腹泻病人
 - 盆腔炎病人

33. 清洁灌肠的主要目的是
- A. 解除腹部手术后的胀气
 - B. 术前肠道准备
 - C. 为保胎孕妇解除便秘
 - D. 治疗肠道感染
 - E. 为高热病人降温
34. 配制过氧化乙酸消毒液时错误的是
- A. 现用现配
 - B. 配药容器最好用塑料、玻璃制品以防腐蚀
 - C. 配制中可将原液直接倒入水中
 - D. 配制时要注意个人防护
 - E. 配制时忌与碱或有机物混合
35. 使用冰帽或冰槽的患者, 应注意监测患者
- A. 血压的变化, 发现血压异常立即停止使用
 - B. 注意患者瞳孔的变化, 发现瞳孔异常说明出现并发症立即停止使用
 - C. 监测肛温在 33℃ 左右, 不低于 30℃, 以防止心室纤颤等并发症出现
 - D. 注意监测血氧分压和血氧饱和度的变化
 - E. 注意监测呼吸的变化, 发现异常呼吸立即停止使用
36. 使用烤灯表明剂量合适的情况是
- A. 皮肤疼痛
 - B. 出现水疱
 - C. 出现红斑
 - D. 出现头晕
 - E. 出现过热
37. 巴比妥类(安眠药)药物中毒时, 常采用的导泻剂是
- A. 硫酸镁
 - B. 硫酸钠
 - C. 高锰酸钾
 - D. 碳酸氢钠
 - E. 油性泻药
38. 安定中毒后使用硫酸钠导泻的机

制是

- A. 在肠道内形成高渗透压, 阻止肠道水分和残存药物的吸收
- B. 促进肠蠕动
- C. 在肠管内壁形成保护屏障, 减少吸收
- D. 与毒物发生化学反应, 降低毒性
- E. 与毒物发生竞争性抑制作用

39. 血友病患者, 欲行静脉输血治疗, 其适用的血液制品种类为

- A. 库存血
- B. 新鲜血浆
- C. 保存血浆
- D. 冰冻血浆
- E. 干燥血浆

40. 独立性护理措施是指

- A. 源于护士独立提出的措施
- B. 源于医嘱的措施
- C. 源于病人意愿的措施
- D. 源于家属建议的措施
- E. 融入其他学科专家意见的措施

41. 尿液比重的正常波动范围

- A. 1.010~1.020
- B. 1.015~1.025
- C. 1.020~1.030
- D. 1.025~1.035
- E. 1.030~1.040

42. 对排便异常的叙述正确的是

- A. 胆道梗阻的患者, 粪便呈暗黑色
- B. 肠套叠的患者可有果酱样便
- C. 痔疮患者排暗红色便
- D. 上消化道出血患者粪便表面鲜红
- E. 阿米巴痢疾患者排白色“米泔水”样便

样便

43. 内源性医院感染的原因是

- A. 患者自身免疫力增强, 对本身固有的微生物感受性降低, 正常菌群发生易位
- B. 患者自身免疫力降低, 对本身固有的微生物感受性增加, 正常菌群发生易位
- C. 患者自身免疫力降低, 对本身固有的

微生物感受性降低,正常菌群发生易位

D.患者自身免疫力增强,对本身固有的微生物感受性增强,正常菌群发生易位

E.患者自身免疫力增强,对条件致病菌感受性降低,正常菌群发生易位

44.传染病房除实行严格终末消毒外,更主要是进行

A.预防性消毒

B.随时消毒

C.终末消毒

D.通风换气

E.清洁消毒

45.急性肺水肿时结扎肢体的止血带放松间隔时间宜为

A.3~5分钟

B.5~10分钟

C.10~15分钟

D.15~30分钟

E.30~60分钟

46.足底部禁忌用冷的主要原因是

A.以免加重血液循环障碍,导致局部组织缺血缺氧而继发坏死

B.以免出现局部荨麻疹

C.以免引起足部疼痛

D.以免引起肌肉痉挛

E.以防反射性末梢血管收缩影响散热或引起一过性冠状动脉收缩

47.温水擦浴或乙醇擦浴的目的

A.头部降温,预防脑水肿

B.全身用冷,为高热病人降温

C.乙醇是挥发性液体,擦浴时在皮肤上迅速蒸发,吸收和带走机体大量热量

D.乙醇具有刺激皮肤血管扩张的作用,因而散热能力较强

E.达到降温、止血、消炎、止痛目的

48.以下中毒可直接导致心脏骤停的是

A.一氧化碳中毒

B.灭鼠药中毒

C.毒蛇中毒

D.阿托品中毒

E.洋地黄中毒

49.氧中毒的特点

A.肺实质的改变

B.肺间质改变

C.肺纤维化改变

D.肺间质水肿

E.肺泡破裂

50.王某,男性,65岁。肺炎,T 39.8℃,P 102次/分,R 28次/分,咳嗽,痰不易咯出,颜面潮红。其中一项护理诊断为体温过高,主要诊断依据是

A.体温 39.8℃,高于正常范围

B.皮肤发红,触之有热感

C.痰液不易排出

D.呼吸、心跳均加快

E.不能出汗

51.王某,男性,65岁。因肺心病收住院治疗,护士巡视病房时,发现患者口唇发绀,并伴有明显三凹征,血气分析结果显示:PaO₂ 4.6 kPa,SaO₂ 50%。根据患者症状及血气分析结果,判断其缺氧程度为

A.轻度

B.极轻度

C.中度

D.重度

E.过重度

52.刘某,女性,72岁。因脑血管意外致左侧肢体偏瘫,在患侧肢体使用热水袋保暖时水温不能过高的原因是

A.血管反应敏感

B.局部皮肤对热敏感

C.局部血液循环不良

D.局部皮肤感觉迟钝或麻痹

E.热刺激可加重原发病

53.齐先生,男性,58岁。因肝功能不全收入院。护士在为其做特殊口腔护理时发现患者出现肝臭味,提示不包括

A.口腔清洁不彻底

- B.患者出现消化不良
C.肝功能逐渐好转
D.肝昏迷前兆
E.病情无变化
- 54.刘女士,女性,65岁。在下蹲或打喷嚏时,会出现不由自主排尿的症状,其恰当的护理诊断的书写形式是
- A.功能性尿失禁:与骨盆支持性结构无力有关
B.反射性尿失禁:与膀胱收缩有关
C.完全性尿失禁:与神经传导功能减退有关
D.功能性尿失禁:与膀胱过度充盈有关
E.急迫性尿失禁:与膀胱痉挛有关
- 55.刘女士,发热4天,体温40℃,伴神志不清,反复抽搐,瞳孔对光反射迟钝,考虑乙型脑炎,应施行
- A.呼吸道隔离
B.接触性隔离
C.昆虫隔离
D.保护性隔离
E.消化道隔离
- 56.卢女士,女性,48岁。诊断为支气管哮喘,一日出现呼吸困难,下列描述恰当的是
- A.张口呼吸、口唇发绀、吸气费力
B.胸闷、烦躁、喜平卧
C.胸闷、口唇发绀、呼气费力
D.呼吸频率快而表浅、吸气费力
E.三凹征、吸气和呼气均感费力
- 57.患者,男性,21岁。在人际交往中总因为自以为是而遭遇挫折,根据弗洛伊德的性心理发展理论,你判断他的问题可能源自于
- A.口欲期
B.肛门期
C.性蕾期
D.潜伏期
E.生殖期
- 58.患者,男性,58岁。肠胀气,遵医嘱行肛管排气,不正确的操作是
- A.肛管插入直肠15~18cm
B.与肛管相连的橡胶管插入水瓶中
C.在病人腹部做向心按摩
D.病人取左侧卧位
E.保留肛管1小时以上
- 59.患者,女性,30岁。血FT₃为8.3 μmol/L,面容惊愕,眼裂增大眼球凸出,目光闪烁,兴奋、烦躁,该患者呈现的面容为
- A.贫血面容
B.慢性病容
C.甲亢面容
D.病危面容
E.满月面容
- 60.患者,男性,32岁。确诊为再生障碍性贫血,欲行静脉输血治疗,已知其为“O”型血,则其血清中的抗体应为
- A.抗B
B.抗A
C.无
D.抗A,抗B
E.抗D
- 61.患者,男性,65岁。患“高血压”住在某院高干病区,充满攻击性鄙视周边的人与事,被称为“坦克型老人”。根据艾瑞克森心理社会发展学说,他面临的危机属于
- A.完善→失望
B.亲密→孤独
C.自我认同→角色紊乱
D.相信→不相信
E.自动→内疚
- 62.患者,男性,32岁。某项目总负责人,突发急性心肌缺血收住心内科病室,因担心到期的工程图不能如期上报而违反医嘱不配合治疗,究其原因
- A.生理需要未被满足
B.安全需要未被满足
C.爱与归属的需要未被满足

- D.自尊的需要未被满足
 - E.自我实现的需要未被满足
- (63~66 题共用题干)

患者,王某,因**服毒昏迷不醒**,被送入急诊室抢救。其家属不能准确地说出毒物的名称及性质,观察患者**双侧瞳孔缩小**。

63.根据患者**瞳孔变化**初步判断患者可能为何种毒物中毒

- A.碱性物中毒
- B.酸性物中毒
- C.有机磷、吗啡类中毒
- D.颠茄类中毒
- E.酒精中毒

64.洗胃时胃管插入的长度是

- A.30~40 cm
- B.35~45 cm
- C.40~50 cm
- D.45~55 cm
- E.50~60 cm

65.在**不知毒物名称和性质**的情况下护士的**正确处理**方法是

- A.请家属立即查清毒物名称后洗胃
- B.抽出胃内容物送检,再用温水洗胃
- C.用生理盐水清洁灌肠,减少毒物吸收
- D.鼻饲牛奶或蛋清水,以保护胃黏膜
- E.禁忌洗胃,待清醒后用催吐法排出毒物

66.有一位**药物中毒**,病情较重的患者,在**不知毒物名称和性质**的情况下,护士给患者采取的**正确体位**是

- A.坐位
- B.半坐位
- C.去枕右侧卧位
- D.左侧卧位
- E.平卧位,头偏向一侧

(67~69 题共用题干)

王女士,75岁。**双下肢瘫痪卧床一年**。两天前**骶尾部出现 3 cm×4 cm 的红色斑**,局部**麻木疼痛**,每2小时翻身1次无缓解。

67.患者**局部**出现了什么情况

- A.烫伤
- B.炎症
- C.褥疮
- D.化学刺激
- E.挫伤

68.其**损伤程度**属于

- A.重度感染
- B.轻度感染
- C.淤血红润期
- D.炎性浸润期
- E.浅度溃疡期

69.属于哪方面**功能障碍**

- A.皮肤系统
- B.骨骼、关节和肌肉组织
- C.新陈代谢
- D.泌尿系统
- E.心血管系统

(70~71 题共用题干)

患者,男性,68岁。慢性阻塞性肺疾病急性发作入院治疗,给予吸氧、抗感染、对症支持疗法,今晨**输液过程中自行调快滴数**,30分钟后**突然出现胸闷、呼吸困难**,继之**咳嗽、咯粉红色泡沫样痰**,听诊两肺**满布湿啰音**,**心率快且律不齐**。

70.该患者**可能发生**

- A.哮喘急性发作
- B.过敏反应
- C.急性肺水肿
- D.空气栓塞
- E.气胸

71.此时患者宜采取的**体位**是

- A.半坐卧位
- B.左侧头低足高卧位
- C.右侧头低足高卧位
- D.端坐位,双腿下垂
- E.仰卧中凹位

(72~74 题共用题干)

患者,男性,38岁。因车祸受伤入院,患

者入院后神志不清,各种反射消失,单侧瞳孔扩大、固定,手术回病房后,发现患者呼吸道分泌物较多,遵医嘱给予吸痰治疗。

72.从患者的瞳孔情况可判断患者出现

- A.车祸同时伴有有机磷中毒
- B.颅内压增高
- C.散大瞳孔侧颅内病变所致小脑幕裂孔疝的发生
- D.颅脑损伤
- E.虹膜粘连

73.为患者吸痰时,电动吸引器的负压应调节在

- A. -100~-200 mmHg
- B. -200~-300 mmHg
- C. -300~-400 mmHg
- D. -400~-500 mmHg
- E. 根据情况随意调节

74.为患者吸痰时,每次吸痰不应超过

- A.5 秒
- B.15 秒
- C.10 秒
- D.20 秒
- E.25 秒

(75~76 题共用题干)

患者,男性,36 岁。被重物击伤头部约 30 分钟后送到医院,家属诉:患者受伤后呕吐三次,呼唤其不能应答。

75.该患者意识障碍,呕吐数次,有可能发生的危险是

- A.坠床
- B.呼吸困难甚至窒息
- C.皮肤受损
- D.营养失调
- E.焦虑

76.护理人员应特别注意做好的工作是

- A.及时清理呼吸道呕吐物,保持呼吸道通畅
- B.给予约束
- C.按摩骨突出部位

D.安慰患者

E.给予补充营养和水分

(77~78 题共用题干)

患者,女性,23 岁。因急性心肌炎入院,护士进行评估收集资料。

77.属于主观资料的是

- A.气促、感觉心慌、心率快
- B.心悸、疲乏、周身不适
- C.心动过速、气促、发热
- D.感觉心慌、发热、疲乏
- E.心动过速、发热

78.下列属于客观资料的是

- A.心悸、疲乏
- B.患者自觉周身不适
- C.体温 37.3 °C
- D.自觉心慌
- E.担心病治不好

(79~80 题共用题干)

患者,女性,65 岁。生活习惯不良,有习惯性便秘,作健康教育的内容有

79.以下护理方法错误的是

- A.腹部环形按摩
- B.不轻易口服缓泻药物
- C.餐前多喝冷饮料
- D.多食水果
- E.每天液体摄入不少于 2 000 mL

80.遵医嘱给予开塞露灌肠,排便前应保留的时间是

- A.1~2 分钟
- B.5~10 分钟
- C.3~5 分钟
- D.15~20 分钟
- E.10~15 分钟

(81~82 题共用题干)

患儿,女,10 个月。主因发热 2 天,咳嗽、喘憋 1 天入院,入院诊断“支气管肺炎”,给予静脉输液治疗。

81.该患儿适宜的穿刺静脉为

- A.颞浅静脉

- B.手背静脉
- C.足背静脉
- D.肘正中静脉
- E.大隐静脉

82.若穿刺时不慎误入动脉,其特征为

- A.触之无搏动
- B.不易滑动
- C.向心方向血流
- D.注药时局部血管树状突起
- E.血液色暗红

(83~84 题共用题干)

患者,男性,47岁。诊断“乙型脑炎”,
查体:神志处于深度昏迷状态。

83.该患者应该采取何种卧位

- A.低足高卧位
- B.头高足低卧位
- C.仰卧位
- D.平卧位头偏向一侧
- E.俯卧位

84.护理工作需特别注意的是

- A.准确执行医嘱
- B.按时服药
- C.做好基础护理
- D.保暖
- E.保持呼吸道通畅

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(85~87 题共用备选答案)

- A.肺结核
- B.肾移植
- C.克雷式骨折石膏固定后
- D.中风恢复期
- E.断肢再植

85.家庭病床的收治对象有

86.医院的收治对象有

87.传染病院的收治对象有

(88~89 题共用备选答案)

- A.备用床
- B.暂空床
- C.备用床加橡皮中单
- D.麻醉床
- E.手术床

88.胃大部分切除术后需要准备

89.肺炎患者住院时需要准备

(90~91 题共用备选答案)

- A.增强新陈代谢和白细胞的吞噬功能
- B.降低细胞新陈代谢和微生物活力
- C.降低痛觉神经的兴奋性
- D.使神经末梢的敏感性降低
- E.增加毛细血管通透性减轻肿胀

90.热疗法减轻疼痛的机制是

91.冷疗法减轻疼痛的机制是

(92~94 题共用备选答案)

- A.钙
- B.铁
- C.碘
- D.锌
- E.磷

92.调节酸碱平衡的是

93.调节心脏、神经的传导和肌肉收缩的是

94.构成甲状腺素的重要成分是

(95~96 题共用备选答案)

- A.200~500 U/mL
- B.150 IU/mL
- C.2 500 U/mL
- D.0.25 mg/mL
- E.500μg/mL

95.破伤风抗毒素皮试液剂量为

96.青霉素皮试液的剂量为

(97~98 题共用备选答案)

- A.膝胸位
- B.蹲位

- C.截石位
D.右侧卧位
E.仰卧位
- 97.肛门手术的体位多为
- 98.直肠肛管疾病检查的常用体位是
(99~100 题共用备选答案)
- A.蛋清水、牛奶
- B.温开水或生理盐水
C.2%~4%碳酸氢钠
D.活性炭悬液
E.3%过氧化氢溶液
- 99.敌敌畏中毒时应用的洗胃药物是
- 100.酸性物、碱性物中毒时应用的洗胃
药物是



参考答案

基础知识

1.【答案】E

【解析】自发性气胸中的继发性气胸以继发于 COPD、肺结核为多。

2.【答案】E

【解析】考查学生对于风心病二尖瓣狭窄病理生理的掌握,正常成人的二尖瓣口面积为 $4.0\sim 6.0\text{ cm}^2$ 。

3.【答案】C

【解析】IgA 肾病可包括原发性肾小球疾病的各种临床表现,但几乎所有患者均有血尿。肉眼血尿有反复发作的特点。

4.【答案】C

【解析】腰椎穿刺术后应指导患者去枕平卧 $4\sim 6$ 小时,告知卧床期间不可抬高头部,可适当转动身体。

5.【答案】C

【解析】正常成年男性体内水含量约占体重的 60% ,其中 $2/3$ (占体重 40%)构成细胞内液, $1/3$ (占体重 20%)构成细胞外液,细胞外液又分为血浆和组织间液,其中血浆占体重的 5% ,组织间液占体重的 15% 。

6.【答案】C

【解析】急性肠套叠多见于 2 岁以内的儿童,以回肠末端套入结肠最多见。

7.【答案】C

【解析】局麻药中毒临床表现早期有精神症状,中期有恶心呕吐,视物模糊,颜面肌肉抽搐。

8.【答案】B

【解析】正常情况下,收缩压为 $80\sim 120\text{ mmHg}$,脉压为 $30\sim 40\text{ mmHg}$ 。当收缩压 $<90\text{ mmHg}$ 、脉压 $<20\text{ mmHg}$ 时认为存在

休克。

9.【答案】C

【解析】开放性气胸时,由于患侧胸膜腔与大气直接相通,导致纵隔位置随呼吸左右摆动,此现象称纵隔扑动。

10.【答案】D

【解析】术后早期出现恶心、呕吐的最常见原因为麻醉镇痛后的反应,待麻醉作用消失后自然消失。

11.【答案】B

【解析】肝脓肿常为多发性,以肝左外叶最多见,阿米巴性肝脓肿好发于肝右叶,尤以右肝顶部多见。

12.【答案】D

【解析】子宫峡部的上端因解剖上较狭窄,称为解剖学内口。

13.【答案】C

【解析】产后子宫创面未完全修复,为避免引起感染,应禁止性生活,6 周后生殖器官已恢复的情况下,可恢复性生活。

14.【答案】C

【解析】妊娠期孕妇总循环血量于妊娠第 6 周开始逐渐增加, $32\sim 34$ 周达到高峰。

15.【答案】C

【解析】出生后 24 小时内完成乙肝疫苗接种, $2\sim 3$ 天完成卡介苗的接种。

16.【答案】C

【解析】扁桃腺在小儿 $4\sim 10$ 岁时发育达高峰, $14\sim 15$ 岁后逐步退化,因此扁桃腺体常见于年长儿。

17.【答案】C

【解析】冬春季感染化脓性脑膜炎的主

要病原菌为肺炎链球菌;春秋感染化脓性脑膜炎的主要病原菌为脑膜炎双球菌和流感嗜血杆菌。

18.【答案】A

【解析】原发综合征胸片可呈典型“哑铃状”双极阴影。

19.【答案】C

【解析】6个月~6岁小儿血红蛋白低于110 g/L,6~14岁小儿低于120 g/L为诊断贫血标准。

20.【答案】C

【解析】成人24小时正常尿量为1 000~2 000 ml/d。

21.【答案】C

【解析】病毒性心肌炎各种病毒均可引起,以可引起肠道和呼吸道感染的病毒最常见。

22.【答案】C

【解析】急性肾小球肾炎几乎全部患者均有肾小球源性血尿。40%患者可有肉眼血尿,常为起病首发症状和患者就诊原因。

23.【答案】B

【解析】膀胱癌组织分型上皮性肿瘤占95%以上,其中多数为移行细胞癌。

24.【答案】C

【解析】高平面蛛网膜下腔阻滞,脊神经阻滞平面在胸2~胸4之间;中平面蛛网膜下腔阻滞脊神经阻滞平面在胸4~胸10之间;低平面蛛网膜下腔阻滞,脊神经阻滞平面在胸10以下。

25.【答案】B

【解析】肛裂是肛管皮肤的全层裂伤后形成的慢性溃疡,常发生在肛管的后正中线。

26.【答案】E

【解析】按照骨折的程度和形态分为不完全骨折和完全骨折。不完全骨折是指骨骼连续性没有完全中断,依骨折形态又分为裂缝骨折、青枝骨折等。

27.【答案】B

28.【答案】A

【解析】酸中毒时。血清 H^+ 浓度增高,进入细胞内,为保持电荷平衡,细胞内 K^+ 转移到细胞外,故血钾浓度变化趋向是升高。

29.【答案】B

【解析】阴道穹隆分为4部分,后穹隆较深,是腹腔的最低部位。

30.【答案】C

【解析】计算方法为末次月经第一日起,月份减3或加9,日期加7。

31.【答案】B

【解析】人体维生素D的主要来源是皮肤内7-脱氢胆固醇经紫外线照射生成。

32.【答案】D

【解析】病程<1个月为急性肺炎,病程1~3个月为迁延性肺炎,病程>3个月为慢性。

33.【答案】E

【解析】血红蛋白参考值:成人男性:120~160 g/L,成人女性:110~150 g/L,新生儿:170~200 g/L,血红蛋白生理性减少见于妊娠中、晚期孕妇及部分老人,病理性减少可由造血原料不足、造血功能障碍或红细胞丢失、破坏过多等原因引起。

34.【答案】C

35.【答案】C

【解析】本题考核了学生对痰液性状的观察,阿米巴肺脓肿的痰液性状为红褐色或巧克力色痰。

36.【答案】A

【解析】肝硬化门脉高压症患者晚期可有脾功能亢进,表现为全血细胞减少。

37.【答案】A

【解析】因为中性粒细胞的功能为吞噬异物尤其是细菌,是机体抵御入侵细菌的第一道防线,所以中性粒细胞减少易导致发热。

38.【答案】E

39.【答案】C

【解析】双侧瞳孔时大时小,变化不定,对光反射消失,伴眼球运动障碍(如眼球分离、同向凝视),常是脑干损伤的表现。

40.【答案】B

【解析】胆汁内的主要成分胆盐、磷脂酰胆碱、胆固醇,正常情况下这三种成分按一定比例组成,保持相对高的浓度而又呈溶解状态。

41.【答案】A

【解析】CVP 正常值是 $5 \sim 10 \text{ cmH}_2\text{O}$, $<5 \text{ cmH}_2\text{O}$ 提示血容量不足。

42.【答案】D

【解析】高分解代谢应激状态患者处于负氮平衡,需营养支持治疗,但当患者处于体液失调、出血、凝血功能障碍、休克时应优先处理,暂不宜营养疗法。

43.【答案】E

【解析】体外循环装置包括:①血泵取代心脏,具有泵血功能;②人工肺(氧合器)替代肺功能;③滤器滤过血液中的碎屑;④变温器降低和升高血液中的温度。

44.【答案】D

【解析】卵巢的内分泌功能是分泌女性激素。

45.【答案】C

【解析】由于新生儿中枢调节功能不全,呼吸肌发育不完善,呼吸主要依靠膈肌运动,以腹式呼吸为主。

46.【答案】C

【解析】前庭大腺炎的主要病原体为葡萄球菌、链球菌、大肠埃希菌、肠球菌奈瑟菌及沙眼衣原体等。

47.【答案】D

【解析】正常新生儿每日共需热量约 $418 \sim 502 \text{ kJ/kg}$ 。

48.【答案】C

【解析】猩红热的传染源以患者及带菌者为主,自发病前 24 小时至疾病高峰传

性最强。

49.【答案】A

【解析】肾病综合征时会出现高凝状态,易形成血栓。当出现肾静脉血栓时会突发腰痛、血尿、少尿。

50.【答案】E

【解析】本题考核了学生对痰液量的观察,肺脓肿患者的痰液静置后出现分层现象。

51.【答案】B

【解析】血栓形成的最常见原因是脑动脉粥样硬化,其次为脑动脉炎,少见的病因有结缔组织病。

52.【答案】D

【解析】发生嵌顿后,静脉回流受阻,导致疝内容物淤血和水肿;若嵌顿未能及时解除,可使动脉血流减少,最后导致完全阻断,发生血运障碍。

53.【答案】A

【解析】地西洋类药物属中枢神经系统抑制药,有镇静催眠作用;镇痛类有吗啡、哌替啶、芬太尼等;抗胆碱能类有阿托品、东莨菪碱等;抗组胺类有异丙嗪等。

54.【答案】B

【解析】开放性气胸时,纵隔扑动影响静脉回流,导致循环功能严重障碍。

55.【答案】E

【解析】产后 10 天,子宫降至盆腔内,腹部检查测不到子宫底。

56.【答案】D

【解析】通常术后 48 小时可恢复正常肠蠕动,一经排气,腹胀可减轻。

57.【答案】B

【解析】营养不良皮下脂肪减少的顺序依次是腹部、躯干、臀部、四肢,最后是面部。

58.【答案】D

【解析】2 岁以后的小儿动脉收缩压可用 $\text{年龄} \times 0.27 + 10.6 \text{ kPa}$ 。

59.【答案】D

【解析】结核杆菌冰冻1年半仍保持活力,经65℃30分钟或干热100℃20分钟可灭活。痰内结核杆菌用苯酚或漂白粉处理须经24小时才能被杀灭,而将痰吐在纸上直接焚烧就能灭菌。

60.【答案】C

【解析】血氨升高是肝性脑病的临床特征之一,氨代谢紊乱引起的氨中毒是肝性脑病十分重要的发病机制。

61.【答案】A

【解析】胚胎早期,肝、脾为机体的主要造血器官;胚胎后期至出生后,骨髓成为主要的造血器官,当机体需要时,已停止造血的肝、脾又可恢复造血功能,成为骨髓外造血的场所。

62.【答案】B

【解析】阑尾动脉是肠系膜上动脉所属回结肠动脉的分支,属无侧支的终末动脉,当血运障碍时易导致阑尾坏死。

63.【答案】B

【解析】胃排空时间因食物种类不同而不同;水为1.5~2小时,母乳为2~3小时,牛乳为3~4小时。

64.【答案】A

65.【答案】A

【解析】高血压危象时,出现血压急剧升高,以收缩压为主。出现头痛、心悸、视力模糊等症状。危象发作时交感神经活动。

66.【答案】A

【解析】小囟位于母体骨盆的左上方,提示为左枕前位,经静滴缩宫素,加强产力后,可考虑经阴道分娩。

67.【答案】B

【解析】吉兰-巴雷综合征多见于10岁以内小儿,临床上可见以急性、对称性、弛缓性肢体瘫痪为特征,病前可有病毒感染史。

68.【答案】B

【解析】病人摄入过多蛋白,可加重已经衰竭的肝脏负担,同时血氨的增高和蛋白质

代谢不全促进肝功能衰竭,诱发肝性脑病。

69.【答案】C

【解析】颈部的急性蜂窝织炎,可发生喉头水肿而压迫气管,引起呼吸困难,甚至窒息。

70.【答案】B

【解析】妊娠36周,子宫底在剑突下2横指,宫高应在32cm,结合本病例,考虑36周可能性大。

71.【答案】D

72.【答案】D

【解析】孕妇于妊娠18~20周时开始自觉胎动,结合子宫底高度为23cm,考虑为妊娠23~25周比较符合实际。

73.【答案】C

74.【答案】B

75.【答案】B

76.【答案】D

77.【答案】B

78.【答案】E

79.【答案】C

80.【答案】B

81.【答案】A

82.【答案】B

83.【答案】B

【解析】脑血栓形成患者一般在安静休息时发病,不少患者在睡眠中发生。脑出血患者和蛛网膜下腔出血患者多在活动及情绪激动时发病。

84.【答案】D

85.【答案】A

86.【答案】B

【解析】纤维黄色瘤好发于躯干,多起自外伤或搔痒后的小丘疹,肿块硬,边缘不清,呈深咖啡色;隆突性皮纤维肉瘤位于真皮层,突出体表,表面形似瘢痕疙瘩,好发于躯干,低度恶性,切除后易复发;带状纤维瘤腹壁肌修复性增生所成,无明显包膜,宜手术切除。

87.【答案】C

【解析】乳突型糜烂指糜烂面高低不平,呈乳突状突起。糜烂面积大于宫颈面积的2/3为重度糜烂。

88.【答案】A

【解析】单纯型糜烂表面平坦,糜烂面积占宫颈面积的1/3~2/3为中度糜烂。

89.【答案】A

90.【答案】C

91.【答案】C

92.【答案】C

93.【答案】B

94.【答案】A

【解析】肾乳头坏死是急性肾盂肾炎的严重并发症之一,常发生于肾盂肾炎伴有糖尿病或尿路梗阻。腹膜透析常见并发症是腹膜炎,但由于腹膜透析管路的改进,腹膜炎已大为减少。慢性肾衰竭患者血液透析,心血管功能不稳定,过度脱水、长期透析器

管路血液的丢失,可引起低血压。

95.【答案】A

96.【答案】C

97.【答案】B

【解析】腹股沟斜疝多见于青壮年男性,肿块多呈带蒂柄的梨形,可降至阴囊,如病人平卧休息或用手将肿块推送向腹腔回纳而消失。股疝多见于40岁以上的妇女,因股环较小,最易嵌顿,易引起疼痛,且不宜还纳。腹股沟直疝因疝囊颈宽大,压住内环仍可突出,常见于年老体弱者。

98.【答案】E

99.【答案】C

【解析】按世界卫生组织6个月~6岁小儿贫血的诊断标准是Hb<110 g/L。

100.【答案】B

【解析】按世界卫生组织6~14岁小儿贫血的诊断标准是Hb<120 g/L。



相关专业知识

1.【答案】D

2.【答案】B

【解析】上消化道出血要先补充血容量,防止重要器官衰竭。

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】E

6.【答案】B

【解析】碘剂可抑制甲状腺激素释放入血,减少甲状腺的血流量,减少腺体充血,使腺体缩小变硬。临床常用的碘剂是复方碘化钾,可单独用于甲亢术前准备,或与硫脲类药物合用。硫脲类药物可抑制甲状腺素的合成,但可使甲状腺肿大充血,手术时极易发生出血,增加手术困难和危险,因此不能单独用于甲亢术前准备。

7.【答案】A

8.【答案】A

9.【答案】D

10.【答案】C

11.【答案】C

【解析】苍白密螺旋体是引起梅毒发病的病原体,在体外干燥条件下不易生存,一般消毒剂及肥皂水均可杀灭。

12.【答案】C

13.【答案】D

【解析】法洛三联症病情轻重起决定性作用的病变是肺动脉狭窄。由于肺动脉狭窄,血液进入肺循环受阻,引起右心室代偿性肥厚,右心室压力增高超过左心室时,出现右向左分流而出现青紫;肺动脉狭窄使肺循环气体交换的血流减少加重青紫。

14.【答案】E

15.【答案】A

16.【答案】A

17.【答案】E

18.【答案】C

19.【答案】C

【解析】应禁止灌肠,以免肠穿孔。

20.【答案】B

【解析】化疗病人应避免出现便秘,防止因用力排便引起肠黏膜损伤和潜在性的颅内压升高发生脑出血。

21.【答案】E

【解析】急性心梗24小时内禁止使用洋地黄制剂,避免室性心律失常的发生。

22.【答案】B

23.【答案】A

【解析】急性期应给予低盐饮食(每天3g以下),肾功能正常者不需要限制蛋白质摄入。但氮质血症的时候应限制蛋白质摄入,并以优质蛋白为主。

24.【答案】C

25.【答案】E

26.【答案】B

27.【答案】A

28.【答案】B

【解析】高渗性缺水,体液丧失以水分为主,血清钠增高,输液治疗的首选液体是5%葡萄糖液,血清钠降低后再补充适量的等渗盐水。

29.【答案】A

【解析】羊水栓塞的最初阶段首先是纠正缺氧,解除肺动脉高压,防止心衰,抗过敏抗休克。

30.【答案】D

【解析】正常情况下摸不到卵巢。

31.【答案】E

32.【答案】E

33.【答案】D

34.【答案】E

【解析】随着年龄增长小儿呼吸肌逐渐

发育和膈肌下降,肋骨由水平逐渐倾斜,胸廓前后径和横径增大,出现胸腹式呼吸。

35.【答案】E

【解析】人体有 30% 的贮存铁,当体内铁缺乏时贮存铁可供应造血所需,多服用两个月铁是为了补充贮存铁,因此营养性缺铁性贫血,服用铁剂停药的时间应是血红蛋白量恢复正常后 2 个月。

36.【答案】B

37.【答案】B

38.【答案】B

【解析】脾脏肿大的程度分为三度,轻度肿大为深吸气时,脾下缘在左侧肋下不超过 3 cm,中度肿大为脾下缘在肋缘下 3 cm 至脐水平线,高度肿大为脾下缘超过脐水平线。

39.【答案】C

40.【答案】B

【解析】全血胆碱酯酶(CHE)活力测定是诊断中毒程度的重要指标,有助于有机磷中毒的诊断。

41.【答案】A

42.【答案】D

【解析】ITP 是血小板免疫性破坏引起的出血性疾病,与血管本身没关系,所以应除外。

43.【答案】A

【解析】梅毒一经确诊,其治疗原则是及时治疗,首选为青霉素,用药足量,疗程规则。

44.【答案】C

【解析】母乳含铁量与牛奶相似,但母乳中的铁吸收率高达 50%,牛奶中铁的吸收率仅为母乳的 1/5。

45.【答案】D

【解析】小儿强心苷中毒最常见的表现是心律失常,其次是胃肠道反应。

46.【答案】B

【解析】该患者有自觉症状,血压 160/110 mmHg,尿蛋白(++),为子痫前期,因

此病情 24~48 小时不缓解考虑终止妊娠。

47.【答案】A

【解析】因为患者符合慢支、肺气肿发展至肺心病的过程,所以考虑为肺心病右心衰竭。

48.【答案】C

【解析】临床上对病因不明或一时不能解除病因的颅内高压者,先采取限制液体入量,应用脱水、利尿剂和糖皮质激素、冬眠低温等治疗,以减轻脑水肿降低颅内压,暂时控制颅内高压,待病因诊断明确后再行其他如脑室引流、手术等治疗。

49.【答案】C

【解析】急诊 CT 检查,见右颞顶不规则阴影,可判断该患者出现了颅内血肿。

50.【答案】E

【解析】对高热惊厥的患儿应告知家长惊厥预防及急救措施。

51.【答案】E

【解析】对于贫血的患者应检查骨髓象。

52.【答案】C

【解析】丙硫氧嘧啶用于治疗成人甲状腺功能亢进,开始剂量一般为每天 300 mg,视病情轻重介于 150~400 mg,分次口服,一日最大量 600 mg。其作用机理是抑制甲状腺功能亢进。

53.【答案】D

【解析】注意缺陷多动障碍,在我国称为多动症,是儿童期常见的一类心理障碍,表现为与年龄和发育水平不相称的注意力不集中和注意时间短暂、活动过度和冲动,常伴有学习困难、品行障碍和适应不良。

54.【答案】A

【解析】肢体抬高试验是血栓闭塞性脉管炎的主要检查。

55.【答案】A

【解析】激素的副作用:①向心性肥胖、满月脸、水牛背、多毛、痤疮、高血压、糖尿病、高血脂、低血钾、骨质疏松。②诱发或加

重感染或使体内潜在病灶扩散。③诱发或加重胃、十二指肠溃疡。④可引起饮食增加、激动、失眠,个别人可诱发精神病,偶尔可诱发癫痫。⑤使眼压升高,诱发青光眼、白内障。

56.【答案】D

【解析】系统性红斑狼疮患者的血清中可以检查到多种自身抗体。①抗核抗体谱:有 ANA、抗 dsDNA 抗体、抗 ENA 抗体。抗 ENA 抗体又包括一组抗体,其中抗 Sm 抗体是诊断 SLE 的标记抗体之一,其特异度达 99%,但是敏感度仅有 25%,它不代表疾病活动性;②抗磷脂抗体;③抗组织细胞抗体;④其他,少数患者血清中可以出现类风湿因子和抗中性粒细胞胞浆抗体 P-ANCA。狼疮患者可以见到红细胞沉降率增快,提示病情控制不满意。红细胞花环形成提示红细胞膜上 C3b 受体的活性,与题目无关。

57.【答案】E

【解析】贫血、出血及发热为白血病常见症状。其中,发热最主要的原因是成熟粒细胞缺乏,其次是人体免疫力低下,导致感染。最多见致病菌为革兰阴性杆菌,如铜绿假单胞菌、肺炎杆菌、大肠杆菌等,还有金黄色葡萄球菌等革兰阳性球菌。

58.【答案】D

【解析】因为茶叶中有鞣酸,遇铁能形成缺铁性贫血。

59.【答案】A

【解析】类风湿关节炎是一个累及周围关节为主的多系统性的自身免疫病,其特征性的症状为对称性、多个周围性关节的慢性炎症病变,RF(+)和关节 X 线检查等都符合类风湿关节炎的诊断条件。

60.【答案】A

【解析】慢性肾炎患者伴有水肿、血压升高及大量蛋白质,饮食应注意限制水钠的摄入,应采取低盐饮食。

61.【答案】C

【解析】该患儿发生腹泻、中度脱水导致电解质大量丢失,应考虑低钙抽搐。

62.【答案】D

63.【答案】C

64.【答案】B

【解析】小脑幕切迹疝的临床表现:头痛剧烈,呕吐频繁;进行性意识障碍;病变侧瞳孔先暂时缩小,继之进行性增大(动眼神经麻痹);病变对侧面舌及肢体瘫痪(锥体束受压);晚期患者深昏迷,双瞳孔散大,光反应消失,去皮质强直发作,生命体征严重紊乱,并导致继发性枕骨大孔疝。发生枕骨大孔疝时,延髓直接受压,患者可迅速出现呼吸骤停,且较早出现生命体征紊乱,意识障碍出现较晚。

65.【答案】D

【解析】胸部正常叩诊音有清音、浊音、鼓音,异常叩诊音有过清音、浊音或实音、鼓音,其中浊音或实音见于肺炎、胸膜腔积液、肺部肿瘤病人。

66.【答案】D

【解析】轻度脱水,呕吐不严重,应选择 ORS 液,中、重度脱水选择静脉补液。

67.【答案】B

【解析】皮肤黏膜均有散在性小红点,不高出皮肤表面,直径约 1~2 mm,加压时不褪色,称之为出血点。

68.【答案】D

【解析】腹泻导致臂养不足,应及时补充葡萄糖补充能量。

69.【答案】C

【解析】百忧解主要不良反应是胃肠功能紊乱。

70.【答案】B

【解析】破伤风诊断:多有开放性创伤史(包括分娩或流产史、新生儿产伤及脐带处理不当),特别是伤道深而有异物者。潜伏期自 24 小时至 8 周或更长不等,一般为 1~2 周。

71.【答案】C

72.【答案】B

【解析】抬高患肢有利于淋巴回流。

73.【答案】D

【解析】可用清洁的温水冲洗皮损部位,避免使用碱性肥皂水。

74.【答案】D

75.【答案】A

【解析】锻炼应循序渐进,高蛋白、高维生素饮食,保持一定生活自理能力,但不要过度劳累。

76.【答案】E

【解析】溶栓治疗效果可根据冠状动脉造影直接判断,对直接诊断冠脉再通最有价值。

77.【答案】E

【解析】该患者为主动脉瓣狭窄,超声心动图检查是最有价值的检查方法。

78.【答案】C

【解析】口服铁剂易引起胃肠道反应,因此应在饭后服用。

79.【答案】E

【解析】对于肾病综合征患者蛋白摄入量应为正常入量的优质蛋白(富含必需氨基酸的动物蛋白),水肿者应给予低盐饮食。

80.【答案】A

81.【答案】B

【解析】乳腺癌根治手术备皮范围:前至对侧锁骨中线,后至腋后线,上过锁骨及上臂,下过脐部平行线。

82.【答案】D

【解析】铺床时护士身体靠近床边,上身保持直立,两脚间距离与肩同宽,两膝稍屈,两脚根据活动情况前后、左右分开,有助于扩大支持面,增加身体的稳定。操作时使用肘部力量,避免无效动作,减少走动次数。

83.【答案】B

【解析】乳腺癌患者术后应采取去枕仰卧位,待生命体征平稳后取半卧位。

84.【答案】E

【解析】链霉素的皮肤过敏反应主要是皮疹,可表现为斑丘疹、荨麻疹、红斑、麻疹样皮疹、猩红热样皮疹、湿疹样皮疹、紫癜及血管神经性水肿等皮肤表现,严重者可发生过敏性休克。

85.【答案】C

【解析】链霉素的急性毒性反应以麻木、头晕、耳聋等为多见,多在用药后10天内出现。慢性毒性反应为耳前庭系损害,主要表现为眩晕、头痛等;耳蜗系损害一般发生较迟,常在用药数月后或停药以后发生,其主要症状是耳鸣和耳聋。

86.【答案】D

【解析】急腹症四禁为:禁食水、禁止痛、禁热敷、禁灌肠。

87.【答案】D

【解析】根据题干信息患者规律上腹痛5年,患者发生了胃肠道穿孔性疾病。

88.【答案】A

【解析】用排除法,在病因不明情况下,禁止使用解痉止痛药物。

89.【答案】B

90.【答案】D

【解析】发生心室颤动时尽快采用非同步直流电除颤或电复律房室传导阻滞发展到第二度或第三度,伴血流动力学障碍者宜用人工心脏起搏器作临时的经静脉心内膜右心室起搏治疗,待传导阻滞消失后撤除。

91.【答案】C

92.【答案】A

【解析】髌关节脱位后患侧下肢可出现短缩、屈曲、内收、内旋畸形,臀部可触及股骨头。

93.【答案】E

【解析】肩关节脱位表现为肩部疼痛、肿胀、不能活动。三角肌塌陷,呈“方肩”畸形,原关节孟处空虚。

94.【答案】B

【解析】股骨干上 1/3 段骨折,由于受髂腰肌、臀中肌、臀小肌和外旋肌的作用,骨折的近端屈曲、外旋、外展移位。

95.【答案】D

【解析】肘关节脱位表现为肘部疼痛、肿胀、活动障碍,明显畸形,肘部弹性固定在半屈位,肘后空虚,可摸到凹陷、肘后三点关系失常。

96.【答案】A

97.【答案】E

【解析】儿茶酚胺包括肾上腺素和去甲肾上腺素,可作用于微血管的受体使其收缩,而抗利尿激素和醛固酮具有使水钠潴留的作用,从而保证血容量。

98.【答案】D

99.【答案】B

100.【答案】C

【解析】中位硬膜外阻滞穿刺部位在胸 6~胸 12 之间,常用于腹部手术。



专业知识

1.【答案】C

【解析】原发性甲亢伴有突眼,故又称突眼性甲状腺肿,其他症状为所有甲亢患者共有的表现。

2.【答案】D

【解析】因为张力性气胸的裂口或伤口与胸膜腔相通,并且形成活瓣,吸气时空气从裂口进入胸膜腔,呼气时活瓣关闭,胸膜腔内积气不断增多,压力进行性增高,压迫伤侧肺使之逐渐萎缩,并将纵隔推向健侧,挤压健侧肺脏,造成极度呼吸困难和循环严重障碍,高压空气扩散到皮下组织,形成颈、面、胸部等处严重的皮下气肿。

3.【答案】A

【解析】消化性溃疡合并穿孔,主要表现为腹部剧烈疼痛和具有急性腹膜炎的体征。

4.【答案】C

【解析】门脉高压症有三大表现:脾大、侧支循环建立与开放、腹水。恶心、呕吐、出血倾向和贫血、蜘蛛痣和肝掌、肝病面容是肝功能减退的表现。

5.【答案】E

【解析】肝性脑病又称为肝昏迷,主要临床表现为意识障碍、行为失常和昏迷。

6.【答案】C

【解析】急性出血坏死型胰腺炎常有水、电解质及酸碱平衡紊乱,出血坏死型胰腺炎常有脱水和代谢性酸中毒,并常伴有低血钾、低血镁、低血钙。

7.【答案】A

【解析】右半结肠肠腔较大,粪便稀薄,肿瘤以肿块型多见,故临床上以全身症状、贫血、腹部包块等为主要表现。

8.【答案】B

【解析】造口开放时应行造口侧卧位,以免污染腹部伤口。

9.【答案】A

【解析】上消化道出血是晚期肝癌、食管胃底静脉曲张者的并发症,应及时纠正或控制出凝血功能异常。

10.【答案】D

【解析】婴幼儿颅内压增高可见囟门饱满、颅缝增宽、头颅增大、头皮静脉怒张等。

11.【答案】A

【解析】离心沉淀后的尿沉渣在每高倍视野中平均见到3个以上红细胞,称镜下血尿。

12.【答案】E

【解析】本题考核了肺气肿氧疗的要点,每日吸氧时间应超过15小时。

13.【答案】D

【解析】压迫淤血的肝脏使回心血量增加,已充血的右心房不能接受回心血流而使颈静脉压被迫上升。

14.【答案】C

【解析】视网膜血管硬化、脆弱、出血、纤维增生,最终导致视网膜脱离,所以视网膜病变是致盲的主要原因之一。

15.【答案】E

【解析】因避孕药含雌、孕激素,而性激素是诱发系统性红斑狼疮的因素。

16.【答案】A

【解析】热射病是一种致命性急症,以此“三联征”为典型表现,直肠温度可高达43℃,甚至会昏迷,此型可发生于任何年龄的人,但以老年人和心血管疾病患者多见。

17.【答案】E

【解析】全脊髓麻醉呼吸、循环功能抑制,一旦发生应面罩给氧或气管插管控制呼吸进行呼吸、循环支持治疗。

18.【答案】B

【解析】肾结核病变在肾脏,症状在膀胱。

胱,早期临床症状不明显,尿频是最早出现的症状。膀胱刺激症状最明显。由结核菌及脓液的酸性尿液刺激膀胱引起,随病情发展,膀胱黏膜发生炎症,引起尿频、尿急、尿痛等膀胱刺激症状。

19.【答案】D

【解析】输液管应每日更换。

20.【答案】A

【解析】尿频、尿急、尿痛是膀胱刺激征;血尿、脓尿、肾区疼痛和肿块是肾结核的临床表现;排尿突然中断,并感到疼痛是膀胱结石典型症状;排尿困难,点滴状排尿,尿痛,急性尿潴留是尿道结石的临床表现。

21.【答案】A

【解析】肝浊音界扩大常见于肝癌、肝脓肿患者。

22.【答案】C

【解析】肺炎球菌肺炎患者如使用抗生素后热退,但又复升,应考虑并发症或其他疾病存在的可能性。

23.【答案】E

【解析】脑出血患者急性期应绝对卧床休息2~4周,减少再次脑出血发生几率。

24.【答案】E

【解析】一般认为,高钠低钙、高肉类、高动物油饮食摄入是促进高血压、动脉硬化的因素,故应指导短暂性脑缺血发作患者选择低盐、低脂、充足蛋白质饮食。

25.【答案】E

26.【答案】A

【解析】周围静脉输注操作简单,相对安全,但受到一定的限制,包括营养液的浓度、速度、时间,一般不超过2周。

27.【答案】E

【解析】丹毒是皮肤及其网状淋巴管的急性炎症,病变部位与周围皮肤边界清楚并略隆起。

28.【答案】B

【解析】因椎管内麻醉阻滞交感神经,副

交感神经兴奋,使容量血管扩张,血容量相对不足而引起低血压,所以首先应用麻黄碱使血管收缩,维持正常血压。

29.【答案】E

【解析】骨折固定晚期(6~8周后)已达到骨折的临床愈合,外固定已拆除,任务是促使功能全面恢复,运动以重点关节为主的全身锻炼,此期是功能锻炼的关键阶段。

30.【答案】A

【解析】膝部术后膝关节应屈曲15°,可以保证膝关节的功能位,防止发生关节强直。

31.【答案】D

【解析】结核病、风湿热、休克、肺炎为出汗增多,皮肤干燥无汗见于脱水、黏液性水肿、维生素A缺乏。

32.【答案】D

【解析】正常人两侧瞳孔对称、等大、正圆,直径为2~5mm。

33.【答案】D

【解析】正常尿量为1000~2000ml/d,当尿量<400ml/d为少尿。

34.【答案】A

【解析】低盐饮食,降低体液渗透压,减少体液潴留,右心衰竭长期体循环淤血,胃肠道淤血,摄入少,吸收少,胶体渗透压会降低,液体又会向组织间隙外渗,加重水肿。所以应补充优质蛋白,提高胶体渗透压。

35.【答案】A

【解析】由于体循环系统静脉淤血,使组织间隙积聚过多液体,重力作用影响,多发生于低垂部位。

36.【答案】C

【解析】结核性腹膜炎有结核毒血症的症状,主要表现为发热和盗汗,热型以低热或中等热为多见,少数患者可有弛张热或稽留热。

37.【答案】A

【解析】再生障碍性贫血是由于各种原

因引起骨髓造血功能衰竭,骨髓增生低下,三系细胞不同程度的减少,所以主要的临床表现是进行性贫血、出血、感染及全血细胞减少。

38.【答案】D

【解析】热敷可促使外渗药物向周围组织扩散,化疗药对局部组织刺激性大,外渗可引起局部组织坏死,所以不宜局部热敷,宜局部冷敷以减少扩散。

39.【答案】B

【解析】绞窄性肠梗阻腹痛发作间隙时间缩短,呈持续性剧烈腹痛伴阵发性加重。

40.【答案】D

【解析】急性阑尾炎最初是上腹部或脐周的疼痛,最后转移至右下腹并固定。

41.【答案】D

【解析】瞳孔缩小见于有机磷、巴比妥类、吗啡等药物中毒患者。

42.【答案】A

【解析】因库存血含氨多易诱发肝性脑病。

43.【答案】B

【解析】上消化道出血是肝硬化最常见的并发症,多突然发生大量呕血或黑便,常引起出血性休克,诱发肝性脑病。

44.【答案】B

【解析】肝性脑病是晚期肝硬化最严重的并发症,亦是常见死亡原因。

45.【答案】E

【解析】Graves病的典型临床表现有高代谢综合征、甲状腺肿、突眼征。

46.【答案】B

【解析】胰岛素应在5℃冰箱保存,禁止冷冻。

47.【答案】E

【解析】因为急性中毒发病时间与毒物种类、剂量和侵入途径密切相关,一般经皮肤吸收中毒常在接触农药后2~6小时发病。所以一旦中毒症状出现后,病情发展迅速,

故需及时采取抢救措施。

48.【答案】C

【解析】骨折固定中期(2~3周),此期患肢肿胀疼痛已消,骨折处已纤维性连接,运动重点为患肢骨折部位远近关节活动,防止肌肉萎缩和关节粘连。

49.【答案】A

【解析】急性胆囊炎典型的症状是右上腹阵发性绞痛,常放射至右肩背部。

50.【答案】E

51.【答案】B

52.【答案】A

【解析】正常成年男性的RBC参考值(4.0~5.0) $\times 10^{12}/L$,Hb参考值120~160g/L。

53.【答案】D

【解析】患者有脑出血的临床表现,又有高血压病史,因此,最有可能的诊断是脑出血。CT检查发现有高密度病灶可确诊。

54.【答案】A

【解析】利多卡因单次用量应是400mg。

55.【答案】C

【解析】重度妊娠期高血压疾病导致的重型胎盘早剥主要症状为突然发生的腹部疼痛,严重时可以出现面色苍白、出汗、血压下降等休克征象。

56.【答案】A

【解析】肺心病的患者合并有呼吸衰竭,所以要慎用镇静剂。

57.【答案】E

【解析】声带的运动由喉返神经支配,如一侧喉返神经损伤表现为声音嘶哑,两侧喉返神经损伤则表现为呼吸困难和窒息。

58.【答案】E

【解析】孕妇一般24小时尿雌三醇值急剧减少30%~40%,或于妊娠末期连续多次测定在10mg/24h以下,即考虑胎盘功能不全。

59.【答案】C

【解析】前置胎盘不主张阴道检查,B超

检查是目前最安全、有效的首选方法。

60.【答案】E

【解析】颅内压增高患者已发生便秘者切勿用力屏气排便,可用缓泻剂或低压小量灌肠通便,避免高压大量灌肠。

61.【答案】C

【解析】不可抓挠创面,以免发生感染。

62.【答案】A

【解析】该患儿一般情况差,有局部感染灶,体温异常,白细胞总数增高,符合新生儿败血症的表现。

63.【答案】B

64.【答案】A

65.【答案】D

【解析】第二产程虽然时间短,但异常情况的可能性相对较多,应严密观察,指导待产妇在宫缩时屏气用力增加腹压,将胎儿娩出,是第二产程的首要护理目标。

66.【答案】E

【解析】骨盆每个平面的径线小于正常值 2 cm 或更多,称为均小骨盆,胎儿小、产力好、胎位正常者,可借助胎头极度俯屈和变形,经阴道分娩。

67.【答案】D

【解析】慢性肾炎常以蛋白尿、血尿、高血压、水肿为基本临床表现。血压持续性升高。

68.【答案】D

【解析】成人首次剂量为 50 mg/d,如无不良反应,次日改为 100 mg/d。

69.【答案】B

【解析】丹毒是皮肤及其网状淋巴管的急性炎症,起病急,进展快,先有畏寒、发热、恶心、呕吐症状,高热可达 39~40℃,局部出现片状红疹,颜色鲜红,局部有烧灼样痛。

70.【答案】E

【解析】妊娠早期,应避免接触放射线,以免造成流产。

71.【答案】C

【解析】绒毛膜癌可继发于足月产后,可发生脑转移,脑 CT 可显示转移灶。

72.【答案】B

【解析】滋养细胞肿瘤的治疗原则是以化疗为主,手术为辅。

73.【答案】A

74.【答案】A

【解析】复温是主要的护理措施,复温原则是循序渐进。

75.【答案】C

【解析】高血压危象首选降压药硝普钠治疗,应注意避光输液,药物要现配现用,开始剂量为 10~25 g/min,以后根据血压水平调节速度,严密监测血压,15~30 分钟测血压一次。

76.【答案】D

【解析】高血压危象时,若患者发生烦躁不安,护理要做到保持病室安静,避免患者外出检查,严密监测血压,而不能等待患者平稳时再测量血压,烦躁时要给予甘露醇等脱水剂,输入速度宜快,应用硝酸甘油制剂时输入的速度宜慢,护理操作要动作轻巧,有人陪伴,以避免患者受伤。

77.【答案】D

【解析】急性肾小球肾炎血清 C₃ 及总补体初期下降,8 周内逐渐恢复正常。

78.【答案】D

【解析】本病为自限性疾病,不宜应用糖皮质激素治疗及细胞毒药物。

79.【答案】A

【解析】患者有出血的表现、胸骨压叩痛(+)、白细胞高于正常,外周血出现幼稚细胞,所以考虑急性白血病。

80.【答案】B

【解析】血小板的值低于 $20 \times 10^9/L$ 可发生自发性脑出血,本患者为 $7 \times 10^3/L$ 随时有脑出血的危险。

81.【答案】E

【解析】本患者血小板太低,需活动受

限,绝对卧床休息,以预防脑出血的发生。

82.【答案】D

【解析】患者有10年的病史,中上腹部疼痛,并逐渐加重,向两侧腰背部放射,伴有饱胀,食欲不振,大便次数增多、内含脂肪滴。是胰腺炎的典型症状,此次发病有白细胞、中性粒细胞、血糖的升高。

83.【答案】A

【解析】酒精可刺激胃酸、促胰液素和胰液分泌增加,可增加Oddi括约肌的阻力,导致胰管的阻塞,从而发生胰腺炎。

84.【答案】C

【解析】戒酒是预防胰腺炎复发的重要环节。

85.【答案】D

86.【答案】B

【解析】慢性肾衰竭晚期常引起血液系统的改变。

87.【答案】C

【解析】急性中毒时应进行毒物的特异性检测,此患者因生气,呼之不应并可闻到蒜臭味,怀疑是有机磷农药中毒。

88.【答案】A

【解析】阿托品用药原则是早期、足量、反复给药。

89.【答案】E

【解析】患者男,50岁以上的高血压病患者,因情绪激动,突然出现头痛,呕吐等烦压增高症状,并伴有偏瘫、失语等体征,所以

考虑为一脑出血患者。

90.【答案】C

【解析】为明确诊断,建议CT检查,可见有高密度灶。

91.【答案】B

【解析】脑出血患者常见病因为高血压并发动脉粥样硬化和颅内动脉瘤,而其发病大多因用力和情绪改变等外因使血压急剧增高所致,应指导患者避免使血压骤然升高的各种诱因。

92.【答案】E

93.【答案】C

【解析】2个月小儿首次接种脊髓灰质炎疫苗。

94.【答案】E

【解析】8个月小儿首次接种麻疹疫苗。

95.【答案】B

【解析】6个月小儿完成第三次乙肝疫苗接种。

96.【答案】A

97.【答案】B

【解析】I度喉梗阻安静时无症状,活动后出现吸气性喉鸣,呼吸困难;II度喉梗阻安静时有吸气性喉鸣,呼吸困难;III度喉梗阻烦躁不安,发绀;IV度喉梗阻时可抽搐,肺部呼吸音几乎消失,仅有气管传导音。

98.【答案】B

99.【答案】A

100.【答案】C

实践能力

1.【答案】B

【解析】血气分析时应用肝素抗凝。

2.【答案】A

【解析】急诊观察室是收治已明确诊断或暂不能确诊以及病情危重但暂时住院有困难的患者。来到急诊观察室的患者已经经过了初步的诊治不需要再进行预检分诊。留观室的护士的工作有入室登记、建立病案、观察病情、处理医嘱等。

3.【答案】B

【解析】大量不保留灌肠主要用于解除便秘;为手术、分娩或肠道检查前做准备;为高热患者降温,因此选项 A、C、D、E 均适于行大量不保留灌肠。而急腹症、消化道出血、妊娠、严重心血管疾病等患者禁忌行大量不保留灌肠。

4.【答案】B

【解析】输液速度应根据患者的年龄、病情、药物性质调节滴速。一般年老、体弱、婴幼儿、心肺疾患的患者输液速度宜慢;严重脱水、心肺功能良好者输液速度宜快。输入高渗盐水、含钾药物、升压药等宜慢。

5.【答案】B

【解析】热敷常用于消炎、消肿、减轻疼痛、促进局部血液循环,可用于急性感染部位。选项 B 静脉炎的患者可使用热敷。

6.【答案】C

【解析】两床之间的距离不可少于 1 m,一般病床宽为 0.9 m,而病床又要求平行摆放,可计算得出该病房最多可摆放 3 张病床。

7.【答案】C

【解析】空气进入静脉后,随血流经右心房至右心室,如空气量大,容易阻塞肺动脉口,使血液不能进入肺内,引起严重缺氧,甚至死亡。所以应防止空气栓塞肺动脉入口。

8.【答案】D

【解析】当患者心率和脉率不一致时,应由两名护士同时测量,一人测心率,一人测脉率,由测心率的护士计时,测 1 分钟。

9.【答案】C

【解析】为患者插胃管前应首先测量插入的长度,测量方法有两种,一是测量患者前发际至胸骨剑突的长度,二是测量患者鼻尖至耳垂再至胸骨剑突的长度。这两种方法测量出来的长度基本相同,都相当于鼻腔经食道到胃的长度。

10.【答案】D

【解析】超声波雾化吸入后,因雾化罐、螺纹管、面罩和口含嘴直接或间接地接触了患者或患者的体液、药液,应将其浸泡于消毒液内 1 h,而水槽附于雾化器上,未接触患者的体液和药液,故不需消毒。

11.【答案】A

【解析】发生急性肺水肿后,首先应立即停止输液,防止更多的液体进入;患者取端坐卧位,两腿下垂,减少静脉血回流,减轻心脏负担;加压和乙醇湿化给氧,其中加压给氧可使肺泡内压力增高,减少肺泡内毛细血管液渗出,乙醇能降低肺泡内泡沫的表面张力,使泡沫破裂消散,从而改善肺部气体交换;给予强心、利尿、扩血管药物有利于舒张周围血管,加速液体排出,减少回心血量。所以有助于减轻肺泡内液体渗出的是加压给氧。

12.【答案】C

【解析】煮沸法是热力消毒灭菌法的一种,进行煮沸时,物品应全部浸没在水中并把物品的盖子或轴节打开,使各个面充分受热,玻璃类物品应用纱布包好,大小相同的物品不能重叠放入,应散开放置。煮沸法也可以用于橡胶类物品,短时间不会使橡胶变

形,但在用煮沸法对橡胶类物品进行消毒灭菌后应及时取出。

13.【答案】A

【解析】辐射指热由一个物体表面通过电磁波的形式传至另一个与它不接触的物体表面的一种方式,是人体安静状态下处于气温较低环境中主要的散热形式当外界温度等于或高于人体皮肤温度时,蒸发成为人体唯一的散热形式。

14.【答案】D

【解析】使用链霉素发生过敏反应时,可遵医嘱注射氯化钙,因链霉素可与钙离子结合,使毒性症状减轻。

15.【答案】C

【解析】尿常规检查的目的包括:检查尿液的色泽、透明度、细胞及管型,测定尿比重,做尿蛋白及尿糖定性。尿糖的定量检查需留取 12 h 或 24 h 尿标本。

16.【答案】E

【解析】预防长期卧床患者肌肉挛缩的护理措施是肢体被动运动,并进行按摩,以促进血液循环,增加肌肉张力帮助恢复功能。

17.【答案】E

【解析】正常人瞳孔呈圆形,边缘整齐,两侧对等,在自然光线下直径约为 2.5~4 mm。瞳孔对光反应灵敏,危重或昏迷患者可表现对光反应消失。

18.【答案】E

【解析】多种药物同时注射时,应先注射无刺激性或刺激性较弱的药物,再注射刺激性强的药物,以免先注射刺激性强的药物后因患者不适产生肌紧张而不宜注射。

19.【答案】C

【解析】触摸颈动脉搏动的体表标志是喉节旁开 1~2 cm 处。

20.【答案】D

【解析】婴幼儿、精神异常、昏迷、口腔疾患、口鼻手术、张口呼吸患者禁测口温,故选

项 A、B、C、E 不正确。痔疮术后的患者禁测直肠温,可以测口温。

21.【答案】C

【解析】全麻未清醒的患者可能会发生呕吐。为了避免呕吐物误吸造成窒息或肺炎,应该将患者的体位安置为去枕仰卧位,头偏向一侧,当发生呕吐时,呕吐物容易引出,不易进入呼吸道。

22.【答案】C

【解析】超声雾化吸入法的目的包括治疗呼吸道感染、解除支气管痉挛改善通气功能、胸部手术前后用于预防呼吸道感染、湿化呼吸道、减轻咳嗽、稀化痰液帮助祛痰等,而不适用于胸部手术后的止痛,通常胸部手术后的止痛采用口服、肌肉注射和静脉注射途径。

23.【答案】B

【解析】小儿头皮动、静脉的主要区别为:头皮静脉外观呈微蓝色,无搏动,管壁薄,易被压瘪,不易滑动,血流呈向心性流动,穿刺后回血缓慢,血液呈暗红色。

24.【答案】E

【解析】对于需要密切观察血压的患者,在测量血压时要做到固定,即定体位、定部位、定时间、定血压计。

25.【答案】D

【解析】根据检查的目的不同,对便标本采集的要求不同。便常规标本应用竹签取少量异常粪便送检;便培养的标本应用无菌棉签取带脓血或黏液的粪便少许,置培养管中送检;检查寄生虫虫卵的标本,应在不同部位取带血或黏液的便标本 5~10 g 送检;服驱虫剂后或做血吸虫孵化检查,应留取全部粪便送检;查阿米巴原虫的标本应置于加温便盒内送检,因为阿米巴原虫在常温下容易失去活性。

26.【答案】D

【解析】松弛术属于非药物性止痛方法,其主要是通过分散患者的注意力达到解除

疼痛和焦虑的目的,并能增加患者的自我控制感。

27.【答案】B

【解析】护士在护理牙关紧闭抽搐患者时,可用压舌板包裹数层纱布放于上下白齿间,以免因咀嚼肌痉挛而咬伤舌。

28.【答案】D

【解析】往加压输液时,如及时更换液体,输入空气,空气随血流经右心房至右心室,如空气量大,容易阻塞肺动脉口,使血液不能进入肺内,引起严重缺氧,甚至死亡。为患者取左侧卧位,头低脚高位,可使肺动脉的位置低于右心室,有利于气泡向上漂移,浮向右心室尖部,避开肺动脉口,再者由于心脏的不断跳动,可将空气混成泡沫,分次小量进入肺动脉内,以免发生肺栓塞。

29.【答案】A

【解析】心肺疾病引起的呼吸困难采用半坐卧位的原因是使膈肌位置下降,胸腔容积扩大,使呼吸困难得到改善。

30.【答案】B

【解析】两种原因可引起骨筋膜室综合征:一是骨筋膜内肿胀、出血,压力高,此种常见于前臂或小腿骨折;另一种是肢体包扎过紧,尤其是石膏包扎。预防方法是,石膏包扎不要过紧,密切观察,及时发现,迅速减压。

31.【答案】B

【解析】ROM 练习指的是关节活动范围练习。

32.【答案】B

【解析】尿失禁病人进行盆底肌锻炼以增强控制排尿的能力。

33.【答案】B

【解析】清洁灌肠的主要目的是解除便秘或为肠道手术、检查、分娩做准备或解毒或降温。

34.【答案】C

【解析】配制过氧乙酸时应现配现用,配

制时忌与碱和有机物混合,切勿将原液直接倒入水中,以防引起爆炸。

35.【答案】C

【解析】使用冰帽或冰槽时,应注意观察冰帽有无破损,漏水,冰帽或冰槽内的冰块融化后,应及时更换或添加,监测肛温在 33℃ 左右,不低于 30℃,以防止心室纤颤等并发症出现。

36.【答案】C

【解析】使用烤灯时,灯距为 30~50 cm,治疗时间为 20~30 分钟,应观察有无过热、心慌、头晕感觉及皮肤反应,皮肤出现红斑为剂量合适。

37.【答案】B

【解析】巴比妥类药物中毒采用硫酸钠导泻,是利用其在肠道内形成的高渗透压,而阻止肠道水分和残存的巴比妥类药物的吸收,促其尽早排出体外。

38.【答案】A

【解析】由于硫酸钠没有心脏和神经系统的抑制作用,不会加重巴比妥类药物的中毒症状,使用安全。主要是利用其在肠道内形成高渗透压,阻止肠道水分和残存的巴比妥药物的吸收,促进药物排出体外。

39.【答案】B

【解析】新鲜血浆含有正常量的全部凝血因子,适用于凝血因子缺乏的患者。

40.【答案】A

【解析】独立的护理措施是不依赖医嘱,护士独立提出和采取的措施。

41.【答案】B

【解析】成人正常情况下,尿比重波动在 1.015~1.025。

42.【答案】B

【解析】果酱样便可见于肠套叠、阿米巴痢疾。

43.【答案】B

【解析】内源性感染,病原体来自患者自身体内或体表定值或寄生的正常菌群,在正

常情况下对人体无感染力,不致病。在一定条件下,当人体局部或全身免疫力低下,对本身固有微生物感受性增加,正常菌群发生易位,成为发生感染的优势菌。

44.【答案】B

【解析】传染病患者随时排出的分泌物、排泄物对环境污染严重,因此传染病房随时消毒很重要。

45.【答案】B

【解析】急性肺水肿时每隔 5~10 分钟轮流放松一个肢体的止血带,可有效地减少静脉回心血量。时间过长可使局部血液循环发生障碍导致供血不足;时间过短不能有效减少静脉回流量。

46.【答案】E

【解析】足底禁忌用冷以防反射性末梢血管收缩影响散热或引起一过性冠状动脉收缩。

47.【答案】B

【解析】温水擦浴或乙醇擦浴目的是为高热病人降温。

48.【答案】E

【解析】洋地黄药物直接作用于心脏,其治疗的有效剂量接近于中毒剂量,不同的人对洋地黄的敏感性不同。使用不当极易出现心脏毒性作用,而导致心脏骤停的发生。

49.【答案】A

50.【答案】A

【解析】诊断依据是做出诊断时的临床判断标准,这些判断标准包括相关的症状、体征以及有关病史等。因而体温过高的临床判断标准当然应该以实际测得的患者体温为依据。

51.【答案】D

【解析】对缺氧判断主要评估患者的病史、临床表现、动脉血气分析。最重要的一项检查是动脉血气分析,尤其是动脉血氧分压(PaO_2)及血氧饱和度(SaO_2)对判断患者缺氧程度更为重要。轻度缺氧: $\text{PaO}_2 >$

6.65 kPa , $\text{SaO}_2 > 80\%$ 无发绀;中度缺氧: PaO_2 $4.69 \sim 6.65 \text{ kPa}$, SaO_2 $65\% \sim 85\%$, 有发绀;重度缺氧: $\text{PaO}_2 < 4.69 \text{ kPa}$, SaO_2 小于 65% , 有明显发绀并伴有明显三凹征等。

52.【答案】D

【解析】偏瘫侧肢体使用热水袋时水温不能过高,应控制在 50°C 以内,原因是局部皮肤感觉迟钝或麻木,水温过高容易引起烫伤。

53.【答案】D

【解析】肝昏迷的患者会出现肝臭味,可能是由于氨、硫醇和短链脂肪酸的协同毒性作用产生挥发气体的气味。

54.【答案】A

【解析】根据病例所给予的资料首先可以判断是功能性尿失禁,然后根据患者的年龄 65 岁属于老年妇女,发生尿失禁是在腹压增加时,这往往是老年女性骨盆支持性结构(肌肉、韧带等)无力或功能衰退从而导致出现尿失禁的一种原因。

55.【答案】C

【解析】乙型脑炎可以通过蚊虫叮咬传播。因此对于乙型脑炎的患者应采取昆虫隔离。

56.【答案】C

【解析】支气管哮喘患者常出现呼气性呼吸困难,表现为呼气费力,呼气时间显著长于吸气时间,有胸闷、呼吸费力、烦躁、张口呼吸、发绀、鼻翼扇动等症状。

57.【答案】B

【解析】因为 1~3 岁个体的原欲集中在肛门区,此期的健康发展建立在控制排便所带来的愉快经历上,从而养成讲卫生守秩序并能控制自己的习惯,所以固结者则表现为缺乏自我意识或自以为是等。

58.【答案】E

【解析】肛管排气时应保留肛管不超过 20 分钟。

59.【答案】C

【解析】 FT_3 (正常范围:3.10~6.8 $\mu\text{mol/L}$)增高,表明患者为甲状腺功能亢进,该患者的表现是一个典型的甲亢面容。

60.【答案】D

【解析】“O”型血者的红细胞内无抗原存在,而其血清中存在“抗A”“抗B”两种抗体。

61.【答案】A

【解析】因为老年期面临着完善与失望的危机,所以此期的负性解决指标有失望感、鄙视他人等。

62.【答案】E

【解析】因为该患者处于事业发展的高级阶段,所以对于充分发挥潜能体验工作快乐有较高的需要。

63.【答案】C

64.【答案】D

65.【答案】B

66.【答案】D

67.【答案】C

68.【答案】C

69.【答案】A

70.【答案】C

【解析】患者系老年人,且有慢性肺病史,短时间内输入过多液体并出现粉红色泡沫样痰及肺部湿啰音的典型体征,即可判断发生急性肺水肿。

71.【答案】D

【解析】端坐位,双腿下垂可以减少静脉回流,减轻心脏负荷。

72.【答案】C

【解析】一侧瞳孔扩大、固定,常提示同侧颅内病变所致的小脑幕裂孔疝的发生。

73.【答案】C

【解析】为成人患者吸痰可根据患者情况及痰黏稠情况调节负压,成人-300~-400 mmHg。

74.【答案】B

75.【答案】B

【解析】昏迷病人咳嗽、吞咽反射减弱或

消失,呼吸道分泌物、呕吐物易积聚于喉头,引起呼吸困难或窒息应取平卧位头偏向一侧以防止窒息,并注意保持呼吸道通畅。

76.【答案】A

【解析】应取平卧位头偏向一侧,以防止窒息,及时清理呼吸道呕吐物,保持呼吸道通畅。

77.【答案】D

【解析】主观资料即护理对象的主诉,是其对经历、感觉、思考及担心的内容进行的诉说。

78.【答案】C

【解析】客观资料是护士通过观察、体检或借助诊断仪器和实验室检查获得资料。

79.【答案】C

【解析】餐前应喝热饮促进肠蠕动刺激排便反射。

80.【答案】B

【解析】开塞露灌肠应保留5~10分钟再排便。

81.【答案】A

【解析】病儿多采用头皮静脉穿刺法,常用的头皮静脉有额静脉、颞浅静脉、耳后静脉、枕静脉等。

82.【答案】D

【解析】由于头皮动脉压力较高,故推注药液时阻力大,局部血管树枝状突起。

83.【答案】D

84.【答案】E

【解析】昏迷患者咳嗽、吞咽反射减弱或消失,呼吸道分泌物易积聚于喉头,引起呼吸困难或窒息。应取平卧位头偏向一侧以防止窒息,并注意保持呼吸道通畅。

85.【答案】D

86.【答案】B

87.【答案】A

88.【答案】D

89.【答案】B

90.【答案】C

91.【答案】D

92.【答案】E

93.【答案】A

94.【答案】C

【解析】磷具有调节酸碱平衡的作用;钙具有调节心脏、神经的传导和肌肉收缩的作用;碘是构成甲状腺素的重要成分。

95.【答案】B

【解析】破伤风抗毒素皮试液剂量为150 IU/ml。

96.【答案】A

97.【答案】C

98.【答案】A

99.【答案】C

100.【答案】A



金英杰医学
WWW.JINYINGJIE.COM