

致宝宝们：

领取试卷后，一定要收听金英杰大咖名师的解读直播课哦！所有师资在业内具有颇高的地位，多位老师曾经创造整个班级全部通过考试的神话。

直播课中还会抽取幸运学员免费赠送【金英杰镇店之宝——王牌、金鹰直播系列药师课程】（4期分别抽取）

直播课程安排如下

考试类别		时间	主题	授课老师
西药学	5月27日	19:30—21:30	西药二+西药综+近3年考情分析+核心考点解读	曲蕾
	5月28日	19:30—21:30	西药一+法规+近3年考情分析+核心考点解读	杨树
中药学	5月26日	19:30—21:30	中药二+中药综+法规+近3年考情分析+核心考点解读	王爽
	5月29日	19:30—21:30	中药一+近3年考情分析+核心考点解读	潇潇

听师一席话，胜读十年书

划重点，每晚直播课的抽奖都将在群内进行

童鞋们需要[进入药师备考交流群抽奖，参考答案也是群内领取哦！](#)

微信扫码，回复“药师抽奖”，立即加群



2019 年全国执业药师

药学综合知识与技能全真模拟题

一、最佳选择题

1. 在不同单位与部门执业的药师都应该树立的服务理念是
 - A. 以患者为中心
 - B. 提供优质的服务
 - C. 以消费者为中心
 - D. 保障公众安全、有效用药
 - E. 以消费者为中心，主动参与药学服务
2. 药师审核处方过程中，发现存在用药不适宜的处方的处理方法是
 - A. 拒绝接收处方
 - B. 调配处方并核发药品
 - C. 告知处方医师，请其确认或重新开具处方
 - D. 依照处方调剂并核发药品
 - E. 拒绝调剂，及时告知处方医师，并应当记录，按照有关规定报告
3. “消心痛”是下列哪种药物的别名
 - A. 硝酸甘油
 - B. 硝酸异山梨酯
 - C. 5-单硝酸异山梨酯
 - D. 硝苯地平
 - E. 普萘洛尔
4. 可提高后者血药浓度，减少用量，降低不良反应的联合用药是
 - A. 磺胺甲噁唑与甲氧苄啶
 - B. 氢溴酸山莨菪碱与哌替啶
 - C. 吗啡与纳洛酮
 - D. 铁剂与维生素 C
 - E. 卡比多巴与左旋多巴
5. 属于超常处方的是
 - A. 早产儿未标明体重或日、月龄
 - B. 中药饮片和西药开在同一张处方上
 - C. 用法、用量写“遵医嘱”“自用”字样
 - D. 无正当理由不首选国家基本药物
 - E. 无适应证用药

6. 患儿，男，1岁1个月，诊断为巨幼细胞贫血。医嘱 肌内注射维生素 B₁₂，一次 40 μg。已知维生素 B₁₂ 注射液的规格为 0.5mg/ml，计算应该抽取的药液容积为

- A. 0.06ml
- B. 0.07ml
- C. 0.08ml
- D. 0.09ml
- E. 0.10ml

7. 某患者喜吃鱼类，近日出现头痛、头晕、呼吸急促、结膜充血、皮肤潮红、心悸、面目肿胀、麻木等中毒症状。下列药物中，怀疑该患者可能正在服用的是

- A. 维生素 A
- B. 灰黄霉素
- C. 左旋多巴
- D. 异烟肼
- E. 肾上腺皮质激素

8. 一级信息最突出的特点是

- A. 提供的信息最新
- B. 内容广泛、使用方便
- C. 提供的信息丰富、详实
- D. 查阅时需要利用所提供的参考文献进行验证
- E. 有的还能提供疾病与药物治疗的基本知识

9. 下列“给药时间是依据生物钟规律而设定”的实例中，最正确的是

- A. 清晨服用硫酸镁
- B. 清晨服用帕罗西汀
- C. 餐前服用阿莫西林
- D. 餐前服用格列苯脲
- E. 餐后服用双氯芬酸

10. 人体健康参数：体重指数（BMI）正常区间是

- A. 18.0~22.0
- B. 18.0~23.0
- C. 18.5~23.0
- D. 18.5~23.9
- E. 23.9~27.9

11. ADR 因果关系评价结果为“很可能”的依据中，与“肯定”的依据不同的是

- A. 有文献资料佐证
- B. 用药及反应时间顺序合理
- C. 排除原患疾病等其他混杂因素影响
- D. 停药后反应停止，或迅速减轻，或好转
- E. 无重复用药史，基本可排除合并用药导致反应发生的可能性

12. 药品不良反应报告的原则是

- A. 可疑即报
- B. 发现即报
- C. 可疑即报, 但需要待因果关系初步肯定后才做呈报
- D. 可疑即报, 如果能待因果关系初步肯定后再做呈报更好
- E. 可疑即报, 报告者不需要待因果关系肯定后才做呈报

13. 可能导致局部缺血性结肠炎(药源性胃肠道疾病)的药物是

- A. 呋塞米
- B. 利血平
- C. 阿洛司琼
- D. 依他尼酸
- E. 维生素 D

14. 妊娠用药后, 不会出现畸形胎儿的给药时间是在受精后

- A. 10 天之后
- B. 15 天之内
- C. 15 天之后
- D. 20 天之内
- E. 28 天之内

15. 儿科用药中, 对新生儿或婴儿最常用的给药途径是

- A. 口服给药
- B. 静脉注射
- C. 静脉滴注
- D. 肌内注射
- E. 直肠给药

16. 一些药物的副作用是嗜睡、眩晕、视物模糊或定向力障碍, 为安全起见, 驾驶员应该

- A. 开车前 2 小时服用
- B. 开车前 2 小时慎用
- C. 开车前 4 小时服用
- D. 开车前 4 小时慎用
- E. 开车前 6 小时勿用

17. 在药物经济学研究方法中, 可以为总体医疗费用的控制和医疗资源优化配置提供基本信息的是

- A. 最大效果分析
- B. 最小成本分析
- C. 成本-效益分析
- D. 成本-效用分析
- E. 成本-效果分析

18. 洋地黄毒苷的半衰期为 7 天, 通常选择

- A. 每日给药 1 次
- B. 每日给药 3 次
- C. 每周给药 1 次
- D. 静脉滴注给药
- E. 每周给药 3 次

19. 以下药物中，最可能导致嗜酸性粒细胞增多的是

- A. 泼尼松
- B. 地塞米松
- C. 甲基多巴
- D. 坎地沙坦
- E. 头孢拉定

20. 国际标准化比值是血栓性疾病患者实施抗凝治疗的依据，其正常参考区间是

- A. 2.0
- B. >1.5
- C. <0.8
- D. $0.8\sim1.5$
- E. $0.8\sim2.0$

21. 为解热或镇痛，有心功能不全病史的患者应慎用布洛芬。因为用药后可能发生

- A. 过敏反应
- B. 重度肝损害
- C. 急性肾衰竭
- D. 尿潴留和水肿
- E. 电解质平衡失调

22. 连续应用抗菌药物-糖皮质激素眼用制剂的时间不宜超过

- A. 3 天
- B. 5 天
- C. 7 天
- D. 10 天
- E. 30 天

23. 病毒神经氨酸酶抑制剂使用的最佳时间是

- A. 在流感症状初始时
- B. 在流感症状严重时
- C. 在流感症状初始 24 小时内
- D. 在流感症状初始 48 小时内
- E. 在流感症状初始 72 小时内

24. 以下药物中，用于治疗细菌感染性腹泻应首选的是

- A. 维生素
- B. 谷维素
- C. 抗生素
- D. 黄连素
- E. 麻黄素

25. 患者，女，45 岁，既往有心律失常（Q-T 间期延长）、低钾血症病史。近日因发热、咳嗽、咳痰就诊，诊断为社区获得性肺炎。该患者不宜选用的药物是

- A. 莫西沙星
- B. 头孢呋辛
- C. 氨溴索
- D. 阿莫西林
- E. 对乙酰氨基酚

26. 中药血脂康中含有的化学药成分是

- A. 洛伐他汀
- B. 辛伐他汀
- C. 阿托伐他汀
- D. 依折麦布
- E. 非诺贝特

27. 房颤患者若需控制心室率，可使用的药物是

- A. 胺碘酮
- B. 地高辛
- C. 达比加群酯
- D. 阿司匹林
- E. 奎尼丁

28. 对反复发作的短暂性脑缺血发作患者首选

- A. 阿司匹林
- B. 华法林
- C. 巴曲酶
- D. 辛伐他汀
- E. 氟桂利嗪

29. 可导致齿龈增生的抗癫痫药是

- A. 卡马西平
- B. 苯妥英钠
- C. 苯巴比妥
- D. 丙戊酸钠
- E. 拉莫三嗪

30. 阿尔茨海默病患者应该避免使用的药物是

- A. 美金刚
- B. 卡巴拉汀
- C. 颠茄
- D. 多奈哌齐
- E. 加兰他敏

31. 为减少共济失调、幻觉及“宿醉现象”，老年失眠患者宜选用的助眠药物是

- A. 苯巴比妥
- B. 劳拉西泮

- C. 佐匹克隆
- D. 水合氯醛
- E. 地西洋

32. 黏液性水肿昏迷的治疗，首选的药物为

- A. T_4
- B. T_3
- C. $L-T_4$
- D. $L-T_3$
- E. 碘化钾

33. 预混胰岛素 30R 的组成为

- A. 30%低精蛋白锌胰岛素，70%短效胰岛素
- B. 70%低精蛋白锌胰岛素，30%短效胰岛素
- C. 30%速效胰岛素，70%长效胰岛素
- D. 70%速效胰岛素，30%长效胰岛素
- E. 30%短效胰岛素，70%长效胰岛素

34. 婴儿预防佝偻病，每天服用维生素 D 的剂量为

- A. 100~200IU
- B. 300~500IU
- C. 400~800IU
- D. 1000~1500IU
- E. 1500~2000IU

35. 患者，男，54 岁，2 周前痛风急性发作，经治疗后病情缓解，后期针对其痛风治疗不宜选用的药物是

- A. 别嘌醇
- B. 秋水仙碱
- C. 非布索坦
- D. 苯溴马隆
- E. 碳酸氢钠

36. 下列症状中，可视为良性前列腺增生症早期信号的是

- A. 痔疮
- B. 脱肛
- C. 尿路感染
- D. 夜尿增多
- E. 夜尿次数增多

37. 患者，27 岁，妊娠 20 周，出现发热，体温最高达 38.5°C 。体格检查：肾区叩痛。经相关实验室检查，诊断为急性肾盂肾炎。宜选用的抗菌药物是

- A. 甲硝唑
- B. 头孢噻肟

- C. 阿米卡星
- D. 阿奇霉素
- E. 诺氟沙星

38. 属于癌症疼痛治疗第二阶梯的止痛药物为

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 二氢可待因
- C. 羟考酮
- D. 哌替啶
- E. 美沙酮

39. 治疗抗肿瘤引起的恶心、呕吐等不良反应，可选用的止吐药物是

- A. 奥美拉唑
- B. 西咪替丁
- C. 昂丹司琼
- D. 维生素 B₆
- E. 苯海拉明

40. 带状疱疹病毒首选的治疗药物是

- A. 更昔洛韦
- B. α -干扰素
- C. 阿昔洛韦
- D. 伐昔洛韦
- E. 利巴韦林

二、配伍选择题

- A. qd.
- B. qh.
- C. qn.
- D. qod.
- E. qid.

- 41. “1 日 1 次”用药的外文规范缩写是
- 42. “隔日 1 次”用药的外文规范缩写是
- 43. “1 日 4 次”用药的外文规范缩写是

【44~46】

- A. 协同作用
- B. 拮抗作用
- C. 敏感化作用
- D. 减少药物不良反应
- E. 增加毒性或 ADR

44. 普萘洛尔联用硝苯地平抗高血压的机制是

45. 氢氯噻嗪减弱甲苯磺丁脲降糖作用的机制是

46. 排钾利尿药使心脏对强心苷类药物敏感性增强的机制是**【47～48】**

- A. 透皮贴剂
- B. 中药注射剂
- C. 肠内营养制剂
- D. 茶碱类药物（静脉途径）
- E. 胰岛素（皮下或静脉注射）

47. 我国高警示药品推荐目录（2015 版）中，新遴选加入的药品种类是**48. 我国高警示药品推荐目录（2015 版）中，源于美国用药安全研究所高警示药品目录的药品种类是****【49～50】**

- A. 0.9%氯化钠注射液
- B. 5%葡萄糖注射液
- C. 50%葡萄糖注射液
- D. 复方氯化钠注射液
- E. 低分子右旋糖酐注射液

49. 静脉注射两性霉素 B 的适宜溶媒是**50. 静脉注射阿昔洛韦的适宜溶媒是****【51～53】**

- A. 清晨
- B. 餐前
- C. 餐中
- D. 餐后
- E. 睡前

51. 阿莫西林胶囊的适宜服药时间是**52. 阿卡波糖片的适宜服药时间是****53. 比沙可啶片的适宜服药时间是****【54～56】**

- A. 咀嚼片
- B. 舌下片
- C. 含漱剂
- D. 阴道栓剂
- E. 鼻用喷雾剂

54. 用药后 30 分钟内不宜吃东西或饮水的剂型是**55. 用药后不宜马上吃东西或饮水的剂型是****56. 用药后可用少量温水送服的剂型是****【57～59】**

- A. 药物使用不当
- B. 生理因素

- C. 药物制剂因素
- D. 不良生活方式
- E. 药物相互作用

57. 胶囊中的色素可引起固定性药疹，说明药源性疾病的药物因素是

58. 他汀类与贝特类合用可致横纹肌溶解症，说明药源性疾病的药物因素是

59. 口服避孕药导致的心肌梗死，在吸烟妇女中发生危险加大，说明药源性疾病的药物因素是

【60～62】

- A. A 级
- B. B 级
- C. C 级
- D. D 级
- E. X 级

60. 卡托普利在妊娠中前期使用属于药物妊娠毒性分级

61. 利巴韦林属于药物妊娠毒性分级

62. 头孢曲松属于药物妊娠毒性分级

【63～64】

- A. 解离度大
 - B. 呈弱碱性
 - C. 呈弱酸性
 - D. 在母体血浆中处于结合状态
 - E. 在脂肪与水中都有一定的解离度
63. 红霉素易在乳汁中分布的机制是
64. 华法林不会在乳汁中分布的机制是

【65～66】

- A. 经肝肠循环消除的药物
 - B. 肾毒性小且经肝排泄的药物
 - C. 肝毒性小且经肾排泄的药物
 - D. 经肝、肾双途径消除的药物
 - E. 经首过作用消除的药物
65. 肝功能不全而肾功能正常患者宜选用的药物是
66. 肾功能不全而肝功能正常患者宜选用的药物是

【67～69】

- A. 诊断痛风
 - B. 诊断黄疸
 - C. 诊断贫血
 - D. 诊断心肌梗死
 - E. 诊断急性胰腺炎
67. 血清淀粉酶检查超过正常值可
68. 血尿酸检查超过正常值可
69. 肌酸激酶检查超过正常值可

【70～71】

- A. 酞丁安滴眼液
- B. 色甘酸钠滴眼液
- C. 氧氟沙星滴眼液
- D. 羟甲基纤维素钠滴眼液
- E. 毛果芸香碱滴眼液

70. 治疗过敏性结膜炎可选用的药物是

71. 缓解视疲劳可选用的药物是

【72～74】

- A. 1 日
- B. 3 日
- C. 5 日
- D. 7 日
- E. 10 日

72. 使用抗感冒药治疗感冒，连续服用时间不得超过

73. 使用解热镇痛药退热，连续服用时间不得超过

74. 使用解热镇痛药治疗疼痛，连续服用时间不得超过

【75～76】

- A. 胰酶
- B. 莫沙必利
- C. 胃蛋白酶
- D. 二甲硅油
- E. 胰酶和碳酸氢钠

75. 因摄食脂肪过多所致消化不良者，可服用的药物是

76. 因蛋白质过多所致消化不良者，应服用的药物是

【77～79】

- A. 甲硝唑
- B. 咪康唑
- C. 头孢曲松钠
- D. 青霉素钠
- E. 克拉霉素

77. 痛痒明显，阴道检查时发现粘稠的奶酪样分泌物，经验治疗首选的药物是

78. 阴道检查时发现大量泡沫样分泌物，经验治疗首选的药物是

79. 阴道分泌物培养为衣原体，经验治疗首选的药物是

【80～81】

- A. β_2 受体激动剂+吸入型糖皮质激素
- B. 吸入型糖皮质激素+磷酸二酯酶抑制剂
- C. 抗菌药物+短效支气管扩张剂+糖皮质激素
- D. 吸入型糖皮质激素+镇咳药+抗过敏药

E. 吸入型糖皮质激素+祛痰药+镇咳药

80. 慢性阻塞性肺病急性加重期伴浓痰者宜选用的治疗方案是

81. 慢性阻塞性肺疾病稳定期患者宜选用的治疗方案是

【82~83】

A. 异烟肼

B. 利福平

C. 乙胺丁醇

D. 吡嗪酰胺

E. 对氨基水杨酸

82. 患者，男，40岁，因肺结核使用抗结核药后，四肢出现针刺感，导致这种症状的药物是

83. 患者平日佩戴隐形眼镜，使用抗结核药后，导致患者隐形眼镜染色的药物是

【84~85】

A. 氢氯噻嗪

B. 美托洛尔

C. 依那普利

D. 维拉帕米

E. 哌唑嗪

84. 上述抗高血压药的禁忌证为双侧肾动脉狭窄的是

85. 上述抗高血压药的禁忌证为心力衰竭的是

【86~87】

A. 单纯孕激素补充治疗

B. 单纯雌激素补充治疗

C. 雌孕激素序贯用药

D. 雌孕激素连续联合用药

E. 雌激素对抗治疗

86. 适用于已切除子宫妇女的 MHT 治疗方案

87. 适用于有完整子宫、绝经后期仍希望有月经样出血妇女的 MHT 治疗方案是

【88~90】

A. 青霉胺

B. 乙酰胺

C. 纳洛酮

D. 维生素 K₁

E. 解磷定

88. 有机磷中毒的特效解毒剂是

89. 氟乙酰胺中毒的特效解毒剂是

90. 香豆素类杀鼠药中毒的特效解毒剂是

三、综合分析题

【91～93】

上感和流感在在一年四季均可发病，尤以冬、春季较为多见。根据病原体、传播途径和症状的不同分为上呼吸道感染（上感）和流行性感冒（流感）。

91. 感冒初起时出现卡他症状，如鼻黏膜充血、打喷嚏、流涕、流泪等，宜服用服用的药物是

- A. 非甾体抗炎药
- B. 含苯海拉明的制剂
- C. 含右美沙芬的制剂
- D. 含咖啡因的制剂
- E. 含伪麻黄碱、氯苯那敏的制剂

92. 老年伴良性前列腺增生症的感冒患者服用含有氯苯那敏的抗感冒药后，可引起的严重不良反应是

- A. 急性尿潴留
- B. 严重高血压
- C. 慢性荨麻疹
- D. 急性胰腺炎
- E. 血管性水肿

93. 老年高血压病患者服用含有伪麻黄碱的抗感冒药后，可引起的不良反应是

- A. 血糖升高
- B. 牙龈肿胀
- C. 严重高血压
- D. 膀胱颈梗阻
- E. 血管性水肿

【94～95】

患者，女，44岁，半年前诊断为支气管哮喘，间断口服沙丁胺醇 4mg tid，没有规律用药治疗。近日，因秋、冬季节交替，出现明显憋喘，话不成句，被紧急送往医院。

94. 该患者出现支气管哮喘急性发作，应首选的治疗药物是

- A. 沙丁胺醇片
- B. 布地奈德气雾剂
- C. 沙丁胺醇气雾剂
- D. 沙美特罗-氟替卡松吸入干粉剂
- E. 异丙托溴铵雾化吸入剂

95. 该患者支气管哮喘的长期维持治疗宜选用的药物是

- A. 沙丁胺醇片
- B. 福莫特罗吸入剂
- C. 沙丁胺醇气雾剂
- D. 沙美特罗-氟替卡松吸入干粉剂
- E. 茶碱片

【96～98】

患者，男，65岁，良性前列腺增生症病史3年，高血压病是2年，咳嗽、咳痰10年并伴

有喘息，尤其活动后明显；因近半个月咳嗽加重入院，主诉便秘，长期口服硝苯地平控释片 30 mg qd.，血压控制良好。治疗方案如下：

氨溴索注射液 30 mg tid iv.gtt.

莫西沙星氯化钠注射液 0.4 mg bid. iv.gtt.

异丙托溴铵注射液 0.5 mg bid. 雾化吸入

布地奈德混悬液 1ml bid. 雾化吸入

96. 以上用药中，给药频次错误的是

- A. 硝苯地平控释片
- B. 氨溴索注射液
- C. 异丙托溴铵溶液
- D. 布地奈德混悬液
- E. 莫西沙星氯化钠注射液

97. 查体该患者有踝部水肿，引起此不良反应的药物可能为

- A. 硝苯地平控释片
- B. 氨溴索注射液
- C. 异丙托溴铵溶液
- D. 布地奈德混悬液
- E. 莫西沙星氯化钠注射液

98. 该患者经以上药物治疗后，症状出现好转，却出现了尿潴留，考虑需要调整的药物为

- A. 硝苯地平控释片
- B. 氨溴索注射液
- C. 异丙托溴铵溶液
- D. 布地奈德混悬液
- E. 莫西沙星氯化钠注射液

【99～101】

患者，男，50 岁，诊断为高血压、冠心病。 医师处方：

氨氯地平片 10mg po. qd.

美托洛尔缓释片 47.5mg po. qd.

贝那普利片 20mg po. qd.

阿司匹林肠溶片 100mg po. qd.

辛伐他汀片 40mg po. qd.

99. 药师对该患者的用药指导，错误的是

- A. 氨氯地平片可用于早上服用
- B. 阿司匹林肠溶片必须晚上，餐后服用
- C. 若需减量，美托洛尔缓释片可掰开服用
- D. 阿司匹林肠溶片应整片服用，不能嚼碎
- E. 长期使用美托洛尔缓释片不能自行突然停药，须在医师、药师的指导下逐渐减少剂量

100. 该患者对阿司匹林不耐受，可选用的替代药物是

- A. 华法林片
- B. 双嘧达莫片

- C. 氯吡格雷片
- D. 对乙酰氨基酚片
- E. 布洛芬胶囊

101. 该患者治疗后出现肌肉酸痛，实验室检查提示：肌酸激酶(CK) 2000U/L，应考虑停用的药物是

- A. 氨氯地平片
- B. 美托洛尔缓释片
- C. 贝那普利片
- D. 阿司匹林肠溶片
- E. 辛伐他汀片

【102~104】

患者，女，55岁，因“反复发作胸骨后疼痛2年，伴反酸，胃灼热，间断积食”而就诊。食管测压提示食管下括约肌(LES)压力<6mmHg，结合胃镜检查结果，临床诊断为胃食管反流病，医师处方：奥美拉唑肠溶片 20mg bid 强化抑酸治疗。

102. 关于奥美拉唑肠溶片用药教育的说法，错误的是

- A. 适宜餐前30分钟服用
- B. 应整片吞服
- C. 用药后可能出现口干，便秘等不良反应
- D. 长期用药后可能会出现维生素K缺乏
- E. 长期用药后可能会出现骨质疏松

103. 胃食管反流病的治疗应注意调整生活方式。对于本病例患者调整生活方式的说法，错误的是

- A. 戒烟酒
- B. 餐中多饮水
- C. 控制体重
- D. 避免高脂饮食
- E. 抬高床头

104. 若该患者同时患有高血压，则不宜选用的降压药是

- A. 依那普利片
- B. 缬沙坦胶囊
- C. 硝苯地平缓释片
- D. 氢氯噻嗪片
- E. 珍菊降压片

【105~106】

某女性，19岁，2年前 因上呼吸道感染后逐渐出现甲状腺肿大、伴多汗、多食、消瘦、心悸、烦躁。

105. 该患者首选的药物是

- A. 丙硫氧嘧啶
- B. 碘化钾

- C. 碳酸锂
- D. 放射性¹³¹I治疗
- E. 手术治疗

106. 该药最严重的不良反应是

- A. 皮疹
- B. 粒细胞缺乏
- C. 嗜睡
- D. 肝功能损害
- E. 溶血性贫血

【107~110】

患者，男，52岁，身高168，体重85kg，痛风病史6年。近日因多饮、多尿就诊，实验室检查：空腹血糖7.8mmol/L（正常值：3.9~6.1mmol/L）餐后血糖148mmol/L（正常值：<7.8mmol/L），血尿酸580 μmol（正常值：男性180~440 μmol），血LDL3.7mmol/L（正常值：2.1~3.1mmol/L），肌酐清除率100ml/min。颈动脉彩超提示：动脉粥样硬化，有混合性脂质斑块。临床诊断2型糖尿病、痛风、高脂血症、动脉粥样硬化症。

107. 对该患者的治疗方案，不推荐的是

- A. 低嘌呤饮食
- B. 应用阿司匹林
- C. 适量运动
- D. 控制体重
- E. 应用他汀类药物

108. 该患者首选的降糖药是

- A. 格列齐特
- B. 阿卡波糖
- C. 甘精胰岛素
- D. 那格列奈
- E. 二甲双胍

109. 该患者采用首选降糖药物后，经检测餐前血糖已达标，餐后血糖仍控制不佳，应考虑联合用的降糖药是

- A. 二甲双胍
- B. 格列齐特
- C. 阿卡波糖
- D. 甘精胰岛素
- E. 那格列奈

110. 该患者联合用药后，常见不良反应是

- A. 心律失常
- B. 低血压
- C. ALT升高
- D. 腹胀

E. 水钠潴留

四、多项选择题

111. 书写处方时，必须使用阿拉伯数字的项目有

- A. 药品数量
- B. 药品剂量
- C. 用药时间
- D. 药品用法
- E. 用药疗程

112. 以下有关调配门诊患者处方的注意事项中，正确的包括

- A. 将调配药品置于单剂量药盒后核发
- B. 对麻醉药品等特殊管理药品分别登记账卡
- C. 逐一检查调配药品的批准文号、有效期等
- D. 调配齐全一张处方的药品后，再调配下一张处方
- E. 对需要特殊保存（如“置于 2~10℃ 保存”）的药品加贴醒目标签

113. 以下药品中，属于兴奋剂的有

- A. 麻黄碱
- B. 可卡因
- C. 可待因
- D. 氨茶碱
- E. 苯丙酸诺龙

114. 下列注射液与头孢曲松钠混合可产生肉眼难以观测到的白色细微沉淀的有

- A. 氯化钠注射液
- B. 葡萄糖酸钙注射液
- C. 复方氯化钠注射液
- D. 乳酸钠林格注射液
- E. 复方乳酸钠葡萄糖注射液

115. 药师发药环节应交代的药品贮存条件和方法有

- A. 胰岛素应置于 2~8℃ 保存，随用随拿
- B. 生物制剂及活菌制剂应存放于 2~8℃ 冷藏
- C. 药物都应保存在原始包装中，并不要将药瓶外的标签撕掉
- D. 米索前列醇避免受热与受潮，遇热（20℃）或遇潮则易分解
- E. 外用药品与内服药品分开分开摆放，并置于儿童不能拿到的地方

116. 给药方案制定和调整的基本步骤和方法包括：

- A. 首先获取患者的基本信息
- B. 按群体参数设计初始给药方案，并用此方案进行治疗
- C. 评估患者用药期间的药效学和药动学
- D. 必要时，按所测个体数据重新设计或调整给药方案

E. 实施调整后的给药方案和新的给药方案，并再次评估

117. 口腔溃疡治疗的用药注意事项与患者教育包括

- A. 溃疡数目多、面积大且频繁发作者适宜应用灼烧法
- B. 使用甲硝唑口腔粘贴片治疗期间，不得饮酒或含酒精的饮料
- C. 口腔内真菌感染者禁用地塞米松粘贴片
- D. 使用氯己定含漱液后至少间隔 30min 才可刷牙
- E. 保持口腔清洁卫生

118. 帕金森的药物治疗原则有

- A. 疾病早期适当暂缓用药
- B. 当疾病影响患者的日常生活和工作能力时，则应开始症状性治疗
- C. 药物治疗的目标是延缓病情进展，直至痊愈
- D. 药物治疗坚持“low”和“slow”原则
- E. 治疗要考虑结合共病因素，采取个体化的方案

119. 以下药品中，可能减弱缺铁性贫血患者服用铁剂效果的有

- A. 胰酶
- B. 氨基酸
- C. 抗酸剂
- D. 维生素 C
- E. 碳酸氢钠

120. 关于类风湿性关节炎的糖皮质激素治疗，下列说法正确的是

- A. 小剂量使用
- B. 短期使用
- C. 密切监测血压及血糖变化
- D. 用于关节腔注射，1 年内不宜超过 3 次
- E. 使用糖皮质激素时，需同时补充钙剂和维生素 D

