

110-1

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

**2020 年临床执业医师资格考试
模拟试卷
(医学综合笔试部分)**

报考类别：临床执业医师

第一单元

考试日期：2020 年 8 月 22 日

考试时间：16：30—18：30

考生姓名：_____

准考证号：_____

考场号：_____

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.《执业医师法》明确规定,医师在执业过程中应当履行的职责是

- A.以病人为中心,实行人道主义精神
- B.防病治病,救死扶伤,保护人民健康
- C.防病治病,救死扶伤
- D.遵守职业道德,保护患者隐私
- E.树立敬业精神,尽职尽责为患者服务

2.某地级市卫生行政部门接到举报,称市中心医院妇产科主治医师陶某违反《母婴保健法》及其实施办法相关规定,未经市级卫生行政部门批准擅自从事母婴保健专项技术服务,经查证举报属实,依法给予陶某行政处罚。陶某的违法行为是

- A.擅自开展宫腔镜手术
- B.擅自从事助产技术服务
- C.擅自开展孕妇营养咨询和指导
- D.擅自开展婴儿保健
- E.擅自从事婚前医学检查

3.未经患者或其家属同意,对患者进行实验性治疗的,由卫生行政部门给予的处理是

- A.暂停执业活动 3~6 个月
- B.给予行政处分
- C.暂停执业活动 6 个月~12 个月
- D.吊销医师执业证书
- E.追究刑事责任

4.不按规定使用麻醉药品、精神药物,情节严重的,由卫生行政部门给予的处理是

- A.暂停执业活动 3~6 个月

B.给予行政处分

C.吊销医师执业证书

D.暂停执业活动 6 个月~1 年

E.追究刑事责任

5.医务人员收受药品生产企业的财物,情节不严重时,应对其给予的处罚是

- A.警告
- B.没收违法所得
- C.追究刑事责任
- D.吊销执业证书
- E.罚款

6.因抢救急危患者,未能及时书写病历的,有关医务人员应在抢救结束后据实补记,并加以注明,其期限是

- A.6 小时内
- B.2 小时内
- C.4 小时内
- D.8 小时内
- E.12 小时内

7.男,70 岁。因腹主动脉瘤在某市级医院接受手术治疗,术中发生大出血,经抢救无效死亡。其子女要求复印患者在该医院的全部病历资料,而院方只同意复印其中一部分。根据《医疗事故处理条例》规定,其子女有权复印的病历资料是

- A.疑难病例讨论记录
- B.手术及麻醉记录单
- C.上级医师查房记录
- D.死亡病例讨论记录

- E. 会诊意见
8. 糖尿病患者尿量增多的原因是
- 饮水过多
 - 肾小球滤过率增高
 - 小管液溶质浓度过高
 - 肾交感神经紧张度降低
 - 肾小管重吸收 NaCl 量增加
9. CO₂ 在血液中最主要的运输形式是
- 去氧血红蛋白
 - 氨基甲酰血红蛋白
 - 物理溶解
 - 碳酸氢盐
 - 氧合血红蛋白
10. 肾小球滤过膜中, 阻挡大分子物质滤过的主要屏障是
- 肾小囊脏层足细胞足突
 - 肾小球毛细血管内皮细胞
 - 肾小囊脏层足细胞足突裂隙膜
 - 肾小球毛细血管内皮下基膜
 - 肾小囊脏层足细胞胞体
11. 患者经抗肿瘤治疗后尿检发现大量葡萄糖和氨基酸, 推测其肾单位受损部位是
- 近端小管
 - 肾小球
 - 集合管
 - 髓袢升支粗段
 - 远端小管
12. 肾小管对 HCO₃⁻ 重吸收的叙述错误的是
- 主要在近端小管重吸收
 - 与 H⁺ 的分泌有关
 - 以 CO₂ 的形式重吸收
 - 需碳酸酶的参与
 - 滞后于 Cl⁻ 的重吸收
13. 用力牵拉肌肉时, 肌张力突然降低的原因是
- 肌梭抑制
 - 拮抗剂抑制
 - 骨骼肌疲劳
 - 协同肌兴奋
 - 腱器官兴奋
14. 特异性投射系统的特点是
- 对催眠药和麻醉药敏感
 - 点对点投射到大脑皮层特定区域
 - 上行激活系统是其结构
 - 改变大脑皮层兴奋状态是其功能
 - 弥散投射到大脑皮层广泛区域
15. 能引起骨骼肌神经-肌接头处产生终板电位的神经递质是
- 去甲肾上腺素
 - 谷氨酸
 - 乙酰胆碱
 - 多巴胺
 - 肾上腺素
16. 属于牵涉痛的情况
- 胆囊炎患者 Murphy 征阳性
 - 阑尾炎患者麦氏点压痛阳性
 - 冠心病患者胸骨后疼痛
 - 右下肺炎患者右肩部疼痛
 - 肋间神经炎患者电击样痛
17. 影响神经纤维动作电位幅度的主要因素是
- 刺激强度及刺激时间
 - 细胞内、外的 Na⁺ 浓度差
 - 阈电位水平
 - 锋电位
 - 神经纤维的长度
18. 下列各项生理功能活动中, 属于条件反射的是
- 异物接触角膜引起眼睑闭合
 - 闻到食物香味引起唾液分泌
 - 强光刺激视网膜引起瞳孔缩小
 - 咀嚼、吞咽食物引起胃酸分泌
 - 叩击股四头肌肌腱引起小腿前伸
19. 对脑和长骨的发育最为重要的激素是
- 雌性激素
 - 甲状腺激素
 - 雄性激素
 - 甲状旁腺激素

- E.生长激素
- 20.月经周期中,促进卵泡发育成熟的主要激素是
- A.雌激素
B.人绒毛膜促性腺激素
C.黄体生成素
D.卵泡刺激素
E.孕激素
- 21.引起肺泡回缩的主要因素是
- A.大气压
B.肺内压
C.胸膜腔内压
D.肺泡表面张力
E.支气管平滑肌收缩
- 22.下丘脑控制生物节律日周期节律的关键部位是
- A.室旁核
B.外侧区
C.视前区
D.腹内侧区
E.视交叉上核
- 23.兴奋性突出后电位是由于突出后膜提高了对下列哪些离子的通透性引起的
- A. Na^+ , K^+ ,尤其是 Na^+
B. K^+ , Na^+ ,尤其是 K^+
C. Cl^- , Na^+ ,尤其是 Cl^-
D. Ca^{2+} , Na^+ ,尤其是 Ca^{2+}
E. Ca^{2+} , Na^+ ,尤其是 Na^+
- 24.医患关系出现物化趋势的最主要原因是
- A.患者过多依赖医学高技术的检测手段
B.医学高技术手段的大量应用
C.医院分科越来越细,医生日益专业
D.患者对医生的信任感降低
E.医生工作量加大
- 25.现代医学伦理学中,对生命的看法已转变为
- A.生命价值论
B.生命质量论
C.生命神圣论
D.生命质量与生命价值相统一的理论
E.生命神圣与生命质量生命价值相统一的理论
- 26.1948年,世界医学大会以希波克拉底誓词为蓝本,形成了著名的
- A.《悉尼宣言》
B.《阿拉木图宣言》
C.《日内瓦宣言》
D.《赫尔辛基宣言》
E.《医学伦理学日内瓦协议法》
- 27.下列符合临终关怀伦理要求的做法是
- A.满足临终患者结束生命的要求
B.帮助临终患者抗拒死亡
C.优先考虑临终患者家属的权益
D.尽力满足临终患者的生活需求
E.建议临终患者选择安乐死
- 28.下列符合动物实验伦理要求的是
- A.对医学研究中的低等动物无需考虑人道问题
B.尽可能用高等动物代替低等动物
C.医学研究的科学性不能以牺牲动物的福利为代价
D.尽可能用活体动物代替无知觉的实验材料
E.用尽可能少的实验动物获得尽可能多的实验数据
- 29.由于伦理方面的原因,目前尚未在人类身上成为现实的辅助生殖技术是
- A.体外授精
B.代孕技术
C.无性生殖
D.同源人工授精
E.异源人工授精
- 30.简单的工作因情绪压力而提高学习效率,而复杂的工作则受压力而降低效率的是
- A.沙赫特-辛格的二因素学说
B.阿诺德的认知评价学说

- C.叶克斯-杜德生法则
 D.坎农-巴德法则
 E.詹姆斯-兰格法则
- 31.医患交流中,能够使得沟通更为有效与顺畅的方法是
- A.尽量多用书面沟通
 B.避免表达态度和情感
 C.尽量使用医学术语
 D.善用问句引导话题
 E.提供的信息越多越好
- 32.心理应激对健康影响的生理机制是
- A.心理-神经-免疫机制
 B.心理-神经-内分泌中介机制
 C.塞里的全身适应综合征
 D.心理-神经中介机制
 E.以上都正确
- 33.某种心理测验在某一人群中测查结果的标准量数是
- A.信度
 B.常模
 C.量表
 D.效度
 E.标准化
- 34.精神分析学派认为,在心理地形图中,当前能被注意到的各种心理活动为
- A.想象
 B.意识
 C.前意识
 D.表象
 E.潜意识
- 35.不适合采取心理治疗的心理障碍是
- A.性行为障碍
 B.儿童行为障碍
 C.综合性医院的非精神病
 D.适应问题
 E.精神分裂症急性发作期
- 36.关于随机抽样研究中,下列描述哪项是错误的
- A.采集样本应遵循随机化原则
 B.实行抽样时,要使总体中每个个体都有同等机会被抽到
 C.调查者可在总体中随意抽取任意部分作为样本
 D.抽取的样本对总体要有代表性
 E.严格控制的随机抽样有助于减少样本的偏性
- 37.如果需要比较3~5个月男婴与7~8岁男童的身高变异程度,应采用下列何种指标
- A.x
 B.S
 C.Sx
 D.CV
 E.Sp
- 38.对正态分布曲线的描述错误的是
- A.正态分布曲线以均数为中心
 B.正态分布曲线上下完全对称
 C.正态分布曲线是左右完全对称的钟形曲线
 D.正态分布曲线由两个参数固定
 E.正态分布曲线在横轴均数上方所在处曲线为最高点
- 39.有关筛检,错误的是
- A.目的是早期发现罕见病病例
 B.应能迅速出结果
 C.筛检试验应费用低廉
 D.检查对象为表面上无病的人
 E.筛检试验应对人体无害
- 40.两样本均数比较的t检验,其目的是检验
- A.两样本均数是否相等
 B.两样本所属的总体均数是否相等
 C.两样本所属总体的均数相差有多大
 D.两样本所属总体的均数为多大
 E.两样本均数相差有多大
- 41.某医师欲采用横断面调查研究的方法,调查高血压病在人群中的分布情况,选择最合适的指标为

- A.病死率
B.发病率
C.死亡率
D.患病率
E.二代发病率
- 42.某学者在某镇开展了一项持续多年的啤酒狂欢节饮酒者与心血管疾病死亡关系的研究。研究初,有70名啤酒狂欢节饮酒者和1500名未饮酒者,在研究结束时,7名啤酒狂欢节饮酒者死于心血管疾病,45名啤酒狂欢节未饮酒者死于心血管疾病。该研究为
- A.生态学研究
B.临床试验
C.病例对照研究
D.队列研究
E.横断面研究
- 43.分析胎儿不同出生体重和围产儿死亡率之间是否有关,可以选用的统计方法是
- A.t 检验
B.F 检验
C. X^2 检验
D.相关分析
E.秩和检验
- 44.肌肉组织中氨基酸脱氨基的主要方式是
- A.转氨基作用
B.氧化脱氨基作用
C.联合脱氨基作用
D.嘌呤核苷酸循环
E.非氧化脱氨基作用
- 45.下列关于尿素循环的叙述正确的是
- A.分解尿素提供能量
B.全部在线粒体内发生
C.将有毒的物质转变为无毒的物质
D.合成尿素不需要能量
E.全部在细胞质内进行
- 46.不参加尿素循环的氨基酸是
- A.赖氨酸
B.精氨酸
C.鸟氨酸
D.天冬氨酸
E.精氨酸代琥珀酸
- 47.将骨骼肌中生成的氨转运至肝的主要氨基酸是
- A.亮氨酸
B.缬氨酸
C.甘氨酸
D.脯氨酸
E.丙氨酸
- 48.一碳单位的载体是
- A.二氢叶酸
B.四氢叶酸
C.生物素
D.焦磷酸硫胺素
E.硫辛酸
- 49.嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸合成的共同原料是
- A.丙氨酸
B.谷氨酸
C.甘氨酸
D.天冬酰胺
E.天冬氨酸
- 50.运输内源性甘油三酯的脂蛋白是
- A.IDL
B.VLDL
C.LDL
D.CM
E.HDL
- 51.胆固醇不能转化为
- A.维生素 D
B.雄激素
C.雌激素
D.醛固酮
E.胆色素
- 52.下列关于酮体的描述错误的是
- A.酮体包括乙酰乙酸, β -羟丁酸和丙酮
B.合成原料是丙酮酸氧化生成的乙

酰 CoA

- C.可以在肝的线粒体内生成
- D.酮体只能在肝外组织氧化
- E.酮体是肝输出能量的一种形式

53.下列关于胆色素的叙述,正确的是

- A.以血红素为主要成分
- B.胆汁酸为其代谢终产物
- C.在血中主要与球蛋白结合而运输
- D.铁卟啉化合物的分解代谢产物
- E.可以转变成细胞色素

54.可抑制细胞氧化磷酸化速率的物质是

- A.磷酸戊糖
- B.胰岛素
- C.细胞色素 C
- D.一氧化碳
- E.磷酸激酶

55.大鼠出生后饲以去脂饮食,结果将引起下列哪种脂质缺乏

- A.磷脂酰胆碱
- B.甘油三脂
- C.鞘磷脂
- D.胆固醇
- E.前列腺素

56.体内脂肪大量动员时,肝内生成的乙酰 CoA 主要生成

- A.胆固醇
- B.二氧化碳和水
- C.葡萄糖
- D.酮体
- E.草酰乙酸

57.关于脂肪酸 β 氧化的叙述错误的是

- A.酶系存在于线粒体中
- B.不发生脱水反应
- C.需要 FAD 及 NAD^+ 为受氢体
- D.脂肪酸的活化是必要的步骤
- E.每进行一次 β 氧化产生 2 分子乙

酰 CoA

58.与“黑死病”有关的病原菌是

- A.炭疽芽胞杆菌

- B.幽门螺杆菌
- C.白喉棒状杆菌
- D.嗜肺军团菌
- E.鼠疫耶氏菌

59.以下不能引起性病的病原微生物是

- A.梅毒螺旋体
- B.沙眼衣原体
- C.风疹病毒
- D.解脲支原体
- E.淋球菌

60.淋病奈瑟菌的形态特点是

- A.革兰阴性双球菌
- B.革兰阴性球杆菌
- C.革兰阴性螺形菌
- D.革兰阳性四联球菌
- E.革兰阳性链球菌

61.老年人动脉粥样硬化引起的脑萎缩属于

- A.神经性萎缩
- B.废用性萎缩
- C.压迫性萎缩
- D.营养不良性萎缩
- E.生理性萎缩

62.下列病变中属于不可逆性改变的是

- A.细胞水肿
- B.线粒体膜破裂
- C.核碎裂
- D.线粒体肿胀
- E.粗面内质网脱颗粒

63.慢性支气管炎患者发生阻塞性通气功能障碍的病变基础是

- A.支气管,上皮细胞变性、坏死
- B.支气管平滑肌萎缩
- C.支气管软骨萎缩、纤维化
- D.支气管腺体增生、肥大
- E.细支气管炎及细支气管周围炎

64.细胞坏死的主要形态学特征是

- A.核分裂
- B.细胞核异型

- C. 线粒体肿胀
D. 细胞核碎裂
E. 细胞质脂质增多
65. 梗死与坏疽的主要区别是
A. 动脉阻塞的程度
B. 静脉回流的好坏
C. 有无明显腐败菌感染
D. 病变的严重程度
E. 发生的部位
66. 肝硬化时, 脾肿大的主要原因是
A. 脾窦巨噬细胞增多
B. 脾索纤维组织增生
C. 脾窦淋巴细胞聚集
D. 淋巴小结内大量中性粒细胞浸润
E. 脾窦扩张红细胞淤滞
67. 下列哪种组织细胞再生能力最强
A. 骨组织
B. 神经节细胞
C. 上皮细胞
D. 心肌细胞
E. 平滑肌细胞
68. 下列哪种新生的细胞是机化时出现的特征细胞
A. 平滑肌细胞
B. 成纤维细胞
C. 类上皮细胞
D. 横纹肌细胞
E. 上皮细胞
69. 男, 45 岁。HBsAg(+) 20 年。超声检查: 肝脏回声不均匀, 脾大, 门静脉增宽, 中等量腹水。肝穿刺病理的特征性发现是
A. 肝细胞变性坏死
B. 弥漫性肝纤维化
C. 肝细胞气球样变
D. 毛细胆管胆汁淤积
E. 假小叶形成
70. 栓塞时常伴有 DIC 发生, 主要见于下列哪种栓塞
A. 血栓栓塞
B. 脂肪栓塞
C. 羊水栓塞
D. 空气栓塞
E. 化脓菌栓塞
71. 急性心力衰竭导致下列哪项病变
A. 肺气肿
B. 肺不张
C. 肺水肿
D. 肺脓肿
E. 肺褐色硬化
72. 股骨骨折后因处理不当, 大量脂肪滴进入血液, 该脂肪栓子常栓塞于
A. 左心室
B. 左心房
C. 肺静脉及其分支
D. 主动脉分支
E. 肺动脉及其分支
73. 贫血性梗死主要发生于
A. 心, 肠, 肾
B. 心, 肺, 脾
C. 心, 肾, 脾
D. 大脑, 肺, 肾
E. 小肠, 肝, 心
74. 硫脲类抗甲状腺作用是由于
A. 抑制垂体前叶促甲状腺素的分泌
B. 抑制甲状腺对碘的摄取
C. 抑制碘离子的氧化和碘化酪氨酸的缩合
D. 抑制甲状腺球蛋白的水解, 使甲状腺素释放减少
E. 加速甲状腺素的破坏
75. 延缓肠道碳水化合物吸收的是
A. 磺脲类降血糖药
B. 双胍类降血糖药
C. α -葡萄糖苷酶抑制剂
D. 噻唑烷二酮类
E. 胰岛素
76. 关于第三代头孢菌素的特点描述正确的是

A.对铜绿假单胞菌作用较弱
 B.主要用于轻、中度呼吸道和尿路感染
 C.对革兰阴性菌有较强的作用
 D.对肾脏毒性较第一、二代头孢菌素大
 E.对 β 内酰胺酶的稳定性较第一、二代头孢菌素低

77.红霉素是下列哪种疾病的首选用药

- A.支原体肺炎
- B.感染性心内膜炎
- C.立克次体感染
- D.斑疹伤寒
- E.泌尿道感染

78.对铜绿假单胞菌作用最强的氨基苷类抗生素是

- A.卡那霉素
- B.庆大霉素
- C.阿米卡星
- D.妥布霉素
- E.链霉素

79.普萘洛尔的药理作用为

- A.松弛支气管平滑肌
- B.升高眼内压
- C.拮抗交感神经活性
- D.促进肾素释放
- E.促进血小板聚集

80.延缓普鲁卡因局部吸收的药物是

- A.去甲肾上腺素
- B.异丙肾上腺素
- C.胰岛素
- D.肾上腺素
- E.庆大霉素

81.不属于苯二氮草类药物的作用特点是

- A.具有抗焦虑作用
- B.具有外周性肌松作用
- C.具有催眠作用
- D.具有镇静作用
- E.用于癫痫持续状态

82.下列哪一作用与阿司匹林引起的反应无关

- A.上腹不适、恶心、呕吐
- B.出血时间延长
- C.荨麻疹
- D.头痛、眩晕、耳鸣、视听力减退
- E.口干、出汗、心悸

83.增加左旋多巴抗帕金森氏病疗效,减少不良反应的药物是

- A.卡比多巴
- B.维生素B₆
- C.利血平
- D.苯乙肼
- E.丙胺太林

84.产妇临产前2~4小时内不宜使用的药物是

- A.哌替啶
- B.丙磺舒
- C.阿司匹林
- D.喷他佐辛
- E.布洛芬

85.下列药物中对脑血管具有较强扩张作用的钙拮抗药是

- A.硝苯地平
- B.维拉帕米
- C.尼群地平
- D.地尔硫革
- E.尼莫地平

86.胎儿娩出前2~4小时内不宜使用的镇痛药物是

- A.喷他佐辛
- B.哌替啶
- C.布洛芬
- D.对乙酰氨基酚
- E.丙磺舒

87.治疗细菌性痢疾最常选用的药物是

- A.磺胺嘧啶
- B.多西环素
- C.妥布霉素
- D.阿米卡星
- E.庆大霉素

- 88.关于新型隐球菌的特点,下列哪项错误
- 主要经消化道传播
 - 主要存在于土壤和鸽粪中
 - 多数是外源性感染
 - 最易侵犯中枢神经系统
 - 菌体外有肥厚的荚膜
- 89.初次体液免疫应答产生抗体的特点是
- 滴度高
 - 亲和力低
 - 主要为 IgG
 - 主要为 IgA
 - 持续时间长
- 90.关于 IL-2 的生物学效应,错误的是
- 以自分泌和旁分泌方式发挥作用
 - 抑制 Th1 细胞分泌 IFN- γ
 - 增强 NK 细胞、单核细胞的杀伤活性
 - 促进 T 细胞和 B 细胞的增殖分化
 - 诱导 LAK 细胞形成
- 91.属于 II 型超敏反应性疾病的是
- 过敏性休克
 - 血清病
 - 荨麻疹
 - 过敏性鼻炎
 - 新生儿溶血
- 92.属于黏膜免疫系统的免疫器官是
- 扁桃体
 - 脾脏
 - 骨髓
 - 胸腺
 - 肝脏
- 93.解除免疫耐受的方法是
- 注射大量耐受原
 - 注射糖皮质激素
 - 注射与耐受原有共同抗原决定簇的抗原
 - 切除动物胸腺
 - 以亚致死量 X 线照射动物
- 94.与自身免疫性疾病的发生无关的是
- 长期使用广谱抗生素
 - 某些与自身组织成分具有共同抗原性的微生物感染
 - 自身组织或器官 MHC-II 类抗原的异常表达
 - 隐蔽抗原的释放
 - 机体免疫系统功能失常
- 95.作为乙型肝炎病毒感染者,哪种指标是病毒复制的标志
- HBeAg
 - HBsAg
 - HBcAg
 - 抗 HBe
 - 抗 HBs
- 96.树突状细胞有别于其他 APC 的特点是
- 刺激活化的 T 细胞增殖
 - 刺激记忆 T 细胞增殖
 - 刺激初始 T 细胞增殖
 - 刺激 CD4⁺T 细胞增殖
 - 刺激 CD8⁺T 细胞增殖
- 97.与 B 细胞活化第二信号产生密切相关的膜表面分子间的作用是
- B7 分子与 CD28 分子之间的相互作用
 - CD4 分子与 MHC-II 类分子间的相互作用
 - BCR-Ig α /Ig β 复合物与抗原间的相互作用
 - IL-2 与 IL-2R 间的相互作用
 - CD40L 与 CD40 分子间的相互作用
- 98.女,32 岁。神经衰弱 3 个月余,未经治疗,主要表现为头痛,失眠,脑力疲乏,精神易兴奋。应选择的治疗药物是
- 利培酮
 - 氯氮平
 - 地西泮
 - 喹硫平
 - 氯丙嗪
- 99.女,43 岁。乏力、厌食、嗜睡 5 年,逐渐加重 2 年,20 年前产后大出血休克,昏迷

7 小时,产后闭经至今。具体治疗不详,近 3 年多中断治疗。首选的治疗药物是

- A. 雌激素
- B. 血管加压素
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 孕激素
- E. 左旋甲状腺素钠

100. 女,30 岁。3 个月来工作较累,近 3 周来出现兴趣缺乏,易疲劳,言语少,动作迟缓,自觉脑子笨,没有以前聪明,早醒,食欲减退,腹胀,便秘,全身酸痛,有时感心悸、气急。总觉自己患了不治之症,给家庭带来许多麻烦。该患者最可能的诊断是

- A. 焦虑症
- B. 抑郁症
- C. 疑病症
- D. 神经衰弱
- E. 心身疾病

101. 男,30 岁。饥饿性上腹痛 2 年,进食后可缓解。胃镜检查:十二指肠溃疡愈合期,快速尿素酶试验阳性。最有效的治疗方案是

- A. 奥美拉唑+枸橼酸铋钾+克拉霉素
- B. 法莫替丁+阿莫西林+克拉霉素
- C. 西咪替丁+克拉霉素+诺氟沙星
- D. 奥美拉唑+阿莫西林+替硝唑
- E. 奥美拉唑+硫糖铝

102. 女,40 岁。闭经、溢乳半年,磁共振发现垂体 1.5 cm×1.0 cm 占位病变,需做激素检查。下列无助于诊断的检查是

- A. 血管加压素
- B. 生长激素
- C. 促肾上腺皮质激素
- D. 泌乳素
- E. 促甲状腺激素

103. 女,26 岁。患重症肌无力 5 年,因感臀后肌无力加重,大量服用溴化吡啶斯的明后出现流口水、大量出汗、肌束颤动、腹痛。此种表现是由于

- A. 乙酰胆碱(ACh)神经元的后发放

- B. 中枢 ACh 神经元传递减慢
- C. 神经肌肉接头处 ACh 兴奋传递加速
- D. ACh 毒蕈碱样作用亢进
- E. ACh 烟碱样作用亢进

104. 男,56 岁。间断发热 1 个月,进行性少尿、咯血 10 天,查体:BP 165/100 mmHg,双肺听诊可闻及湿啰音。双下肢水肿。尿常规:蛋白(++)。尿沉渣镜检:RBC40~50/HP。血肌酐 455 μmol/L,血尿素 18.5 mmol/L,ANA(-),抗中性粒细胞胞浆抗体(+). B 超示双肾增大。该患者肾脏最可能的病理特征是

- A. 肾小球纤维化,玻璃样变
- B. 弥漫性 GBM 增厚,钉突形成
- C. 新月体形成
- D. 系膜局灶性节段性增宽或弥漫性增宽
- E. 系膜局灶性节段性硬化、玻璃样变性

105. 男,34 岁。腰背部疼痛 3 个月,伴有乏力、盗汗。查体:双下肢感觉、运动功能正常。X 线显示椎间隙狭窄,腰大肌影增宽。最适宜的治疗方法是

- A. 局部注射抗感染药物
- B. 加强腰背肌锻炼
- C. 腰背部理疗按摩
- D. 抗结核药物治疗
- E. 立即行病灶清除手术

106. 女,34 岁。右下肢浅静脉迂曲扩张,长期不予外理,并发症不包括

- A. 色素沉着
- B. 皮肤和皮下硬结
- C. 难愈性溃疡
- D. 足趾坏死
- E. 皮肤萎缩

107. 男,27 岁。3 年来劳累时感心前区闷痛及头晕。查伴:胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及 4/6 级收缩期喷射样杂音,无震颤。可使杂音减轻的因素是

- A. 静脉推注毛花苷丙
- B. 静脉滴注硝酸甘油

- C.口服硝酸异山梨酯
D.口服地高辛
E.口服美托洛尔
- 108.某患者咳嗽、发热3天到医院诊,被医院初步诊断为疑似人感染高致病性禽流感,应住院治疗,但患者以工作离不开为由予以拒绝。医院对该患者应采取的措施是
A.定期随诊
B.立即单独隔离治疗
C.请示卫生行政部门
D.居家观察
E.尊重患者的自主决定权
- 109.初产妇,妊娠40周,产力正常,胎心140次/分,头位,双顶径10 cm,先露浮,宫口2 cm,对角径11 cm。正确的处理是
A.剖宫产
B.葡萄糖静脉滴注
C.继续观察产程进展
D.哌替啶肌内注射
E.稀释缩宫素静滴
- 110.男,6个月。患法洛四联症,2天来反复于哭闹时突然四肢抽搐,青紫加重,神志不清,呼吸急促,持续时间约2~3分钟。主要原因是
A.心包炎
B.脑栓塞
C.心力衰竭
D.脑炎
E.肺动脉梗阻
- 111.男,35岁。持续高热、恶心、呕吐、食欲不振伴腹泻5天入院。查体:皮肤、巩膜轻度黄染,胸部可见数枚淡红色斑丘疹,脾脏肋下可触及。实验室检查:血WBC $3.2 \times 10^9/L$, Plt $100 \times 10^9/L$, ALT 140U/L, TBil $145 \mu\text{mol/L}$ 。肥达反应O 1:32。该疾病的特征性病理变化是
A.肠黏膜淤血水肿
B.全身单核巨噬细胞系统增生
C.嗜酸性脓肿
D.中性粒细胞浸润
E.干酪样坏死性肉芽肿
- 112.男,74岁。COPD患者,近来活动耐力下降就诊,针对患者因迷走神经张力过高所致气道狭窄,宜选用的药物是
A.白三烯调节剂
B.异丙托溴铵
C.吸入型糖皮质激素
D.沙丁胺醇
E.茶碱
- 113.男,65岁。腹部手术后出现疼痛,使用吗啡镇痛治疗,复查血气示pH 7.32, PaCO₂ 50 mmHg, PaO₂ 54 mmHg,该患者低氧血症最可能的发生机制是
A.肺内分流
B.氧耗量增加
C.弥散功能障碍
D.肺泡通气量下降
E.通气/血流比例失衡
- 114.男,65岁。间断腹胀、上腹隐痛25年。胃镜检查提示:胃体黏膜变薄,血管透见,皱襞稀疏患者可能缺乏的维生素是
A.维生素B₄
B.维生素B₁₂
C.维生素C
D.维生素B₂
E.维生素D
- 115.男,32岁。因肝损伤急症手术。曾患甲型肝炎已治愈。术中见肝右叶外侧5 cm裂口,深3 cm 术后肝肾功能检查正常,食欲、体力恢复正常。肝脏损伤得以顺利修复,从内环境分析,主要起再生作用的是
A.不稳定细胞
B.稳定细胞
C.纤维细胞
D.肥大细胞
E.永久性细胞
- 116.男,15岁。因发热、乏力、刷牙时牙龈出血1周入院。查体:T 38.5℃,牙龈肿胀,胸骨压痛(+),双下肢小腿出现散在出血

点及痕斑。血常规: Hb 80 g/l, WBC $10.1 \times 10^9/L$, PLT $30 \times 10^9/L$; 骨髓增生极度活跃, 原始细胞占 0.60, POX 染色呈弱阳性, 非特异性酯酶染色阳性, 可被 NaF 抑制, 该患者原始细胞最可能的免疫表型是

- A. CD8⁺
- B. CD41⁺
- C. CD14⁺
- D. CD3⁺
- E. CD4⁺

117. 男, 31 岁。右小腿被撞伤, 创口出血, 骨外露 24 小时。X 线片示右胫腓骨下段粉碎性骨折, 最易出现的并发症是

B1 型题

- A. 感染
- B. 神经血管损伤
- C. 骨筋膜室综合征
- D. 坠积性肺炎
- E. 急性骨萎缩

118. 男, 38 岁支气管哮喘。用“沙美特罗/氟替卡松”每日 3 次, 效果仍然不佳, 则应采取的措施是

- A. 加大药物用量
- B. 加用茶碱类药物
- C. 加用酮替芬
- D. 色甘酸钠
- E. 加用白三烯调节剂口服

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(119~120 题共用备选答案)

- A. apo A I
- B. apo A II
- C. apo B100
- D. apo C I
- E. apo C II

119. 能作为 LPL 激活剂的是

120. 能被 HDL 受体识别的是

(121~122 题共用备选答案)

- A. CAP
- B. 操纵基因
- C. 辅阻遏蛋白
- D. 启动子
- E. 阻遏蛋白

121. 参与乳糖操纵子正性调控的蛋白因子是

122. 与辅阻遏物结合后才与操纵基因结合的成分是

(123~125 题共用备选答案)

- A. 乳头状瘤

B. 移行细胞癌

C. 血管肉瘤

D. 畸胎瘤

E. 脂肪瘤

123. 来源于上皮组织的恶性肿瘤是

124. 含有多个胚房成分的肿瘤是

125. 来源于间叶组织的恶性肿瘤是

(126~127 题共用备选答案)

A. 肺炎链球菌

B. 葡萄球菌

C. 铜绿假单胞(绿脓杆)菌

D. 克雷伯杆菌

E. 肺炎支原体

126. 不引起肺组织坏死和空洞形成的肺炎致病菌是

127. 最易引起间质性肺炎改变的致病菌是

(128~129 题共用备选答案)

A. 气道阻力增大

B. 肺泡容易扩张

C. 肺顺应性增大

- D.肺泡表面张力增大
E.肺活量增加
- 128.肺泡表面活性物质分泌减少,将使
- 129.迷走神经兴奋时
(130~131 题共用备选答案)
- A.6-磷酸果糖-1,6-双磷酸果糖
B.3-磷酸甘油酸—丙酮酸
C.丙酮酸—乳酸
D.6-磷酸葡萄糖-6-磷酸果糖
E.丙酮酸-乙酰 CoA
- 130.需消耗 ATP 的过程是
- 131.发生底物水平磷酸化的过程是
(132~133 题共用备选答案)
- A.乙酰胺
B.异丙嗪
C.氯丙嗪
D.地西洋
E.苯妥英钠
- 132.治疗脊髓损伤引起肌强直的药物是
- 133.治疗癫痫大发作和局限性发作的药物是物是
(134~136 题共用备选答案)
- A.窦道
B.糜烂
C.空洞
D.瘘管
E.溃疡
- 134.肺内干酪样坏死灶液化并经支气管排出形成
- 135.慢性宫颈炎局部黏膜上皮坏死脱落形成
- 136.慢性化脓性骨髓炎向皮肤表面破溃后形成
(137~138 题共用备选答案)
- A.软骨细胞瘤
B.骨母细胞瘤
C.神经纤维细胞瘤
D.髓母细胞瘤
E.成熟性畸胎瘤
- 137.属于恶性肿瘤的是
- 138.含有 2 个胚层以上的肿瘤是
(139~140 题共用备选答案)
- A.支原体
B.衣原体
C.病毒
D.真菌
E.立克次体
- 139.无细胞壁的原核细胞型微生物是
- 140.具有典型细胞核和完善细胞器的微生物是生物是
(141~142 题共用备选答案)
- A.2 日
B.7 日
C.3 日
D.1 日
E.5 日
- 141.急诊处方的用药日数一般不得超过
- 142.普通处方的用药日数一般不得超过

A3/A4 型题**答题说明**

以下提供若干个案例,每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- (143~145 题共用题干)
- 男,68 岁。排便时突然跌倒,意识丧失,呼吸断续,有陈旧心肌梗死和糖尿病病史,
- 无高血压病史,诊断为心脏骤停。
- 143.该患者既往超声心动图检查未发现异常,其心脏骤停最可能的病因是

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 预激综合征
- C. 冠心病
- D. 梗阻性肥厚型心肌病
- E. 主动脉夹层

144. 心电图示心搏停顿, 此时首选的药物是

- A. 普鲁卡因酰胺
- B. 胺碘酮
- C. 普罗帕酮
- D. 肾上腺素
- E. 碳酸氢钠

145. 最佳的给药途径是

- A. 皮下注射
- B. 心内注射
- C. 肌肉注射
- D. 气管内给药
- E. 静脉注射

(146~147 题共用题干)

男, 40 岁。烧伤后 3 小时入院。疼痛剧烈, 感口渴。面色苍白, 心率 150 次/分, BP 85/65 mmHg, 头颈部、躯干部布满大小不等水疱, 可见潮红创面。两上肢呈焦黄色无水疱。

146. 该病员的烧伤总面积估计为

- A. 7×9%
- B. 6×9%
- C. 5×9%
- D. 4×9%
- E. 3×9%

147. 该病员 III 度烧伤面积为

- A. 1×9%
- B. 2×9%
- C. 3×9%
- D. 4×9%
- E. 5×9%

(148~150 题共用题干)

女, 26 岁。足月妊娠, 临产 10 小时, 宫口扩张 2 cm, 自觉下腹部持续疼痛, 孕归烦躁不安, 疼痛喊叫, 宫缩频率高, 子宫下段收缩最强

148. 患者初步诊断是

- A. 正常分娩
- B. 协调性宫缩乏力
- C. 不协调性宫缩乏力
- D. 胎位不正
- E. 骨盆狭窄

149. 患者最可能的原因是

- A. 子宫畸形
- B. 羊水过多
- C. 多胎妊娠
- D. 巨大胎儿
- E. 头盆不称

150. 此时应首选的措施是

- A. 静脉滴注缩宫素
- B. 肌肉注射哌替啶
- C. 行剖宫产
- D. 人工破膜
- E. 无需任何处理

本单元试卷到此结束

参考答案

第一单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	E	C	C	B	A	B	C	D	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	E	E	B	C	D	B	B	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	E	A	B	E	C	D	E	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	E	B	B	E	C	D	B	A	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	D	C	D	C	A	E	B	E	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	B	D	D	E	D	E	E	C	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	C	E	D	C	E	C	B	E	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	E	C	C	C	C	A	D	C	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	E	A	A	E	B	E	A	B	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
E	A	C	A	A	C	E	C	C	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	A	A	C	D	D	E	B	A	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
B	B	D	B	B	C	A	E	E	A

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	E	B	D	C	A	E	D	A	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	D	E	C	B	A	D	E	A	D
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	B	C	D	E	B	B	C	E	B

8.【解析】本题考核尿液生成的调节。肾小管液中形成的渗透压,是抵抗肾小管重吸收水分的力量。糖尿病患者由于肾小管不能将葡萄糖完全重吸收回血,使小管液中的葡萄糖含量增多,小管液溶质浓度过高,渗透压增高,从而阻碍水和 NaCl 的重吸收。故本题正确答案为 C。

10.【解析】本题考核肾小球的滤过膜。肾小球的滤过膜由毛细血管内皮细胞、内皮下基膜、肾小囊脏层上皮足细胞构成,其主要屏障作用的是基膜,基膜是阻挡大分子物质的机械屏障。故本题正确答案为 D。

11.【解析】本题考核肾小管的转运功能。近端小管是大部分物质的主要重吸收部位,滤过液中的约 67% Na^+ 、 Cl^- 、 K^+ 和水被重吸收,还有 85% 的 HCO_3^- 以及全部的葡萄糖、氨基酸都在此被重吸收。故本题正确答案为 A。

12.【解析】本题考核肾小管对 HCO_3^- 重吸收的特点。 HCO_3^- 是以 CO_2 形式重吸收,肾小管对 HCO_3^- 重吸收优先于 Cl^- 的重吸收,若 HCO_3^- 滤过量超过 H^+ 的分泌量,多余部分随尿排出。故本题正确答案为 E。

13.【解析】本题考核腱器官的作用。当肌肉受到牵拉时,首先兴奋肌梭而发动牵张反射,导致受牵拉的肌肉收缩;当牵拉进一步加大时,兴奋腱器官,使牵张反射受到抑制,这样可避免牵拉的肌肉受到损伤。故本题正确答案为 E。

14.【解析】本题考核特异性投射系统的特点。特异性投射系统是指丘脑特意感觉接替核及其投射至大脑皮层神经通路,其特点为:①投射的细胞群为丘脑的第一、第二细胞;②投向大脑皮层的特定区域;③是点对点的投射;④引起特定感觉,激发大脑皮层发出神经冲动;⑤不受药物的影响。故本题正确答案为 B。

16.【解析】本题考核牵涉痛的概念及临床疾病。牵涉痛是指某些内脏疾病引起远隔的体表部位发生疼痛或痛觉过敏。常见牵涉痛:冠心病心肌缺血时心前区、左肩和左上臂疼痛;胆囊炎、胆石症发作时右肩区疼痛;阑尾炎时上腹部、脐周疼痛;肾结石腹股沟区疼痛,右下肺炎患者右肩部疼痛为牵涉痛。故本题正确答案为 D。

17.【解析】本题考核兴奋性突触后电位的离子通透性的特点。兴奋性突触后电位是由于突触后膜对钠、钾离子的通透性增加,发生的局部去极化电位;抑制性突触后电位是由于突触后膜对 Cl^- 离子的通透性增加,突触后膜发生的局部超极化电位;故本题正确答案为 B。

18.【解析】本题考核条件反射。条件反射是指通过后天的学习训练而形成的反射,使

机体适应环境的变化,如闻到食物香味引起唾液分泌。非条件反射是指生来就有的、数量有限、比较固定和形成低级的反射活动,包括防御反射、食物反射、性反射、吸吮反射等。其余选项都是由反射弧组成的反射。故本题正确答案为 B。

19.【解析】本题考核甲状腺激素的作用。甲状腺激素是胎儿和新生儿脑发育的关键激素,是影响神经系统发育最重要的激素,特别是对骨和大脑的发育尤为重要。故本题正确答案为 B。

36.【解析】本题考核调查或研究的随机化原则。随机不等于随意,要抽取具有代表性的样本,贯彻随机化原则是提高组间均衡性的一个重要手段。故本题正确答案为 C。

37.【解析】本题考核变异系数概念和意义的理解。变异系数(CV)是衡量资料中各观察值变异程度的统计量。主要用于:观察值度量单位不同时变异大小的比较,如身高与体重变异程度的比较;均数相差悬殊时,儿童身高与成人身高变异程度的;变异系数越大,表示变异程度越大。故本题正确答案为 D。

38.【解析】本题考核正态分布曲线的特点。正态分布曲线又名高斯分布,因形态也称钟型曲线,有以下特征:①正态曲线在横轴上方均数处最高;②正态分布以均数为中心,左右对称,而非上下对称;③正态分布有两个参数固定,即均数和标准差,均数决定曲线的位置,标准差决定曲线的形状;④正态曲线下面积的分布有一定规律。故本题正确答案为 B。

40.【解析】本题考核 t 检验的意义。假设检验也称显著性检验,是统计推断的主要内容,其目的是比较样本代表的总体参数之间有无差别。其基本思想是首先通过对所需比较的总体提出一个无差别的假设,然后通过样本数据看是否拒绝这个假设。因此,两样本均数比较的 t 检验,其实际目的是检验两样本所属(所代表)的总体均数是否相等。故本题正确答案为 B。

41.【解析】本题考核疾病分布常用指标。①病死率是指一定时期内,患某病的全部患者中因该病死亡者所占的比例,即该病死亡人数/患该病人数,主要用于说明疾病的严重程度,也可用来反应医疗水平和诊断能力;②发病率是表示特定人群在一定时间内(一般为一年)发生某病新病例出现的频率;③患病率指某特定时间内总人口中某病新旧病例所占的比值,适用于病程长的慢性病或流行情况,患病率=新旧病例/平均人口数;④死亡率是指在一定时间内(一般为一年),某人群中死于某病(或死于所有原因)的频率;⑤继发率又称“二代发病率”,指某传染病易感接触者中,在最短潜伏期最长潜伏期之间发病的人数占所有易感人群者总数的百分率。故本题正确答案为 D。

43.【解析】本题考核统计学假设检验方法的选择。 X^2 检验又称卡方检验。它是处理测试数据的一种常用方法,在分类变量资料的统计推断中的应用,包括:两个率或两个构成比比较的卡方检验;多个率或多个构成比的比较的卡方检验,以及分类资料的相关分析等。题干中说胎儿不同出生体重和围产儿死亡率之间是否有关,属于分类变量资料两个率的比较,故用 X^2 检验。故本题正确答案为 C。

44.【解析】本题考核肌肉中氨基酸脱氨基的方式。人体中氨基酸主要是在 L-谷氨酸脱氢酶的作用下与 α -酮戊二酸联合脱氨基,但肌肉中 L-谷氨酸脱氢酶活性低,主要以嘌呤核苷酸循环的方式脱氨基。故本题正确答案为 D。

45.【解析】本题考核尿素循环。尿素循环也称鸟氨酸循环,氨基酸代谢脱下的 NH_3 在

肝内通过鸟氨酸循环形成无毒无害的尿素,是体内氨的主要去路。鸟氨酸循环主要经历 5 个步骤:除第一步是在线粒体进行的,其余四步都是在细胞质内进行的。尿素合成需要消耗 3 分子 ATP。其限速酶为:氨基甲酰磷酸合成酶。故本题正确答案为 C。

46.【解析】本题考核尿素循环。尿素循环也称鸟氨酸循环,氨基酸代谢脱下的 NH_3 在肝内通过鸟氨酸循环形成尿素,是体内氨的主要去路。鸟氨酸循环主要经历 5 个步骤:①在肝细胞线粒体中 NH_3 、 CO_2 、ATP 缩合成氨基甲酰磷酸;②在氨基甲酰磷酸与鸟氨酸反应生成瓜氨酸;③瓜氨酸与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸;④精氨酸代琥珀酸裂解成精氨酸和延胡索酸;⑤精氨酸水解释放尿素再次生成鸟氨酸,鸟氨酸再次参与第二步生成瓜氨酸。故本题正确答案为 A。

47.【解析】本题考核骨骼肌中氨基酸的代谢途径。肌肉中的氨以无毒的丙氨酸形式运输到肝,丙氨酸脱下的氨在肝合成尿素,脱氨后形成的丙酮酸异生成葡萄糖经血液循环运回肌肉。故本题正确答案为 E。

48.【解析】本题考核一碳单位的载体。一碳单位的载体是四氢叶酸,是合成嘌呤和嘧啶的原料,是联系氨基酸和核酸之间的纽带。故本题正确答案为 B。

49.【解析】本题考核嘌呤和嘧啶的合成原料。嘌呤的合成有两条途径,①从头合成,主要原料为:甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺、 CO_2 、磷酸戊糖、一碳单位;②补救合成,游离的嘌呤碱基、磷酸核糖焦磷酸;嘧啶合成有两条途径,①从头合成,主要原料为:天冬氨酸、谷氨酰胺、 CO_2 、磷酸戊糖;谷氨酰胺+ HCO_3^- 合成氨基甲酰磷酸;②补救合成,嘧啶碱基和嘧啶核糖焦磷酸。故本题正确答案为 E。

50.【解析】本题考核体内脂载脂蛋白的功能。CM 转运外源性的甘油三酯和胆固醇;VLDL 转运内源性的甘油三酯和胆固醇;LDL 转运内源性胆固醇;HDL 逆向转运胆固醇至肝将其降解,从而降低血中胆固醇浓度,故具有抗动脉粥样硬化的作用。故本题正确答案为 B。

51.【解析】本题考核胆固醇在体内转化和去路。有三条途径:①转化为胆汁酸盐(最主要的去路);②转化为类固醇激素,即在肾上腺皮质转化为皮质醇、醛固酮、雄激素;在睾丸间质细胞转化为睾酮;在卵巢及黄体转化为雌激素;③转化为 7-脱氢胆固醇,后者在紫外线的照射下转化为 VitD_3 ,调节钙磷代谢。胆色素为衰老红细胞的代谢产物。故本题正确答案为 E。

52.【解析】本题考核酮体的特点。酮体是脂肪酸在肝中氧化的中间产物,包括丙酮、乙酰乙酸和 β -羟丁酸;肝内缺乏利用酮体的酶,故酮体是肝内合成,肝外利用,是心、脑的重要能源物质,故酮体是肝输出能量的一种形式;当机体饥饿时,脂肪组织大量动员,活化的脂肪酸经 β 氧化生成乙酰 CoA,在肝脏的线粒体内合成酮体。故本题正确答案为 B。

55.【解析】本题考核必需脂肪酸。人体内必需脂肪酸包括:亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸,只能从食物获取。合成前列腺素的花生四烯酸只能从食物中获取。因此对大鼠去脂饮食可引起前列腺素减少。故本题正确答案为 E。

56.【解析】本题考核脂肪大量动员乙酰 CoA 的去路。正常情况下,血中酮体含量很少,在饥饿、高脂低糖膳食及糖尿病时,葡萄糖利用减少,脂肪动员加强,脂肪酸分解增多,乙酰-CoA 大量生成,继而生成酮体氧化功能。故本题正确答案为 D。

57.【解析】本题考核脂肪酸的 β 氧化过程。①关键酶:肉毒碱脂酰转移酶-1;②部位:

线粒体;③脂肪酸 β 氧化的过程:a.脂肪酸的活化:乙酰 CoA \rightarrow 脂酰 CoA; b.脂肪酸的 β 氧化:脱氢(FAD) \rightarrow 加水 \rightarrow 再脱氢(NAD) \rightarrow 硫解; c.产物:1分子乙酰 CoA +少2个碳原子的脂酰 CoA。故本题正确答案为 E。

61.【解析】本题考查萎缩的概念及类型。萎缩是指发育正常的组织细胞体积的缩小、数目减少。老年人动脉粥样硬化引起脑细胞供血不足,故属于营养不良性萎缩。故本题正确答案为 D。

62.【解析】本题考查组织细胞损伤的分类及特点。组织细胞损伤分为变性和死亡,变性属于可复性损伤;死亡属于不可复性损伤,包括凋亡和坏死;细胞坏死的主要形态学特征为细胞核的改变:①核固缩②核碎裂③核溶解。除 D 项外,其余项都是变性的表现。故本题正确答案为 C。

64.【解析】本题考查细胞坏死的形态学特征。细胞坏死的主要形态学特征为细胞核的改变:①核固缩②核碎裂③核溶解。核分裂是正常细胞分化的过程,细胞核异型性是肿瘤细胞的表现,细胞肿胀和细胞质脂质增多是细胞变性的表现。故本题正确答案为 D。

65.【解析】本题考查梗死与坏疽的区别。是指机体局部组织细胞的死亡;坏疽是指组织坏死后继发腐败菌的感染,使坏死组织呈黑色、污绿色,并伴有恶臭的病理过程。其最本质的区别是有无腐败菌的感染。故本题正确答案为 C。

67.【解析】本题考查组织细胞的再生能力。根据再生能力的强弱将组织细胞分为:①不稳定细胞:此类细胞的再生能力很强,不断的分裂增殖,以代替衰亡或破坏的细胞,如被覆上皮细胞、淋巴造血细胞、间皮细胞等;②稳定细胞:在生理情况下,这类细胞处于静止状态,当受到组织损伤的刺激时,表现出较强的再生能力,如各种腺细胞(肝、胰腺、乳腺、内分泌腺、肾小管的上皮细胞等)。③永久性细胞:此类细胞几乎无再生能力,主要为骨骼肌细胞、神经细胞、心肌细胞。故本题正确答案为 C。

68.【解析】本题考查机化的概念。机化是指组织细胞坏死后由肉芽组织取代的过程。肉有组织主要由成纤维细胞和新生的毛细血管组成,故机化时的特征细胞为成纤维细胞。故本题正确答案为 B。

70.【解析】本题考查羊水栓塞引起猝死的机制。羊水栓塞是分娩过程中较为严重的并发症,羊水栓塞引起猝死的机制为:①羊水中胎儿代谢产物入血引起过敏性休克;②羊水栓子阻塞肺动脉及羊水内含有血管活性物质引起反射性血管痉挛;③羊水具有致活凝血酶的作用引起 DIC。故本题正确答案为 C。

71.【解析】本题考查急性左心衰的病理特点。急性左心衰时,由于左心腔压力升高,阻碍肺静脉回流,肺淤血致肺泡壁毛细血管通透性增高,引起肺水肿的发生。故本题正确答案为 C。

72.【解析】本题考查脂肪栓塞。股骨骨折后,大量脂滴可经静脉入右心,再到达肺,引起肺动脉及其分支栓塞。故本题正确答案为 E。

73.【解析】本题考查贫血性梗死的发生部位。贫血性梗死常发生于侧支循环不丰富的实质性脏器,如心、脾、脑、肾等。故本题正确答案为 C。

74.【解析】本题考查硫脲类药物抗甲状腺的作用机制。硫脲类药物抑制甲状腺过氧化

物酶,进而抑制酪氨酸的碘化及偶联,减少甲状腺激素的合成。本题正确答案为 C。

75.【解析】本题考核 α -葡萄糖苷酶抑制剂抗糖尿病的机制。 α -葡萄糖苷酶抑制剂通过竞争性抑制双糖类水解酶,延缓肠道单糖的吸收,尤其是水化合物的吸收,主要适用于餐后血糖升高的患者;磺脲类降血糖药属于促胰岛素分泌剂,刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素而降低血糖;双胍类药物主要用于伴有肥胖的糖尿病患者,可促进脂肪组织摄取葡萄糖,降低糖在肠道的吸收及糖异生,抑制胰高血糖素的作用;噻唑烷二酮类属于胰岛素增敏剂,与激活过氧化物酶体增殖因子受体有关。故本题正确答案为 C。

76.【解析】本题考核第三代头孢菌素的特点。第三代头孢菌素的特点:①主要用于危及生命的尿路感染、脑膜炎、脓毒症等;②对 G-菌的有较强的作用,但 G⁺作用较一、二代弱③肾脏毒性:一代>二代,三代、四代无肾毒性;④对铜绿假单胞菌作用较强;⑤对 β 内酰胺酶有较高的稳定性。故本题正确答案为 C。

77.【解析】本题考核红霉素的临床应用。红霉素是大环内脂类抗生素,通过抑制细菌蛋白质的合成抗菌。临床常用于衣原体、白喉、支原体、空肠弯曲菌、军团菌感染的首选。口诀:依白万支空军首选红。故本题正确答案为 A。

78.【解析】本题考核铜绿假单胞菌的敏感抗生素。铜绿假单胞菌感染首选药为:氨基糖苷类妥布霉素,它的抗铜绿假单胞菌的作用是庆大霉素的 2~5 倍。三代头孢、喹诺酮类(儿童禁忌)也有较强的抗铜绿假单胞菌的作用。故本题正确答案为 D。

81.【解析】本题考核苯二氮草类药物的作用特点。苯二氮草类药物具有:抗焦虑、镇静催眠、中枢性的肌松作用,抗癫痫的持续状态。故本题正确答案为 B。

82.【解析】本题考核阿司匹林的副作用。阿司匹林的副作用为:胃肠道反应、凝血功能障碍、水杨酸反应、过敏反应、瑞夷综合征。故本题正确答案为 E。记忆口诀:为、您、扬、名、义。偶可引起头痛、眩晕、耳鸣、视听力减退等。

83.【解析】本题考核卡比多巴抗帕金森的机制。卡比多巴仅能抑制外周多巴胺脱羧酶的活性,从而减少多巴胺在外周组织中的生成,提高脑内多巴胺的浓度;卡比多巴不易通过血脑屏障,这样既能提高左旋多巴的疗效,又能减轻其外周的副作用,但卡比多巴自身不具有抗帕金森的作用。故本题正确答案为 A。

84.【解析】本题考核哌替啶的临床应用。哌替啶阿片类受体激动剂,与吗啡作用相同,有轻微的兴奋作用,但不影响产程,故可以用于分娩之痛,因新生儿对哌替啶呼吸抑制作用较为敏感,故在产妇产前 2~4 小时内不宜使用。故本题正确答案为 A。

85.【解析】本题考核钙拮抗药的药理特点。硝苯地平、尼群地平、尼莫地平均属于二氢吡啶类 Ca^{2+} 拮抗剂,但尼莫地平舒张脑血管的作用较强,能增加脑血流了,故常用于脑血管疾病的首选。地尔硫草、地尔硫草属于非二氢吡啶类钙通道拮抗剂,维拉帕米是阵发性室上性心动过速的首选。故本题正确答案为 E。

112.【解析】迷走神经张力过高则会导致气道狭窄,根据题意,应该选择抗胆碱药,异丙托溴铵属于吸入型抗胆碱药,可以阻断节后迷走神经通路,降低迷走神经兴奋性而舒张支气管,从而可以改善夜间喘憋症状的作用。其余选项类型的药物均不能起到抗胆碱的作用,故不选。

110-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

2020 年临床执业医师资格考试 模拟试卷

(医学综合笔试部分)

报考类别：临床执业医师

第二单元

考试日期：2020 年 8 月 23 日

考试时间：9：00—11：00

考生姓名：_____

准考证号：_____

考场号：_____

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- | | |
|--|---|
| <p>1.区别血红蛋白尿与血尿的主要方法</p> <p>A.尿蛋白电泳</p> <p>B.尿沉渣镜检</p> <p>C.尿蛋白定性试验</p> <p>D.尿比重</p> <p>E.尿胆红素</p> <p>2.下列不是女性外生殖器官血液供应主要来源的是</p> <p>A.卵巢动脉</p> <p>B.髂外动脉</p> <p>C.子宫动脉</p> <p>D.阴道动脉</p> <p>E.阴部内动脉</p> <p>3.能改善稳定型心绞痛患者临床预后的是</p> <p>A.尿素酶</p> <p>B.速效救心丸</p> <p>C.阿司匹林</p> <p>D.硝酸甘油</p> <p>E.利多卡因</p> <p>4.下列与结肠癌关系最密切的疾病是</p> <p>A.回盲部结核</p> <p>B.溃疡性结肠炎</p> <p>C.家族性结肠息肉病</p> <p>D.血吸虫性肉芽肿</p> <p>E.克罗恩病</p> <p>5.下列不属于内分泌腺体功能减退原因的是</p> <p>A.肿瘤</p> <p>B.增生</p> <p>C.感染</p> | <p>D.药物</p> <p>E.遗传</p> <p>6.附睾结核多继发于</p> <p>A.骨结核</p> <p>B.肾结核</p> <p>C.淋巴结核</p> <p>D.肠结核</p> <p>E.肺结核</p> <p>7.佝偻病颅骨软化多发于</p> <p>A.12个月以上</p> <p>B.9~12个月</p> <p>C.6~9个月</p> <p>D.3~6个月</p> <p>E.1~3个月</p> <p>8.急性胆囊炎的临床表现不包括</p> <p>A.右上腹持续性痛并阵发性加重</p> <p>B.右上腹压痛</p> <p>C.右上腹局限性肌紧张</p> <p>D.可伴有右肩部不适症状</p> <p>E.大多伴有黄疸</p> <p>9.进行膳食调查的主要目的是</p> <p>A.了解有无膳食缺乏症</p> <p>B.了解体内的营养素水平</p> <p>C.了解机体营养情况</p> <p>D.是营养不足或缺乏的检查</p> <p>E.了解膳食组成及营养素摄取情况</p> <p>10.下列情况可以行乳腺癌保乳手术的是</p> <p>A.不同象限的多个病灶</p> <p>B.患乳腺内有弥漫钙化灶</p> <p>C.合并有硬皮病的患者</p> |
|--|---|

- D. 外上象限直径 2cm 肿瘤
 E. 曾接受过胸部放疗的患者
11. 有关糖尿病的诊断, 正确的是
 A. 空腹血糖正常可排除糖尿病
 B. 空腹血糖 ≥ 7.0 mmol/L 是重要的诊断指标
 C. 两次 OGTT 仍不能诊断时应做第 3 次
 D. 糖耐量减低是糖尿病的一个亚型
 E. 尿糖阴性可排除糖尿病
12. 胃食管反流病的主要发病机制不包括
 A. 胃排空异常
 B. 下食管括约肌压力降低
 C. 异常的下食管括约肌一过性松弛
 D. 夜间胃酸分泌过多
 E. 食管酸清除能力下降
13. 下列提示糖尿病微血管病变的是
 A. 足部溃疡
 B. 高血压
 C. 脑卒中
 D. 心肌梗死
 E. 眼底出血
14. 对诊断门静脉高压最有价值的依据是
 A. 肝功能异常
 B. 食管胃底静脉曲张
 C. 脾大和脾功能亢进
 D. 腹水征阳性
 E. 肝掌阳性
15. 肠外营养的技术性并发症中最严重的是
 A. 神经损伤
 B. 空气栓塞
 C. 胸导管损伤
 D. 气胸
 E. 血胸
16. 导致胎儿生长受限最常见的病因是
 A. 胎盘早剥
 B. 臀先露
 C. 前置胎盘
 D. 孕妇因素
 E. 脐带因素
17. 婴幼儿时期, 外界刺激不易在大脑皮层形成明确兴奋灶的原因是
 A. 神经元少
 B. 树突、轴突少
 C. 神经髓鞘形成和发育不完善
 D. 神经元体积小
 E. 树突轴突短
18. 室间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭, 上述的先天性心脏病患儿平时最常见的并发症是
 A. 心律失常
 B. 脑栓塞
 C. 肺炎
 D. 喉返神经麻痹
 E. 感染性心内膜炎
19. 以下不是肺血栓栓塞症体征的是
 A. 发绀
 B. 肺部湿啰音
 C. 频发室性期前收缩
 D. 颈静脉充盈或异常波动
 E. 心动过速
20. 烧伤现场急救时, 下列哪种做法不正确
 A. 迅速脱离热源, 用凉水浸泡或冲淋局部
 B. 剪去伤处衣、袜, 用清洁被单覆盖
 C. 酌情使用安定、杜冷丁等药镇静止痛
 D. 呼吸道灼伤者, 应在严重呼吸困难时行气管切开、吸氧
 E. 有严重复合伤时, 应先施行相应的急救处理
21. 鉴别上尿路结石与腹腔钙化灶常用的检查方法是
 A. 静脉尿路造影
 B. CT
 C. MRI
 D. B 超
 E. 腹部侧位 X 线平片
22. 最有助于自身免疫性胃炎诊断的实验室检查是
 A. 胃酸测定

- B.血胃蛋白酶原定量
C.胃液中胃蛋白定量
D.血清壁细胞抗体检测
E.血清促胃液素测定
- 23.室性心动过速心电图诊断的最主要依据是
A.QRS波群形态宽大畸形
B.心室率100~200次/分
C.心室律稍微不规则
D.心室夺获和室性融合波
E.房室分离,房率>室率
- 24.大量出汗时尿量减少,主要原因是
A.血浆晶体渗透压升高,引起ADH分泌增多
B.血浆胶体渗透压升高,导致肾小球滤过减少
C.肾素-血管紧张素系统活动增强,可引起醛固酮分泌增多
D.交感神经兴奋,引起肾小球滤过减少
E.血容量减少,导致肾小球滤过减小
- 25.主要引起动脉性肺动脉高压的疾病是
A.睡眠呼吸障碍
B.慢性阻塞性肺疾病
C.二尖瓣狭窄
D.特发性肺动脉高压
E.肺动脉栓塞
- 26.提示结核性脑膜炎进入晚期的临床表现是
A.性格改变
B.脑膜刺激征
C.颅神经障碍
D.昏迷、频繁惊厥
E.肢体瘫痪或偏瘫
- 27.根治原发性肝癌最好的方法是
A.化学抗癌药物治疗
B.放射治疗
C.手术切除治疗
D.中医治疗
E.生物和免疫治疗
- 28.对判断白细胞分布异常最有意义的

检查是

- A.骨髓造血干细胞培养
B.肾上腺素试验
C.白细胞聚集试验
D.骨髓细胞学检查
E.氯化可的松试验
- 29.导致新生儿胆红素生成过多的疾病是
A.先天性胆道闭锁
B.先天性甲状腺功能减退症
C.新生儿败血症
D.新生儿窒息
E.胆汁黏稠综合征
- 30.较少出现精神病性症状的疾病状态是
A.强迫状态
B.幻觉状态
C.兴奋状态
D.妄想状态
E.谵妄状态
- 31.经产妇,足月活胎可经阴道娩出的胎位是
A.肩右后位
B.肩左后位
C.枕右后位
D.颞左后位
E.颞右后位
- 32.医务人员彼此协作的基础是
A.没有分歧
B.彼此独立
C.互相学习
D.互相信任
E.彼此竞争
- 33.下列按照假药论处的是
A.超过有效期的药品
B.更改有效期的药品
C.所注明的适应证超出规定范围的药品
D.药品成分的含量不符合国家药品标准的药品
E.未注明有效期的药品
- 34.在血吸虫发育各阶段中,引起人主要病理改变的是

- A. 尾蚴
 B. 虫卵
 C. 成虫
 D. 幼虫
 E. 毛蚴
35. 胃腺癌的最好发部位是
 A. 胃窦
 B. 幽门
 C. 胃体
 D. 贲门
 E. 胃底
36. 外科治疗肝硬化门静脉高压症公认的重点是
 A. 预防肝癌
 B. 控制腹水
 C. 治疗和预防出血
 D. 防治门静脉高压性胃病
 E. 治疗脾功能亢进
37. 急性乳腺炎的重要病因是
 A. 全身和局部抵抗力下降
 B. 哺乳次数增多
 C. 乳腺组织发育不良
 D. 乳汁瘀积并细菌入侵
 E. 乳腺分泌障碍
38. 最容易引起枕骨大孔疝的颅内占位性病变是
 A. 颞叶肿瘤
 B. 侧脑室肿瘤
 C. 第二脑室肿瘤
 D. 第四脑室肿瘤
 E. 鞍区肿瘤
39. 目前用于判断慢性阻塞性肺疾病严重程度的肺功能指标是
 A. 用力肺活量(FVC)占预计值百分比
 B. 最大通气量(MVV)占预计值百分比
 C. 一秒率(FEV_1/FVC)
 D. 残总比(RV/TLC)
 E. 一秒量(FEV_1)占预计值百分比
40. 属于十二指肠溃疡手术后早期并发症的是
 A. 术后胃瘫
 B. 营养性并发症
 C. 早期倾倒综合征
 D. 残胃癌
 E. 碱性反流性胃炎
41. 临床上老年人最常见的腹外疝是
 A. 腹股沟直疝
 B. 股疝
 C. 脐疝
 D. 腹股沟斜疝
 E. 腹壁疝
42. 幼儿急疹的出疹时间是
 A. 先出疹后退热
 B. 边出疹边退热
 C. 退热后出疹
 D. 出疹 1~2 天后退热
 E. 出疹 3~5 天后退热
43. 内痔的早期症状是
 A. 排便时出血
 B. 内痔脱出
 C. 里急后重
 D. 肛门瘙痒
 E. 排便时疼痛
44. 急性肾小球肾炎水肿的主要机制为
 A. 低蛋白血症
 B. 肾小球滤过率下降, 水钠潴留
 C. 毛细血管通透性增加
 D. 继发性醛固酮增多症
 E. 抗利尿激素增加
45. 变异型心绞痛抗心肌缺血治疗, 首选的药物是
 A. 抗血小板药
 B. 长效硝酸酯类
 C. 低分子肝素
 D. 钙通道阻滞剂
 E. β 受体拮抗剂
46. 肝硬化时, 脾大的主要原因是
 A. 脾内纤维组织增生
 B. 脾窦巨噬细胞增多
 C. 脾内淋巴细胞聚集

- D.脾窦扩张红细胞淤滞
E.脾小体多量中性粒细胞浸润
- 47.体内脂肪大量动员时,肝内生的乙酰辅酶A可生成的是
A.葡萄糖
B.酮体
C.胆固醇
D.草酰乙酸
E.二氧化碳和水
- 48.内科的心身疾病一般不包括
A.冠心病
B.高血压
C.肺结核
D.支气管哮喘
E.消化性溃疡
- 49.痛风患者合并的泌尿系结石最可能是
A.草酸钙结石
B.磷酸盐结石
C.碳酸盐结石
D.黄嘌呤结石
E.尿酸结石
- 50.Fisher综合征的最主要临床特征是
A.眼外肌麻痹、共济失调、腱反射消失
B.四肢弛缓性瘫痪伴眼外肌麻痹
C.双侧对称性眼外肌和面肌麻痹
D.由下肢逐渐向上肢进展的对称性弛缓性瘫痪
E.四肢对称性弛缓性瘫痪伴双侧面瘫
- 51.病因不明的急性腹膜炎行剖腹探查时,手术切口一般多选择
A.右旁正中
B.右肋缘下
C.左肋缘下
D.正中
E.左旁正中
- 52.颅底骨折通常的诊断依据是
A.昏迷
B.头痛伴呕吐
C.偏瘫头皮血肿
D.视力模糊
E.脑脊液鼻、耳漏
- 53.硬脑膜外血肿的典型特征是
A.伤后当时立即出现的昏迷时间较长
B.CT示皮髓质交界处多个点状出血点
C.伤后一过性意识清醒或好转
D.鼻出血
E.伤后逆行性遗忘
- 54.长期淤血导致肝硬化的基本病理变化是
A.肝细胞坏死
B.肝细胞缺氧改变
C.大量肝小叶改建
D.大量肝细胞脂肪变性
E.大量肝细胞嗜酸性变性
- 55.下腹部手术拆线时间一般为术后
A.7~9日
B.4~5日
C.13~14日
D.6~7日
E.10~12日
- 56.乳腺癌局部表现中提示预后最差的是
A.乳头内陷,偏向一侧
B.乳头湿疹样变
C.局部皮肤凹陷,呈“酒窝征”
D.皮肤红肿、炎症样变
E.皮肤呈橘皮样变
- 57.颌下、颈部发生急性蜂窝织炎,最危险的并发症是
A.脓毒血症
B.吞咽困难
C.呼吸困难、窒息
D.化脓性颌下腺炎
E.面部感染
- 58.血源性肺脓肿最常见的病原体是
A.流感嗜血杆菌
B.肺炎克雷伯杆菌
C.金黄色葡萄球菌
D.铜绿假单胞菌
E.肺炎链球菌
- 59.根据传染病法的规定,不属于乙类传

染病的是

- A. 艾滋病
- B. 脊髓灰质炎
- C. 霍乱
- D. 梅毒
- E. 麻疹

60. 出生后即有且终生存在的神经反射是

- A. 拥抱反射
- B. 膝腱反射
- C. 握持反射
- D. 觅食反射
- E. 腹壁反射

61. 细菌细胞壁特有的成分是

- A. 外膜
- B. 肽聚糖
- C. 脂蛋白
- D. 脂多糖
- E. 类脂

62. 有助于诊断肝性脑病的血液实验室检查指标是

- A. 球蛋白
- B. 丙氨酸氨基转移酶
- C. 白蛋白

A2 型题

D. 血氨

E. 血小板计数

63. 佩戴金属首饰后局部皮肤出现炎症反应,其免疫病理基础可能是

- A. Arthus 反应
- B. IV 型超敏反应
- C. III 型超敏反应
- D. II 型超敏反应
- E. I 型超敏反应

64. 严重心力衰竭,治疗频发室性期前收缩首选的药物是

- A. 多巴酚丁胺
- B. 索他洛尔
- C. 胺碘酮
- D. 氟卡尼
- E. 普罗帕酮

65. 治疗和预防创伤发生气性坏疽的关键措施是

- A. 注射破伤风抗毒素
- B. 快速补液与输血
- C. 应用大剂量青霉素
- D. 即刻给予高压氧治疗
- E. 尽早行彻底清创术

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

66. 男,59 岁。外伤致右腕部疼痛、肿胀 1 小时。既往体健,无糖尿病病史。查体: T36.8℃, P70 次/分, R18 次/分, BP100/60mmHg, 心、肺、腹未见异常,右腕部疼痛、肿胀、活动受限。X 线片检查: 桡骨下端骨皮质不连续,对位对线良好,并有嵌插。最恰当的治疗措施是

- A. 皮牵引
- B. 中药活血化瘀
- C. 切开复位内固定
- D. 骨牵引
- E. 手法复位外固定

67. 女,40 岁。因原发性甲状腺功能亢进症在气管内插管全麻下行甲状腺双侧次全切除术,术后清醒拔出气管插管,后患者出现呼吸困难,伴有失音,无手足麻木。查体: T 37.2℃, P 90 次/分, R 27 次/分, BP 130/75 mmHg, 面红无发绀,颈部不肿,引流管通畅,有少许血液流出。引起该患者呼吸困难最可能的原因是

- A. 喉上神经损伤
- B. 伤口出血
- C. 甲亢危象
- D. 甲状旁腺损伤

E. 双侧喉返神经损伤

68. 女, 36 岁。发现颈部包块 2 年, 包块逐渐增大, 无甲亢表现, 目前有憋闷感。查体: 右侧甲状腺可触及 4 cm×3 cm 包块, 光滑, 质韧, 随吞咽上下移动, 无压痛, 未触及肿大淋巴结。核素扫描: 甲状腺右叶温结节。建议手术治疗, 最主要的依据是

- A. 易发生继发感染
- B. 用力后包块易破裂
- C. 有压迫症状
- D. 可继发甲亢
- E. 易发生恶变

69. 男, 36 岁。呕血 1 小时。患肝硬化门静脉高压症多年。查体: 巩膜黄染, 中等量腹水。血白蛋白 25 g/L。应首选的治疗方法是

- A. 断流手术
- B. 选择性门体分流术
- C. 非选择性门体分流术
- D. 三腔二囊管压迫止血
- E. 经颈静脉肝内门体分流术

70. 男, 35 岁。被倒塌的房屋压伤左下肢 6 小时入院。查体: T37 °C, P108 次/分, R28 次/分, 左小腿大片肌肉撕脱, 伤口处留有大量污物。急诊行清创处理, 术后 3 天, 患者体温逐步上升, 烦躁不安, 大量出汗, 尿量明显减少。观察伤口: 左下肢明显肿胀, 见大量恶臭浆液血性渗出物。皮下可触及捻发音。下面处理措施不正确的是

- A. 整块切除受累肌肉
- B. 术后勤换敷料
- C. 应用高压氧治疗
- D. 首选氨基糖苷类抗生素
- E. 病变区多处切开

71. 女, 66 岁。6 个月前无明确原因咳嗽、咳痰, 痰中带血。MRI 示大脑半球皮质多个小类圆形低信号影。诊断是

- A. 脑蛔虫
- B. 脑脓肿
- C. 脑梗死

D. 脑软化灶

E. 脑转移瘤

72. 女, 47 岁。体检发现右肾下有 2 cm×2 cm 占位病变, IVU 尿路造影未见右肾盂肾盏形态改变, CT 诊断右肾下级恶性肿瘤, 左肾形态和功能正常。下面治疗方案正确的是

- A. 右肾切除
- B. 根治性右肾切除
- C. 右肾部分切除
- D. 右肾动脉栓塞
- E. 右肾部分切除加放化疗

73. 50 岁, 女性。汽车撞伤左小腿, 局部肿痛畸形, 反常活动, 有片状皮肤擦伤出血, 现场紧急处理时最重要的是

- A. 创口消毒
- B. 创口包扎
- C. 创口缝合
- D. 夹板固定
- E. 迅速运送医院, 由医院处理

74. 女, 43 岁。左乳头溢液 10 余天, 无不适症状。查体: 乳房视诊无异常发现, 未扪及肿块, 无压痛, 按压左乳房外上方可见黄褐色溢液。门诊首选的检查是

- A. 热图像检查
- B. 钼靶 X 线摄片
- C. B 型超声检查
- D. 溢液涂片细胞学检查
- E. 近红外线扫描

75. 男 45 岁。突发呕鲜血 2 小时, 约 400mL。发现 HBsAg 阳性 20 年。查体: T36.5 °C, P80 次/分, R18 次/分, BP120/80mmHg。巩膜无黄染, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹膨隆, 无压痛、反跳痛、肌紧张, 肝脏肋下未触及, 脾脏肋下 4cm, 移动性浊音阳性。准备急诊手术治疗, 术前检查中不包括

- A. 腹水常规检查
- B. 肾功能测定
- C. 出、凝血功能测定

D.血清电解质测定

E.肝功能检查

76.女,26岁。腹泻半天,于8月15日来诊。腹泻30多次,开始为稀便,后为水样便,继之多次呕吐。查体:T 36.5℃,P 110/分,BP 60/40 mmHg,神志清楚,皮肤干燥,弹性差,腹软,无压痛。粪常规:水样便,镜检 WBC 0~3/HP,RBC 0~2/HP。最可能的诊断是

A.胃肠型细菌性食物中毒

B.霍乱

C.急性细菌性痢疾

D.溃疡性结肠炎

E.阿米巴痢疾

77.男,60岁。酒精性肝硬化15年。1个月前出现右上腹胀痛,低热,体重下降。最可能的诊断为

A.肝脓肿

B.肝血管瘤

C.肝囊肿

D.胃癌

E.原发性肝癌

78.女,60岁。上腹痛2小时,伴恶心、呕吐2次,为胃内容物。在下列疾病诊断中,可能性最小的是

A.心肌梗死

B.急性胰腺炎

C.急性阑尾炎

D.急性胃炎

E.梅尼埃综合征

79.女,68岁。排尿困难2年,腹部平片提示膀胱区有2cm椭圆形致密影,典型的临床表现是

A.膀胱刺激征

B.进行性排尿困难

C.血尿

D.尿流中断,改变体位后好转

E.腰痛,血尿,脓尿

80.女,80岁。高血压病史20年。间断头晕。既往有痛风史,查体:心率52次/分,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。实验室检

查,血肌酐100 μ mol/L,血钾正常,该患者的最适宜降压治疗方案是

A.缬沙坦与美托洛尔

B.氨氯地平与美托洛尔

C.缬沙坦与氢氯噻嗪

D.氨氯地平与氢氯噻嗪

E.缬沙坦与氨氯地平

81.女,16岁。月经初潮后1年,月经期1~4个月,经量多,伴血块,止血首先应选择

A.雌激素

B.大剂量雄激素

C.孕激素

D.雌、孕激素联合法

E.刮宫术

82.女,50岁。头部棍击伤,无昏迷史及意识障碍,无颅骨骨折,1个月后出现颅内高压症状。最可能的诊断是

A.慢性硬膜下血肿

B.多发颅内血肿

C.慢性硬膜外血肿

D.急性颅内血肿

E.脑震荡后遗症

83.女,38岁。吞咽困难30天,不能进水2天,口渴、尿少、体重下降。查体26次/分,BP 80/50 mmHg,神志清楚,烦躁。血Na⁺ 152 mmol/L,血K⁺ 3.2 mmol/L、HCO₃⁻ 18 mmol/L、PaCO₂ 38 mmHg。首要的处理措施应是

A.氧疗

B.补充血容量

C.纠正酸碱失衡

D.有控制的补充血钾

E.应用升压药

84.女,25岁。尿频、尿急、尿痛2天,无发热及腰痛,既往无类似发作。查体:双肾区无叩击痛,血WBC 5.4 $\times 10^9$ /L,尿WBC 30~40/HP,RBC 10~15/HP,亚硝酸盐(+).该患者抗感染治疗疗程应为

A.3天

B.7天

C.10天

D.2 周

E.4 周

85.男,65 岁。人工膝关节置换术后膝关节周围加压包扎。1 天后发现右足不能背屈。跖屈正常,足背动脉得动正常。最可能的原因是

- A.腓总神经损伤
- B.坐骨神经损伤
- C.深静脉血栓
- D.胫神经损伤
- E.骨筋膜室综合征

86.女,50 岁。月经不规则 3 年余,阴道不规则流血 30 天。查体:中度贫血貌,子宫略大,稍软,无压痛,宫旁未触及异常。为确定诊断,首选的检查是

- A.盆腔 CT 检查
- B.尿 hCG 测定
- C.盆腔 B 超
- D.分段诊刮
- E.阴道镜检查

87.女婴,7 个月。平时多汗,有夜惊,枕秃明显,易激惹,烦躁,睡眠不安。早期诊断最可靠的指标是

- A.血 25-(OH) D_3 升高
- B.血 25-(OH) D_3 下降
- C.维生素 C
- D.血清钙、磷
- E.骨密度

88.女,63 岁。COPD 急性发作伴发热。使用头孢他啶 10 天,体温曾降至正常,症状缓解 3 天后再次出现高热。检查发现口腔黏膜有白色念珠菌感染。此时抗生素拟改用

- A.红霉素
- B.氯霉素
- C.青霉素
- D.环丙沙星
- E.两性霉素 B

89.女,40 岁。便血、面色苍白 3 个月。血常规:Hb 60 g/L,MCV 72 fl,MCHC 27%,

WBC $8.0 \times 10^9/L$,PLT $38 \times 10^9/L$,网织红细胞 0.025。最可能出现的特有临床表现是

- A.皮肤瘀斑
- B.肝脾大
- C.酱油色尿
- D.巩膜黄染
- E.匙状甲

90.男,31 岁。乏力、皮肤颜色变黑 2 年、1 周前受凉后出现恶心、呕吐、血钠 120mmol/L ,血 K^+ 5.8mmol/L ,可能的病变部位是

- A.肾上腺
- B.肾脏
- C.垂体前叶
- D.垂体后叶
- E.下丘脑

91.女,50 岁。右季肋部胀痛 1 个月余。查体:无黄疸,肝肋缘下 3 cm,质硬,无腹水征。B 超示肝右叶低回声病灶,约 $11\text{cm} \times 10\text{cm}$,肝左叶见多个小低回声区。AFP $> 1\ 000\ \mu\text{g/L}$ 。最佳的治疗措施是

- A.放射治疗
- B.抗感染治疗
- C.中草药治疗
- D.剖腹探查术
- E.肝动脉插管栓塞化疗

92.女,30 岁。外阴瘙痒伴烧灼感 4 天。妇科检查见外阴局部充血、小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色状薄膜或凝乳状物。诊断是

- A.细菌性阴道炎
- B.滴虫性阴道炎
- C.萎缩性阴道炎
- D.淋病性阴道炎
- E.外阴阴道念珠菌病

93.女,28 岁。继发不孕 3 年,经后 4 天突起高热、寒战、下腹痛,右侧疼痛更甚。血压 $110/80\text{mmHg}$,P 120 次/分,体温 $39\text{ }^\circ\text{C}$,下腹轻压痛。白细胞 $18 \times 10^9/L$,中性粒细胞 80%。复查:宫颈稍大稍软,有压痛,双侧附

件增厚,压痛。诊断为

- A.急性阑尾炎
- B.急性盆腔腹膜炎
- C.急性盆腔结缔组织炎
- D.急性子宫内膜炎
- E.以上均不是

94.男,56岁。因吞咽、饮水困难2周,现有乏力、尿少、极度口渴来诊。查体:血压正常,唇干,眼窝凹陷,烦躁不安,出现躁狂、幻觉,有时昏迷。该患者应考虑为

- A.中度等渗性缺水
- B.重度高渗性缺水
- C.重度等渗性缺水
- D.中度低渗性缺水
- E.中度高渗性缺水

95.男,22岁。大量饮酒后突发上腹部胀痛,伴恶心、呕吐2小时。查体:P102次/分,BP110/60mmHg。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。上腹部压痛明显,反跳痛(+),肠鸣音减弱。血尿常规及尿淀粉酶检查、立位腹部X线平片均未见明显异常。最可能的诊断

- A.急性肠梗阻
- B.胆囊结石
- C.急性胰腺炎
- D.急性胆囊炎
- E.上消化道穿孔

96.男,56岁。2年来间断出现活动时胸闷,休息后可缓解,近4个月无胸闷发作。查体:BP120/80mmHg,心率72次/分,心脏各瓣膜区未闻及杂音。最有助于明确诊断的检查是

- A.心电图运动负荷试验
- B.动态心电图
- C.放射性核素静态心肌显像
- D.胸部X线片
- E.超声心动图

97.男,60岁。突发心前区疼痛2小时,既往有高血脂症和吸烟史,无高血压和出血性疾病史。查体:BP150/90mmHg,双肺呼

吸音清,心率89次/分,律齐。心电图示Ⅱ、Ⅲ和aVF导联ST段下斜型压低0.2mv, $V_1 \sim V_6$ 导联ST段弓背向上抬高0.3~0.5mV。该患者最关键的治疗是

- A.口服硝苯地平控释片
- B.口服速效救心丸
- C.再灌注治疗
- D.吸氧
- E.口服血管紧张素转换酶抑制剂

98.女,50岁。绝经3年,阴道脱出肿物,检查宫颈及部分宫体脱出阴口外。患者治疗采用的方式是

- A.阴道前壁修补术
- B. Manchester 手术
- C.阴道纵隔形成术
- D.子宫悬吊术
- E.经阴道子宫全切及阴道前后壁修补术

99.上腹部汽车撞伤4小时,患者面色苍白,四肢厥冷,脉搏140次/分,血压60/40mmHg,全腹轻度压痛、肌紧张及反跳痛。首先考虑为

- A.肝脾破裂
- B.十二指肠破裂
- C.胃破裂
- D.严重的腹壁软组织损伤
- E.腹膜后血肿

100.男,56岁。低热咳嗽,咳痰2周,胸部X线片示右肺下叶背段可见不规则斑片影及薄壁空洞。其内未见液平,血常规正常,ESR56mm/h。该患者首先考虑

- A.肺结核
- B.肺癌
- C.急性肺脓肿
- D.弹性多管炎
- E.金黄色葡萄球菌肺炎

101.男,20岁。头晕、呕吐伴流涎半小时。1小时前曾少量饮酒并进食较多凉拌蔬菜。查体:P55次/分,BP100/70mmHg,神志清晰,皮肤潮湿,双瞳孔针尖样大小,双下肺可闻及湿啰音。最可能的诊断是

- A.亚硝酸盐中毒

B.杀鼠药中毒

C.吗啡中毒

D.乙醇中毒

E.有机磷农药中毒

102.女,68岁。反复咳嗽、咳脓痰、咯血40年,再发伴发热3天。近几天来静脉滴注“头孢菌素”,仍有较多脓痰及痰中带血。查体:T37.5℃,左下肺可闻及湿啰音,杵状指。该患者最可能的诊断是

A.慢性支气管炎

B.支气管扩张

C.肺结核

D.肺脓肿

E.支气管肺癌

103.55岁,女性。右手拇指晨起僵硬伴疼痛半年,近2周出现该处的肿胀及活动受限,被动活动患指可出现伴疼痛的弹响,临床诊断最可能是

A.类风湿关节炎

B.关节内游离体

C.骨关节炎

D.风湿性关节炎

E.狭窄性腱鞘炎

104.女,37岁。间断上腹痛5年,空腹时出现。Hp(+).应选择的联合治疗方案的是

A.奥美拉唑+CBS+两种抗生素

B.奥美拉唑+阿托品

C.硫糖铝+阿托品+抗生素

D.前列腺素+硫糖铝

E.法莫替丁+抗生素

105.女,56岁。干咳、呼吸困难2周,逐渐加重,现不能平卧,无发热,查体:R24次/分,BP85/70mmHg,端坐位,颈静脉怒张,双肺呼吸音清,心脏浊音界向两侧扩大,心率106次/分,律齐,心音遥远,心脏各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音,奇脉,心电图:窦性心动过速,各导联QRS波低电压,该患者最关键的治疗方案是

A.口服美托洛尔

B.静脉滴注硝酸甘油

C.静脉注射呋塞米

D.静脉滴注多巴胺

E.心包穿刺

106.女,61岁。宫颈癌行子宫切除术后3天,晨起时突发左小腿疼痛,左足不能着地踏平,行走时疼痛加重。查体:左小腿肿胀,深压痛,足背动脉搏动存在。首选的检查为

A.同位素骨扫描

B.下肢CT

C.下肢X线平片

D.下肢超声多普勒

E.下肢MRI

107.男,40岁。腹痛16小时,呈持续性,阵发性加重,伴呕吐,无肛门排气。查体:全腹肌紧张,有压痛及反跳痛。行腹腔穿刺抽出的液体呈血性,伴臭味。最可能的断是

A.结核性腹膜炎

B.胃十二直肠穿孔

C.急性阑尾炎穿孔

D.绞窄性肠梗阻

E.急性重症胰腺炎

108.男,65岁。间断腹胀、上腹隐痛25年。胃镜检查提示:胃体黏膜变薄,血管透见,皱襞稀疏。患者可能缺乏的维生素是

A.维生素C

B.维生素D

C.维生素B₂

D.维生素B₄

E.维生素B₁₂

109.男,50岁。无明显诱因出现左肩、上臂、前臂外侧放射痛3个月。既往体健。查体:T36.6℃,P82次/分,BP110/60mmHg,双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,未闻及杂音,腹软,无压痛,未触及包块,肩关节活动正常,上肢感觉及肌力均正常。Eaton试验和Spurling试验阳性。首先考虑的诊断是

A.冈上肌腱炎

B.肩峰撞击综合征

C.肩袖损伤

- D.神经根型颈椎病
E.粘连性肩关节囊炎

110.女,40岁。活动后心悸、气短5年,逐渐加重。胸部X线片示心影外形呈“梨形”,心电图示P波呈双峰样,超声心动图示左房、右室扩大,估测肺动脉收缩压增高。

B1 型题

最可能的基础疾病是

- A.先天性心脏病
B.系统性红斑狼疮心脏损害
C.扩张型心肌病
D.退行性心脏瓣膜病
E.风湿性心脏瓣膜病

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(111~112题共用备选答案)

- A.降结肠癌
B.升结肠癌
C.克罗恩病
D.溃疡性结肠炎
E.小肠肿瘤

111.女,60岁。腹胀、右下腹部隐痛6个月,阵发性腹痛、乏力、消瘦,近3个月贫血。首先应考虑的诊断是

112.男,23岁。腹痛、腹泻、便秘交替2年,便无脓血和黏液。近1年来消瘦、乏力、贫血,下午有时低热。首先考虑的诊断是

(113~114题共用备选答案)

- A.磺胺嘧啶
B.四环素
C.异烟肼
D.环丙沙星
E.甲氧苄啶

113.治疗铜绿假单胞菌感染首选的药物是

114.治疗结核病选用的药物是

(115~116题共用备选答案)

- A.淀粉酶检测
B.血清甲胎蛋白检测
C.腹部CT检查
D.绒毛膜激素
E.血CEA

115.葡萄胎时主要增高的是

116.肝细胞肝癌时主要增高的是

(117~118题共用备选答案)

- A.呼吸道传播
B.消化道传播
C.血液传播
D.虫媒传播
E.性接触传播

117.登革病毒的传播方式是经

118.人乳头瘤病毒的传播方式是经

(119~120题共用备选答案)

- A.挤压综合征
B.长期饥饿状态
C.反复呕吐
D.盐皮质激素过多
E.长期胃肠减压

119.高钾血症的常见原因是

120.代谢性酸中毒的常见病因是

(121~123题共用备选答案)

- A.收缩压
B.循环系统平均充盈压
C.脉压
D.舒张压
E.平均动脉压

121.心动周期中,主动脉压的最低值是

122.心动周期中,主动脉压的最高值是

123.心动周期中,主动脉压的最高值与最低值之差是

(124~125题共用备选答案)

- A.硝苯地平

B.普萘洛尔

C.卡托普利

D.氢氯噻嗪

E.哌唑嗪

124.具有降压作用的利尿药物是

125.适用于早期糖尿病肾病的降压药物是

(126~127 题共用备用答案)

A.盆腔炎性疾病

B.子宫内膜异位症

C.卵巢上皮癌

D.生殖器结核

E.输卵管妊娠

126.女,31岁。取环后10天,发热3天。查体:T38.6℃,P98次/分,R23次/分,BP100/80mmHg,宫颈举痛(+),子宫压痛,右侧附件区可触及腊肠型肿物,触痛明显,活动度差。该患者最可能的诊断是

A3/A4 型题

127.女,31岁。婚后2年未孕,性生活正常。既往痛经5年。妇科检查:子宫后倾后屈位,正常大小,活动度差,后穹隆有触痛结节,子宫左侧可触及直径5cm包块。该患者最可能的诊断是

(128~129 题共用备选答案)

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

E.5年

128.取得执业医师执业证书后,具有高等学校医学专科学历的,可以在医疗、预防、保健机构中工作满一定年限后报考执业医师资格考试的年限是

129.具有高等学校医学专业本科学历,报考执业医师资格考试的,需要在医疗、预防、保健机构中工作满一定年限,该年限是

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考试题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(130~131 题共用题干)

男,35岁。会阴部骑跨伤,受伤后尿道外口滴血,会阴部和阴囊处肿胀、瘀斑及蝶形血肿。

130.该患者泌尿系损伤的部位是

A.尿道球部

B.尿道阴茎部

C.膀胱

D.尿道前列腺部

E.尿道膜部

131.该患者最可能的诊断是

A.后尿道挫裂伤

B.膀胱破裂

C.膀胱挫伤

D.前尿道挫伤

E.前尿道裂伤

(132~133 题共用题干)

初产妇,妊娠38周,8小时前突然出现阴道流血,如尿样,6小时前开始出现规律宫缩,因胎手脱出于阴道口2小时就诊。查体:产妇烦躁不安,腹痛拒按,脉搏110次/分,呼吸28次/分,胎心160次/分,导尿时血尿。

132.诊断首先考虑为

A.胎膜早破

B.先兆子宫破裂

C.子宫破裂

D.前置胎盘

E.胎盘早剥

133.最适宜的处理是

A.口服地西洋

B.消毒后还纳肢体

C.立即行剖宫产

- D.全麻下行内倒转术
 E.等待宫口开全后行牵引术
 (134~135 题共用题干)

患者,男性,32 岁。车祸致胸部损伤,出现严重呼吸困难,查体:BP 80/60 mmHg,脉细速,皮肤完整,气管左移,颈静脉充盈,颈部及右胸部皮下气肿,右胸廓饱满,肋间隙增宽,叩诊鼓音,右肺呼吸音消失。

- 134.最可能的诊断是
 A.张力性气胸
 B.闭合性气胸
 C.开放性气胸
 D.纵隔气肿
 E.肺爆震伤
- 135.其主要的病理生理紊乱为
 A.静脉回心血量增加
 B.纵膈扑动
 C.患侧胸膜腔正压
 D.每分通气量增加
 E.急性肺水肿

(136~137 题共用题干)

男,71 岁。间断咳嗽咳痰 20 余年,加重伴喘憋 1 周。近 2 天出现嗜睡。查体,意识模糊。口唇发绀,球结膜水肿,双肺满布哮鸣音。双下肢水肿。

- 136.该患者出现意识障碍最主要的机制是
 A.心源性休克
 B.电解质紊乱
 C.肺性脑病
 D.感染中毒性脑病
 E.脑出血

137.患者经吸氧治疗后呼吸困难进一步加重。血气分析示 pH7.10, PaO₂ 65mmHg, PaCO₂ 102mmHg, 查体:昏睡,口唇发绀,双肺散在干湿性啰音。此时,应首选的治疗措施是

- A.糖皮质激素静脉滴注
 B.大剂量利尿剂静脉滴注
 C.呼吸兴奋剂静脉滴注
 D.静脉应用广谱抗生素

- E.机械通气
 (138~139 题共用题干)

女,35 岁。腹痛、腹胀 1 个月。伴发热,下午较明显,无寒战,无恶心、呕吐、腹泻。查体:T37.5 °C, P80 次/分, R18 次/分, BP120/80mmHg。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。腹部膨隆,全腹弥漫性压痛,无反跳痛,移动性浊音(+).胸部 X 线检查:右上肺可见钙化灶。

- 138.应首先考虑的诊断是
 A.肝硬化腹水
 B.心源性腹水
 C.腹膜间皮瘤
 D.腹膜转移癌
 E.结核性腹膜炎
- 139.为明确诊断,应首先进行的检查是
 A.PPD 试验
 B.血白蛋白
 C.血常规+血沉
 D.腹腔穿刺及腹水化验
 E.腹部 CT

(140~142 题共用题干)

男,66 岁。近 1 周来“上呼吸道感染”后出现呼吸困难,夜间为著,可逐渐自行缓解。白天症状不明显。既往高血压病史 20 年,血压控制欠满意。已戒烟 18 年。过敏性鼻炎病史 8 年。门诊心肺检查及胸部 X 线片未见异常,行超声心动图检查未见异常。

- 140.该患者首先考虑的诊断是
 A.慢性阻塞性肺疾病
 B.支气管哮喘
 C.心力衰竭
 D.睡眠呼吸暂停综合征
 E.冠心病
- 141.为明确诊断首先采取的检查是
 A.肺功能
 B.睡眠呼吸监测
 C.胸部 CT
 D.动脉血气分析
 E.冠状动脉 CT 血管造影术

142. 该患者入院后仍间断发作憋气, 在进行检查和临床观察时应特别关注的是

- A. 症状缓解时的活动耐力
- B. 上呼吸道检查
- C. 血压波动情况
- D. 发作时心肺体征
- E. 有无杵状指

(143~144 题共用题干)

女, 62 岁。咳嗽、咳痰伴喘息 20 余年, 加重 1 周。2 天来发热、咳嗽、意识不清。血 WBC $12.8 \times 10^9/L$, N 0.82, SpO₂ 85% (吸氧)。

143. 患者意识障碍最可能的原因是

- A. 脑血管病
- B. 低血糖
- C. 低钠血症
- D. 感染中毒性脑病
- E. 肺性脑病

144. 对于该患者最重要的治疗措施是

- A. 静脉滴注呼吸兴奋剂
- B. 静脉注射 10% 葡萄糖
- C. 静脉滴注 3% 氯化钠溶液
- D. 静脉滴注甘露醇
- E. 机械通气

(145~146 题共用题干)

女, 40 岁。发现颈部肿物 3 个月, 无不适, 无结核病史。查体: 左颈部外侧中部有肿块, 2.5 cm 大小, 活动, 无压痛, 甲状腺未触及结节。

145. 对该患者确诊最有意义的检查是

- A. MRI 检查
- B. PPD 试验
- C. B 超检查
- D. CT 检查
- E. 细针穿刺细胞学检查

146. 若以上的检查方法未能明确诊断, 而肿块仍在增大, 其进一步的检查是

- A. 用抗生素治疗、观察
- B. 肿瘤标记物检查

C. 复查 MRI

D. 肿块切除活检

E. 同位素扫描

(147~148 题共用题干)

女, 45 岁。脸圆、变红 1 年, 体重增加、月经稀发 6 个月。查体: BP 160/100 mmHg, 向心性肥胖, 皮肤薄, 面部痤疮较多, 下颌小胡须, 全身毳毛增多, 腹部、大腿根部可见宽大紫纹。血钾 1.1 mmol/L, 空腹血糖 15.4 mmol/L。

147. 该患者最可能的诊断是

- A. 原发性醛固酮增多症
- B. 原发性高血压
- C. 女性男性化
- D. 糖尿病
- E. 库欣综合征

148. 定性诊断最主要的检查是

- A. 小剂量地塞米松试验
- B. 血 ACTH 测定
- C. 大剂量地塞米松试验
- D. 血皮质醇测定
- E. 血醛固酮测定

(149~150 题共用题干)

女, 32 岁。G₂P₁ 停经 70 天, 下腹隐痛, 阴道不规则流血 6 天, 子宫达脐水平, 尿 hCG (+)。

149. 首选的辅助检查是

- A. B 超检查
- B. 盆腔 CT
- C. 血 hCG
- D. 诊断刮宫
- E. PPD 试验

150. 随访中无需常规检查的是

- A. hCG 定量测定
- B. 月经规律
- C. 胸片
- D. 定期 B 超检查
- E. 定期性激素水平测定

本单元试卷到此结束

参考答案

第二单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	C	C	B	B	D	E	E	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	D	E	B	B	D	C	C	C	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	D	D	A	D	D	C	B	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	D	C	B	A	C	D	D	E	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	C	A	B	D	D	B	C	E	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	E	C	C	D	D	C	C	C	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	D	B	C	E	E	E	C	D	D
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
E	B	D	D	A	B	E	E	D	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	A	B	A	A	D	B	E	E	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
E	E	C	B	C	A	C	E	A	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
E	B	E	A	E	D	D	E	D	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
B	C	D	C	D	B	D	E	A	B

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	A	C	D	C	A	B	B	A	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	B	C	A	C	C	E	E	D	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	D	E	E	E	D	E	A	A	E

23.【解析】室性心动过速心电图:

- (1) 3个或以上的室早连续出现。
- (2) QRS波群形态畸形,时限超过0.12秒;ST-T波方向与QRS波主波方向相反。
- (3) 心室率通常为100~250次/分;心律规则,但亦可略不规则。
- (4) 心房独立活动与QRS波群无固定关系,形成室房分离。
- (5) 通常发作突然开始。
- (6) 心室夺获与室性融合波(特征性)。

39.【解析】慢支或肺气肿的患者吸入支气管扩张剂后, $FEV_1/FVC < 0.70$ 可诊断为慢阻肺;然后根据 FEV_1 占预计值的百分比,判断严重程度的分级。轻度: $FEV_1\% \text{ pred} \geq 80\%$;中度: $50\% \leq FEV_1\% \text{ pred} < 80\%$;重度: $30\% \leq FEV_1\% \text{ pred} < 50\%$;极重度: $FEV_1\% \text{ pred} < 30\%$ 。故E对。

66.【解析】Colles骨折是桡骨远端,距关节面2.5cm以内的骨折,常伴有远侧骨折断端向背侧倾斜,前倾角度减少或呈负角,典型者伤手呈银叉畸形,是最常见的骨折之一,约占所有骨折的6.7%,好发于老年人,女性较多,有“老年性骨折”之称。老年性骨质疏松是骨折的内因,摔倒则是外因。新鲜有移位桡骨远端骨折,应尽早整复、固定,固定方法为手法复位小夹板或石膏固定,所以答案为E。

73.【解析】畸形、反常活动,是骨折的专有体征,可确定为下肢骨折,所以急救处理应选择夹板固定,是最重要的措施,以防止周围组织的进一步受损,创口包扎也是急诊需要处理的,但是大家在做这类试题务必注意处理首要矛盾的原则,如果题干中有休克最优先处理的是休克,本题骨折和皮肤擦伤明显骨折危险性更大,故选D。

96.【解析】①56岁患者2年来间断胸闷,休息后缓解,主要考虑冠心病。由于近4个月无胸闷发作,为明确诊断,最常用的检查是心电图运动负荷试验。②动态心电图一般连续记录24小时,但本例4个月未发作,故动态心电图可能与普通心电图一样为阴性。③放射性核素静态心肌显像主要用于了解心肌梗死患者,梗死灶周边心肌缺血的位置和范围。④胸部X线片对冠心病的诊断价值不大,主要用于心影的观察或肺部情况的筛查。⑤超声心动图主要用于了解心脏的形态学改变,常用于风湿性心脏瓣膜病。

97.【解析】根据老年患者,突发心前区疼痛2小时,心电图示 $V_1 \sim V_6$ 导联ST段弓背向上抬高0.3~0.5mV,可诊断为急性广泛前壁心肌梗死。由于患者起病仅2小时,故最关键的治疗措施是心肌再灌注治疗(即介入治疗),可使闭塞的冠状动脉再通,濒临坏死的心肌可能得以存活。其它四项均属一般性治疗措施。

102.【解析】①老年女性,长期反复咳嗽、咳痰,咯血,痰中带血,首先应考虑支扩。肺部

固定性湿啰音、杵状指为支气管扩张的解题关键。故答案为 B;②慢支可有慢性咳嗽、咳痰,但咯血少见,一般不会出现杵状指。肺结核常见于青年人,伴低热盗汗的症状,病变多位于肺尖。肺脓肿多表现为高热、咳嗽,咳大量臭脓痰,长期咯血者少见。患者病程长达 40 年,排除肺癌。

103.【解析】狭窄性腱鞘炎常见于手与腕部的“骨纤维隧道”。好发于长期快速用力使用手指和腕部的中老年妇女,手工业者在手指常发生屈肌腱鞘炎,又称弹响指或扳机指。

109.【解析】患者颈肩痛向左上肢放射、肌力下降,手指动作不灵活、拇指感觉减弱,上肢牵拉、压头试验阳性。考虑为神经根型颈椎病。

(134~135 题)【解析】①患者男性,车祸后出现呼吸困难,血压低,右胸部皮下气肿,右胸廓饱满,肋间隙增宽,叩诊鼓音,考虑为张力性气胸;②张力性气胸的病理生理:张力性气胸又称高压性气胸,其胸膜腔内的压力高于大气压,使肺脏迅速受压,纵隔向健侧移位迅速出现严重呼吸循环障碍。特征是出现皮下气肿。

(140~142 题)【解析】①患者夜间为著的呼吸困难,可自行缓解,合并过敏性鼻炎的病史,间歇期胸片、心脏彩超检查正常,应诊断为支气管哮喘(B);②支气管哮喘的确诊当然首选肺功能(A)。睡眠呼吸监测用于诊断睡眠呼吸暂停综合征。胸部 CT 主要用于了解肺部器质性病变。动脉血气分析主要用于诊断呼吸衰竭。冠脉 CT 血管造影主要用于诊断冠心病;③入院后仍间断发作喘憋,说明患者处于哮喘急性发作期,双肺可闻及广泛哮鸣音,因此体检时应注意心肺体征(D)。其他均非哮喘发作时特殊关注的。

110-3

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

2020 年临床执业医师资格考试 模拟试卷

(医学综合笔试部分)

报考类别：临床执业医师

第三单元

考试日期：2020 年 8 月 23 日

考试时间：13：30—15：30

考生姓名：_____

准考证号：_____

考场号：_____

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- | | |
|--|--|
| <p>1.蛋白质-热能营养不良常见并发的维生素缺乏是</p> <p>A.维生素 A
B.维生素 B
C.维生素 C
D.维生素 D
E.维生素 E</p> <p>2.金黄色葡萄球菌感染局限化的有关物质是</p> <p>A.凝固酶
B.肠毒素
C.杀白细胞素
D.表皮溶解素
E.葡萄球菌 A 蛋白</p> <p>3.试验动物出生后即去脂饮食,将导致下列哪种脂质缺乏</p> <p>A.磷脂酰胆碱
B.前列腺素
C.鞘磷脂
D.胆固醇
E.甘油三酯</p> <p>4.尿路感染诊断的最重要依据是</p> <p>A.有尿频、尿急、尿痛症状
B.腰痛和肾区叩痛
C.有真性细菌尿
D.有红细胞管型
E.有白细胞尿</p> <p>5.女性青春期最早出现的是</p> <p>A.脂肪蓄积</p> | <p>B.乳房发育
C.体格发育
D.骨盆变化
E.月经来潮</p> <p>6.关于左心功能不全、肺循环淤血的主要临床表现,下列哪项说法是错误的</p> <p>A.咳嗽、咳痰,痰为浆液性,呈白色泡沫状
B.肺微小动脉压增高,血浆外渗,痰中带血
C.劳力性呼吸困难,休息即可缓解
D.支气管痉挛,发作性哮喘
E.夜间阵发性呼吸困难</p> <p>7.下列疾病中由内分泌疾病而引起尿量增多的是</p> <p>A.摄水过多
B.慢性肾小球肾炎
C.急性肾衰多尿期
D.中枢性尿崩症
E.慢性肾盂肾炎</p> <p>8.下列贫血性疾病中,属于大细胞性贫血的是</p> <p>A.再生障碍性贫血
B.地中海贫血
C.慢性病性贫血
D.恶性贫血
E.缺铁性贫血</p> <p>9.高血压时的肾脏病理变化表现为</p> <p>A.肾脏单发性贫血性梗死</p> |
|--|--|

- B.肾的多发性大瘢痕形成
 C.肾动脉动脉瘤形成
 D.颗粒型固缩肾
 E.肾脏淤血
- 10.肾小球囊壁层上皮细胞增生是哪类肾小球疾病的病理表现
 A.急性肾炎
 B.急进性肾小球肾炎
 C.膜性肾病
 D.脂性肾病
 E.膜增生性肾小球肾炎
- 11.属于不稳定性骨折的是
 A.嵌插骨折
 B.青枝骨折
 C.横行骨折
 D.裂缝骨折
 E.斜形骨折
- 12.人类免疫缺陷病毒(HIV)不易传播的途径是
 A.性传播
 B.器官移植
 C.母婴传播
 D.生活接触
 E.不洁注射
- 13.病情恢复后不发生病原携带状态的传染病是
 A.乙型肝炎
 B.丙型肝炎
 C.细菌性痢疾
 D.甲型肝炎
 E.伤寒
- 14.胆汁中与消化有关最重要的物质是
 A.胆盐
 B.消化酶
 C.卵磷脂
 D.胆色素
 E.脂肪酸
- 15.区分血尿与血红蛋白尿的主要方
 法是
 A.观察血尿颜色
 B.做尿胆原测验
 C.做尿沉渣镜检
 D.做尿三杯试验
 E.做尿潜血试验
- 16.关于超敏反应,正确的理解是
 A.不出现组织细胞损伤
 B.机体反应性处于低状态
 C.不是特异性的
 D.属于正常免疫应答
 E.属于异常免疫应答
- 17.诊断卵巢肿瘤最常用的辅助检查为
 A.B超
 B.CT检查
 C.腹部平片
 D.腹腔镜检
 E.细胞学检查
- 18.炎症时血小板激活因子的作用不包括
 A.激活血小板
 B.促进白细胞吞噬
 C.对白细胞有趋化作用
 D.促进白细胞聚集和黏着
 E.使血管通透性增加
- 19.下列脏器通常易发生凝固性坏死的是
 A.肾
 B.脑
 C.肠
 D.子宫
 E.肺
- 20.属于黏膜免疫系统的免疫器官是
 A.胸腺
 B.脾脏
 C.扁桃体
 D.骨髓
 E.肝脏

21. 患者将地上的草绳看成一条大蛇, 这种表现是
- 幻觉
 - 错觉
 - 感觉过敏
 - 关系妄想
 - 象征性思维
22. 狼疮肾炎诱导期治疗中, 以下免疫抑制剂首选的是
- 硫唑嘌呤
 - 甲氨蝶呤
 - 环磷酰胺
 - 来氟米特
 - 雷公藤
23. 肱骨髁上骨折最容易出现的晚期并发症是
- 肱动脉损伤
 - 肘内翻畸形
 - 肘关节外翻畸形
 - 尺神经损伤
 - 骨折不愈合
24. 对女性生殖器尖锐湿疣, 不适宜的治疗是
- 局部用三氯醋酸
 - 冷冻
 - 口服红霉素
 - 微波
 - 激光
25. 胎盘的组成
- 羊膜、叶状绒毛膜和底蜕膜
 - 羊膜、叶状绒毛膜和包蜕膜
 - 羊膜、平滑绒毛膜和包蜕膜
 - 羊膜、平滑绒毛膜和底蜕膜
 - 羊膜、平滑绒毛膜和直蜕膜
26. 使用化妆品后 24 小时后出现面部水肿、渗出、痒痛, 应属于
- I 型变态反应
 - II 型变态反应
 - III 型变态反应
 - IV 型变态反应
 - 以上都不是
27. 日本血吸虫病的临床分型不包括
- 急性血吸虫病
 - 肝硬化型血吸虫病
 - 晚期血吸虫病
 - 异位血吸虫病
 - 慢性血吸虫病
28. 丙型肝炎病毒下列叙述不正确的是
- 为单股正链 RNA 病毒
 - 绝大多数为血源传播
 - 血清中可检测病毒 RNA
 - 可应用血源疫苗免疫以预防感染
 - 血清中检测出抗-HCV 提示有感染
29. 提示早期慢性肺源性心脏病的临床表现是
- 胸闷、呼吸困难
 - 心悸、心音遥远
 - 发绀、乏力、易疲劳
 - 可见剑突下明显心脏搏动
 - 颈静脉怒张
30. 需要与妊娠晚期合并急性病毒性肝炎鉴别不包括
- 妊娠综合征
 - 药物性肝损害
 - 妊娠期急性脂肪肝
 - 妊娠剧吐引起的肝损害
 - 妊娠期高血压引起的肝损害
31. 骨干骨折经复位后发现“对线”不满意, 表示尚有
- 侧方移位
 - 旋转移位
 - 缩短移位
 - 成角移位
 - 分离移位
32. 肛裂“三联征”
- 肛裂, 前哨痔和肛乳头肥大

- B. 肛裂, 肛乳头肥大和肛周脓肿
 C. 肛裂, 前哨痔和肝周脓肿
 D. 肛裂, 大便失禁和肛乳头肥大
 E. 肛裂, 前哨痔和大便失禁
33. 关节内骨折最常见的并发症是
 A. 创伤性关节炎
 B. 缺血性骨坏死
 C. 骨化性肌炎
 D. 骨生成异常
 E. 骨折不愈合
34. 骨折功能复位标准, 正确的说法是
 A. 长骨干横行骨折对位至少达 3/4
 B. 下肢侧方成角移位不需矫正
 C. 前臂双骨折只需对位良好
 D. 下肢缩短移位成人不超过 2 厘米
 E. 旋转移位必须矫正
35. 股骨颈骨折时, 股骨头缺血性坏死率最高的是
 A. 完全性头下骨折
 B. 不完全性基底骨折
 C. 完全性基底骨折
 D. 不完全性经颈骨折
 E. 完全性经颈骨折
36. 肱骨外上髁炎首选的治疗方法是
 A. 加强功能锻炼
 B. 局部封闭
 C. 肘关节制动
 D. 抗生素消炎
 E. 手术治疗
37. 肾病综合征出现大量蛋白尿的主要机制是
 A. 肾血流量增加
 B. 肾静脉回流障碍
 C. 肾小球上皮细胞足突裂隙增大
 D. 肾小球过滤膜电荷屏障受损
 E. 肾小球过滤膜内皮窗孔径异常过大
38. 肠外营养的技术性并发症中最严重的是
 A. 神经损伤
 B. 气胸
 C. 胸导管损伤
 D. 空气栓塞
 E. 血胸
39. 月经来潮前性激素的生理变化是
 A. 孕激素出现两个高峰
 B. 只出现孕激素高峰
 C. 只出现雌激素高峰
 D. 出现雌、孕激素高峰
 E. 雌、孕激素均不出现高峰
40. 胰腺癌与胆总管结石的主要鉴别点是
 A. 进行性黄疸
 B. 肝功能改变
 C. 淀粉酶改变
 D. 胆囊肿大
 E. 皮肤瘙痒
41. 慢性乙型肝炎最重要的治疗药物是
 A. 扶正化瘀胶囊
 B. 恩替卡韦
 C. 甘草酸二胺
 D. 利巴韦林
 E. 胸腺肽
42. 与宫颈癌的发生密切相关的是
 A. 人乳头瘤病毒
 B. 麻疹病毒
 C. 禽流感病毒
 D. 乙型肝炎病毒
 E. 以上都不正确
43. 药物不良反应
 A. 一般都很严重
 B. 发生在治疗剂量
 C. 发生在大剂量情况下
 D. 可以避免一般都很严重
 E. 产生原因与药物作用的选择性高有关
44. 胃癌最常见的病理类型是

- A.腺癌
B.小细胞癌
C.未分化癌
D.印戒细胞癌
E.鳞状细胞癌
- 45.血栓闭塞性脉管炎查体的特异性体征是
A.足背动脉搏动消失
B.Hoffman 征阳性
C.Trendelenburg 试验阳性
D.Buerger 试验阳性
E.Perthies 试验阳性
- 46.T₃ 期多发性膀胱肿瘤的治疗方法是
A.放疗
B.膀胱部分切除术
C.膀胱内灌注化疗
D.经尿道膀胱肿瘤切除术
E.根治性膀胱全切术
- 47.伤寒最严重的并发症是
A.肺炎
B.肠穿孔
C.肠出血
D.中毒性心肌炎
E.血栓性静脉炎
- 48.外阴鳞状上皮增生局部治疗的主要药物是
A.雌激素
B.糖皮质激素
C.抗病毒药物
D.雄激素
E.抗生素
- 49.符合继发性腹膜炎腹痛特点的是
A.阵发性全腹绞痛
B.剧烈、持续性全腹痛
C.逐渐加重的阵发性腹痛
D.疼痛与进食有关
E.高热后全腹痛
- 50.急性胰腺炎最常见的临床表现是
A.左上腹部疼痛
B.呕吐
C.停止排气排便
D.黄疸
E.腹泻
- 51.脊髓灰质炎疫苗初种的年龄是
A.2 个月
B.3 个月
C.4 个月
D.5 个月
E.6 个月
- 52.癫痫患者服用抗癫痫药切忌
A.用药剂量太小
B.同时合用两种药
C.只在夜间服
D.突然停药
E.药物价格太高
- 53.急性苯中毒主要损害的是
A.骨骼系统
B.血液系统
C.神经系统
D.消化系统
E.呼吸系统
- 54.无症状性细菌尿最常见的致病菌是
A.粪肠球菌
B.大肠埃希菌
C.葡萄球菌
D.铜绿假单胞菌
E.变形杆菌
- 55.可出现血液中抗壁细胞抗体阳性的疾病是
A.慢性非萎缩性胃炎
B.急性胃炎
C.十二指肠溃疡
D.反流性食管炎
E.慢性萎缩性胃炎
- 56.确诊系统性红斑狼疮最有价值的自身抗体是

- A. 抗 SSA 抗体
 B. 抗 SSB 抗体
 C. 抗 RNP 抗体
 D. ANA 抗核抗体
 E. 抗 SM 抗体
57. 随境转移主要见于
 A. 躁狂症
 B. 适应障碍
 C. 精神分裂症
 D. 精神发育迟滞
 E. 脑器质性精神障碍
58. 心理冲突的类型不包括下列哪项
 A. 双避冲突
 B. 双趋冲突
 C. 趋避冲突
 D. 矛盾冲突
 E. 多重趋避冲突
59. 患支原体肺炎的患儿, 治疗首选的抗生素是
 A. 红霉素
 B. 青霉素
 C. 氨苄西林
 D. 先锋霉素
 E. 庆大霉素
60. 用青霉素 G 治疗钩端螺旋体病时, 应注意
 A. 首次给予大剂量
 B. 首次给予小剂量
 C. 与链霉素联合应用
 D. 与磺胺嘧啶联合应用
 E. 疗程 10 天以上
61. 霍乱弧菌最重要的致病物质是
 A. 菌毛
 B. 鞭毛
 C. 荚膜
 D. 内毒素
 E. 霍乱肠毒素
62. 真性和假性球麻痹症状的鉴别点是
 A. 吞咽困难
 B. 发音障碍
 C. 伸舌不能
 D. 双侧肢体活动障碍
 E. 咽反射的存在或减弱消失
63. 帕金森综合征与帕金森病的最主要区别是
 A. 症状更多
 B. 伴有脑萎缩
 C. 常有家族史
 D. 有明确病因
 E. 用多巴胺效果差
64. 肝硬化腹水形成的决定性因素是
 A. 中心静脉压增高
 B. 抗利尿激素增加
 C. 醛固酮分泌增加
 D. 门静脉高压
 E. 肝内淋巴液容量增加和淋巴回流不畅
65. 造成阑尾管腔阻塞从而诱发急性阑尾炎的最常见原因是
 A. 阑尾肿瘤压迫
 B. 食物残渣进入阑尾管腔
 C. 粪石阻塞管腔
 D. 蛔虫进入阑尾管腔
 E. 阑尾壁淋巴滤泡增生
66. 对骨与关节结核具有早期诊断价值的检查是
 A. 普通 X 线照片
 B. CT
 C. 核素骨扫描
 D. MRI
 E. 超声波检查
67. 胫骨中下 1/3 骨折最常见的并发症是
 A. 血管损伤
 B. 神经损伤
 C. 损伤性骨化

D.血管断裂

E.骨折延迟愈合

68.抗休克治疗中,下列提示微循环改善的指标中,临床最有意义的是

A.脉率减慢

B.神志变清楚

C.肤色转红润

D.尿量已达到 30mL/h

E.肢端温度上升

69.急性失血输血合理的是

A2 型题

A.失血量达到总血容量的 20%,输浓缩红细胞及全血

B.失血量达到总血容量的 35%,只输浓缩红细胞

C.失血量达到总血容量的 15%,输浓缩红细胞

D.失血量低于总血容量的 20%,可考虑不输血

E.失血量达到总血容量的 55%,只输浓缩红细胞及全血

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

70.68 岁,女性,近消瘦,嗜睡,神态淡漠。胃镜、肠镜检查无阳性,肝/肾功能正常,心电图示房颤,该患者诊断最大可能是

A.冠心病房颤

B.抑郁症

C.淡漠型甲亢

D.甲状腺功能减退症

E.老年性痴呆症

71.女,52 岁。低热、干咳 3 周,经胸部 X 线片诊断为浸润性肺结核。既往有高血压病史 8 年,痛风史 4 年,口服药物治疗。在患者进行抗结核治疗时,应避免使用的药物是

A.异烟肼

B.利福平

C.乙胺酰胺

D.吡嗪酰胺

E.链霉素

72.女,78 岁,晨起进行性左侧肢体无力,有糖尿病史。体检:左鼻唇沟浅,伸舌偏左,左上肢肌力 II 级,腱反射右>左,左侧跖反射无反应,左偏侧针刺觉降低。血压 150/80 mmHg,CT 无异常。临床诊断为

A.右侧半球脑栓塞

B.右侧半球脑出血

C.右侧半球脑血栓形成

D.蛛网膜下腔出血

E.以上都不是

73.20 岁,女,乳房肿块,边缘清晰,活动度大,生长缓慢,无压痛,应诊断为

A.乳管内乳头状瘤

B.乳腺结核

C.乳腺炎性肿块

D.乳腺纤维性腺瘤

E.乳腺囊性增生病

74.女,56 岁。直肠癌,距齿状线 5 cm,未浸出浆膜,经病理检查报告病理类型为腺癌,应选择哪种治疗

A.拉下式直肠癌切除术

B.Dixon 手术

C.经腹会阴联合直肠癌根治术

D.保留肛门,直肠癌切除,腹壁造瘘术

E.姑息乙状结肠造瘘术

75.患者男性,48 岁,确诊肝硬化 10 余年,腹水 7 天,经对症治疗效果不佳。昨日出现昏迷。化验肝功能正常,白蛋白 35 g/L

(正常 35~55 g/L), 血氨正常, 血常规: WBC $4 \times 10^9/L$, N 70%, L 30%。血 K^+ 2.5 mmol/L, Na^+ 128 mmol/L, Cl^- 100 mmol/L, 诊断为肝性脑病, 应以下列哪项抢救措施为主

- A. 补充人血白蛋白
- B. 抗感染
- C. 脱氨治疗
- D. 纠正电解质紊乱
- E. 纠正氨基酸比例

76. 女, 45 岁, 黄疸和皮肤瘙痒 3 月余, 伴乏力和食欲减退, 血清丙氨酸氨基转移酶 (ALT) 轻度异常, AKP、GGT、血清胆固醇均明显升高, IgM 升高, PT 延长应考虑为

- A. 急性黄疸型肝炎
- B. 淤胆型肝炎
- C. 原发性肝癌
- D. 钩端螺旋体病
- E. 原发性胆汁性肝硬化

77. 一患者在硬膜外麻醉下行胆囊切除术, 胸₇₋₈椎间隙穿刺, 首次给 1.33% 利多卡因 30 mL, 给药后 20 分钟医生划刀时发现血色发紫, 刀口不渗血, 诊断心跳停止, 应进行哪种抢救措施

- A. 头部降温
- B. 脱水治疗
- C. 胸内心脏按压
- D. 气管插管及胸外心脏按压
- E. 口对口人工呼吸

78. 男, 28 岁。在气温 34 °C 时, 负重跑步 5 公里后突发意识不清伴痉挛、抽搐 2 小时。查体: T41.5 °C, P166 次/分, R28 次/分, BP 100/42 mmHg。瞳孔等大等圆, 心尖部第一心音低钝。四肢肌张力高。最关键的治疗措施是

- A. 应用抗癫痫药物
- B. 应用镇静药
- C. 氧疗
- D. 降温治疗

E. 应用甘露醇

79. 男, 31 岁, 反酸伴上腹胀 2 个月, 胸骨后烧灼样痛 3 天。最适当的处理措施是

- A. 口服阿司匹林, 胸痛时舌下含硝酸甘油
- B. 口服奥美拉唑
- C. 食管 24 小时 pH 监测
- D. 多潘立酮及枸缘酸铋钾口服
- E. 冠状动脉造影

80. 女, 29 岁。无意中发现甲状腺肿块半个月, 近 3 天来似有增大, 甲状腺 B 超结果为实质性肿块, 内可见砂砾样钙化点。最可能的诊断是

- A. 单纯性甲状腺肿
- B. 青春期甲状腺肿
- C. 甲状腺癌
- D. 结节性甲状腺肿
- E. 甲状腺腺瘤伴囊内出血

81. 女, 45 岁。1 年来久站或长时间行走时觉左下腹部胀痛不适。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软, 无压痛, 立位左腹股沟韧带下方内侧突起半球形肿物, 平卧时可缩小, 咳嗽时无明显冲击感, 压迫内环后肿物仍可复出。该患者最适宜的手术方法是

- A. Shouldice 法疝修补术
- B. Ferguson 法疝修补术
- C. Bassini 法疝修补术
- D. Halsted 法疝修补术
- E. McVay 法疝修补术

82. 女, 40 岁。确诊为急性胰腺炎, 内科正规治疗 2 周后体温仍在 38~39 °C, 左上腹部压痛明显。血淀粉酶 256 U/L, 血 WBC $16 \times 10^9/L$, 可能性最大的是

- A. 并发胰腺脓肿
- B. 病情迁延未愈
- C. 合并急性胆囊炎

D. 并发胰腺假性囊肿

E. 败血症

83. 男性, 43 岁。因门静脉高压症食管胃底静脉曲张出血, 已行脾切除, 贲门周围血管离断术 1 年, 近 3 天来又有黑粪, 每日 4 次, 糊状, 量每次 150 mL 左右, 血红蛋白 80 g/L, 血压 90/60 mmHg, 应首先考虑作何种检查

A. 急诊胃镜

B. 急诊胃肠钡餐检查

C. 选择性动脉造影

D. 经皮肝穿刺行门静脉造影

E. 先止血待患者情况好转后再做胃镜检查

84. 男孩, 8 岁。突发剑突下阵发性剧烈绞痛 3 小时, 发作时辗转不安, 呻吟痛苦, 伴恶心呕吐, 发作过后如常人。检查无发热无黄疸, 腹平软无明显压痛, 白细胞计数正常, 应诊断为何病

A. 急性胃炎

B. 急性胆囊炎

C. 肠套叠

D. 胆道蛔虫病

E. 胃溃疡穿孔

85. 30 岁, 男性。驾车撞树受伤, 伤后右髋关节疼痛剧烈不能活动。查体: 患肢短缩, 呈屈曲、内收、内旋畸形, 应首先考虑的诊断是

A. 股骨颈骨折

B. 股骨干骨折

C. 髋关节后脱位

D. 髋关节前脱位

E. 坐骨神经损伤

86. 男孩, 8 岁。左膝肿痛, 急骤加重, 活动剧痛, 伴有高热。检查左膝关节明显红、肿、热及压痛。X 线片示关节间隙增宽, 其诊断首先应考虑为

A. 膝关节结核

B. 风湿性关节炎

C. 类风湿性关节炎

D. 化脓性关节炎

E. 痛风性关节炎

87. 男, 35 岁, 农民。发热 5 天, 尿少 1 天。查体: 体温 37.5 °C, 面部红, 结膜充血水肿, 腋下可见数个出血点。实验室检查: 血 WBC $19 \times 10^9/L$, 有异型淋巴细胞, 尿蛋白 (+ + +), 最可能的诊断是

A. 败血症

B. 地方性斑疹伤寒

C. 钩端螺旋体病

D. 肾综合征出血热

E. 急性肾盂肾炎

88. 女性, 30 岁。2 天来进行性双下肢瘫痪, 大小便障碍, 体温正常。胸 4 水平以下深浅感觉丧失和截瘫。脑脊液检查压力正常, 白细胞 $80 \times 10^9/L$ (80 个/ mm^3), 淋巴细胞占 80%, 蛋白轻度增高, 最可能的诊断为

A. 脊髓出血

B. 急性脊髓炎

C. 脊髓肿瘤

D. 多发性硬化

E. 急性硬膜外脓肿

89. 女性, 25 岁。无意中发现甲状腺肿块 7 天, 近 3 天肿块迅速增长, 伴有胀痛, 甲状腺 SPECT 检查甲状腺右叶冷结节, 应初步诊断为

A. 甲状腺癌

B. 甲状腺瘤

C. 结节性甲状腺肿

D. 单纯性甲状腺肿

E. 甲状腺囊腺瘤并囊内出血

90. 男, 50 岁。烦躁、昼睡夜醒 2 天。肝炎肝硬化病史 5 年。对明确意识障碍病因最有意义的实验室检查是

A. 血氨

B. ALT/AST

C. 血清蛋白电泳

D. 血糖

E. 电解质

91. 女性, 45 岁。因右上腹阵发性绞痛, 伴恶心呕吐 4 小时来院。检查: 体温 37℃, 右上腹深在轻度压痛, 无腹肌紧张, Murphy 征阴性, 为确诊进一步检查应首选

A. 白细胞计数和分类

B. 腹部 X 线平片

C. 测血清淀粉酶

D. BUS

E. PTE

92. 男, 50 岁。呕血、黑便 4 小时。发病前曾食硬质食物。发现 HBsAg 阳性 30 年。查体: P 108 次/分, BP 90/60 mmHg。烦躁、面色苍白、皮肤湿冷。应首选考虑的出血原因是

A. 十二指肠溃疡

B. 食管肿瘤

C. 胃溃疡

D. 食管胃底静脉曲张破裂

E. 急性胃黏膜病变

93. 男性, 34 岁。腹部砸伤 4 小时。查体见四肢湿冷, 腹肌紧张, 全腹压痛、反跳痛, 有移动性浊音, 肠鸣音消失。该病人目前应进行的处理不包括

A. 诊断性腹腔穿刺

B. 密切监测基本生命体征

C. 补充血容量, 抗休克治疗

D. 给予止痛和镇静剂

B1 型题

E. 抗感染治疗

94. 女, 64 岁。右膝疼痛 10 年, 加重半年。查体: 右膝肿胀, 屈曲内翻畸形。X 线片见关节间隙严重狭窄, 关节边缘大量骨赘形成。最佳治疗方案是

A. 制动和理疗

B. 关节融合术

C. 人工关节置换术

D. 口服非甾体抗炎药

E. 滑膜切除术

95. 男孩, 12 岁。诊断为左胫骨近端骨髓炎, 经局部引流后症状好转, 但目前局部仍有窦道流脓。X 线检查示大块死骨及新生骨, 有包壳形成。最主要的治疗措施是

A. 清除病灶

B. 间断应用抗生素

C. 石膏固定

D. 大剂量抗生素

E. 窦道刮除术

96. 男孩, 4 岁。发热、头痛、皮疹 12 小时, 频繁抽搐、昏迷 2 小时。查体: 全身可见大量瘀点瘀斑, 双下肢右部分融合成片, 血压测不出, 右侧瞳孔散大, 对光反射消失。下列处理不正确的是

A. 吸氧及心电监护

B. 瘀点涂片检菌

C. 急查 DIC 指标

D. 20% 甘露醇立即静脉滴注

E. 立刻腰椎穿刺做脑脊液常规检查

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(97~99 题共用备选答案)

A. 急性完全性输入段梗阻

B. 慢性不完全性输入段梗阻

C. 吻合口梗阻

D. 输出段梗阻

E. 碱性反流性胃炎

97.胃大部切除术后2年,剑突下持续性疼痛,进食后加重,常有胆汁性呕吐,呕吐后仍有疼痛,抗酸剂无效

98.胃大部切除术后,餐后20分钟上腹部胀痛,随后呕吐大量胆汁,不含食物,呕吐后症状缓解

99.胃大部切除术后,餐后上腹部饱胀,伴呕吐物既含胆汁,又有食物

(100~102题共用备选答案)

- A.椎基底动脉系统TIA
- B.颈内动脉血栓形成
- C.大脑前动脉血栓形成
- D.大脑中动脉血栓形成
- E.大脑后动脉血栓形成

100.病灶侧单眼失明

101.病灶对侧下肢中枢性瘫

102.眩晕

(103~106题共用备选答案)

- A.内分泌功能亢进
- B.内分泌功能减退
- C.内分泌功能正常
- D.激素受体不敏感
- E.下丘脑-垂体-靶腺轴的反馈抑制致

功能减退

103.甲状腺功能亢进

104.地方性甲状腺肿

105.Cushing综合征伴双侧肾上腺皮质萎缩是

106. I型糖尿病是

(107~108题共用备选答案)

- A.股骨颈骨折
- B.股骨粗隆间骨折
- C.股骨上1/3骨折
- D.股骨上中段骨折
- E.股骨髁上骨折

107.骨折近折端外展,外旋屈曲移位

108.下肢短缩,外展,极度外旋位

(109~110题共用备选答案)

A.上斜肌

B.下斜肌

C.外直肌

D.眼轮匝肌

E.瞳孔开大肌

109.滑车神经支配的肌肉是

110.动眼神经支配的肌肉是
(111~112题共用备选答案)

- A.低位肠梗阻
- B.麻痹性肠梗阻
- C.痉挛性肠梗阻
- D.绞窄性肠梗阻
- E.高位肠梗阻

111.持续腹痛血便,肠鸣音消失,有腹膜刺激征的原因是

112.呕吐粪样内容物,腹部高度膨胀的原因是

(113~115题共用备选答案)

- A.肩关节外展受限
- B.肩部疼痛、无活动受限
- C.肘关节外侧疼痛
- D.肘关节活动受限
- E.Finkelstein试验阳性

113.颈椎病

114.肩关节周围炎

115.桡骨茎突狭窄性腱鞘炎

(116~117题共用备选答案)

- A.滴虫阴道炎
- B.外阴阴道假丝酵母菌病
- C.萎缩性阴道炎
- D.婴幼儿外阴阴道炎
- E.淋球菌阴道炎

116.妊娠,糖尿病患者及接受大量雌激素治疗患者易发生

117.白带呈脓性泡沫状,用酸性液体冲洗阴道可提高疗效

(118~119题共用备选答案)

A.阿奇霉素

- B. 氧氟沙星
- C. 多西环素
- D. 青霉素
- E. 头孢曲松

118. 孕妇感染梅毒首选的治疗药物是

119. 孕妇生殖道感染沙眼衣原体首选的药物是

(120~121 题共用备选答案)

A3/A4 型题

- A. 人类疱疹病毒 6 型
- B. 柯萨奇病毒 A 型
- C. 柯萨奇病毒 B 型
- D. 单纯疱疹病毒
- E. 无正确选项

120. 病毒性心肌炎与哪项有关

121. 幼儿急疹的病原

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(122~124 题共用题干)

患儿,4 周岁。2 周前曾患感冒,现不规则发热,易疲倦,脸色苍白,查体发现心率增快,心尖部第一心音减弱,并可闻及早搏,心电图检查:P-R 间期延长,ST 段下移,实验室检查:C 反应蛋白增高。

122. 该患儿的临床诊断最可能是

- A. 病毒性心肌炎
- B. 风湿性心肌炎
- C. 风湿性心包炎
- D. 结核性心包炎
- E. 类风湿性心包炎

123. 下列哪项检查可以帮助确诊

- A. 血沉
- B. 谷草转氨酶
- C. 抗透明酸酶
- D. 心脏 X 线检查
- E. CK-MB

124. 该患儿首选的药物是

- A. 水杨酸制剂
- B. 洋地黄类药物
- C. 地塞米松制剂
- D. 镇静剂
- E. 抗生素

(125~127 题共用题干)

患儿,5 岁。眼睑及双下肢明显水肿,少尿 1 周,体检:精神状态良好,眼睑水肿,双下肢呈凹陷性水肿,血压 90/60 mmHg,心肺正常,尿常规:蛋白(+++),红细胞 0~3 个/HP,血浆总蛋白 45 g/L,白蛋白 22 g/L,抗“O”正常,C₃ 补体正常,胆固醇 11.3 mmol/L。

125. 该患儿诊断为

- A. 急性肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 肾炎性肾病
- D. 急进性肾炎
- E. 病毒性肾炎

126. 该患儿病理类型最可能为

- A. 微小病变型
- B. 系膜增生型
- C. 局灶性阶段性肾小球硬化
- D. 膜性肾病
- E. 膜增生性肾炎

127. 该患儿治疗应选

- A. 泼尼松短程疗法
- B. 泼尼松中程疗法
- C. 泼尼松长程疗法
- D. 甲泼尼松龙冲击疗法

E.波尼松+环磷酰胺

(128~130题共用题干)

女,25岁。2周来发热,四肢关节酸痛,无皮疹,胸透示两侧少量胸腔积液,体检:体温39℃,心率:120次/分,两下肺叩诊浊音,呼吸音降低,肝脾未触及,两手掌指关节及膝关节轻度肿胀,Hb 100 g/L,白细胞 $3\times 10^9/L$,血小板 $50\times 10^9/L$,尿常规蛋白1 g/L。

128.本病最可能诊断

- A.类风湿关节炎
- B.系统性红斑狼疮
- C.结核性胸膜炎
- D.病毒感染
- E.再生障碍性贫血

129.根据以上病史还需作进一步检查,下列检查中,你认为对诊断最为关键的检查是

- A.血沉
- B.C反应蛋白
- C.类风湿因子
- D.抗核抗体谱检查
- E.免疫球蛋白+补体

130.检查结果:类风湿因子弱阳性,血沉120 mm/h,IgG 19 g/L,抗核抗体阳性, C_3 及 CH_5O 降低,抗双链DNA抗体增高。本例首选药物

- A.非甾体抗炎药+慢作用抗风湿药
- B.糖皮质激素
- C.环磷酰胺
- D.羟基氯喹
- E.青霉胺

(131~133题共用题干)

男,66岁。突发剧烈头痛、呕吐3天,伴眼睑下垂。体检:神志模糊,瞳孔右6 mm,对光反射消失,左3 mm,对光反射灵敏,四肢均有自主活动,颈有抵抗,Kernig征(+).体温37℃,血压140/75 mmHg。

131.临床的第一个诊断是

- A.脑炎
- B.脑膜炎
- C.脑出血
- D.蛛网膜下腔出血
- E.急性硬膜下出血

132.为了明确诊断,首选辅助检查是

- A.脑电图
- B.腰穿脑脊液检查
- C.头颅CT
- D.头颅MRI
- E.DSA脑血管造影

133.治疗中哪一项是不正确的

- A.绝对卧床休息
- B.大剂量止血剂
- C.脱水降颅压
- D.保持大便通畅
- E.早期应用钙通道阻滞剂

(134~136题共用题干)

女性,30岁。右侧甲状腺单发结节,质硬,生长迅速,近一周伴声音嘶哑,ECT示右甲状腺冷结节。

134.为明确诊断下列哪项检查最有意义

- A.确切的体检
- B.颈部X线摄片
- C.穿刺细胞学检查
- D.甲状腺B超
- E.甲状腺CT

135.如未能确诊,拟行手术,应采用何种术式

- A.结节切除术
- B.患侧腺体全切
- C.颈部淋巴结清除术
- D.患侧腺体大部切除加冷冻切片检查
- E.患侧全切,峡部切除,对侧大部切除

136.如病理报告为甲状腺乳头状癌,又无远处转移,应采用何种术式

- A.患侧全切加颈部淋巴结清扫

- B. 患侧全切, 峡部切除, 对侧大部切除
 C. 双侧甲状腺全部切除
 D. 患侧腺体大部切除, 峡部切除
 E. 患侧腺体大部切除加颈淋巴结清除
 (137~139 题共用题干)

男, 65 岁。排便次数增加 6 个月, 伴里急后重、排便不尽感。1 个月来大便变细, 偶有大便表面带血, 自觉乏力, 体重减轻 4kg。

137. 首选的检查方法是

- A. 粪隐血
 B. 直肠指检
 C. 腹部超声
 D. 结肠镜
 E. 腹部 CT

138. 决定该病人手术方式的要点是

- A. 病灶下缘距齿状线距离
 B. 病灶浸润肠壁的深度
 C. 是否合并肠周淋巴结转移
 D. 病灶浸润肠壁的周长
 E. 病灶浸润肠壁的长度

139. 该疾病最常见的远处转移部位是

- A. 脾
 B. 肝脏
 C. 骨骼
 D. 脑
 E. 肺

(140~143 题共用题干)

女性, 52 岁。有胆管结石病史, 近 2 天来右上腹痛, 体温 37.8℃, 2 小时前突然畏寒、寒战, 体温达 40℃, 精神紧张兴奋、口渴、面色苍白、脉搏 98 次/分、有力, 血压 110/96 mmHg, 尿量每小时 26 mL。

140. 患者处于何种情况

- A. 急性胆管炎, 无休克
 B. 休克代偿期
 C. 中度休克
 D. 重度休克
 E. 高排低阻型休克

141. 下列哪一项不是其微循环变化的特征

- A. 微动脉, 微静脉收缩
 B. 动静脉短路开放
 C. 直捷通道开放
 D. 组织灌流减少
 E. 静脉回心血量减少

142. 为排除发生弥散性血管内凝血的可能作了多项检查, 下列哪项监测检查结果是无意义的

- A. 血小板计数低于 $80 \times 10^9/L$
 B. 纤维蛋白原少于 1.5 g/L
 C. 凝血酶原时间较正常延长 3 秒以上
 D. 副凝固试验阳性
 E. 凝血时间明显缩短

143. 下列哪项治疗原则是错误的

- A. 积极补充血容量
 B. 联合应用抗菌药物
 C. 尽早作胆管引流
 D. 纠正酸中毒
 E. 静脉滴注间羟胺

(144~145 题共用题干)

男, 68 岁。风湿性心脏瓣膜病 20 年, 因心悸 5 天就诊。查体: 自主体位, BP 150/70 mmHg, 心率 119 次/分, 心律绝对不齐, 第一心音强弱不等。心电图示心房颤动。

144. 为控制该患者的心室率不宜首选

- A. 地高辛
 B. 美托洛尔
 C. 维拉帕米
 D. 硫氮草酮
 E. 普罗帕酮

145. 宜首选的抗凝治疗是

- A. 华法林
 B. 阿司匹林
 C. 肝素
 D. 尿激酶
 E. 复方丹参片

(146~148 题共用题干)

女性,68 岁。进行性吞咽困难 2 个月,现仅能进流质食物。查体:消瘦,锁骨上未触及肿大淋巴结,食管 X 线钡餐透视显示:食管中段黏膜破坏,充盈缺损,管腔狭窄。

146. 第一步检查应首选

- A. 食管镜
- B. 食管拉网
- C. 放射性核素
- D. 胸部及纵隔 CT
- E. 腹部超声波和肝功能检查

147. 如患者出现声音嘶哑,提示肿瘤已侵犯

- A. 声带
- B. 气管隆突
- C. 迷走神经
- D. 喉返神经
- E. 喉上神经

148. 腹部超声波检查发现肝内有多发性转移瘤,提示来自食管癌的哪种转移途径

- A. 直接浸润

B. 血行转移途径

C. 淋巴转移途径

D. 种植转移途径

E. 消化道黏膜下浸润

(149~150 题共用题干)

男性,52 岁。反复无痛性肉眼血尿伴条状血块 2 月,膀胱镜检见右输尿管口喷血,尿细胞学可见癌细胞。

149. 静脉尿路造影最有诊断价值的 X 线表现是

- A. 右肾不显影
- B. 右肾积水
- C. 右肾萎缩
- D. 右肾盂充盈缺损
- E. 右肾盏破坏

150. 明确诊断后首选的治疗方法是

- A. 右肾切除术
- B. 右肾输尿管全切除
- C. 化疗
- D. 放疗
- E. 免疫治疗

本单元试卷到此结束

参考答案

第三单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	B	C	B	B	D	D	D	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	D	A	C	E	A	B	A	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	C	B	C	A	D	B	D	D	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	A	A	E	A	B	D	D	D	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	B	A	D	E	B	B	B	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	D	C	B	E	E	A	D	A	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
E	E	D	D	E	D	E	D	D	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	C	D	B	D	E	D	D	B	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	A	A	D	C	D	D	B	A	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	D	D	C	A	E	E	B	D	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	A	A	C	E	B	C	B	A	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	A	B	A	E	B	A	D	A	C

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	A	E	C	B	A	B	B	D	B
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	C	B	C	D	E	B	A	B	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
E	E	E	E	A	A	D	B	D	B

11.【解析】依据骨折复位后是否稳定可分为稳定性骨折和不稳定性骨折。不稳定性骨折是骨折端移位或复位后经适当外固定仍易于发生再移位者。如斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折等。故选 E。

23.【解析】儿童期肱骨髁上骨折时,桡侧或尺侧移位未得到纠正,或合并了骨骺损伤,骨折愈合后,可出现肘内、外翻畸形。因此,应尽量达到解剖复位,如达不到解剖复位可采用切开复位克氏针固定,注意解析的描述是肘,而不是肘关节。

29.【解析】①ABC 选项中症状缺乏特异性,因此可排除;②剑突下心脏搏动增强提示右心室肥大,属于肺心病心肺功能代偿期的临床表现。颈静脉怒张提示右心衰竭,属于失代偿期的临床表现。题干要求回答的是“早期”临床表现,因此正确答案为 D。

31.【解析】轴线不平行,即对线不良,表示有成角畸形,以角顶的方向称为向前,向内或向外成角。

33.【解析】创伤性关节炎为软骨损坏,软骨下骨硬化,囊性变,滑膜炎。临床表现为关节活动后肿痛发作。多见于关节内骨折复位不良,造成关节面不平引起。故答案为 A。

34.【解析】骨折功能复位标准:①骨折部位的旋转移位、分离移位必须完全矫正;②缩短移位:在成人下肢骨折不超过 1cm;儿童若无骨骺损伤,下肢缩短在 2cm 以内,在生长发育过程中可自行矫正;③成角移位:在骨痂改造期内自行矫正,必须完全复位;④长骨干横形骨折对位 1/3,干骺端骨折对位 3/4。故选 E

35.【解析】(1)股骨头下骨折:骨折线位于股骨头下,使旋股内、外侧动脉的营养支损伤。股骨头严重缺血,坏死率高。(2)经股骨颈骨折:骨折线位于股骨颈中部,常呈斜形,可使股骨干滋养动脉升支损伤,易发生股骨头坏死或骨折不愈合。(3)股骨颈基底骨折:骨折线位于股骨大、小转子连线处。因骨折部位对股骨头血供干扰较小,容易愈合,股骨头坏死率低。

36.【解析】肱骨外上髁炎治疗方法包括限制局部功能锻炼,局部封闭,腕关节制动。对早期治疗不当,病程长、症状顽固者,施行伸肌总腱起点剥离松解术或卡压神经血管束切除结扎术。故答案选 B。

71.【解析】①异烟肼常见不良反应为周围神经炎,可服用维生素 B₆;②利福平不良反应为用药后如出现一过性转氨酶上升可继续用药,加保肝治疗观察,如出现黄疸应立即停药;③吡嗪酰胺不良反应为高尿酸血症、肝损害、食欲缺乏、关节痛和恶心。患者有痛风史所以本题选 D;④乙胺丁醇不良反应为视神经炎;⑤链霉素不良反应为耳毒性、前庭功能损害和肾毒性。

66.【解析】核素骨扫描的灵敏度最高,可以早期显示出病灶的变化,但这种变化并不是

只有骨关节结核才具有的特征性改变,故不能作为定性诊断。MRI 检查可以在炎性浸润阶段时显示出异常信号,具有早期诊断价值。

67.【解析】胫骨的营养血管从胫骨上、中 1/3 交界处入骨内,在中、下 1/3 处的骨折营养动脉损伤,供应下 1/3 的血循环明显减少,同时胫骨下 1/3 几乎无肌肉附着,血供本来就少,因此,胫骨下 1/3 骨折愈合较慢,容易发生骨折延迟愈合或不愈合。在试题中很多时候下 1/3 描述为中下 1/3。

85.【解析】患肢短缩,呈屈曲、内收、内旋畸形,应首先考虑的诊断是髌关节后脱位。

86.【解析】左膝关节明显红、肿、热及压痛。X 线片示关节间隙增宽,其诊断首先应考虑为化脓性关节炎。

94.【解析】女性患者,右膝肿胀,疼痛加重,查体:屈曲内翻畸形。X 线片示关节间隙狭窄,关节边缘大量骨赘形成。考虑为骨关节炎。由于患者处于病情的晚期。出现畸形,且年龄较大,可选用人工关节置换术。

95.【解析】①左胫骨近端骨髓炎患者,窦道流脓,X 线片示大块死骨、有新生骨和包壳形成,应诊断为慢性骨髓炎。其治疗以手术为主,原则是清除死骨、炎性肉芽组织,消灭死腔(A);②抗生素主要用于慢性骨髓炎急性发作期的治疗,故不答 BD。石膏固定是预防病理性骨折的措施之一,故不答 C。仅作窦道刮除术而不作病灶清除术,则慢性骨髓炎不会痊愈。

110-4

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

2020 年临床执业医师资格考试 模拟试卷

(医学综合笔试部分)

报考类别：临床执业医师

第四单元

考试日期：2020 年 8 月 23 日

考试时间：16：30—18：30

考生姓名：_____

准考证号：_____

考场号：_____

第四单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- | | |
|--|---|
| <p>1. 治疗骨肉瘤应首选</p> <p>A. 肿瘤切除术+化学治疗</p> <p>B. 局部整块切除</p> <p>C. 化学治疗</p> <p>D. 放射治疗</p> <p>E. 根治性切除+术前术后化疗</p> <p>2. 脓尿患者,一般抗炎治疗无效,普通培养无细菌生长,首先考虑</p> <p>A. 肾盂肾炎</p> <p>B. 膀胱肿瘤</p> <p>C. 间质性膀胱炎</p> <p>D. 泌尿系结核</p> <p>E. 泌尿系结石</p> <p>3. 损伤出现明显血尿的是</p> <p>A. 肾部分裂伤,肾盂肾盏黏膜破裂</p> <p>B. 肾动脉血栓形成</p> <p>C. 肾盂广泛裂伤</p> <p>D. 输尿管断裂或被血块阻塞</p> <p>E. 肾蒂血管断裂</p> <p>4. 急性血源性骨髓炎好发年龄应该是</p> <p>A. 少年</p> <p>B. 婴幼儿</p> <p>C. 青年</p> <p>D. 中壮年</p> <p>E. 老年</p> <p>5. 关于精索静脉曲张的治疗,下列哪项是错误的</p> <p>A. 无症状或症状轻者,可穿紧身内裤或</p> | <p>用阴囊托带</p> <p>B. 手术方式为高位结扎精索内静脉</p> <p>C. 症状较重,或精液异常排除其他疾病时可以考虑手术</p> <p>D. 腹腔镜手术可以同时结扎双侧曲张静脉</p> <p>E. 对儿童Ⅲ度曲张患者可以观察</p> <p>6. hCG 妊娠期间分泌量达高峰的时间是</p> <p>A. 妊娠 4~6 周</p> <p>B. 妊娠 12~14 周</p> <p>C. 妊娠 8~10 周</p> <p>D. 妊娠 16~18 周</p> <p>E. 妊娠 20~22 周</p> <p>7. 常伴有 AFP 升高的卵巢肿瘤是</p> <p>A. 卵黄囊瘤</p> <p>B. 颗粒细胞瘤</p> <p>C. 成熟性畸胎瘤</p> <p>D. 无性细胞瘤</p> <p>E. 上皮性肿瘤</p> <p>8. 后尿道损伤最常见的后期并发症为</p> <p>A. 尿道直肠痿</p> <p>B. 直肠损伤</p> <p>C. 尿外渗</p> <p>D. 阳痿</p> <p>E. 尿道狭窄</p> <p>9. 腹股沟部隐睾最常见的并发症为</p> <p>A. 腹股沟疝</p> <p>B. 恶变</p> |
|--|---|

- C.疼痛
D.精索静脉曲张
E.睾丸鞘膜积液
- 10.前列腺增生最重要的症状是
A.排尿困难
B.尿频
C.尿失禁
D.尿潴留
E.尿流中断
- 11.睾丸肿瘤主要临床表现
A.腹股沟淋巴结肿大
B.睾丸疼痛
C.血尿
D.发热
E.睾丸肿大,有沉重感
- 12.下列关于胎方位的描述正确的是
A.指最先进入母体骨盆入口的胎儿部分
B.指胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系
C.指母体纵轴与胎儿纵轴的关系
D.指胎儿头部与母体骨盆的关系
E.指胎儿在腹腔中的各种姿势
- 13.有先兆偏头痛最常见的先兆是
A.听觉先兆
B.视觉先兆
C.感觉先兆
D.言语先兆
E.运动先兆
- 14.下列提示胎盘功能正常的情况是
A.血清胎盘生乳素突然降低 50%
B.NST 试验无反应型
C.胎动<10 次/12 小时
D.OCT 试验阳性
E.雌激素/肌酐比值>15
- 15.孕妇尿中检出的激素,与胎儿胎盘功能关系最密切的是
A.孕二醇
B.皮质醇
C.雌三醇
D.雌二醇
E.醛固酮
- 16.下列提示颅后窝骨折的临床表现是
A.视神经损伤
B.Battle 征
C.嗅神经损伤
D.眼镜征
E.脑脊液鼻漏
- 17.防止子宫下垂最主要的韧带是
A.子宫圆韧带
B.子宫阔韧带
C.腹股沟韧带
D.子宫骶韧带
E.子宫主韧带
- 18.晚期胚泡透明带消失后,相当于受精后第几日开始着床
A.2~3 天
B.4~5 天
C.8~9 天
D.6~7 天
E.10~11 天
- 19.吉兰-巴雷综合症的脑脊液蛋白-细胞分离是指
A.蛋白增高,细胞数正常
B.蛋白增高,细胞数降低
C.蛋白正常,细胞数正常
D.蛋白降低,细胞数正常
E.蛋白正常,细胞数增高
- 20.确诊前列腺癌最有帮助的检查是
A.直肠指诊
B.经直肠超声
C.血 PSA
D.CT
E.前列腺穿刺活检
- 21.不能通过输血传播的病原是
A.HIV

- B. EB 病毒
C. 巨细胞病毒
D. 肝炎病毒
E. 单纯疱疹病毒
22. 导致输卵管妊娠的主要病因是
A. 输卵管妊娠史
B. 辅助生殖技术
C. 输卵管炎症
D. 输卵管发育不良或功能异常
E. 剖宫产史
23. 早产儿出生后立即出现进行性呼吸困难, 最可能发生的疾病是
A. 先天性心脏病
B. 胎粪吸入综合征
C. 吸入性肺炎
D. 湿肺
E. 新生儿呼吸窘迫综合征
24. 一侧肾癌主要治疗方法是
A. 肾肿瘤切除术
B. 单纯肾切除
C. 肾输尿管全切除
D. 根治性肾切除术
E. 化疗
25. 乳腺癌中, 一般分化低, 预后较差的病理类型是
A. 黏液腺癌
B. 髓样癌
C. 小管癌
D. 乳头状癌
E. 浸润性小叶癌
26. 无排卵性功能失调性子宫出血患者诊断性刮宫的病理结果不可能出现的是
A. 增生性子宫内膜
B. 单纯性增生
C. 复杂性增生
D. 萎缩型子宫内膜
E. 分泌期和增生期内膜并存
27. 用羊水指数法表示, 大于多少考虑羊水过多
- A. 10 cm
B. 12 cm
C. 25 cm
D. 14 cm
E. 22 cm
28. 关于产力, 胎头在完成内旋转时, 除了子宫收缩力之外, 还有下述哪组肌肉参与了子宫收缩力, 还有下述哪组肌肉参与
A. 膈肌
B. 腹肌
C. 胎儿躯干肌肉
D. 四肢骨骼肌
E. 肛提肌
29. 疱疹性咽峡炎的最常见的病原体是
A. 流感病毒
B. 副流感病毒
C. 单纯疱疹病毒
D. 柯萨奇病毒
E. 腺病毒
30. 关于子宫内膜癌的描述, 正确的是
A. 透明细胞癌是最常见的病理类型
B. 非激素依赖型比激素依赖型预后差
C. 早期患者首选治疗方法是放射治疗
D. 肿瘤侵及直肠黏膜时, 分期为 IVB
E. 血行转移是最常见的转移途径
31. 早期先兆流产最先出现的症状是
A. 停经
B. 子宫停止增大
C. 少量阴道流血
D. 阵发性腹痛
E. 妊娠试验由阳性转为阴性
32. 下列导致胎儿生长受限的因素最常见的是
A. 妊娠期糖尿病
B. 多次刮宫导致宫腔粘连
C. 妊娠期高血压疾病
D. 合并卵巢小囊肿
E. 羊水过多

33. 心脏病孕妇妊娠期间, 最危险的时期是

- A. 妊娠 34~35 周
- B. 妊娠 28~31 周
- C. 妊娠 24~27 周
- D. 妊娠 32~34 周
- E. 产褥期 7 天后

34. 既往月经规律, 妊娠 42⁺⁵ 周, 下列情况最不可能出现的是

- A. 羊水增多
- B. 羊水粪染
- C. 胎儿生长受限
- D. 胎盘功能正常
- E. 胎儿过熟综合征

35. 引起胎盘早剥的主要病因是

- A. 叶酸缺乏
- B. 胎动活跃
- C. 全身水肿
- D. 羊水过少
- E. 妊娠高血压疾病

36. 妊娠早期心脏病患者, 决定是否继续妊娠的主要依据是

- A. 患者年龄
- B. 孕前的体重
- C. 胎儿大小
- D. 病变发生部位
- E. 心脏病种类

37. 健康育龄妇女出现恶心、食欲减退等消化道症状, 问诊时不应忽视的是

- A. 月经史
- B. 传染病史
- C. 肝炎病史
- D. 不结饮食史
- E. 胃炎病史

38. 确诊前置胎盘首选

- A. 产后检查胎膜破口距胎盘边缘 5 cm
- B. 腹部正位片, 子宫体部无胎盘影
- C. 窥器检查宫颈未见病变

D. 阴道穹隆扪诊可发现宫颈口周围有软组织

E. 妊娠晚期 B 型超声检查可见胎盘覆盖宫颈内口

39. 初产妇, 急产一体重 4 000 g 新生儿, 胎儿娩出后较多量持续性鲜红色阴道出血, 出血原因最可能是

- A. 宫缩乏力
- B. 子宫破裂
- C. 胎盘剥离不全
- D. 凝血功能障碍
- E. 软产道损伤

40. 对雌激素生理作用的叙述, 正确的是

A. 抑制子宫收缩
B. 促进水钠潴留, 维持和促进骨基质代谢

C. 抑制输卵管平滑肌节律性收缩的振幅

D. 加快阴道上皮细胞脱落

E. 使宫颈口闭合, 黏液分泌减少、变黏稠

41. 中央性前置胎盘大出血的治疗方法正确的是

- A. 人工破膜
- B. 催产素引产阴道分娩
- C. 胎头吸引
- D. 为臀位行牵引术
- E. 剖宫产

42. 口服避孕药后月经第 9 天不规则出血, 正确的处理方法是

- A. 加倍服药
- B. 需立即停药
- C. 加服少量孕激素
- D. 加服少量雄性激素
- E. 加服少量雌激素

43. 病理性缩复环最常见于

- A. 男性骨盆
- B. 高张性宫缩乏力

- C.软产道损伤
D.枕后位
E.先兆子宫破裂
- 44.关于胎膜早破患者阴道流液的 pH 说法正确的是
A.pH 4.5
B.pH 4.5~5.5
C.pH 5.5~6.0
D.pH \geq 6.5
E.pH 6.0~6.5
- 45.部分性葡萄胎核型常是
A.三倍体
B.二倍体
C.单倍体
D.四倍体
E.五倍体
- 46.下列疾病中,最可能于凌晨反复出现咳嗽和气短症状的是
A.慢性肺脓肿
B.慢性支气管炎
C.支气管哮喘
D.肺结核
E.支气管扩张
- 47.维持阴道正常酸性环境的主要菌群是
A.葡萄球菌
B.肠球菌
C.大肠埃希菌
D.棒状杆菌
E.乳酸杆菌
- 48.羊水栓塞 DIC 的早期,首选的处理是
A.输新鲜血
B.止血药
C.肝素治疗
D.输纤维蛋白原
E.肌注双嘧达莫
- 49.治疗具有严重细胞免疫缺陷患者的唯一有效措施是
A.保护性隔离
B.抗生素预防性治疗
C.输新鲜血
D.免疫球蛋白替代疗法
E.免疫重建
- 50.子宫肌瘤红色变性常发生在
A.肌瘤扭转时
B.性功能活跃时
C.分娩期
D.妊娠期
E.月经期经量多时
- 51.绒癌最常见的转移部位依次是
A.肺、脑、肝、阴道
B.阴道、肺、肝、脑
C.肝、心、脑、肺
D.肺、阴道、肝、脑
E.肝、肺、阴道、脑
- 52.与子宫肌瘤的临床表现无明显相关的是
A.不孕
B.反复早期流产
C.排便困难
D.贫血
E.尿频尿急尿痛
- 53.关于哮喘的治疗下列错误的是
A.避免接触过敏原
B.清除感染灶
C.去除各种诱发因素
D.不需抗炎治疗
E.解除支气管痉挛
- 54.新生儿窒息复苏评估的三大指标是
A.呼吸,心率,哭声
B.心率,呼吸,皮肤颜色
C.呼吸,皮肤颜色,哭声
D.心率,呼吸,肌张力
E.心率,皮肤颜色,肌张力
- 55.支气管淋巴结结核出现声嘶是由于肿大的淋巴结压迫

- A.迷走神经
 B.右侧颈静脉
 C.左侧颈静脉
 D.喉返神经
 E.肺动脉
- 56.小儿生理性贫血发生的时期是在出生后
- A.7~8 个月
 B.2~3 个月
 C.6~7 个月
 D.1 个月内
 E.4~5 个月
- 57.诊断脑出血最迅速、最可靠的检查是
- A.脑电图
 B.脑血管造影
 C.脑脊液检测
 D.头颅 CT
 E.头颅 MRI
- 58.临床常用药物流产方法是
- A.米非司酮
 B.卡孕栓
 C.米非司酮+米索前列醇
 D.环磷酰胺
 E.卡孕栓+米索前列醇
- 59.法洛四联症较少合并以下哪种疾病
- A.脑缺氧发作
 B.感染性心内膜炎
 C.脑脓肿
 D.脑栓塞
 E.肺炎
- 60.不引起肠黏膜损伤的腹泻致病菌是
- A.空肠弯曲菌
 B.耶尔森菌
 C.金黄色葡萄球菌
 D.侵袭性大肠杆菌
 E.产毒性大肠杆菌
- 61.肾病综合征诊断标准中,24 小时尿蛋白总量临界值应
- A.>4.5 g/d
 B.>4 g/d
 C.>3.5 g/d
 D.>3.0 g/d
 E.>2.5 g/d
- 62.反映缺铁性红细胞生成的最佳指标是
- A.血清铁蛋白
 B.血清铁
 C.转铁蛋白饱和度
 D.总铁结合力
 E.红细胞游离原卟啉
- 63.下列关于小儿免疫系统的说法,错误的是
- A.IgM 不能通过胎盘
 B.IgG 不能通过胎盘
 C.脐血 IgM 水平过高,提示可能有宫内感染
 D.新生儿时期各种 T 细胞亚群功能均显不足
 E.新生儿 B 淋巴细胞发育已完善,但不成熟
- 64.营养性缺铁性贫血选用的治疗,最恰当的是
- A.硫酸亚铁加叶酸
 B.维生素 C 加叶酸
 C.维生素 B₁₂加高蛋白饮食
 D.硫酸亚铁加维生素 C 加高蛋白饮食
 E.以上都不是
- 65.导致儿童风湿热的最常见病原体是
- A.肺炎克雷伯杆菌
 B.流感嗜血杆菌
 C.大肠埃希菌
 D.A 组乙型溶血性链球菌
 E.肺炎链球菌
- 66.新生儿 ABO 溶血病发生在
- A.母血型“A”,子血型“O”
 B.母血型“AB”,子血型“O”

- C.母血型“O”,子血型“AB”
 D.母血型“O”,子血型“A”或“B”
 E.母血型“B”,子血型“O”
- 67.水痘最常见的并发症为
 A.败血症
 B.心肌炎
 C.皮肤继发细菌感染
 D.肺炎
 E.脑炎
- 68.新生儿败血症的发生,从感染途径分析,以哪一项最常见
 A.羊水穿刺感染
 B.产前感染
 C.产时感染
 D.产后感染
 E.宫内输血消毒不严
- 69.男婴足月顺产,出生体重 3 200 g,生后 48 小时血清总胆红素 297.5 $\mu\text{mol/L}$ 。在检查黄疸原因时,首选治疗方法是
 A.输血浆
 B.换血
 C.口服苯巴比妥
 D.清蛋白输注
 E.光照疗法
- 70.左向右分流型的先天性心脏病多见的并发症是
 A.心律失常
 B.脑栓塞
 C.肺炎
 D.喉返神经麻痹
 E.亚急性细菌性心内膜炎
- 71.我国使用的围生期概念是
 A.妊娠 20 周~生后 1 周
 B.妊娠 26 周~生后 4 周
 C.妊娠 28 周~生后 4 周
 D.妊娠 28 周~生后 1 周
 E.妊娠 24 周~生后 1 周
- 72.先心病中最常见的类型是
 A.动脉导管未闭
 B.房间隔缺损
 C.室间隔缺损
 D.法洛四联症
 E.肺动脉狭窄
- 73.我国法定传染病中甲类传染病有
 A.天花和鼠疫
 B.狂犬病和天花
 C.霍乱和副霍乱
 D.艾滋病与霍乱
 E.鼠疫和霍乱
- 74.母体免疫球蛋白能通过胎盘转移给胎儿的是
 A.IgM
 B.IgA
 C.IgE
 D.IgD
 E.IgG
- A2 型题**

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

- 75.老年女性,不慎摔倒,左髌部着地,当即左髌剧痛,不能站立,急诊来院,检查见左下肢缩短,外旋畸形。其最可能的诊断是
 A.左髌关节前脱位
 B.左髌关节后脱位
 C.左髌关节中心脱位
 D.左股骨颈骨折
 E.左股骨干骨折

76.男,29 岁。发作性左腰区疼痛 1 周,每次疼痛数小时,腹部 X 线平片可见左侧腹部有一高密度阴影,在肾下极下 2 cm,直径为 1.1 cm,诊断考虑是左输尿管结石,目前首选治疗方案为

- A.大量饮水
- B.输尿管镜取石
- C.解痉、抗感染
- D.体外冲击波碎石术
- E.以上都不是

77.男,36 岁。10 岁时因右侧隐睾行睾丸固定术,近 1 个月以来右侧阴囊肿大伴疼痛,查体:右侧阴囊下垂明显;皮温不高,睾丸肿大,质硬,有明显沉重感,透光试验阴性。应初诊为

- A.右睾丸炎
- B.右附睾炎
- C.右睾丸肿瘤
- D.右睾丸鞘膜积液
- E.右睾丸结核

78.男,31 岁。1.5 小时前被自行车撞到腰部。血压 100/65 mmHg,尿常规:红细胞 30~40/高倍视野,最可能的诊断是

- A.肾蒂裂伤
- B.肾盂裂伤
- C.肾挫伤
- D.肾皮质深部裂伤
- E.肾碎裂伤

79.男,31 岁。头痛进行性加重 1 个月。入院前 3 天出现喷射状呕吐 3 次,抽搐 1 次。查体:神志清楚,双侧视神经乳头水肿,颈软。最可能的诊断是

- A.蛛网膜下腔出血
- B.脑血管畸形
- C.脑软化
- D.颅内压增高
- E.陈旧性脑梗死

80.女,22 岁。半年前诊断为精神分裂症,平时服用利培酮治疗。病情稳定,半月前因与男朋友分手,情绪低落,话少。近 3 天加重,整日躺在床上,不语不动,拒绝进食,常双眼含泪,家人反复询问下有时能用点头、摇头表示。患者目前首要的处理方法是

- A.暗示疗法
- B.认知疗法
- C.加用抗抑郁药
- D.电抽搐治疗
- E.抗精神病药加量

81.风湿性心脏病,心功能 III 级的妇女,患异位妊娠,左侧输卵管妊娠破裂,手术应行

- A.右附件切除
- B.右附件切除+左输卵管结扎
- C.左输卵管切除+右输卵管结扎
- D.子宫次全切除术+右附件切除
- E.右输卵管切除

82.女,18 岁,未婚。月经规律,无停经史,突发下腹部疼痛伴恶心、呕吐 8 小时。查体:P78 次/分,BP 100/70 mmHg。直肠腹部触诊:子宫前位,正常大,右侧附件区触及一个 6 cm×5 cm×5 cm 囊实性包块,边界清楚,触痛明显。最可能的诊断是

- A.浆膜下子宫肌瘤
- B.急性阑尾炎
- C.输卵管妊娠破裂
- D.卵巢肿瘤蒂扭转
- E.卵巢黄体破裂

83.初产妇,25 岁。停经 49 天,阵发性腹痛伴阴道流血 3 天,妇科检查:宫颈口开大 1 cm,有羊膜囊堵塞子宫口,子宫孕 49 天大小。最可能的诊断是

- A.先兆流产
- B.过期流产

- C.完全流产
- D.难免流产
- E.习惯性流产

84.女性,30岁,已婚。放置宫内节育器2年,停经48天,少量阴道出血3天,突然右下腹剧烈撕裂样疼痛,血压80/40 mmHg,右下腹压痛,反跳痛明显,但肌紧张不明显。妇科检查:后穹隆饱满,宫颈举痛(+),宫口闭,子宫正常大小,呈漂浮感,双附件触诊不满意,本病例最可能的诊断是

- A.先兆流产
- B.黄体破裂
- C.卵巢囊肿蒂扭转
- D.输卵管妊娠破裂
- E.急性阑尾炎

85.肾病综合征患儿开始应用泼尼松治疗,口服泼尼松后,4周尿蛋白已经转阴,并且已经开始隔日顿服,突发上呼吸道感染,尿蛋白又(+++),经常规抗炎治疗后,尿蛋白仍(+++),下一步治疗应采用

- A.治疗不变,泼尼松仍然隔日顿服
- B.应用环磷酰胺
- C.泼尼松重新开始起始治疗量每日三次口服
- D.应用激素+环磷酰胺
- E.以上均不对

86.3个月婴儿,腹泻3天,大便每天10多,呈蛋花汤样,伴呕吐,尿少,精神萎靡,拒奶,面色苍白,前囟、眼窝凹陷,口唇樱红,皮肤弹性差。除诊断婴儿腹泻、中度脱水外,还应考虑

- A.低血容量休克
- B.代谢性碱中毒
- C.低镁血症
- D.低钙血症
- E.代谢性酸中毒

87.女,40岁。瘢痕子宫,妊娠39周,规

律宫缩8小时。宫口6 cm,先露S=+1,突然腹痛加剧。查体:T 37.5℃,P 100次/分,BP 90/60 mmHg,宫口4 cm,先露S=-2,胎心60次/分,2分钟后胎心消失。最可能的诊断是

- A.腹腔感染
- B.子宫破裂
- C.胎盘早剥
- D.羊水栓塞
- E.先兆子宫破裂

88.女,56岁,G₄P₂。绝经5年,阴道脱出肿物4年,脱出肿物增大3个月。不能自行回缩,伴排尿困难。妇科检查见宫颈及部分宫体已脱出于阴道口外。妇科超声及泌尿系统超声均未提示异常。适宜的处理为

- A.阴道全封闭术
- B.阴道半封闭术
- C.盆底修复及子宫切除术
- D.经腹圆韧带缩短术
- E. Manchester 手术

89.8岁男孩,常有活动后心悸、气促,心脏听诊于胸骨左缘第2~3肋间可闻及Ⅱ~Ⅲ级喷射性收缩期杂音,肺动脉瓣区第二心音亢进和固定分裂。该患儿最可能的诊断是

- A.肺动脉狭窄
- B.室间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.房间隔缺损

90.女婴,一个月。生后间断呕吐,呕吐物为奶液,体重增长不满意。查体:可见胃蠕动波,右上腹触及包块。最可能的诊断是

- A.先天性巨结肠
- B.先天性肥厚性幽门狭窄
- C.胃扭转
- D.胃食管反流
- E.幽门痉挛

91.7 个月小儿出现低钙性手足抽搐,应怎样处理

- A. 补钙—止抽
- B. 止抽—补钙
- C. 维生素 D₂—止抽—补钙
- D. 止抽—补钙—维生素 D₂
- E. 补钙—维生素 D₂—止抽

92.男孩,7 岁。水肿 4 天,伴血尿、尿少 2 天。查体:P 112 次/分,R 33 次分,BP 120/85 mmHg,颜面、双下肢明显水肿,烦躁不安、气促,双肺底可闻及湿啰音,肝肋下 1.5 cm。尿常规:蛋白(+)。尿沉渣镜检:RBC25/HP。目前应首选的药物是

- A. 毛花苷丙
- B. 呋塞米
- C. 硝普钠
- D. 地西泮
- E. 青霉素

93.男性,30 岁。车祸后半小时,血压 90/50 mmHg,心率 121 次/分,下腹膨隆,不能自排小便,尿道口有少量流血,X 线提示骨盆骨折,尿道造影提示后尿道断裂,最佳处理是

- A. 立即导尿
- B. 耻骨上穿刺排尿
- C. 后尿道修补术
- D. 抗休克治疗后耻骨上膀胱造瘘术
- E. 尿道会师术

94.男婴,30 天。过期产,出生体重 4 500 g,母亲无糖尿病病史。生后人工喂养,常鼻塞,时有呼吸困难,吃奶差。哭声弱、反应差、便秘,体检:T 35 °C,P 90 次/分,皮肤轻度黄染。血象:Hb 90 g/L,RBC 3.6×10¹²/L,WBC 11×10⁹/L。对该患儿最主要的治疗是

- A. 保肝、利胆、退黄
- B. 应用抗生素抗感染

- C. 服用甲状腺制剂
- D. 保暖给氧,支持呼吸
- E. 不需用药,继续观察

95.女,24 岁,经产妇。阴道分娩后 72 小时,自觉乳房胀痛,发热,T 37.5 °C,下腹部阵发性疼痛伴少量阴道流血。正确的处理是

- A. 口服镇痛剂
- B. 排空乳房
- C. 应用抗生素
- D. 局部理疗
- E. 静脉滴注缩宫素

96.男孩,6 岁。咳嗽伴喘息 1 天,无发热。既往有反复喘息发作 4~5 次。其外祖父患有支气管哮喘。查体:呼吸急促,可见轻度三凹征,呼气相延长,双肺满布哮鸣音。目前应首选的治疗是

- A. 吸入沙丁胺醇
- B. 静脉滴注青霉素
- C. 口服白三烯调节剂
- D. 静脉注射地塞米松
- E. 口服西替利嗪

97.孕 3 产 1。因停经 7 个月,阴道流血 4 天,增多 1 小时,急诊入院,查血压 90/60 mmHg,P 115 次/分,宫底剑突下三横指,臀先露 LSA,胎心 136 次/分,有不规律宫缩。为进一步确诊首选的检查是

- A. 颈管内指诊
- B. 肛诊
- C. 阴道检查
- D. B 超检查
- E. 腹部平片

98.女,28 岁。初产妇,妊娠 39 周,规律宫缩 10 小时,查宫口扩张 6 cm,LOA,先露 S = +1,胎心 140 次/分,胎儿监护 NST 有反应型,需要进一步的处理是

- A. 给予宫颈封闭

- B.催产素加强宫缩
- C.超声评估胎儿大小
- D.严密观察产程
- E.肌注哌替啶

99.4岁患儿,发热、干咳10天,体温39℃,双眼疱疹性结膜炎,颈部可触及成串肿大的淋巴结,右肺呼吸音稍低,少许干啰音,PPD硬结直径18mm。诊断考虑

- A.急性支气管炎
- B.支气管肺炎
- C.右侧胸膜炎
- D.原发型结核
- E.支气管炎合并结膜炎

100.女,35岁。妊娠35⁺²周,2周前血压升高至160/100mmHg,未治疗。现突然持续腹痛、逐渐加重,感头晕、恶心,阴道有少量流血。查体:T 36.8℃,P 120次/分,BP 100/60mmHg,呼吸急促。面色苍白,腹部隆起,板状腹,胎方位不清,未闻及胎心。最可能的诊断是

- A.胎盘早剥
- B.先兆子宫破裂

- C.早产临产
- D.临产伴急性阑尾炎
- E.妊娠合并急性胰腺炎

101.胎龄为36周的新生儿,生后7小时皮肤出现黄染,生后3天出现抽搐,体检:一般状态差,前囟平、皮肤及巩膜重度黄染,心肺正常,腹软,四肢张力增强,血胆红素342μmol/L,血钙2.0mmol/L,此患儿最可能患

- A.低钙
- B.化脑
- C.核黄疸
- D.低血糖
- E.癫痫

102.3岁小儿患金葡菌肺炎,突然呼吸困难,发绀烦躁,体温40℃,左侧呼吸运动及呼吸音减弱,叩之不浊,心率162次/分,肝肋下2.5cm,本例最大可能并发

- A.肺气肿
- B.心包炎
- C.心肌炎
- D.呼吸衰竭
- E.张力性气胸

B1型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在该组考题前列出,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不

(103~104题共用备选答案)

- A.Mills征阳性
- B.Dugas征阳性
- C.Thomas征阳性
- D.Lasegue试验阳性
- E.Finkelstein试验阳性

103.肩关节脱位主要体征为

104.肱骨外上髁炎主要体征为

(105~107题共用备选答案)

A.嗜睡、腹胀、便秘

B.高腭弓、通贯手

C.智力正常

D.尿有鼠尿味

E.四肢细长

105.21-三体综合征

106.先天性甲状腺功能减低症

107.苯丙酮尿症

(108~110 题共用备选答案)

A.萎缩性阴道炎

B.阿米巴阴道炎

C.滴虫性阴道炎

D.外阴阴道假丝酵母菌病

E.细菌性阴道病

108.育龄妇女阴道 pH 升高时容易发生

109.阴道分泌物镜检可见线索细胞, pH >4.5, 加入 10% 氢氧化钾溶液后可产生烂鱼肉样腥臭气体

110.糖尿病患者及长期使用广谱抗生素患者易发生

(111~113 题共用备选答案)

A.胎头在脐左上, 胎心在脐上

B.胎头位于母体左侧, 胎心位于母体腹前壁靠近脐下

C.胎头在脐右上, 胎心靠脐上

D.胎头位于宫底部, 胎心位于脐右下方

E.胎头位于耻骨上方, 胎心位于脐左下方

111.LOA 是指

112.LSA 是指

113.RSA 是指

A3/A4 型题

(114~115 题共用备选答案)

A.月经周期正常, 经期延长

B.月经周期规律, 但周期短

C.月经周期无规律

D.突然大量出血, 并发痛经

E.周期、经期、经量都不正常

114.黄体萎缩不全

115.黄体发育不全

(116~118 题共用备选答案)

A.细胞数 $400 \times 10^6/L$ 、蛋白升高、糖降低、氯化物降低

B.细胞数 $400 \times 10^6/L$ 、蛋白降低、糖正常、氯化物正常

C.细胞数 $400 \times 10^6/L$ 、蛋白稍高、糖正常、氯化物正常

D.细胞数 $400 \times 10^6/L$ 、蛋白正常、糖降低、氯化物正常

E.细胞数 $1200 \times 10^6/L$ 、蛋白增高、糖降低、氯化物降低

116.化脓性脑膜炎

117.结核性脑膜炎

118.病毒性脑膜炎

(119~120 题共用备选答案)

A.润滑和冲洗阴道, 减少感染机会

B.防止胎体畸形

C.不利于胎儿体液平衡

D.保持羊膜腔内恒温

E.胎儿不受挤压

119.关于羊水的功能错误的是

120.破膜后羊水起的作用是

答题说明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息, 在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(121~124 题共用题干)

6 个月健康小儿,体重为 6 kg,用牛奶人工喂养。

121.如采用 8% 的牛奶,每天应给多少毫升

- A.500 mL
- B.550 mL
- C.660 mL
- D.600 mL
- E.700 mL

122.除牛奶外,还应给予多少毫升水

- A.200 mL
- B.240 mL
- C.280 mL
- D.350 mL
- E.300 mL

123.每天需要的总能量应为

- A.450 kcal
- B.500 kcal
- C.550 kcal
- D.660 kcal
- E.600 kcal

124.现在该小儿可以添加的辅食,除外

- A.菠菜泥
- B.白菜泥
- C.米粉
- D.苹果泥
- E.肉末

(125~126 题共用题干)

患儿,7 岁,眼睑及双下肢明显水肿,少尿 1 周。查体:精神状态尚可,眼睑水肿,双下肢呈凹陷性水肿,血压 90/60 mmHg,心肺正常。尿常规:蛋白(+++),红细胞 0~3/HP。血浆总蛋白 45 g/L,白蛋白 22 g/L,抗“O”正常,C₃ 补体正常,胆固醇 11.2 mmol/L;肌酐 46 μmol/L。尿素氮 1.56 mmol/L。胸片示:少许胸腔积液。

125.该患儿最可能的诊断为

- A.急性肾炎
- B.急进性肾病
- C.肾炎性肾病
- D.单纯性肾病
- E.病毒性肾病

126.该患儿病理性类型最可能为

- A.膜性肾病
- B.系膜增生性
- C.局灶性阶段性肾小球硬化
- D.微小病变型
- E.膜性增生性肾炎

(127~130 题共用题干)

3 岁男孩,生后即发现有青紫现象,久站喜蹲踞,心脏听诊可在胸骨左缘第 2 肋间闻及 II 级喷射性杂音,肺动脉第二心音减低。

127.该患儿最可能的诊断是

- A.房间隔缺损
- B.室间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.肺动脉狭窄
- E.法洛四联症

128.一般首选哪项检查以进一步明确诊断

- A.心电图
- B.胸部 X 线检查
- C.磁共振成像
- D.心血管造影
- E.多普勒彩色血流显像

129.如行胸部 X 线检查,最可能的改变是

- A.右房、右室大,肺动脉段凸出,肺野充血
- B.左房、左室大,肺动脉段凹陷,肺野充血
- C.左室、右室大,肺动脉段凸出,肺野充血

- D.右室大,肺动脉段凹陷,肺野清晰
 E.右室大,肺动脉段凸出,肺野清晰

130.若患儿突发偏瘫,检查血常规示白细胞 $12.6 \times 10^9/L$,红细胞 $5.7 \times 10^{12}/L$,则可能并发了

- A.亚急性细菌性心内膜炎
 B.脑积水
 C.病毒性脑炎
 D.脑脓肿、脑栓塞
 E.艾森曼格综合征
 (131~133 题共用题干)

经产妇,45 岁。近 6 年痛经并逐渐加重,伴经量增多及经期延长,需服强止痛药。查子宫均匀增大如孕 12 周,质硬,有压痛,血红蛋白 75 g/L。

- 131.痛经逐渐加重的原因,最可能的是
 A.功能性痛经
 B.子宫腺肌病
 C.子宫内膜结核
 D.子宫黏膜下肌瘤
 E.子宫肌瘤

- 132.最需要的辅助检查是
 A.诊断刮宫
 B.子宫输卵管碘油造影
 C.输卵管通液术
 D.宫腔镜检查
 E.B 超检查

- 133.本例确诊后的处置应选择
 A.镇痛药物治疗
 B.雌激素治疗
 C.手术治疗
 D.化学药物治疗
 E.放射治疗
 (134~136 题共用题干)

10 个月女婴,不能独坐,尚不能认识亲人与陌生人。平时少哭少动,经常便秘,进食少。查体:表情呆板,前囟未闭,头大,颈

短,眼距宽,眼睑水肿,舌大常伸出口外,头发稀少,心率 86 次/分,心音稍低钝,腹部膨隆,腹胀明显。

- 134.该患儿最可能的诊断是
 A.佝偻病
 B.先天愚型
 C.先天性甲状腺功能减低症
 D.先天性巨结肠
 E.黏多糖病

- 135.应进行哪项检查以明确诊断
 A.血钙、磷及碱性磷酸酶测定
 B.染色体检查
 C.腹部 B 超
 D.骨骼 X 线片
 E.血 T_3 、 T_4 、TSH

- 136.该患儿的治疗药物首选
 A.维生素 D
 B.钙剂
 C.特殊饮食疗法
 D.甲状腺素
 E.胃肠动力药

(137~139 题共用题干)

50 岁女性,孕 5 产 5,绝经 3 年,阴道不规则流血 1 个月。妇科检查:外阴阴道正常,宫颈肥大、糜烂、触之易出血,子宫后屈、稍大,双侧附件未见异常。

- 137.该患者绝经后最可能的出血原因是
 A.子宫颈炎
 B.子宫内膜炎
 C.子宫内膜癌
 D.子宫颈尖锐湿疣
 E.子宫颈癌

- 138.进一步确诊时需做
 A.B 型超声检查
 B.宫颈涂片细胞学检查
 C.子宫颈碘试验
 D.宫颈活组织检查

E.阴道镜检查

139.若以上检查未发现可疑病灶,下一步最恰当的处理是

- A.子宫镜+子宫内膜活检
- B.分段刮宫
- C.宫颈激光
- D.宫颈锥切术
- E.3~6个月后复查

(140~142题共用题干)

患者,女,63岁。绝经13年,近3个月阴道出血2次,每次持续4天,妇科检查:外阴、阴道无萎缩,宫颈光滑,子宫前位,正常大小,右侧附件区10 cm×5 cm×3 cm肿物,质地中等,光滑、实性,活动良好,无腹水,全身淋巴结无转移。

140.最可能的诊断为

- A.子宫内膜癌
- B.卵巢畸胎瘤
- C.卵巢颗粒细胞瘤
- D.卵巢无性细胞瘤
- E.卵巢睾丸母细胞瘤

141.可能有变化的肿瘤标记物是

- A.β-hCG
- B.CA125
- C.性激素
- D.AFP
- E.CA19-9

142.辅助治疗应加用

- A.孕激素治疗
- B.放疗
- C.雌激素治疗
- D.化疗
- E.雄激素治疗

(143~146题共用题干)

男性,63岁。尿频,排尿迟缓4年,间歇肉眼血尿1年。B超检查可见膀胱壁毛糙,可见1.5 cm×2.0 cm×2.0 cm大小强回声光

团伴声影,前列腺4.2 cm×4.0 cm×5.0 cm大小,残余尿100 mL。

143.该患者主要的诊断是

- A.前列腺增生
- B.前列腺增生合并膀胱血块
- C.膀胱肿瘤
- D.慢性膀胱炎合并膀胱结石
- E.前列腺增生合并膀胱结石

144.该患者宜采用下列哪种治疗

- A.膀胱切开取石术
- B.抗感染
- C.膀胱肿瘤电切术
- D.膀胱内碎石术
- E.前列腺电切术及膀胱碎石术

145.膀胱结石的典型症状是

- A.肉眼血尿
- B.排尿中断
- C.中药排石
- D.会阴部下坠感
- E.剧烈腰痛

146.诊断膀胱结石最可靠的方法是

- A.有尿线中断史
- B.膀胱刺激症状
- C.B超检查
- D.膀胱区平片检查
- E.直肠指检

(147~149题共用题干)

患者,女,32岁。停经35天,以突发左下腹撕裂样痛1小时就诊,现腹痛渐加重,发冷,BP 80/40 mmHg,P 120次/分,全腹压痛、反跳痛阳性,移动浊音阳性。妇科检查:宫颈举痛,子宫稍大、软,漂浮感,双附件区压痛,左侧明显,未触及包块。

147.最简便又最能帮助迅速确立诊断的检查方法是

- A.B型超声
- B.妊娠试验

- C.腹腔镜检查
- D.后穹窿穿刺
- E.诊断性刮宫

148.此患者最可能的诊断是

- A.流产合并感染
- B.急性输卵管炎
- C.急性阑尾炎
- D.输卵管妊娠破裂
- E.完全流产

149.对于该患者,最恰当的处理方法是

- A.纠正休克后手术
- B.纠正休克同时手术
- C.立即进行开腹探查
- D.输血
- E.中药活血化瘀治疗

150.若该患者行保守手术,术后 12 日血 HCG 未下降,再次出现出血,腹痛。考虑是什么原因

- A.腹部炎症
- B.术后出血
- C.持续异位妊娠
- D.卵巢囊肿
- E.绒毛膜癌

本单元试卷到此结束

参考答案

第四单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	D	A	A	E	C	A	E	A	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	B	E	C	B	E	D	A	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	C	E	D	E	E	C	E	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	C	D	A	E	E	A	E	E	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	E	E	D	A	C	E	C	E	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	E	D	B	D	B	D	C	E	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	E	B	D	D	D	C	D	E	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	C	E	E	D	D	C	C	D	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	D	D	D	C	E	B	C	E	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	B	D	C	B	A	D	D	D	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	E	B	A	B	A	D	C	E	D
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
E	A	C	A	E	E	A	C	C	A

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	E	E	E	D	D	E	E	D	D
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	E	C	C	E	D	E	D	B	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	D	E	E	B	C	D	D	B	C

46.【解析】支气管哮喘表现为发作性喘息、气急、呼吸困难,有时咳嗽是唯一症状。在凌晨发作是哮喘的特征之一,这是因为在凌晨时,迷走神经兴奋性强,容易引起支气管痉挛狭窄,导致哮喘的发作(C)。其余这 4 种疾病都没有凌晨反复发作的特点。

75.【解析】股骨颈骨折① $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 的外旋畸形,患肢缩短;②患髋有压痛,下肢轴向叩痛;③Bryant 三角底边短缩,股骨大转子顶端在 Nelaton 线之上,大转子明显突出。

(103~104 题)【解析】在正常情况下将手搭到对侧肩部,肘部可以贴近胸膛,称为 Dugas 征阴性。有脱位时,将患侧肘紧贴胸壁时,手掌搭不到健侧肩部;或手掌搭在健侧肩部时,肘部无法贴近胸壁,称为 Dugas 征阳性。伸肘握拳、屈腕、前臂旋前,肘部外侧出现疼痛为阳性伸肌腱牵拉试验(Mills 征),其提示肱骨外上髁炎。髋屈曲畸形试验(Thomas 征)阳性常见于髋关节结核。Lasegue 试验也称直腿抬高加强试验,阳性常见于腰椎间盘突出症。握拳尺偏(Finkelstein)试验:握拳尺偏腕关节时,桡骨茎突处出现疼痛,称为 Finkelstein 试验阳性,见于桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。