

妇幼保健（中级）

专业代码:364

精华必背考点

-
- 1、过期妊娠是指平日月经规则，妊娠达到或者超过 42 周末分娩者
 - 2、滴虫阴道炎的治疗是全身用药甲硝唑
 - 3、慢性盆腔炎常发生在盆腔炎性疾病急性发作后的 4~8 周
 - 4、病人血清中检测到高滴度抗-HBcIgM，可确诊为急性乙型肝炎
 - 5、妊娠早期的孕妇患肝炎常被忽视，其主要原因是妊娠呕吐常有转氨酶升高
 - 6、在妊娠晚期羊水过少的诊断标准是少于 300ml
 - 7、子宫破裂多发生在妊娠分娩期
 - 8、前置胎盘阴道出血的特点是无诱因、无痛性反复阴道流血
 - 9、产妇产后胃肠肌张力及蠕动力恢复的时间是约需 2 周
 - 10、妊娠期高血压疾病引产终止妊娠的适用条件为适用于宫颈条件较成熟，行人工破膜后加用

缩宫素静点引产

- 11、应用超声羊水指数诊断，羊水过多的标准是 >18cm
- 12、目前淋病治疗首选药物是第三代头孢菌素
- 13、无排卵性功能失调性子宫出血在临床上最常见的症状是子宫不规则出血
- 14、孕妇中晚期妊娠时，检查胎儿有无畸形，采取的方法是 B 型超声检查
- 15、孕妇预防巨幼红细胞性贫血的方法是于妊娠后半期每日给予叶酸 5mg 口服
- 16、卵巢的生理功能主要是产生卵子并排卵和分泌女性激素
- 17、产后出血是指胎儿娩出后 24 小时内阴道流血量超过 500ml
- 18、尖锐湿疣的病原体为 HPV
- 19、妊娠期病毒性肝炎的主要诊断依据是孕妇有肝炎症状、体征及化验检查异常结果
- 20、先兆子宫破裂应立刻采取的措施是抑制子宫收缩
- 21、性成熟期一般自 18 岁左右开始，历时 30 年

-
- 22、慢性宫颈炎疗效最好的治疗方法是**物理治疗**
 - 23、一般情况下，婴儿动脉压下肢比上肢高 **20mmHg**
 - 24、与成年人相比，小儿机体对能量所特有的需求是**生长发育所需**
 - 25、唐氏综合征患儿最主要的特征是**智力低下**
 - 26、对于典型苯丙酮尿症患儿主要的治疗方法是**低苯丙氨酸饮食**
 - 27、小儿先天性甲状腺功能减低症最主要的致病因素是**甲状腺不发育或发育不全**
 - 28、提示小儿缺乏维生素 B12 的血清维生素 B12 值是 **<100ng/L**
 - 29、细菌性痢疾的主要临床分型包括**普通型、轻型、重型、中毒型和慢性菌痢**
 - 30、小儿营养性巨幼红细胞贫血的病因是由于缺乏**维生素 B12 或叶酸**
 - 31、正常新生儿可能引不出的反射是**巴宾斯基征**
 - 32、新生儿期是指**出生后脐带结扎至满 28 天以前**
 - 33、重型与轻型婴幼儿腹泻相比，最重要的区别是**水、电解质和酸碱平衡紊乱症状**
 - 34、脊髓灰质炎的潜伏期是 **5~14 天**
 - 35、婴儿生理性贫血一般发生在**出生后 2~3 个月**
 - 36、在胎儿血液循环中，血氧饱和度最高的血液是**脐静脉血**
 - 37、学龄前儿童颈静脉压一般为 **40mmH₂O**
 - 38、严密观察、精心治疗属于手术后的道德要求
 - 39、专属于体格检查中的道德要求的是**尊重病人、耐心细致**
 - 40、医学行为是否有利于医学科学发展和揭示人类的生命奥秘是**医德评价的科学标准**
 - 41、安全有效属于**药物治疗中的道德要求**
 - 42、医疗机构从业人员分为 **6 个类别**
 - 43、医师在执业活动中应履行的义务是**遵守法律、法规，遵守技术规范**

-
- 44、弘扬**高尚医德**，严格自律，不索取和非法收受患者财物不利用执业之便谋取不正当利益
- 45、“不索取和非法收受患者财物；不收受**医疗器械、药品、试剂**等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与**医疗广告宣传和药品医疗器械促销**”体现了**廉洁自律，恪守医德**的基本行为规范
- 46、组织实施医师资格考试的部门是**省级以上人民政府卫生行政部门**
- 47、医患沟通是指**医患之间信息的传递与交流**
- 48、“医学科学规律，不断更新医学理念和知识，保证医疗技术应用的**科学性、合理性**”这是**医师执业的重要行为规范**
- 49、**卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局**参与组织制定了《医疗机构从业人员行为规范》
- 50、医师在执业活动中应履行的义务是**遵守法律、法规，遵守技术规范**
- 51、医师在执业活动中享有的权利是**在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯**
- 52、医务人员的职业要求其情绪主要是**积极而稳定**
- 53、马斯洛认为需要的最高层次是**自我实现的需要**
- 54、科学心理学诞生的标志是**冯特建立世界上第一个心理学实验室**
- 55、医学心理学是伴随**生物-心理-社会医学模式**的形成应运而生的
- 56、经历过的事物再度出现时，能把它认出来，则为**再认**
- 57、大多数终末期病人的心理反应大致经历五个阶段，其中第二个阶段是**愤怒阶段**
- 58、病人的心理反应中最突出的是**情绪问题**
- 59、MMPI 是一种**人格测验**
- 60、霉菌的产毒和繁殖的最适温度为 **25 ~ 30°C**
- 61、组成低聚糖的单糖分子数为 **3 ~ 8 个**

-
- 62、霉菌产毒的条件是水分、湿度、温度、氧气量和**基质**等
 - 63、可能为人体内合成亚硝胺的重要场所的是**胃**
 - 64、**盐酸**是不允许使用的酸度调节剂
 - 65、**钙、铁、锌、碘**在孕妇膳食中强调要增加
 - 66、浮肿型蛋白质-热能营养不良主要是由于缺乏**蛋白质**
 - 67、我国成年人膳食中碳水化合物提供能量占全日摄入总能量的适宜百分比为 **55% ~ 70%**
 - 68、在相对湿度为 90%以上时主要适合**湿生性霉菌**繁殖
 - 69、青少年膳食总原则为充足的能量，足量的动物性食品、果蔬、谷类及**平衡膳食，多运动**
 - 70、对于一般孕妇而言，整个妊娠期母体体重约增加 **11 ~ 12.5kg**
 - 71、强化食品的种类有**主食强化，副食强化**
 - 72、女性青少年月经初潮，铁丢失增加，易引起青春期缺铁性贫血，铁的 AI 为 **18 ~ 25mg/d**
 - 73、学龄前儿童营养素摄取方面的主要问题是**钙、磷、钾缺乏**
 - 74、钙的最好来源是**奶及奶制品**
 - 75、国家对生猪实行统一纳税、分别经营和**定点屠宰和集中检疫**
 - 76、马铃薯中的毒性成分是**龙葵素**
 - 77、糖类中，可促进肠道有益细菌的生长，有利于某些维生素的合成，并促进钙的吸收的是**乳糖**
 - 78、**柠檬黄**是允许使用的食用合成色素
 - 79、病例对照研究中，调查对象应当是**病例应是确定患某种疾病的人，对照是不患某种疾病的人**
 - 80、一项雌激素与子宫内膜癌关系的配对病例对照研究，病例与对照共 63 对。病例组与对照组两组均有雌激素暴露史者 27 对，两组均无暴露史者 4 对，病例组有暴露史而对照组无暴露

史者 29 对，其余为对照组有暴露而病例组无暴露者。OR 值为 9.67

81、有关混杂因素和混杂偏倚的说法，在分析阶段控制混杂的方法多采用多元分析，不仅能分析暴露因素的效应也能估计混杂因素的效应

82、在设计病例对照研究时，对照的选择最好是从该地区未患该病的全人群中选对照

83、在 1000 名被调查者中，有 80 人 HBsAg 阳性，该调查最合适的描述指标为感染率

84、建立流行病学模型的最重要的基础是已知疾病的分布特征、流行过程、主要影响因素及其相互制约关系等相关知识和理论

85、常染色体显性遗传病的理论分离比为 0.50

86、分离分析是指检验实际观察的子代同胞分离比与某特定遗传方式所决定的理论分离比有无统计学差异

87、易患性是指多因子遗传病中，人群个体易于或不易于患某种疾病的属性变量

88、在确定因果关联的时间顺序上，设计的效果最差的是横断面研究

89、验证病因假设论证强度最高的流行病学方法是实验流行病学研究

90、某单位有十余人吃了某冷饮店的冰棒后感染了痢疾，同时防疫站从冰棒中分离到痢疾杆菌，从而确定冰棒是传播媒介

91、决定传染病病人隔离期限长短的主要依据是传染期

92、疾病监测本身属于描述性研究

93、普查妇女乳腺癌时测量疾病的频率指标应选用时点患病率

94、病例对照研究属于分析流行病学

95、在病例对照研究中选择对照时使用最多的对照来源是同一或多个医疗机构中诊断的其他病例

96、垂直传播是指经胎盘传播；上行性传播；分娩时引起的传播

-
- 97、流行病学的研究对象是**人群**
- 98、当对疾病的情况了解不多的时候，往往总是从**描述性研究**着手
- 99、为了尽量减少偏倚，病例对照研究中应该选用**新发病例**最为理想
- 100、传染病患者隔离期限的长短主要应依据**传染期**
- 101、回忆偏倚与报告偏倚的区别在于回忆偏倚是研究对象**不能准确、完整地回忆以往发生的事情和经历时**所产生；报告偏倚是研究对象**有意扩大或缩小某些信息**造成的偏倚
- 102、疾病监测采用的方法属于**描述性研究**
- 103、构成传染病流行的3个环节是**传染源、传播途径、易感人群**
- 104、引起医源性感染的细菌最常见的传播途径是**经污染物传播**
- 105、流行病学实验研究的人群来自**同一总体的干预人群和非干预人群**
- 106、利用医院就诊或住院病人作为研究对象时，由于入院率的不同而造成的偏差是 **Berkson's 偏倚**
- 107、自然疫源性疾病是指**一种疾病的病原体不依靠人而能在自然界野生动物中生存繁殖，并只在一定条件下传给人和家畜**
- 108、调查研究中，对研究因素所需的指标或数据进行测定或测量时容易产生**测量偏倚**
- 109、传染源是指**体内有病原体生长繁殖并能排出病原体的人和动物**
- 110、能长期或永久保存血清的温度条件是**-70℃**
- 111、暴露与疾病由于有共同的原因而产生的关联是**继发关联**
- 112、根据三个环节两个因素的学说，构成传染病流行的三个环节是**传染源、传播途径、易感人群**
- 113、疾病分布是指**时间分布，地区分布，人群分布**
- 114、用某年全市的出生数和婴儿死亡数计算婴儿死亡率，这种方法属于**统计描述**

115、Poisson 分布的方差一定等于均数