

2021 年 中 西 医 助 理 医 师 考 试

**模拟密押卷**

**2021 年  
中 西 医 助 理 医 师  
资 格 考 试 专 用  
( 答 案 )**

## 第一单元

### 一、A1 题型

#### 1、答案：A

解析：证，即证候，是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括，一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。证候是病机的外在反映；病机是证候的内在本质。A 项正确。B 项：症状与体征，皆属于“症”的概念，症状是病人异常的主观感觉或行为表现，如恶寒发热、烦躁易怒等；体征是医生检查病人时发现的异常征象，如舌苔、脉象等。二者仅是疾病的个别现象，对其进行鉴别概括，并不能说明证候的意义，故 B 项错。C 项：同上，对症状与体征进行分析概括，也不能说明证候的意义，故 C 项错。D 项：证候的重点在现阶段，反映疾病某一阶段或某一类型的病变本质，并不是反映疾病整个过程的所有症状，不能对疾病表现症状进行综合概括，故 D 项错。E 项：病，即疾病，是致病邪气作用于人体，人体正气与之抗争而引起的机体阴阳失调、脏腑组织损伤、生理功能失常或心理活动障碍的一个完整的异常生命过程。阴阳气血失调临床表现的概括属于疾病

概念的一部分，不属于证候的概念，故 E 项错。故正确答案为 A。

#### 2、答案：A

解析：所谓五脏者，藏精气而不泻也，故满而不能实，六腑者，传化物而不藏，故实而不能满也。

#### 3、答案：A

解析：本题考查的是心的生理功能。心的主血脉与藏神功能是密切相关的。血是神志活动的物质基础之一，心血充足则能化神、养神而使心神灵敏不惑，而心神清明，则能驭气以调控心血的运行，濡养全身脏腑形体官窍及心脉自身。A 项正确。B 项：肝主疏泄的功能与题干不符，排除。C 项：肺主治节，是指肺气具有治理调节肺之呼吸及全身之气、血、水的作用。与题干不符，排除。D 项：脾主运化的功能。与题干不符，排除。E 项：肾主藏精的功能与题干不符，排除。故正确答案为 A。

#### 4、答案：B

解析：本题考查大家对中医基础理论中五脏学说的理解与脾喜燥恶湿的生理特性的掌握。脾喜燥恶湿，与其运化水饮的生理机能相关，脾气健旺，运化水饮正常，水精四布，自然无痰饮水湿的停聚，脾气升动，才能将水液布散全身，而脾气升运的条件之一

就是脾体干燥而不被痰湿所困。B 项正确。A 项：肝的生理特性是肝为刚藏，肝气升发，与题干不符，排除。C 项：胃的生理特性是胃气下降，喜润恶燥，与题干不符，排除。D 项：肾的生理特性是主蛰守位，肾气上升，与题干不符，排除。E 项：肺的生理特性是肺为华盖，肺为娇脏，肺气宣降，与题干不符，排除。故正确答案为 B。

5、答案：B

解析：本题考查的是肝的特性。肝在志为怒。B 项正确。A 项：肺在志为悲（忧）。与题干不符，排除。C 项：肾在志为恐。与题干不符，排除。D 项：心在志为喜。与题干不符，排除。E 项：脾在志为思。与题干不符，排除。故正确答案为 B。

6、答案：D

解析：本题考查的是心与肾的关系：心与肾在生理上的联系，主要表现为“心肾相交”。心肾相交的机理，主要从水火既济、精神互用、君相安位来阐发。D 项正确。A 项：心与脾的关系：心主血而脾生血，心主行血而脾主统血。心与脾的关系，主要表现在血液生成方面的相互为用及血液运行方面的相互协同。与题干不符，排除。B 项：肺与肝的关系：肝气升发，肺气肃降。肺与肝的生理联系，主要体现

在人体气机升降的调节方面。“肝生于左，肺藏于右。”肝气从左升发，肺气由右肃降。肝气以升发为宜，肺气以肃降为顺。与题干不符，排除。C 项：脾与肾的关系：脾为后天之本，肾为先天之本，脾肾两者首先表现为先天与后天的互促互助关系；脾主运化水液，肾为主水之脏，脾肾的关系还表现在水液代谢方面。与题干不符，排除。E 项：肝肾之间的关系，有“肝肾同源”或“乙癸同源”之称。肝主藏血。而肾主藏精，肝主疏泄而肾主封藏，肝为水之子。而肾为木之母。故肝肾之间的关系，主要表现在精血同源、藏泄互用以及阴阳互滋互制等方面。与题干不符，排除。故正确答案为 D。

7、答案：B

解析：本题考查的是五脏之间的关系。气虚，指一身之气不足及其功能低下的病理变化。多因先天禀赋不足，或后天失养，或肺脾肾的功能失调而致气的生成不足。也可因劳倦内伤，或久病不复等，过多耗气而致。A 项：心与肺的关系，主要表现在血液运行与呼吸吐纳之间的协同调节关系。与题干不符，排除。B 项：肺、脾肺司呼吸而摄纳清气，脾主运化而化生谷气；肺主行水，脾主运化水液。肺与脾的

关系，主要表现在气的生成与水液代谢两个方面。B 项正确。C 项：肺与肾的关系，主要表现在水液代谢、呼吸运动及阴阳互资三个方面。与题干不符，排除。D 项：脾与胃的关系，体现在水谷纳运相得、气机升降相因、阴阳燥湿相济三个方面。与题干不符，排除。E 项：肝气升发，肺气肃降。肺与肝的生理联系，主要体现在人体气机升降的调节方面。与题干不符，排除。故正确答案为 B。

8、答案：B

解析：本题考查的是中医基础理论五脏与形、窍、志、液时关系的具体应用。肝藏血，开窍于目，眼睛有赖于肝血濡养才能发挥视觉功能。《素问·五脏生成篇》说：“肝受血而能视”。B 项正确。A 项：肾主骨生髓，肾中精气的充盈可促进骨骼的生长发育以及脊髓脑髓的生化，排除。C 项：脾主运化，脾气的健运主要与水谷精微及水液的生成输布相关，排除。D 项：肾阳为一身阳气之本，能温煦机体，推动激发脏腑功能，但题目强调“主要”，排除。E 项：肾阴为一身阴气之源，能滋润濡养脏腑组织，但题目强调“主要”，排除。故正确答案为 B。

9、答案：E

解析：本题考查的是津液的基本概念。

津液是津和液的总称。质地较浓稠，流动性较小，灌注于骨节、脏腑、脑、髓等，起濡养作用的，称为液。E 项正确。A 项：精，是由禀受于父母的生命物质与后天水谷精微相融合而形成的一种精华物质，是人体生命的本原，是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。与题干不符，排除。B 项：气是人体活力很强运行不息的极精微物质，是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。与题干不符，排除。C 项：血是循行于脉中而富有营养的红色液态物质，是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一，具有很高的营养和滋润作用。与题干不符，排除。D 项：津质地较清稀，流动性较大，布散于体表皮肤、肌肉和孔窍，并能入血脉之内，起滋润作用。与题干不符，排除。故正确答案为 E。

10、答案：C

解析：本题考查的是奇经八脉中阴、阳跷脉的生理功能。跷脉的生理功能有两个方面：一是主司下肢运动。“跷”有跷捷之意。阴跷脉行于下肢内侧，阳跷脉行于下肢外侧，二者均起于足部，上达头面联络于脑，故跷脉具有调节肢体运动，促使下肢灵活跷捷的在用。二是司眼睑开合。阴阳跷脉交会于目内眦，阳跷主一身左右之阳，

阴跷脉、主一身左右之阴。故有“分主一身左右之阴阳”之说。C项正确。A项：冲脉的生理功能为：一是调节十二经气血，称其为“十二经脉之海”或“五脏六腑之海”；二是与女子月经及孕育功能有关。与题干不符，排除。B项：督脉的生理功能有二：一是调节阳经气血，为“阳脉之海”；二是与脑、髓和肾的功能有关。与题干不符，排除。D项：阴、阳维脉有维系联络全身阴、阳经的作用。与题干不符，排除。E项：任脉的生理功能为：一是调节阴经气血，为“阴脉之海”；二是任主胞胎，与女子月经来潮及妊养生殖功能有关，故为生养之本。与题干不符，排除。故正确答案为C。

12、答案：D

解析：本题考查的是六淫各自的性质和致病特点。湿邪的性质及致病特点：①湿为阴邪，易伤阳气。②湿性重浊，其致病常出现沉重感及附着难移为特征的临床表现，如头身困重、四肢酸楚沉重并且附着难移等。还易出现分泌物和排泄物秽浊不清的特征。③湿性黏滞，易阻气机。D项正确。A项：风邪的性质及致病特点：①风性轻扬开泄，易袭阳位。②风性善行而数变，故风邪致病具有病位游走、行无定处的特点。③风性主动，指风邪致病具

有动摇不定的特征。如风邪伤人，常见颜面肌肉抽掣，或眩晕、震颤、抽搐、颈项强直、角弓反张、两目上视等。与题干不符，排除。B项：寒邪的性质及致病特点：①寒为阴邪，易伤阳气。②寒性凝滞，指寒邪伤人，易致寒邪所伤之部位气血津液凝结、经脉阻滞。③寒性收引，指寒邪伤人，可致气机收敛，腠理、筋脉挛急收缩。与题干不符，排除。C项：火热邪性质及致病特点：①火热为阳邪，其性燔灼趋上。②火热易扰心神。③火热易伤津耗气。④火热易生风动血。⑤火邪易致疮痍。与题干不符，排除。

E项：燥邪的性质及致病特点：①燥性干涩，易伤津液。②燥易伤肺。与题干不符，排除。故正确答案为D。

13、答案：B

解析：本题考查的是中医基础理论邪正盛衰病机的判断。患者胃肠热盛，大便秘结。腹满硬痛而拒按，可判断为阳明腑实证，因里热内盛，故见潮热，热邪扰神，见神昏谵语；面色苍白，四肢厥冷，精神萎顿表面看上去为虚证，实则为实邪内阻，阳气郁闭于内而不能外达，从而出现面色苍白，四肢厥冷，精神萎顿等假虚证候，故该患者的病机为真实假虚证。B项正确。

14、答案：B

解析：本题考查的是正治与反治。热因热用，即以热治热，是指用热性药物来治疗具有假热征象的病证。适用于阴盛格阳的真寒假热证。B项正确。A项：瘀血所致崩漏者，适宜选用通因通用之法。与题干不符，排除。C项：里热盛极，阳盛格阴而见寒象者，适宜选用寒因寒用之法。与题干不符，排除。D项：因脾虚而致痞满且大便不畅者，适宜选用塞因塞用之法。与题干不符，排除。E项：因实热壅积而致大便不通者，适宜选用实则泻之的正治之法。与题干不符，排除。

15、答案：D

解析：本题考查的是得神、失神、少神、假神的常见临床表现及其意义。失神的临床表现：精神萎靡，反应迟钝，面色晦暗无华，目无光彩，眼球呆滞，呼吸微弱，或喘促无力，肉削骨，动作艰难，或郑声等。少神的临床表现：精神不振，两目乏神，面色少华，肌肉松软，倦怠乏力，少气懒言，动作迟缓等。面色晦暗少华为失神与少神的共同表现。D项正确。A项：言语失伦，是神乱或失神的表现之一。与题干不符，排除。B项：表情淡漠，为失神表现。与题干不符，排除。C项：倦怠乏力，为神气不足表现。

与题干不符，排除。E项：干扰选项，排除。故正确答案为D。

16、答案：D

解析：本题考查的是舌苔变化的特征与临床意义。吐、弄舌两者皆因心、脾二经有热所致。心热则动风，脾热则津耗，以致筋脉紧缩不舒，频频动摇。D项正确。A项：强硬舌，多因外感热病，邪入心包，心神受扰，舌无所主；或高热伤津，筋脉失养，舌体失柔；或肝风挟痰，风痰阻络，筋脉失养。以致舌体强硬失和。与题干不符，排除。B项：颤动舌，因气血两虚，阴液亏虚，舌失于濡养而无力平稳伸展舌体，或因热极津亏而动风、肝阳化风等导致舌抖颤难安。与题干不符，排除。C项：痿软舌，多因气血不足，阴液亏虚，舌体筋脉失养而致。与题干不符，排除。E项：歪斜舌，多因肝风内动，夹痰或夹瘀，痰瘀阻滞一侧经络，舌肌弛缓，收缩无力，而健侧舌肌如常而致。与题干不符，排除。故正确答案为D。

17、答案：E

解析：本题考查的是特殊汗出的临床表现及其意义。战汗指先见全身寒战抖动，而后汗出者，为邪正交争的表现，为病情变化的转折点。若汗出热退，脉静身凉，是邪去正复之佳兆；

若汗出而身热不减，烦躁不安，脉来疾急，是邪盛正衰的危候，E项正确。A项：自汗，多见于气虚证和阳虚证。因阳气亏虚，不能固护肌表，玄府不密，津液外泄所致。与题干不符，排除。B项：盗汗，多见于阴虚证。C项：绝汗，指患者在病情危重的情况下，出现大汗不止的症状，又称脱汗。常是亡阳或亡阴的表现。与题干不符，排除。D项：冷汗，多因阳气虚或惊吓所致。与题干不符，排除。故正确答案为E。

18、答案：B

解析：本题考查的是中医诊断学中按诊的内容。腹部膨满，但按之不实，无压痛，叩之作空声者为气胀，气胀多属虚满，因未成有形的病理产物，故无压痛。B项正确。A项：水臌表现为全腹胀大，推之有波动感，按其肌肤不能即起，排除。C项：痰饮者按之有形而胀痛，推之漉漉有声，排除。D项：积者病属血分，痛有定处，按之有形而不移；聚者病属气分，痛无定处，按之无形而聚散不定，排除。E项：内痛者，按腹而其热烙手，痛不可忍，排除。故正确答案为B。

19、答案：C

解析：本题考查的是中医诊断学六淫辨证中暑淫证候的临床表现。暑淫证

多表现为发热恶热，汗出，口渴喜饮，气短，神疲，肢体困倦，小便短黄，舌红，苔白或黄，脉虚数。因暑为阳邪，炎热升散，故发热恶热，汗出多，暑邪耗气伤精，故气短神疲。C项正确。A项：头昏沉，嗜睡，胸脘痞闷为湿淫证表现，排除。B项：口渴饮水，口唇鼻咽干燥为燥淫证表现，排除。D项：突发皮肤瘙痒、丘疹为风淫证表现，排除。E项：肠鸣腹泻，脘腹拘急冷痛为寒淫证表现，排除。故正确答案为C。

20、答案：E

解析：本题考查的是血病辨证。血虚证，临床多见面色淡白或萎黄，眼睑、口唇、舌质、爪甲的颜色淡白，头晕，或见眼花、两目干涩，心悸，多梦，健忘，神疲，手足发麻，或妇女月经量少、色淡、延期甚或经闭，脉细无力等。血瘀证，临床多见①疼痛特点为刺痛、痛久拒按、固定不移、常在夜间痛甚；②肿块的性状是在体表者包块色青紫，腹内者触及质硬而推之不移；③出血的特征是出血反复不止，色紫暗或夹血块，或大便色黑如柏油状，或妇女血崩、漏血；④瘀血色脉征主要有面色黧黑，或唇甲青紫，或皮下紫斑，或肌肤甲错，或腹露青筋，或皮肤出现丝状红缕，或舌有紫色斑点、舌下络脉曲张，脉多细涩或结、

代、无脉等。二者可见闭经，血虚闭经因经血乏源所致；而血瘀证则因瘀血不去，新血不生，故亦可见闭经。E项正确。A项：心悸，见于血虚证。与题干不符，排除。B项：脉涩，见于血瘀证。与题干不符，排除。C项：手麻，见于血虚证。与题干不符，排除。D项：腹痛，见于血瘀证。与题干不符，排除。故正确答案为E。

21、答案：D

解析：本题考查：气血同病辨证。A项：气血两虚，临床表现：头晕目眩，少气懒言，神疲乏力，自汗，面色淡白或萎黄，唇甲淡白，心悸失眠，形体消瘦，舌淡而嫩，脉细弱。与题干不符，排除。B项：气血失和，指气与血失去互相协调作用的病机，包括气滞血瘀、气虚血瘀、气不摄血、气随血脱以及气血两虚等方面。与题干不符，排除。C项：气不摄血，临床表现：吐血、便血、崩漏、皮下瘀斑、鼻衄，神疲乏力，气短懒言，面色淡白，舌淡，脉弱。与题干不符，排除。D项：气随血脱，临床表现：大出血时，突然面色苍白，大汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，甚至晕厥，舌淡，脉微欲绝或见芤脉。题例中，“产后大出血，继则冷汗淋漓，面色苍白，甚则晕厥”，属典型的气随血脱症状。D项正确。E

项：气滞血瘀，临床表现：胸胁胀满疼痛，乳房胀痛，情志抑郁或易怒，兼见痞块刺痛、拒按，妇女痛经，经血紫黯有块，或闭经，舌紫暗或有瘀点瘀斑，脉弦涩。与题干不符，排除。故正确答案为D。

22、答案：A

解析：少阳病本证的临床表现是口苦，咽干，目眩，寒热往来，胸胁苦满，默默不欲饮食。

23、答案：D

解析：气陷证的临床表现是头晕眼花，气短疲乏，脘腹坠胀感，大便稀溏，形体消瘦，或见内脏下垂、脱肛、阴挺等。

24、答案：D

解析：正常舌象的主要特征是舌色淡红鲜明，舌质滋润，舌体大小适中、柔软灵活；舌苔均匀薄白而润。简称“淡红舌，薄白苔”。

25、答案：C

解析：咸味有泻下通便、软坚散结的作用，多用治大便燥结、痰核、瘰疬、癭瘤、癥瘕痞块等证。

26、答案：B

解析：本题考查的是解表药中发散风寒药的药效。白芷：辛、温，归肺、胃、大肠经；功效：解表散寒，祛风止痛，通鼻窍，燥湿止带，消肿排脓。



B 项正确。A 项：防风：祛风解表，胜湿止痛，止痉。无燥湿止带功效，排除。C 项：羌活：解表散寒，祛风胜湿，止痛。无燥湿止带功效，排除。D 项：苍耳子：发散风寒，通鼻窍，祛风湿，止痛。无燥湿止带功效，排除。E 项：藁本：祛风散寒除湿止痛。无燥湿止带功效，排除。故正确答案为 B。

27、答案：B

解析：柴胡善治表证发热，少阳证：半表半里之邪，为治少阳证要药。

28、答案：C

解析：本题考查的是祛风湿药的功效。白花蛇，功效祛风湿，透筋骨，定惊搐。主治风湿瘫痪，骨节疼痛，麻风，疥癩，小儿惊风搐搦，破伤风，杨梅疮，瘰疬恶疮。故 C 项正确。A、B、D、E 四项：皆与题干不符，排除。故正确答案为 C。

29、答案：A

解析：本题考查的是攻下药、峻下逐水药功用。A 项：大黄除泻下作用外，还可治疗血热吐衄、目赤咽痛、热毒疮疡、烧烫伤、瘀血诸证、湿热痢疾、黄疸、淋证。故 A 项正确。B 项：芦荟可治小儿疳积、癣疮。与题干不符，排除。C 项：番泻叶可治腹水肿胀。与题干不符，排除。D 项：甘遂可治水肿、胸胁停饮、风痰癫痫、疮痈肿毒。与

题干不符，排除。E 项：大戟可治疗水肿、胸胁停饮、瘰疬痰核，疮痈肿毒。与题干不符，排除。故正确答案为 A。

30、答案：A

解析：本题考查祛风寒湿药中威灵仙的功效。威灵仙、独活、木瓜属于祛风寒湿药，均能祛风湿，通经络，其中威灵仙和独活还均能止痛，不同之处在于，威灵仙还可消骨鲠，独活还具有解表之力，可用于风寒夹湿表证，而木瓜还能和胃化湿，消食，生津止渴，为治疗吐泻转筋之要药；防己属于祛风湿热药，祛风湿，止痛，利水消肿的作用，主治风湿热痹，水肿，小便不利等；狗脊属于祛风湿强筋骨药，不仅具有祛风湿的作用，还兼有补肝肾，强腰膝，止血之功。A 项正确。B、C、D、E 四项：均不具有消骨鲠的作用，排除。故正确答案为 A。

31、答案：E

解析：本题考查的是中药利水消肿药中猪苓的功效主治。猪苓性味甘、淡，平，归肾、膀胱经，善通利水道，利水渗湿作用较强，单味应用即可起效，可用于水湿停滞的各种水肿，如小便不利、水肿、泄泻、带下等。E 项正确。A 项：石韦为利尿通淋药，多用于治疗淋证小便不通，排除。B 项：滑石为利尿通淋药，多用于治疗淋证小便不通、

尿热涩痛，排除。C项：萆薢为利尿通淋药，具有利湿去浊功效，为治膏淋小便混浊要药，排除。D项：木通为利尿通淋药，能利水消肿，下利湿热，多用于治疗热淋涩痛，治疗水肿则需配以猪苓等，排除。故正确答案为E。

32、答案：D

解析：本题考查的是乌药的归经。A项：木香，归脾、胃、大肠、胆、三焦经。与题干不符，排除。B项：陈皮，归脾、肺经。与题干不符，排除。C项：香附，归肝、脾、三焦经。与题干不符，排除。D项：乌药，归肺、脾、肾、膀胱经。D项正确。E项：青皮，归肝、胆、胃经。与题干不符，排除。故正确答案为D。

33、答案：B

解析：本题考查的是理气药功效。A项：柿蒂，降气止呃。与题干不符，排除。B项：木香，行气止痛，健脾消食。故B项正确。C项：香附，疏肝解郁，调经止痛，理气调中。与题干不符，排除。D项：乌药，行气止痛，温肾散寒。与题干不符，排除。E项：薤白，通阳散结，行气导滞。与题干不符，排除。故正确答案为B。

34、答案：E

解析：本题考查的是中药驱虫药的功效。榧子性味甘平，归肺、胃、大肠

经，具有杀虫消积，润肠通便，润肺止咳功效。E项正确。A项：贯众为清热解毒药，具有清热解毒，凉血止血，杀虫功效，不能润肺止咳，排除。B项：槟榔具有杀虫消积，行气，利水，截疟功效，不能润肺止咳，排除。C项：花椒为温里药，具有温中止痛，杀虫止痒功效，不能润肺止咳，排除。D项：雷丸具有杀虫消积功效，不能润肺止咳，排除。故正确答案为E。

35、答案：B

解析：本题考查的是五味子的功效。A项：诃子，功效涩肠止泻，敛肺止咳，利咽开音。与题干不符，排除。B项：五味子，功效收敛固涩，益气生津，补肾宁心。B项正确。C项：乌梅，功效敛肺止咳，涩肠止泻，安蛔止痛，生津止渴。与题干不符，排除。D项：五倍子，功效敛肺降火，止咳止汗，涩肠止泻，固精止遗，收敛止血，收湿敛疮。与题干不符，排除。E项：覆盆子，功效固精缩尿，益肝肾明目。与题干不符，排除。故正确答案为B。

36、答案：D

解析：本题考查的是方剂中配伍特点的鉴别。所谓“以补为固”，是指以补气为主，通过补气而达固摄气、血、精、津之目的。玉屏风散虽为止汗之方，却不用收敛止汗之药，而以黄芪、

白术补气固表为治，是典型的“以补为固”，且更佐少许防风，使补中兼疏，固表而不留邪。D项正确。A项：牡蛎散主治气虚卫外不固，阴液不能内守而致的自汗、盗汗证，由牡蛎，黄芪，麻黄根组成，补敛并用而以固涩为主，为收敛止汗的代表方。与题干不符，排除。B项：固冲汤主治肾虚不固，脾虚不摄，冲脉滑脱而致的崩漏。全方以众多收敛固涩药固涩滑脱为主，配伍补气药以助固涩为辅，意在急则治标。与题干不符，排除。C项：健脾丸主治脾虚食积证，方中补气健脾药与消食行气药同用，为消补兼施之剂，补而不滞，消不伤正。与题干不符，排除。E项：真人养脏汤主治久泻久痢，脾肾虚寒证。病虽然以脾肾虚寒为本，但是已至滑脱失禁，非固涩则泻痢不能止，治当涩肠固脱治标为主，温补脾肾治本为辅。全方具有标本兼治，重在治标；脾肾兼顾，补脾为主；涩中寓通，补而不滞的配伍特点。与题干不符，排除。故正确答案为D。

37、答案：C

解析：本题考查的是小青龙汤的药物组成。小青龙汤的药物组成：麻黄、芍药、细辛、干姜、甘草、桂枝、五味子、半夏。C项正确。A、B、D、E

四项：都与题干不符，排除。故正确答案为C。

38、答案：E

解析：本题考查泻下剂主治区别。泻下剂适用于里热积滞实证，里寒积滞实证，肠燥津枯便秘，水饮壅盛于里以及里实正虚之大便秘结证。大黄附子汤的主治证候是阳虚寒结，腹痛便秘，属冷积便秘，E项正确。A项：枳实导滞丸常用于湿热食积便秘，排除。B、C两项：泻下剂中未见专用于血虚便秘方剂，排除。D项：麻子仁丸又称“脾约丸”，主治胃肠燥热，脾约便秘证，排除。故正确答案为E。

39、答案：D

解析：逍遥散配伍薄荷：少许薄荷，疏散肝经郁遏之气，透达肝经郁遏之热。

40、答案：B

解析：本题考查的是青蒿鳖甲汤的配伍意义。吴瑭自释“此方有先入后出之妙，青蒿不能直入阴分，有鳖甲领之入也；鳖甲不能独出阳分，有青蒿领之出也。”B项正确。生地滋阴凉血，知母滋阴降火，共助鳖甲以养阴退虚热，为臣药。A、D、E三项与题干不符，排除。C项：生地滋阴凉血，知母滋阴降火，共助鳖甲以养阴退虚热，为臣药，丹皮泄血中伏火，以助青蒿清透

阴分伏热，为佐药。与题干不符，排除。故正确答案为 B。

41、答案：C

解析：左金丸：黄连：吴茱萸（6：1）

42、答案：B

解析：固涩剂的适用范围固涩剂主要用于气、血、精、津耗散滑脱之证。凡是气、血、精、津滑脱不禁，散失不收，表现为自汗、盗汗、久咳不止、久泻久痢、遗精滑泄、小便失禁、崩漏、带下等均可使用固涩剂治疗。

43、答案：E

解析：本题考查的是方剂滋养安神剂中酸枣仁汤组成药物的功效。方中重用酸枣仁为君，以其甘平，入心肝之经，养血补肝，宁心安神。E 项正确。A 项：知母苦寒质润，用之以滋阴润燥、清热除烦，排除。B 项：川芎辛散，调肝血而疏达肝气，排除。C 项：茯苓宁心安神，兼有益气健脾之效，排除。D 项：甘草生用，和中缓急，调和诸药，排除。故正确答案为 E。

44、答案：C

解析：本题考查的是方剂行气剂中越鞠丸组成药物的功效。越鞠丸具有行气解郁功效，方中香附辛香入肝，行气解郁，以治气郁，用为君药。C 项正确。A、B、D、E 四项药物具有行气功效，但均不是越鞠丸的组成，排除。

故正确答案为 C。

45、答案：D

解析：呼吸困难分为肺源性呼吸困难、心源性呼吸困难和中毒性呼吸困难。其中肺源性呼吸困难又分为吸气性呼吸困难、呼气性呼吸困难和混合性呼吸困难。呼气性呼吸困难表现为呼气费力，呼气时间延长，常伴有哮鸣音。多见于支气管哮喘、慢性喘息性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿等。D 项正确。46、答案：D

解析：头痛的表现，往往根据病因不同而有其不同的特点。慢性进行性头痛并有颅内压增高的症状 如呕吐、视神经盘水肿 应注意颅内占位性病变。A 项：脑血栓形成血管性头痛为搏动样头痛，不会引起颅内压增高，视神经盘水肿。与题干不符，排除。B 项：颅骨骨折为外伤性头痛，发生在受伤后。与题干不符，排除。C 项：偏头痛常在月经期发作，呈周期性。与题干不符，排除。D 项：慢性进行性头痛伴呕吐、视神经盘水肿是颅内占位性病变的典型表现。D 项正确。E 项：三叉神经痛表现为颜面部发作性电击样疼痛，不会引起呕吐或视神经乳头水肿。与题干不符，排除。故正确答案为 D。

47、答案：E

解析：本题考查的是凹陷型水肿和非凹陷性水肿的病因。凹陷性水肿多是心、肝、肾源性水肿、营养不良性水肿等。在手指松开后，这种凹陷须数秒至一分钟方能平复。这是由于凹陷性水肿时，皮下组织间隙中有较多的游离水，因按压局部压力增高，使游离水移向压力较低处，故出现凹陷，手指松开后，游离水回复到原处的时间即为凹陷平复的时间。非凹陷性水肿多为是组织间隙内蛋白的沉积导致，又叫粘液性水肿，多见于甲状腺功能减退症，重者表现为粘液性水肿，故又称为“粘液性水肿”。指压后组织下陷不明显或没有凹痕。可能因为毛细血管通透性增加、淋巴回流缓慢及局部组织粘多糖特别是透明质酸的堆积。心源性、肾源性、肝源性、营养不良性水肿水肿液均为水，故为凹陷性水肿。非凹陷性水肿多见于甲状腺功能减退症，为内分泌性。综上所述，本题 A、B、

48、答案：E

解析：本题考查的是问诊现病史的内容。现病史包括以下几个方面：①起病情况：起病时间、起病急缓、有无病因或诱因等。②主要症状特征：包括症状的部位、性质、持续时间和程度等。③病因和诱因：应询问与本次

发病有关的病因（如外伤、中毒、感染、遗传、变态反应等）和诱因（如气候变化、环境改变、情绪激动或抑郁、饮食起居失调等）。④病情发展与演变过程：起病后主要症状的变化是持续性还是发作性，是进行性加重还是逐渐好转，缓解或加重的因素等。⑤伴随症状。⑥诊治经过。⑦患者的一般情况。由此，A、B、C、D 四项，均属于现病史 E 项：家族成员患同样疾病的情况属于家族史。本题为选非题，故正确答案为 E。

49、答案：E

解析：本题考查的是各种触诊手法的适用场合。大量腹水形成而肝脾难以触及时应采用冲击触诊浮沉触诊法。A 项：浅部触诊主要用于检查体表浅在病变，如关节，软组织，浅部的动脉、静脉、神经、阴囊和精索等。与题干不符，排除。B 项：深部滑行触诊主要适用于腹腔深部包块和胃肠病变的检查。与题干不符，排除。C 项：双手触诊适用于肝、脾、肾、子宫和腹腔肿物的检查。与题干不符，排除。D 项：深压触诊用于探测腹部深在病变部位或确定腹腔压痛点，如阑尾压痛点、胆囊压痛等。与题干不符，排除。E 项：冲击触诊法适用于大量腹水而肝、脾

难以触及时。E 项正确。故正确答案为 E。

50、答案：D

解析：本题考查的是头颅形状，大小检查。脑积水患者巨颅，额、头顶、颞和枕部膨呈圆形，颜面部相对很小，头皮静脉明显怒张。由于颅内高压，压迫眼球，形成双目下视、巩膜外露的特殊面容，称为落日现象。A 项：婴幼儿前囟过早闭合可引起小头畸形。与题干不符，排除。B 项：见于小儿佝偻病呈方颅，前额左右突出，头顶平坦呈方颅畸形。与题干不符，排除。C 项：脑膜炎有脑膜刺激征，不引起头颅形态变化。与题干不符，排除。D 项：落日症见于脑积水。D 项正确。E 项：颅内出血引发的颅内压增高不会表现为落日征。与题干不符，排除。故正确答案为 D。

51、答案：C

解析：本题主要考查蛛网膜下腔出血的特征。蛛网膜下腔出血以青壮年多见。多在情绪激动或用力情况下急性发生，部分患者可有反复发作头痛史。突发剧烈头痛、呕吐、颜面苍白、全身冷汗，多数患者无意识障碍，但可有烦躁不安。发病数小时后可见脑膜刺激征阳性。血性脑脊液改变。其他临床症状：如低热、腰背腿痛等。C 项

正确。A 项：蛛网膜下腔出血多无意识障碍，无昏迷，排除。B 项：蛛网膜下腔出血发病数小时后可见脑膜刺激征阳性，排除。D 项：蛛网膜下腔出血一般不会见到“三偏”征，排除。E 项：蛛网膜下腔出血一般不会失语，排除。故正确答案为 C。

52、答案：B

解析：本题考查的是心绞痛的实验室检查。心绞痛是冠状动脉供血不足，心肌急剧、暂时缺血与缺氧所引起的临床综合征，其相关的实验室检查有心脏 X 线检查、心电图检查、超声心动图、放射性核素检查、冠状动脉造影、CT 及其他检查。其中心电图检查是发现心肌缺血、诊断心绞痛最常用的检查方法，B 项正确。A 项：超声检查，在心脏疾病中，常用于先天性心脏病、心瓣膜病变、高血压性心脏病等的检查，排除。C 项：血清淀粉酶检查，是诊断急性胰腺炎、急腹症等常用的检查，排除。D 项：冠状动脉造影是冠心病的确诊检查，排除。E 项：放射性核素检查，可辅助检查用于心血管系统，主要有心肌显像和心功能的测定，但不是心绞痛最常用的检查，排除。故正确答案为 B。

53、答案：D

解析：临床上常见的病理性痰液可分为粘液性、浆液性、脓性、黏液脓性、煎液血性、血性等，红色或棕红色痰见于肺癌、肺结核、支气管扩张；铁锈色痰见于细菌性肺炎（大叶性肺炎）、肺梗死；粉红色浆液泡沫性痰见于急性左心功能不全、肺水肿；棕褐色痰见于阿米巴性脓肿、慢性充血性心脏病、肺瘀血等；灰黑色痰见于煤矿工及大量吸烟者。肺脓肿及晚期肺癌患者痰常有恶臭。D 项正确。

54、答案：D

解析：血尿素氮是蛋白质代谢的终产物，在肝脏中经过鸟氨酸代谢，进入血液循环中，由肾脏排泄。正常值为 2.9~6.4mmol/L。临床意义主要分为肾前性、肾性、肾后性和蛋白分解代谢亢进。肾前性如急性失血、烧伤等有效的循环血量减少时，升高。肾性如慢性肾盂肾炎、肾小球肾炎等可以引起肾小球的滤过功能损伤，则血液中的尿素氮升高。肾后性主要指的是前列腺增生症、尿路结石等引起尿液排出障碍，则血尿素氮升高。血尿素氮对早期的肾功能损害的敏感性差。D 项正确。

55、答案：C

解析：本题考查的是十二经脉的循行交接规律。十二经脉循行交接规律是：

①相表里的阴经与阳经在手足末端交接；②同名的阳经与阳经在头面部交接，如手阳明大肠经和足阳明胃经交接与鼻旁；③相互衔接的阴经与阴经在胸中交接。C 项正确。A、B、D、E 四项与题干不符，排除。故正确答案为 C。

56、答案：C

解析：本题考查的是通督脉的八脉交会穴。后溪为八脉交会穴，通于督脉。C 项正确。A 项：足临泣为八脉交会穴，通于带脉。与题干不符，排除。B 项：公孙为八脉交会穴，通于冲脉。与题干不符，排除。D 项：照海为八脉交会穴，通于阴跷脉。与题干不符，排除。E 项：列缺为八脉交会穴，通于任脉。与题干不符，排除。故正确答案为 C。57、答案：E

解析：本题考查的是腧穴的定位方法中骨度分寸法：股头大转子至膝中 19 寸。E 项正确。A 项：胫骨内侧面下缘至内踝尖 13 寸。与题干不符，排除。B 项：臀沟至腘横纹 14 寸。与题干不符，排除。C 项：膝中至外踝尖 16 寸。与题干不符，排除。D 项：耻骨联合上缘至髌底 18 寸。与题干不符，排除。故正确答案为 E。

58、答案：D

解析：本题考查手阳明大肠经中手三里穴的定位。手三里穴在前臂背面桡侧，阳溪穴与曲池穴连线上，肘横纹（曲池穴）下 2 寸。D 项正确。A、B、C、E 四项：均不符合题意，排除。故正确答案为 D。

59、答案：B

解析：在胸部，距前正中线 2 寸循行的经脉是足少阴肾经，距前正中线 4 寸循行的经脉是足阳明胃经，距前正中线 6 寸循行的经脉是足太阴脾经。

60、答案：B

解析：本题考查的是针灸学中足太阴脾经的主治。足太阴脾经脾胃病、妇科病、前阴病和经脉循行部位的其他病证。A、C、D、E 四项均为足太阴经的主治范围。B 项：口舌病不属脾经主治范围。本题为选非题，故正确答案为 B。

61、答案：A

解析：阴郄的定位：在前臂前区，腕掌侧远端横纹上 0.5 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。

62、答案：C

解析：本题考查至阴穴的主治。至阴穴是足太阳膀胱经的常用腧穴之一，具有上清头目、下调胞产的作用。至阴主治：①胎位不正，滞产；②头痛，目痛，鼻塞，鼻衄。C 项正确。A 项：

隐白主治妇科病，慢性出血证，癫狂，多梦，惊风，腹满，暴泻。与题干不符，排除。B 项：中渚主治头痛、目赤、耳鸣、耳聋、喉痹舌强等头面五官病证；热病，肩背肘臂酸痛、手指不能屈伸。与题干不符，排除。D 项：涌泉主治昏厥、中暑、癫痫、小儿惊风等急症及神志病患；头痛，头晕；咯血，咽喉肿痛；小便不利，便秘；足心热；奔豚气。为急救穴之一。与题干不符，排除。E 项：合谷主治发热，头痛，目赤肿痛，鼻衄，血渊，咽喉肿痛，齿痛，耳聋，面肿，口眼喎斜，中风口噤，热病无汗，多汗，消渴，黄疸，痛经，经闭，滞产等。与题干不符，排除。故正确答案为 C。

63、答案：A

解析：复溜的主治：①腹胀，泄泻，癃闭，水肿；②盗汗、汗出不止或热病无汗等津液输布失调病证；③下肢瘫痪，腰脊强痛。所以治疗汗证首选复溜。

64、答案：C

解析：曲泽的定位：在肘前区，肘横纹上，肱二头肌腱的尺侧缘凹陷中。

65、答案：D

解析：本题考查的是药理学中药物对机体作用的选择性。药物的选择性指的是药物对某些器官组织产生明显的



作用，而对另一些器官组织则无明显作用，称为药物作用的选择性。药物的选择性是药物分类和临床选药的依据。有些药物可影响机体的多种功能。选择性低的药物作用范围广，不良反应多见。药物作用的选择性是相对的，随着剂量增大，选择性下降。药物的选择项具有相对性。D项说法错误，当选。本题为选非题，故正确选项为D。66、

答案：A

解析：本题考查对治疗有机磷酸酯类中毒药物的掌握。有机磷农药中毒毒蕈碱样症状表现为体内多种腺体分泌增加和平滑肌收缩所产生的症状和体征，如多汗，流涎，流泪，鼻溢，肺部干湿啰音，呼吸困难，恶心呕吐，腹痛腹泻，肠鸣音亢进，尿频尿急，大小便失禁，瞳孔缩小，视力模糊，抑制血管平滑肌，血压下降。阿托品是治疗急性有机磷酸酯类中毒的特异性、高效能解毒药物，应尽早较大剂量给药。A项正确。B项：氯磷定，又名氯解磷定，其水溶性好，可肌肉注射或静脉给药，可用于治疗有机磷农药中毒，但中、重度中毒必须合用阿托品，不是最佳选项，排除。C项：利多卡因是林场上常用的局麻药，也用于治疗心率失常，是防治急性心肌梗死及各种心脏病并发快速室性心律失

常药物，是急性心肌梗死的室性早搏，室性心动过速及室性震颤的首选药，与题干不符，排除。D项：甲硝唑(灭滴灵)是治疗阴道滴虫病的首选药物，可用于治疗阿米巴痢和阿米巴肝脓肿，与题干不符，排除。E项：双复磷可用于治疗有机磷农药中毒，但中、重度中毒必须合用阿托品，不是最佳选项，排除。故正确答案为A。

67、答案：C

解析：本题考查对阿托品用药禁忌的掌握。阿托品主要用于缓解内脏绞痛、休克抢救、心律失常、解救有机磷农药中毒等症，禁忌症为青光眼及前列腺肥大。C项正确。A项：阿托品能解除平滑肌痉挛，可用于治疗膀胱刺激征，而非禁忌症，排除。B项：大剂量的阿托品能解除血管痉挛，舒张外周血管，改善微循环，对抗休克，而非禁忌症，排除。D项：阿托品用于治疗迷走神经过度兴奋导致的房室传导阻滞等缓慢型心率失常，而非禁忌症，排除。E项：麻醉前给予阿托品可减少腺体分泌，防止分泌物阻塞呼吸道，而非禁忌症，排除。故正确答案为C。

68、答案：C

解析： $\beta$ 受体阻断作用：①抑制心脏②收缩支气管③减慢代谢④抑制肾素释放，所以关于 $\beta$ 受体阻滞药的禁忌

证，错误的是高血压。

69、答案：C

解析：本题考查的是抗癫痫药中的丙戊酸钠。对小发作疗效优于乙琥胺，但是由于其肝脏毒性不作为小发作的首选药物。C项表述错误，当选。A项：丙戊酸钠是为广谱抗癫痫药，叙述正确，排除。B项：抗癫痫的作用机制与GABA有关，能减少GABA代谢，叙述正确，排除。D项：对大发作疗效不及苯妥英钠、苯巴比妥，叙述正确，排除。E项：对精神运动性发作与卡马西平相似。叙述正确，排除。不题为选非题，故正确答案为C。

70、答案：E

解析：本题考查的是氯丙嗪的应用。氯丙嗪止吐的作用机制，小剂量：阻断延髓第四脑室底部的催吐化学感受区的D<sub>2</sub>受体，对抗DA受体激动剂吗啡引起的呕吐。大剂量：直接抑制呕吐中枢。故可治疗尿毒症、癌症、放射病、药物中毒引起的呕吐。但不能对抗前庭刺激引起的呕吐。由此，A、B、C、D四项，均正确。E项：晕动病，是晕车、晕船、晕机等的总称。它是指乘坐交通工具时，人体内耳前庭平衡感受器受到过度运动刺激，前庭器官产生过量生物电，影响神经中枢而出现的出冷汗、恶心、呕吐、头晕等

症状群。本题为选非题，故正确答案为E。

71、答案：D

解析：本题考查的是药理学镇痛药的相关知识。芬太尼是短效镇痛药，作用于吗啡相似，镇痛效力为吗啡的100倍。适用于各种剧痛以及外科、妇科等手术过程中的镇痛，与全身麻醉药或局部麻醉药合用，可减少麻醉药用量。与氟哌利多合用有安定镇痛作用。D项正确。A项：哌替啶又名度冷丁，镇痛作用弱于吗啡，排除。B项：喷他佐辛镇痛作用弱于吗啡的1/3，排除。C项：美沙酮镇痛的作用于吗啡相当，排除。E项：可待因药理作用与吗啡相似，但是作用较吗啡弱，排除。故正确答案为D。

72、答案：B

解析：用于治疗胃和十二指肠溃疡，胃肠道出血，特别是胃肠黏膜糜烂引起的出血，多采用静脉滴注给药；治疗胃酸分泌过多症和反流性食管炎，及各种原因引起的免疫功能低下或抗肿瘤的辅助治疗。

73、答案：E

解析：本题考查的是利尿药的不良反应。氢氯噻嗪因减少细胞外液容量，增加近曲小管对尿酸的重吸收，竞争性抑制尿酸从肾小管分泌，可引起高

尿酸血症，痛风患者慎用。E 项正确。  
A 项：甘露醇，不良反应静脉注射过快可引起一过性头痛、眩晕、视力模糊及注射部位疼痛。与题干不符，排除。B 项：丙磺舒，抑制尿酸盐在近曲肾小管的主动再吸收，增加尿酸盐的排泄而降低血中尿酸盐的浓度。可缓解或防止尿酸盐结节的生成，减少关节的损伤，亦可促进已形成的尿酸盐溶解。用于高尿酸血症伴慢性痛风性关节炎患者。与题干不符，排除。C 项：氯沙坦，不良反应为头晕、高血钾和与剂量相关的体位性低血压。与题干不符，排除。D 项：卡托普利，不良反应为高血钾、低血压。与题干不符，排除。故正确答案为 E。

74、答案：E

解析：本题考查的是抗心律失常药中的普萘洛尔。普萘洛尔主要是β肾上腺素受体拮抗药，主要的机制是降低窦房结、心房、浦肯野纤维自律性，减慢心律。E 项正确。A 项：治疗量的膜稳定作用不是抗心律失常药物的作用机制，排除。B 项：扩张血管减轻心脏负荷主要是降血压药物的药理机制，排除。C 项：消除精神紧张是精神类药物的作用机制，排除。D 项：加快心律和传导是抗心衰药物的作用机制，排除。故正确答案为 E。

75、答案：C

解析：本题考查的是感染过程中病原体的作用。病原体经过不同途径进入人体就开始了感染过程，感染是否导致疾病取决于病原体的致病力和人体的抗病能力。C 项正确。A、B、D 三项：病原体的致病作用包括以下四个方面：①侵袭力；②毒力；③数量；④变异性。由此，A、B、D 三项，过于片面，与题干不符，排除。E 项：机体的抵抗能力，过于片面，与题干不符，排除。故正确答案为 C。

76、答案：C

解析：本题考察的是病毒性肝炎的临床特点。乙型、丙型、丁型肝炎可转化为慢性肝炎，其中丙型肝炎比例最高。C 项正确。A、B、D、E 四项与题干不符，排除。故正确答案为 C。

77、答案：B

解析：本题考查的是流行性脑脊髓膜炎的临床表现，流脑以突发高热、头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点和脑膜刺激征为主要临床表现。B 项正确。A 项：结核性脑膜炎，结核中毒症状之一是低热，排除。C 项：流行性乙型脑炎皮肤一般无瘀点，排除。D 项：伤寒常有中毒性脑病的表现，无脑膜刺激征，皮疹的典型特征为玫瑰疹，排除。E 项：

中毒性细菌性痢疾一般无脑膜刺激征，排除。故正确答案为 B。

78、答案：E

解析：消毒是指用物理、化学、生物学的方法清除或杀灭体外环境中的病原微生物，使其达到无害化程度的过程。传染病消毒是用物理或化学方法消灭停留在不同传播媒介物上的病原体，藉以切断传播途径，阻止和控制传染的发生。

79、答案：E

解析：乙脑的神经系统表现多在病程 10 天内出现，第 2 周后较少出现新的神经症状和体征。

80、答案：B

解析：在感染过程中，一般隐性感染者最多见，病原携带者次之，显性感染者比率最低，但一旦出现最易识别。仅少数传染病存在潜伏性感染者。

81、答案：C

解析：布鲁菌病又称波状热，是布鲁菌感染引起的自然疫源性疾病，临床上以长期发热、多汗、乏力、肌肉和关节疼痛、肝、脾及淋巴结肿大为主要特点。

82、答案：E

解析：标准预防基本特点：①强调双向防护，既要防止疾病从患者传至医护人员，又要防止疾病从医护人员传

至患者；②既要防止血源性疾病的传播，也要防止非血源性疾病的传播；

③根据疾病的主要传播途径，采取相应的隔离措施，包括接触隔离、空气隔离、和飞沫隔离。

83、答案：E

解析：艾滋病患者典型症状有卡氏肺孢子菌肺炎

84、答案：D

解析：病原体的变导致人群对某种传染病易感性增高。

85、答案：D

解析：本题考查的是卫生法基本原则的内容。卫生法的基本原则主要有五个方面：①卫生保护原则；②预防为主原则；③公平原则；④保护社会健康原则；⑤患者自主原则。综上所述，本题 A、B、C、E 四项均为卫生法基本原则的内容，正确。本题为选非题，故正确答案为 D。

86、答案：B

解析：本题考查的是中医师执业注册制度中改变执业地点注册的相关规定。《中华人民共和国执业医师法》第十七条规定：医师变更执业地点、执业类别、执业范围等注册事项的，应当到准予注册的卫生行政部门依照本法第十三条的规定办理变更注册手续。B

项正确。A、C、D、E 四项不符合该项规定，排除。故正确答案为 B。

87、答案：B

解析：本题考查的是卫生法规《中华人民共和国药品管理法》中第一类精神药品处方的管理。《处方管理办法》地二十三条规定：除特殊需要外，第一类精神药品的处方，每次不得超过 3 日常用量。B 项正确。A、C、D、E 四项均不是第一类精神药品处方的每次常用量，排除。故正确答案为 B。

88、答案：A

解析：国家对儿童实行预防接种证制度。

89、答案：E

解析：突发公共卫生事件的概念：是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

90、答案：C

解析：正确处理医务人员之间关系的道德原则：①互相尊重；②互相支持；③互相监督；④互相学习。

二、A2 题型

91、答案：C

解析：本题考查的是中医基础理论阴阳失调病机的判断。患者腰膝酸软，

时有遗精，脉沉弦细，为肾阴亏虚之证；阴不制阳，阳亢于上，见眩晕耳鸣，面红头胀，虚热扰神，见失眠多梦，虚火妄动，故性欲亢进，舌红亦为里热之征象，故该患者的病机为阴虚阳亢。C 项正确。A 项：因该患者有眩晕、面红头胀、失眠等虚阳上亢表现，阴虚内热不准确，排除。B 项：阴损及阳指阴液亏损，继而累及阳气生化不足，表现应为阴阳偏虚，而以阴虚为主，排除。D 项：阳损及阴指阳气亏损，进一步导致阴液生成减少，表现应为阴阳偏虚，而以阳虚为主，排除。E 项：因该患者有眩晕、面红头胀、失眠等虚阳上亢表现，阴虚火旺不准确，排除。故正确答案为 C。

92、答案：D

解析：心在五行属火，位居于上而属阳；肾在五行属水，位居于下而属于阴。心火必须下降于肾，肾水必须上济于心，心肾之间的生理功能才能协调，而称为“心肾相交”，反之，若心火不能下降于肾而独亢，肾水不能上济于心而凝聚，心肾之间的生理功能就会失去协调，而出现一系列的病理表现，即称为“心肾不交”，临床表现为：失眠，心悸怔忡，心烦，腰膝酸软，或见男子梦遗，女子梦交等症。心主神志，心烦不寐，病位在心；

腰为肾府，腰酸梦遗，病位在肾。D 项正确。

93、答案：B

解析：本题考查的是望舌苔。题目中所描述为外感表寒证。薄苔，主外感表证，或内伤轻病；白苔，一般常见于表证、寒证、湿证，也可见于热证。

B 项正确。

94、答案：B

解析：根据患者头痛为空痛，为虚证疼痛的特点，且患者兼眩晕，有腰膝酸软，神疲乏力，遗精带下，耳鸣失眠等肾虚的表现，判断其为肾虚头痛，舌红少苔，脉细无力，皆为肾虚的特点。B 项正确。

95、答案：D

解析：本题考查的是小儿脉象主病。小儿疾病一般都比较单纯，故其病脉也不似成人那么复杂。主要以脉的浮、沉、迟、数辨病证的表、里、寒、热；以脉的有力、无力定病证的虚、实。A 项：沉滑为痰食。与题干不符，排除。B 项：浮滑为风痰。与题干不符，排除。C 项：迟脉为寒湿。与题干不符，排除。D 项：大小不齐为积滞。D 项正确。E 项：浮数为风热。与题干不符，排除。故正确答案为 D。

96、答案：A

解析：阴虚指精血或津液的亏虚。一般在正常状态下，阴和阳是相对平衡的，相互制约而协调。阴气亏损，阳气失去制约，就会产生亢盛的病理变化，生理病理性功能亢进，称为“阳亢”。因此，阴虚会引起阳气亢盛，阳亢则能使阴液耗损，两者互为因果。临床表现：形体消瘦，口燥咽干，两颧潮红，五心烦热，潮热，盗汗，小便短黄，大便干结，舌红少津或少苔，脉细数等。题例中，患者“血压病史 10 年，现面红头胀”，为阴虚致使肝阳上亢之证；“眩晕耳鸣，腰膝酸软，失眠多梦，时有遗精或性欲亢进，舌红，脉沉细弦”，为阴虚之证。A 项正确。

97、答案：C

解析：本题考查发散风寒药的功效主治。患者外感风寒，恶寒发热，无汗，为风寒表实证；腹痛，吐泻等症提示脾胃失调。香薷除发汗解表之用外，还有化湿和中，利水消肿的作用；故本题所述病证选取有化湿和中功效的香薷较好。C 项正确。

198、答案：D

解析：本题考查白茅根的功效主治。患者小便短数，灼热刺痛，尿色黄赤，舌苔黄腻，脉数，此为热淋涩痛证，治宜清热利尿。白茅根凉血止血，清

热利尿，清肺胃热，最为适宜。D 项正确。

99、答案：A

解析：患者头痛连及项背，遇风则痛甚，恶风寒喜裹头戴帽，口不渴，苔薄白，脉浮。外感风寒的表现用药应首选的是发散风寒药。

100、答案：C

解析：患者，全头胀痛，急躁易怒，面红目赤，便秘溲赤，舌边尖红，苔黄，有热的表现，脉弦，口苦胁痛表现肝火盛，龙胆泻肝胆火，栀子泻火除烦、清热利湿。

101、答案：C

解析：患流行性出血热，经治疗基本恢复，但仍低热未退，夜热早凉，热退无汗，形体消瘦，舌红少苔，脉细数，用牡丹皮清热凉血、活血祛瘀。

102、答案：D

解析：本题考查竹叶石膏汤的功用主治。患者身热多汗，心胸烦热，气逆欲呕，口干喜饮，舌红少苔而脉虚数，是气分有热而气津两伤，胃失和降之证。竹叶石膏汤具清热生津、益气和胃之功，当为首选之方。D 项正确。A 项：导赤散清心利水，主治心经热盛或移于小肠。心火循经上炎，而见心胸烦热，面赤，口舌生疮；火热内灼，阴液被耗，故见口渴，意欲饮冷等症

状。与题意不符，排除。B 项：凉膈散具有清热解毒，清上泄下之功效。主治上中焦邪郁生热证。临床表现多为面赤唇焦，胸膈烦躁，口舌生疮，谵语狂妄，或咽痛吐衄，便秘溲赤，或大便不畅，舌红苔黄，脉滑数。与题意不符，排除。C 项：生脉散亦主气阴(津)两虚之证，临床应用以体倦，气短，咽干，舌红，脉虚为辨证要点。但重在益气生津，而清热之力不强。与题意不符，排除。E 项：清暑益气汤亦具清热益气，养阴生津之功，但以清热解暑除烦见长，而益气和胃作用不足。与题意不符，排除。故正确答案为 D。

103、答案：E

解析：本题考查回阳救急汤的功用主治。《素问·厥论》云：“阳气衰于下，则为寒厥。”寒邪深入少阴，症见恶寒蜷卧，神疲欲寐，吐泻腹痛，肢厥脉微者，不仅肾阳衰微，心脾之阳亦衰，其阴寒独盛之危候。此外，非大剂辛热不足以破阴回阳而救逆。回阳救急汤以大剂辛热与甘温益气之品同用，脾肾同健，破阴回阳，有回阳救急、益气生脉之功，于阴寒极盛、阳欲脱之证最宜。E 项正确。

104、答案：C

解析：本题考查的是补益剂中的当归补血汤的主治证候。患者年事既高，绝经数年，忽又来潮，且量多色淡，并见肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚，是冲任亏损，血虚阳浮之证，治当益气补血。当归补血汤重在补气生血，适用于气弱血虚，阳浮外越，以致身热、烦渴、头痛者。C项正确。

105、答案：B

解析：本题考察的是苏子降气汤的功用和主治。根据题干喘证日久，咳嗽痰多，气急胸闷，可判断上实下虚之证，舌脉亦为佐证。方选苏子降气汤降气平喘，祛痰止咳。B项正确。

106、答案：C

解析：患者漏下不止，四肢不温，脾主肌肉，可见脾阳不足，舌淡苔白，脉沉细为血虚表现，辨证为脾阳不足，脾不统血之血证，黄土汤具有温阳健脾，养血止血功效。C项正确。

107、答案：E

解析：本题考查的是化痰息风剂中半夏白术天麻汤的主治：风痰上扰证。眩晕，头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑。E项正确。A项：温胆汤主治：胆郁痰扰证。胆怯易惊，头眩心悸，心烦不眠，夜多易梦；或呕恶呃逆，眩晕癫痫。苔白腻，脉弦滑。与题干不符，排除。B项：镇肝息

风汤主治：类中风。头目眩晕，目胀耳鸣，脑部热痛，面色如醉，心中烦热；或时常噫气，或肢体渐觉不利，口眼渐形喎斜，甚或眩晕颠扑，昏不知人，移时始醒，或醒后不能复元，脉弦长有力。与题干不符，排除。C项：羚角钩藤汤主治：肝热生风证。高热不退，烦闷躁扰，手足抽搐，发为痉厥；甚则神昏，舌绛而干，或舌焦起刺，脉弦而数；以及肝热风阳上逆，头晕胀痛，耳鸣心悸，面红如醉，或手足躁扰，甚则瘈疝，舌红，脉弦数。与题干不符，排除。D项：天麻钩藤饮主治：肝阳偏亢，肝风上扰证。头痛，眩晕，失眠多梦，或口苦面红，舌红苔黄，脉弦或数。与题干不符，排除。故正确答案为E。

108、答案：B

解析：本题考查的是清气化痰丸的临床表现。清气化痰丸主治：痰热咳嗽。临床表现为：咳嗽，咳痰黄稠，胸膈痞闷，甚则气急呕恶，舌质红，苔黄腻，脉滑数。以咳痰黄稠，胸膈痞闷，舌质红，苔黄腻，脉滑数为辨证要点。B项正确。A项：温胆汤主治：胆胃不和，痰热内扰证。临床表现为：胆怯易惊，虚烦不宁，失眠多梦，或呕恶呃逆，或眩晕，或癫痫等，苔腻微黄，脉弦滑。与题干不符，排除。C项：茯



苓丸主治：痰伏中脘，流注经络证。临床表现为：两臂酸痛或抽掣，手不得上举，或左右时复转移，或两手麻木，或四肢浮肿，舌苔白腻，脉沉细或弦滑。与题干不符，排除。D 项：半夏白术天麻汤主治：风痰上扰证。临床表现为：眩晕，头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑。与题干不符，排除。E 项：小陷胸汤主治：痰热互结之小结胸证。临床表现为：心下痞闷，按之则痛，或心胸闷痛，或咳痰黄稠，舌红苔黄腻，脉滑数。以胸脘痞闷，按之则痛，舌红苔黄腻，脉滑数为辨证要点。与题干不符，排除。故正确答案为 B。

109、答案：A

解析：本题考查的是诊断学基础中颈部检查中器官偏移的诊断及鉴别诊断。当一侧大量胸腔积液、积气、纵膈肿瘤或有不匀称的甲状腺肿大时，可将气管推向健侧；当一侧肺不张、胸膜增厚及黏连、肺硬化时，气管被牵拉向患侧。本案中患者气管左移、右侧胸腔较左侧饱满，提示该侧气胸或胸腔积液病变；叩诊音为实音，则属于右侧胸腔积液病变。A 项正确。B 项：右侧气胸叩诊应为鼓音。错误，排除。C 项：肺气肿胸部呈桶状，呼吸运动减弱，语颤减弱，叩呈过清音，听诊呼

吸音减弱，呼气延长，两肺可听到散在的干、湿啰音，无气管偏移的体征。错误，排除。D 项：右侧大叶性肺炎可闻及湿性啰音、支气管呼吸音，严重者呼吸音减弱。肺部呈实音触诊：病侧语音震颤增强，无气管偏移的体征。与题干不符，排除。E 项：右侧肺不张患侧触觉语颤减弱、膈肌上抬、纵隔移位、叩浊、语音震颤和呼吸音减弱或消失。错误，排除。故正确答案为 A。110、答案：B

解析：本题考查的是诊断学基础中上述几种疾病腹痛的鉴别诊断，胃痉挛为剧烈疼痛，按压后缓解，本题患者症状为上腹痛，按压后疼痛减轻，符合胃痉挛症状，B 项正确。A 项：胃溃疡为饥饿痛，为隐痛，与题干不符，排除。C 项：胃炎为隐痛或者灼热痛，与题干不符，排除。D、E 两项：急性胃扩张、胃穿孔疼痛剧烈但是拒按。与题干不符，排除。故正确答案为 B。111、答案：C

解析：本题考查的是胰腺炎的实验室检查和查体。急性胰腺炎常有饱餐诱因。起病时急性腹痛，程度剧烈，多位于左中上腹、甚至全腹，部分患者腹痛向背部放射。患者病初有恶心、呕吐、轻度发热。查体中上腹压痛，肠鸣音减少，轻度脱水貌。实验室检

查血清淀粉酶增高，血钙降低，血糖增高等。A 项：心肌梗死疼痛位于心前区。与题干不符，排除。与题干不符，排除。B 项：消化性溃疡急性穿孔有溃疡史，且穿孔后会出现腹膜炎体征，腹壁紧张度增加。与题干不符，排除。C 项：患者各方面检查和病史提示急性胰腺炎可能性较大。C 项正确。D 项：急性阑尾炎的典型腹痛为转移性右下腹痛，且不会出现淀粉酶增高。与题干不符，排除。E 项：急性单纯性肠梗阻呕吐后腹痛常有所缓解。与题干不符，排除。故正确答案为 C。

112、答案：B

解析：本题考查的是针灸学中穴位主治应用。神门穴属手少阴心经，为治疗健忘失眠的要穴，主治心痛、心烦、健忘失眠、惊悸怔忡、痴呆、癫狂、痫证等心与神志病证；高血压；胸胁病。患者表现出自觉心慌，时息时作，健忘失眠的症状，属心系疾病，在选项中神门穴为治疗健忘失眠的要穴，并可治疗心悸等症，治疗应首选神门穴，B 项正确。

113、答案：D

解析：本题考查的是中风中脏腑脱证的治疗。中风中脏腑脱证的配穴为：关元、气海、神阙，这组穴位均为任脉之穴，治疗脱证用灸法。关元、气

海用大艾柱灸，神阙用隔盐灸，不计壮数，以汗止、脉起、肢温为度。D 项正确。

114、答案：B

解析：本题考查的是治疗胁痛的主穴。治疗胁痛的主穴为：期门、太冲、支沟、阳陵泉。丘墟为胆之原穴，有主治胸胁痛的功用。B 项正确。

116、答案：C

解析：本题主要考查新斯的明的应用。患者诊断为重症肌无力，而新斯的明适合治疗重症肌无力，为首选。C 项正确。A 项：毛果芸香碱用于治疗原发性青光眼。与题干不符，排除。B 项：毒扁豆碱主要用于急性青光眼。与题干不符，排除。D 项：阿托品适用于缓解内脏绞痛。与题干不符，排除。E 项：加兰他敏用于重症肌无力、进行性肌营养不良、脊髓灰质炎后遗症、儿童脑型麻痹、因神经系统疾患所致感觉或运动障碍、多发性神经炎等。但疗效不如新斯的明。与题干不符，排除。故正确答案为 C。

117、答案：A

解析：阿托品不良反应：因作用广泛，副作用较多。①常见口干、视力模糊、心悸、便秘、皮肤潮红、体温升高、眩晕等，停药后消失。②剂量过大或误服颠茄果、曼陀罗果、洋金花及莨

着的根茎时可出现中毒，出现烦躁不安、多言、谵妄、幻觉及惊厥等中枢兴奋症状，严重中毒可由兴奋转入抑制而出现昏迷、呼吸麻痹而致死。中毒的解救主要是对症处理。用镇静药或抗惊厥药对抗中枢兴奋症状，如呼吸已转入抑制，则采用人工呼吸和吸氧；同时使用毛果芸香碱、毒扁豆碱对抗其外周作用。毒扁豆碱为非季铵类，能透过血脑屏障对抗其中枢症状，故效果比新斯的明好。

118、答案：B

解析：流行性脑脊髓膜炎的主要临床表现为发热，头痛、呕吐、皮肤瘀点及颈项强直等脑膜刺激特征，主要分布于肩、肘、臀等易于受压的部位，脑脊液呈化脓性改变。严重者可有败血症休克和脑实质损害。本题患儿，3岁，尚热、头痛、呕吐，全身皮肤散在瘀点，脑膜刺激征阳性，烦躁不安。实验室检查可见血白细胞升高，脑脊液呈化脓性改变，判断其可能为流行性脑脊髓膜炎。B项正确。

119、答案：D

解析：流行性乙型脑炎（简称乙脑）是由乙脑病毒引起的急性中枢神经系统传染病。主要通过蚊虫传播，流行于夏秋季。临床上以高热、意识障碍、抽搐、呼吸衰竭及脑膜刺激征等为特

征。部分患者可留有后遗症，病死率较高。脑脊液检查符合病毒性脑膜炎的改变，压力增高，外观清亮，白细胞多在 $(50\sim 500)\times 10^9/L$ ，蛋白轻度增高，糖量及氯化物正常。

120、答案：A

解析：目前患者进入低血压休克期，此期治疗原则为：补充血容量，纠正酸中毒和使用血管活性药，应用皮质激素，强心。其中补充血容量是关键。

三：B型题121、

答案：E

122、答案：C

解析：邪气是疾病发生的重要条件。正气不足是疾病发生的基础。

123、答案：B

124、答案：C

解析：劳神过度，即长期思虑劳神而积劳成疾。长思久虑，暗耗心血，损伤脾气，以致心神失养而心悸、健忘、失眠、多梦和脾失健运而纳少、腹胀、便溏、消瘦等。房劳过度，即房事太过，或手淫恶习，或妇女早孕多育等，以致耗伤肾精肾气而致病。常见腰膝酸软、眩晕耳鸣、精神萎靡、性功能减退、早衰等。

125、答案：E

126、答案：E

解析：急则治标适用于病情严重，在疾病过程中又出现某些急重症状的情况。这时则应当先治或急治。所以对大出血、高热患者应当先治或急治。

127、答案：D

128、答案：A

解析：真热假寒证的临床表现是高热肢厥，神识昏沉，胸腹灼热，口渴喜饮，面色紫暗，脉沉有力；亡阳证的临床表现是大汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，神情淡漠，呼吸微弱，脉微欲绝。

129、答案：E

130、答案：B

解析：少阳病证发热的临床表现是寒热往来；阳明病实证发热的临床表现是日晡潮热。

131、答案：E

132、答案：C

解析：大黄配芒硝用于实热积滞，大便秘结。大黄配附子用于寒实积滞，便秘腹痛。

133、答案：D

134、答案：B

解析：具有祛风湿、强筋骨功效的药物是桑寄生。具有祛风湿、利尿功效的药物是防己。

135、答案：B

136、答案：E

解析：木香与黄连配伍，增加健脾祛湿的功效，治疗湿热泻痢、里急后重。枳实与薤白配伍，增加通阳散结，行气止痛，除痹的功效，治疗寒痰阻闭、胸阳不振之胸痹疼痛。

137、答案：E

138、答案：C

解析：苓甘五味姜辛汤：温肺化饮。  
小青龙汤：解表散寒，温肺化饮。

139、答案：C

140、答案：B

解析：A 项：癔病是由明显的精神因素，如生活事件、内心冲突或情绪激动、暗示或自我暗示等而引起的一组疾病，表现为急性的短暂的精神障碍、身体障碍(包括感觉、运动和植物神经功能紊乱)，没有器质性基础。B 项：破伤风见于烦躁不安，局部疼痛，肌肉牵拉，抽搐及强直、苦笑面容。故 112 题 B 项正确。C 项：脑血管疾病以骨骼肌痉挛为主要表现，可伴血压升高。故 111 题 C 项正确。D 项：中毒性痢疾可出现高热，烦躁谵妄，反复惊厥，神志昏迷，大便腥臭，伴有脓血或无大便。与题干不符，排除。E 项：脑膜炎常有脑膜刺激征，头痛、呕吐、颈项强直等，病理反射阳性。与题干不符，排除。故正确答案为 C。

解析: A 项: 癔病是由明显的精神因素, 如生活事件、内心冲突或情绪激动、暗示或自我暗示等而引起的一组疾病, 表现为急性的短暂的精神障碍、身体障碍(包括感觉、运动和植物神经功能紊乱), 没有器质性基础。与题干不符, 排除。B 项: 破伤风见于烦躁不安, 局部疼痛, 肌肉牵拉, 抽搐及强直、苦笑面容。

141、答案: D

142、答案: A

解析: 治疗痛经的配穴: 气血虚弱配气海、脾俞; 肾气亏损配太溪、肾俞。

143、答案: E

144、答案: A

解析: 抢救哮喘持续状态宜选用二丙酸倍氯米松; 伴有心脏功能不全的哮喘急性发作患者, 宜选用氨茶碱。

145、答案: D

146、答案: A

解析: 利福平主要与其他抗结核药合用治疗各种结核病及重症患者。也可用于耐药金黄色葡萄球菌及其他敏感细菌所致的感染。还可用于治疗麻风病。对结核杆菌有高度选择性的药物是异烟肼, 它是治疗各种类型结核病的首选药。

147、答案: B

148、答案: A

解析: 指导-合作型是指医患双方在医疗活动中都是主动的, 医生有权威性, 充当指导者。主动-被动型是指医患双方不是双向作用, 而是医生对患者单向发生作用。

149、答案: C

150、答案: A

解析: 医疗纠纷的预防: 医疗机构应当对其医务人员进行医疗卫生法律、法规、规章和诊疗相关规范、常规的培训, 并加强职业道德教育; 医务人员在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施; 患者应当遵守医疗秩序和医疗机构有关就诊、治疗、检查的规定, 如实提供与病情有关的信息, 配合医务人员开展诊疗活动。

## 第二单元

一、A<sub>1</sub>型选择题(1~45题)

答题说明: 每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案。

1. 急性上呼吸道感染不包括下列哪种疾病

- A. 普通感冒
- B. 急性咽结膜炎
- C. 急性病毒性咽炎
- D. 急性支气管炎
- E. 急性咽-扁桃体炎

答案: D

解析：急性上呼吸道感染包括普通感冒、急性咽结膜炎、急性病毒性咽炎和喉炎、急性咽-扁桃体炎、急性疱疹性咽峡炎。

2. 左心衰竭出现的最早的症状是

- A. 呼吸困难
- B. 心律增快
- C. 嗜睡
- D. 紫绀
- E. 少尿

答案：A

解析：劳力性呼吸困难是左心衰竭最早出现的症状。患者卧位呼吸困难加重，坐位减轻。

3. 风湿性心脏瓣膜病中，最容易并发脑栓塞的是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 三尖瓣狭窄
- E. 二尖瓣狭窄伴心房颤动

答案：E

解析：心脏瓣膜病时，除心力衰竭，心率失常等累及心肌的并发症外，因血流动力学异常，还易发生血栓栓塞和感染性心内膜炎。因其发病机制的不同，血栓栓塞多发于瓣膜狭窄，感染性心内膜炎多发于瓣膜关闭不全。

4. 中医学认为引起高血压病的病机关键是

- A. 肝肾阴阳失调
- B. 肝脾疏泄失调
- C. 肺肾吐纳失调
- D. 心肾交济失调
- E. 心肺相辅失调

答案：A

解析：高血压病常以眩晕、头痛为主要临床表现；其发病主要与肝、脾、肾等脏腑关系密切；病因为情志失调、饮食不节、久病劳伤、先天禀赋不足等；主要病理环节为风、火、痰、瘀、

虚；病机性质为本虚标实，肝肾阴虚为本，肝阳上亢、痰浊内蕴为标。故其病机关键是肝肾阴阳失调。

5. 胃溃疡最主要的症状是

- A. 嗝气，反酸
- B. 恶心，呕吐
- C. 呕吐，黑便
- D. 上腹疼痛
- E. 食欲减退

答案：D

解析：消化性溃疡依据发生部位分为胃溃疡和十二指肠溃疡，胃溃疡以上腹疼痛为主要表现，其诊断要点为：

①长期反复发生，周期性、节律性上腹部疼痛，应用制酸药物可缓解；②上腹部可有局限深压痛；③X线钡餐造影可见溃疡龛影；④内镜检查可见到活动期溃疡。因此，胃溃疡最主要的症状是上腹疼痛。

6. 下列各项中，不符合淤胆型肝炎临床表现的是

- A. 黄疸深
- B. 自觉症状重
- C. 皮肤瘙痒
- D. 大便颜色变浅
- E. 血清胆固醇升高

答案：B

解析：淤胆型肝炎是多种原因引起肝细胞和（或）毛细胆管胆汁分泌障碍，导致部分或完全性胆汁阻滞为特征的综合征。表现有黄疸较深，不易消退，自觉症状较轻，皮肤瘙痒或有灼热感，抓后有细小出血点及淤斑，右肋胀痛，肝脏肿大，大便色浅或灰白；血清胆红素明显升高， $\gamma$ -谷氨酰转肽酶、碱性磷酸酶、胆固醇及血清胆汁酸均升高。

7. 尿路感染的主要病机是

- A. 湿热蕴结下焦，膀胱气化不利
- B. 湿热蕴结中焦，膀胱气化失司
- C. 湿热蕴结肝胆，肝胆疏泄失常

D. 肾气亏虚，肾失蒸化开合

E. 肾阴亏虚，湿热蕴结

答案：A

解析：尿路感染主要与湿热毒邪蕴结膀胱及脏腑功能失调有关，病位在肾与膀胱，与肝脾密切相关。主要病机是湿热蕴结下焦，膀胱气化不利。

8. 有助于再障与急性白血病鉴别的是

A. 感染发热

B. 皮肤黏膜出血

C. 贫血苍白

D. 胸骨压痛

E. 网织红细胞减少

答案：D

解析：本题考查的是再障与急性白血病的临床表现。再障主要表现为贫血、感染和出血，贫血多为进行性，出血以皮肤黏膜多见，严重者可有内脏出血，容易感染，引起发热，可伴有头晕、乏力、心悸、气短、食欲减退、出虚汗、低热等。体检时均有贫血面容，眼结膜、甲床及黏膜苍白，皮肤可见出血点及紫癜，贫血重者，可有心率加快，心尖部收缩期吹风样杂音，一般无肝脾肿大。急性白血病，可有正常骨髓造血功能受抑制表现，如贫血、发热，出血等，还可见白血病白细胞增殖浸润表现，如淋巴结和肝脾大、胸骨下端局部压痛、关节骨骼疼痛，眼球突出、复视或失明，牙龈增生、肿胀，局部皮肤隆起、变硬，呈紫蓝色皮肤结节，以及头痛、头晕、颈项强直、甚至抽搐、昏迷等。可见，胸骨压痛是急性白血病的临床表现而不是再障的临床表现。因此，胸骨压痛可作为二者的鉴别点。

9. 下列哪一项不属于过敏性紫癜的好发部位

A. 下肢

B. 臀部

C. 上肢

D. 躯干

E. 面部

答案：E

解析：过敏性紫癜发病一般较急，半数以上患儿病前 1~3 周有上呼吸道感染史，首发症状以皮肤紫癜为主，多见于四肢及臀部，部分累及上肢、躯干，面部少见。

10. 治疗甲亢危象应首选

A. 普萘洛尔

B. 氢化可的松

C. 控制感染

D. 碘化钠

E. 抗甲状腺药物增量

答案：C

解析：甲亢危象的治疗原则：①首先针对诱因治疗，如控制感染等；②控制甲状腺素的合成与释放，首选 PTU 口服；③可联合使用碘剂、心得安、氢化可的松等。

11. 平胃散合桃红四物汤适用于治疗糖尿病的证型是

A. 痰瘀互结

B. 气阴两虚

C. 阴虚燥热

D. 阴阳两虚

E. 脉络瘀阻

答案：A

解析：糖尿病痰瘀互结证，证候：三多症状不明显，形体肥胖，胸脘腹胀，肌肉酸胀，四肢沉重或刺痛，舌暗或有瘀斑，苔厚腻，脉滑。治法：活血化瘀祛痰。方药：平胃散合桃红四物汤加减。

12. 甲亢的水肿特点是

A. 胫前黏液性水肿

B. 胫后黏液性水肿

C. 下垂性水肿

D. 向心性水肿

E. 离心性水肿

答案：A

解析：甲亢：皮肤及肢端表现可见胫

前黏液性水肿。

13. 类风湿关节炎的基本病理改变是

- A. 皮炎
- B. 滑膜炎
- C. 心包炎
- D. 血管炎
- E. 心肌炎

答案：B

解析：类风湿关节炎的基本病理改变为滑膜炎。

14. 下列是继发性高尿酸血症或痛风鉴别要点的是

- A. 儿童、青少年、女性和老年人更少见
- B. 高尿酸血症程度较轻
- C. 0%患者 24 小时的尿酸排出量减少
- D. 痛风性关节炎症状往往较轻或不典型
- E. 无明确的相关用药史

答案：D

解析：继发性高尿酸血症或痛风具有以下特点：（1）儿童、青少年、女性和老年人更多见。（2）高尿酸血症程度较重。（3）40%的患者 24 小时尿酸排出增多。（4）肾脏受累多见，痛风肾、尿酸结石发生率较高，甚至发生急性肾衰竭。（5）痛风性关节炎症状往往较轻或不典型。（6）有明确的相关用药史。

15. 导致血脂异常发病的关键因素是

- A. HDL-C 升高
- B. HDL-C 降低
- C. TG 升高
- D. LDL-C 升高
- E. LDL-C 降低

答案：D

解析：LDL-C 升高是导致血脂异常发病的关键因素，将降低 LDL-C 作为首要干预靶点。

16. 中医泛指一切皮里膜外浅表部位

的病理性肿块为

- A. 结核
- B. 瘤
- C. 瘰
- D. 疽
- E. 岩

答案：A

解析：结核：即结聚成核之意，既是症状，又是病名。泛指一切皮里膜外浅表部位的病理性肿块。

17. 下列哪项不属于麻醉前用药的目的

- A. 解除病人精神紧张
- B. 使麻醉过程平稳
- C. 增强麻醉效果
- D. 促进肌肉松弛
- E. 减轻病人疼痛感

答案：D

解析：麻醉前用药的目的：解除精神紧张和恐惧心理；控制不良反应；减轻病人疼痛感；增强麻醉效果。

18. 下列哪项不属于输血适应证

- A. 凝血机制异常和出血性疾病
- B. 重症感染
- C. 黄疸
- D. 器官移植
- E. 低蛋白血症

答案：C

解析：输血适应症：①急性出血失血量达总血容量的 10%-20% (500~1000mL) 时；②贫血或低蛋白血症；③凝血异常；④重症感染。

19. 因脾虚感染疔病的中医治法是

- A. 清热利湿解毒
- B. 托毒生肌
- C. 补益气血
- D. 祛风清热
- E. 健脾和胃，清化湿热

答案：E

解析：脾虚，故治疗健脾和胃，清化湿热为主。



20. 下列哪项不属于脑挫裂伤的诊断要点

- A. 脑脊液呈血性改变
- B. 伤后昏迷在半小时以内
- C. CT 检查显示脑挫伤区有点片状高密度或高低混杂密度影像
- D. 头部外伤史
- E. 出现局灶症状与体征

答案: B

解析: 脑挫裂伤的临床表现: ①昏迷; ②局灶症状和体征; ③颅内压增高与脑疝; ④其他表现: 常合并蛛网膜下腔出血, 因而出现脑膜刺激征; 若合并颅底骨折则引起脑脊液漏。

21. 单发的乳腺肿块, 且无疼痛, 腋窝淋巴结不大, 无周期性改变, 可诊断为

- A. 乳腺导管扩张症
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 积乳囊肿
- E. 急性乳腺炎

答案: C

解析: 乳腺纤维腺瘤的临床表现: ①乳房肿块; ②乳房轻微疼痛; ③其他症状: 情志抑郁、心烦易怒、失眠多梦等症状; ④乳房内可扪及单个或多个圆形或卵圆形肿块, 质地坚韧, 表面光滑, 边缘清楚, 无粘连, 极易推动。

22. 下列哪项不属于急性穿孔的诊断要点

- A. 有溃疡病史, 且近期有溃疡病活动症状
- B. 突然发生的持续性上腹部剧烈疼痛, 迅速发展到全腹
- C. 检查时有明显的腹膜刺激征, 并多有肝浊音界缩小或消失
- D. X 线检查发现膈下有游离气体
- E. 墨菲氏征阳性

答案: E

解析: 急性穿孔的临床表现: 剧烈腹痛; 休克症状; 恶心呕吐; 全身情况。穿孔早期体温多正常, 病人蜷曲静卧而不敢动, 面色苍白, 脉搏细速。腹部压痛及腹肌强直、腹腔内积气积液。墨菲氏征阳性是急性胆囊炎的重要体征。

23. 我国原发性肝癌最常见的病因是

- A. 长期饮酒
- B. 肝炎
- C. 肝硬化
- D. 肝血管瘤
- E. 肝吸虫

答案: C

解析: 我国原发性肝癌最常见的病因是肝硬化。

24. 下列哪项不是肿瘤的转移途径

- A. 血道转移
- B. 远位转移
- C. 接种转移
- D. 淋巴道转移
- E. 直接蔓延

答案: B

解析: 肿瘤的转移途径: 血道转移、接种转移、淋巴道转移、直接蔓延。

25. 恶性程度最高的甲状腺癌是

- A. 鳞状上皮癌
- B. 滤泡状腺癌
- C. 髓样癌
- D. 未分化癌
- E. 乳头状腺癌

答案: D

解析: 恶性程度最高的就是未分化癌。未分化癌发展很快, 发病后两到三个月就可以出现压迫症状或者是远处转移, 如果强行做手术切除不但没有益处, 还可以加速癌细胞的血行播散。

26. 下列关于女性骨盆的叙述, 错误的是

- A. 骨盆入口呈横椭圆形

- B. 入口横径长于前后径
- C. 耻骨弓较宽
- D. 坐骨棘间径小于 10cm
- E. 骶骨切迹呈圆形

答案: D

解析: 骨盆中上段为骨盆腔的最宽大部分, 近似圆形, 其前方为耻骨联合后方的中点, 两侧相当于髌臼中心, 后缘位于第二、三骶椎之间。下段为骨盆的最小平面(所谓的中平面)系耻骨联合下缘、坐骨棘至骶骨下端的平面, 呈前后径长的椭圆形。前后径约 11.5cm, 横径(坐骨棘间径)长约 10cm。

27. 子宫内膜从增殖期变成分泌期, 其最直接的原因是

- A. 促性腺激素释放激素的作用
- B. 促性腺激素的作用
- C. 雌激素的作用
- D. 孕激素的作用
- E. HCG 的作用

答案: D

解析: 子宫内膜从增殖期变成分泌期, 其最直接的原因是孕激素的影响。

28. 女子婚后同居 1 年, 未避孕而从未受孕, 应诊断为

- A. 断 绪
- B. 断 产
- C. 五不女
- D. 全不产
- E. 暗 产

答案: D

解析: 女子婚后同居 1 年, 未避孕而从未受孕, 考虑原发性不孕, 在属于中医中全不产。

29. 下列各项, 属产褥感染的是

- A. 产褥期所发生的感染
- B. 分娩后生殖道的感染
- C. 分娩及产褥期生殖道感染
- D. 分娩后体温升高, 达到或超过 38°C
- E. 产后所发生的一切感染

答案: C

解析: 产褥感染是指分娩及产褥期生殖道受病原体侵袭而引起局部或全身性的感染。是导致孕产妇死亡的四大原因(产褥感染、产科出血、妊娠合并心脏病、子痫)之一。产褥感染属中医“产后发热”范畴。

30. 妇科疾病的发生, 主要涉及的脏腑是

- A. 肾、肝、脾
- B. 脾、肺、肾
- C. 心、肺、肾
- D. 心、肝、肾
- E. 肺、脾、心

答案: A

解析: 妇科疾病的发生, 主要涉及的脏腑是肾、肝、脾。

31. 下列各项, 属确诊宫颈癌最可靠的方法是

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 阴道镜检查
- C. 宫颈锥切术
- D. 宫颈活组织检查
- E. 碘试验检查

答案: D

解析: 确诊宫颈癌最可靠的方法是宫颈活组织检查。

32. 下列关于女性生殖系统炎症的叙述, 错误的是

- A. 滴虫阴道炎患者其性配偶也应检查
- B. 生殖器炎症常为需氧菌及厌氧菌混合感染
- C. 衣原体支原体所致生殖器炎症属性传播疾病
- D. 滴虫阴道炎治疗一疗程后复查阴性即为治愈
- E. 外阴阴道念珠菌病久治不愈, 应查血糖

答案: D

解析: 滴虫阴道炎主要是不洁性交史或滴虫污染源接触史, 表现: 白带多,

呈灰黄色稀薄泡沫状。阴道口及外阴瘙痒，或有灼热，疼痛，性交痛等，查体可见阴道黏膜点状充血，后穹窿有多量灰黄色稀薄脓性分泌物，多呈泡沫状。治疗一疗程后复查阴性并不能作为治愈的一个标准。

33. 下列各项，不属妊娠剧吐临床表现的是

- A. 择食、食欲不振
- B. 恶心呕吐频繁
- C. 呕吐物中有胆汁或咖啡渣样物
- D. 脉搏增快
- E. 体温升高

答案：A

解析：妊娠剧吐表现：多见于年轻初孕妇，于停经 6 周左右出现恶心呕吐频繁，食入即吐，呕吐物中可有胆汁或咖啡样物，晨起较重，或伴头晕、倦怠乏力等症状。严重时可出现嗜睡、意识模糊、谵妄，甚至昏迷、死亡，或因维生素B 缺乏引发Wernicke 脑病。体征可见明显消瘦，精神萎靡，面色苍白，皮肤干燥，眼球凹陷，脉搏加快，体温可轻度升高，严重者可见黄疸、昏迷等。妇科检查可见妊娠子宫大小与停经月份相符。

34. 下列各项，不属热伤冲任所致病证的是

- A. 月经先期
- B. 月经过多
- C. 月经过少
- D. 崩漏
- E. 经行吐衄

答案：C

解析：热邪与血相互搏结，热扰冲任，血海不宁，迫血妄行，可致月经先期、月经过多、崩漏、胎漏、胎动不安、产后恶露不绝等。

35. 下列关于新产后和哺乳期的生理特点的叙述，错误的是

- A. 有恶露的排出，1 月左右干净

- B. 体温在产后 24 小时内略升高
- C. 产褥早期，产妇血液处于高凝状态
- D. 12 小时可开始哺乳
- E. 生理性闭经

答案：D

解析：产后半小时内开始哺乳，提倡按需哺乳。

36. 小儿开始更换恒牙的年龄是

- A. 2~3 岁
- B. 4~5 岁
- C. 6~7 岁
- D. 8~9 岁
- E. 10 岁以后

答案：C

解析：约自 6 个月起：乳牙萌出；2 岁以内：乳牙的数目=月龄-4（6）；最晚 2 岁半出齐：乳牙共 20 个 6~7 岁；乳牙开始脱落换恒牙：17~30 岁；恒牙出齐，共 28~32 个。

37. 卫气营血辨证与三焦辨证常用于治疗的疾病是

- A. 心理性疾病
- B. 急性传染病
- C. 营养性疾病
- D. 结缔组织病
- E. 肠寄生虫病

答案：B

解析：儿科常用的辨证方法有脏腑辨证、八纲辨证、卫气营血辨证、气血津液辨证、病因辨证。卫气营血辨证与三焦辨证常用于治疗急性传染病。

38. 符合幼儿期特点的是

- A. 体格发育最快
- B. 识别危险的能力强
- C. 语言思维和交往能力增强
- D. 不易发生营养缺乏和消化紊乱
- E. 自身免疫力增强，传染病发生率低

答案：C

解析：幼儿期是指 1 周岁后至 3 周岁生长速度稍减慢，但智力发育较前突出；语言思维和交往能力增强，注意

防止外伤及中毒。

39. 2 岁小儿的头围大约是

- A. 42cm
- B. 46cm
- C. 48cm
- D. 50cm
- E. 54cm

答案：C

解析：新生儿平均 34cm；1 岁时 46cm；2 岁时 48cm。

40. 下列属于早产儿生理性黄疸特点的是

- A 生后 5~6 天出现，30~35 天完全消退
- B 生后 1~2 天出现，3~7 天完全消退
- C 生后 3~4 天出现，15~20 天完全消退
- D 生后 3~4 天出现，21~28 天完全消退
- E 生后 2~3 天出现，10~14 天完全消退

答案：D

解析：早产儿生理性黄疸一般在出生 3~5 天，早产儿黄疸消退时间可延至 3~4 周完全消退。

41. 下列各项，不属肺炎合并心力衰竭诊断要点的是

- A 心率突然超过 180 次/分
- B 呼吸突然加快，超过 60 次/分
- C 突然极度烦躁不安，发绀
- D 心音低钝，颈静脉怒张
- E 左肋缘下可扪及脾脏

答案：E

解析：肺炎合并心衰的诊断标准：① 心率突然加快，婴儿超过 180 次/分；幼儿超过 160 次/分。②呼吸突然加快，超过 60 次/分。③突然发生极度烦躁不安，明显发绀，皮肤苍白发灰，指（趾）甲微血管再充盈时间延长。④ 心音低钝，有奔马律，颈静脉怒张。⑤肝脏迅速增大。⑥颜面、眼睑或下

肢水肿，尿少或无尿。具有前 5 项者即可诊断为心力衰竭。

42. 肺炎喘嗽痰热闭肺证的治则是

- A. 清热涤痰、开肺定喘
- B. 辛凉开肺、清热化痰
- C. 清心开肺、化痰止咳
- D. 清热解毒、泻肺开闭
- E. 宣肺化痰、止咳平喘

答案：A

解析：肺炎喘嗽痰热闭肺证证候：发热烦躁，咳嗽喘促，呼吸困难，气急鼻扇，喉间痰鸣，口唇紫绀，面赤口渴，胸闷胀满，泛吐痰涎，舌质红，舌苔黄腻，脉象弦滑。治法：清热涤痰，开肺定喘。方药：五虎汤合葶苈大枣泻肺汤加减。

43. 9 岁患儿，男，哮喘病史三年余，现症见咳嗽痰多，食少脘痞，面色欠华，大便不实，肌肉痿弱，倦怠乏力，舌淡苔白，脉缓无力。治疗首选方剂是

- A. 补中益气汤
- B. 六君子汤
- C. 健脾丸
- D. 理中汤
- E. 参苓白术散

答案：B

解析：患儿，男，哮喘病史三年余，现症见咳嗽痰多，食少脘痞，面色欠华，大便不实，肌肉痿弱，倦怠乏力，舌淡苔白，脉缓无力。由此诊断：支气管哮喘-临床缓解期；脾气虚弱证；治法：健脾化痰；方药：六君子汤。

44. 鹅口疮的病原体是

- A. 白色念珠菌
- B. 柯萨奇病毒
- C. 葡萄球菌
- D. 链球菌
- E. 流感杆菌

答案：A

解析：鹅口疮的病原菌为白色念珠菌

感染所致，多见于营养不良、慢性腹泻、长期使用广谱抗生素或激素的患儿。新生儿可因奶头、乳具污染而传播，也可在出生时经产道感染。

45. 中医认为病毒性脑炎的病情演变总不离热、痰、风的相互转化，其始动因素是

- A. 风
- B. 痰
- C. 热
- D. 瘀
- E. 寒

答案：C

解析：病毒性脑炎的始动因素是热。

## 二、A<sub>2</sub>型选择题（46 ~ 113 题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

46. 患者，男，29 岁，因寒战、高热、咳嗽 4 天入院。查体：血压 110/70mmHg，口唇发绀，呼吸幅度减小、叩诊轻度浊音、听诊呼吸音减低和胸膜摩擦音。X 线示：肺段大片、均匀炎症浸润阴影，血象：白细胞  $19 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.76。可诊断为

- A. 支原体肺炎
- B. 病毒性肺炎
- C. 衣原体肺炎
- D. 真菌性肺炎
- E. 肺炎链球菌肺炎

答案：E

解析：肺炎链球菌肺炎症状：寒战、发热，胸痛，咳嗽、咯痰，呼吸困难。体征：①早期肺部无明显异常体征，仅有呼吸幅度减小、叩诊轻度浊音、听诊呼吸音减低和胸膜摩擦音。②肺实变时有叩诊呈浊音、听诊语颤增强和支气管呼吸音等典型体征。消散期可闻及湿啰音。③病变累及胸膜时可有胸膜摩擦音。X 线检查：早期仅见肺纹理增粗或受累的肺段、肺叶稍模糊，

随病情进展可见大片炎症浸润阴影或实变影，沿大叶、肺段或亚肺段分布，实变阴影中可见支气管充气征。

47. 患者，男，49 岁。患支气管哮喘 20 年，急性发作 1 周，昨夜气急突然加重。体检：发绀，大汗，两肺叩诊过清音，两肺闻及哮鸣音，左肺呼吸音减弱，心率 120 次/分，律齐。用氨茶碱、激素后哮鸣音改善，但气急无好转。病情加重的原因最可能是

- A. 严重支气管痉挛
- B. 并发左心衰
- C. 并发气胸
- D. 继发肺部感染
- E. 并发呼吸衰竭

答案：C

解析：患者支气管哮喘发作后加重，药物治疗后哮鸣音缓解但气急无好转。查体一侧呼吸音减弱，提示气胸可能。哮喘发作时，会由于胸部呈过度充气状态，肺内压过大，使肺组织和脏层胸膜破裂，或靠近肺表面的细微气肿泡破裂，肺和支气管内空气逸入胸膜腔，造成气胸。

48. 患者，女，58 岁。患急性心肌梗死后第 2 天出现少尿，血压 75/50mmHg，烦躁不安，面色苍白，表情淡漠，皮肤湿冷，大汗淋漓，脉细弱无力。应首先考虑的是

- A. 左心衰竭
- B. 低血糖反应
- C. 心源性休克
- D. 急性肾衰竭
- E. 心肌梗死后综合征

答案：C

解析：急性心肌梗死急性期常有急性左心衰竭和心源性休克发生，急性左心衰竭初发时往往血压升高，除上述休克表现外多伴有严重气急、端坐呼吸、咳吐泡沫样痰等。而心肌梗死后综合征发生于梗死后数周至数月内，表现为发热、胸痛、气急、咳嗽等。

结合病情，患者症状符合心源性休克表现。

49. 患者，女，28岁。以心悸，气短，下肢水肿入院。检查：颈静脉怒张，心尖部舒张期杂音，肝肋缘下3cm轻度压痛。肝颈静脉回流征 $+$ 。其肝脏病变可能是

- A. 慢性迁延性肝炎
- B. 肝炎后肝硬化
- C. 慢性肝淤血
- D. 肝脂肪变性
- E. 肝细胞肝癌

答案：C

解析：患者青年女性，心悸，气短，下肢水肿，体格检查肝大，颈静脉怒张，应诊断为二尖瓣狭窄并发右心衰竭。二尖瓣狭窄引发肺循环淤血，晚期引发体循环淤血，故肝脏病变应为慢性肝淤血。

50. 一患者因2小时胸痛来诊，心电图示 $V_1\sim V_3$ 导联QRS波呈 $QrS$ 型，ST段呈弓背向上抬高伴倒置T波，诊断心肌梗死的部位是

- A. 下壁
- B. 间壁
- C. 前间壁
- D. 前壁
- E. 侧壁

答案：C

解析：心肌梗死心电图定位诊断前间壁主要看 $V_1\sim V_3$ 导联。

51. 患者，女，32岁。饱餐后出现上腹部剧痛伴恶心呕吐，呕后腹痛反而加重，服解痉剂无效。检查：体温 $39^{\circ}\text{C}$ ，心率120次/分，腹部紧张。有压痛、反跳痛，血清淀粉酶350U，血钙

1.63mmol/L。应首先考虑的是

- A. 急性心肌梗死
- B. 溃疡病穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾炎

E. 急性肠梗阻

答案：C

解析：急性胰腺炎发病可以饱餐为诱因，症状有腹痛，疼痛为持续性进行性加重，似刀割样，恶心、呕吐，黄疸，无尿或少尿，发热等，体征有腹膜刺激征，血清淀粉酶升高，血钙降低。该患者饱餐后出现上腹部剧痛伴恶心呕吐，疼痛为持续性进行性加重，发热，查体有腹膜刺激征，实验室检查血清淀粉酶350U，血钙1.63mmol/L，考虑急性胰腺炎可能性大。

52. 患者，男，48岁。上腹部无规律胀痛3年余，常因饮食不当而发作，偶有反酸，暖气，心血管检查无异常。应首先考虑的是

- A. 慢性胆囊炎
- B. 心绞痛
- C. 胃溃疡
- D. 胃癌
- E. 慢性胃炎

答案：E

解析：慢性胃炎缺乏特异性症状，大多数病人常无症状或仅有程度不同的消化不良症状如上腹隐痛、食欲减退、餐后饱胀、反酸等。慢性萎缩性胃炎患者可有贫血、消瘦、舌炎、腹泻等，个别病人伴黏膜糜烂者上腹痛较明显，并可有出血，如呕血、黑便。症状反复发作，腹痛无规律，常出现于进食过程中或餐后，多数位于上腹部、脐周、部分患者部位不固定，轻者间歇性隐痛或钝痛、严重者为剧烈绞痛。患者上腹无规律胀痛三年，偶有反酸暖气，临床表现符合慢性胃炎。

53. 慢性胃炎患者，胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治疗应首选的方剂是A. 沙参麦冬汤

- B. 生脉饮
- C. 滋水清肝饮
- D. 益胃汤

E. 玉女煎

答案：D

解析：胃阴不足证的主症为胃脘隐隐作痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治以养阴益胃，和中止痛。方用益胃汤加减。

54. 患者，男，50岁。肝硬化腹水，症见：腹膨大，按之坚满，脘闷腹胀纳呆，大便溏泄，小便不利，舌苔白腻，脉弦缓。其治法是

- A. 疏肝理气，利湿散满
- B. 运脾利湿，化气行水
- C. 活血化瘀，利水消肿
- D. 调脾行气，清热利湿
- E. 温补肾阳，通阳利水

答案：A

解析：肝硬化的中医辨证论治：气滞湿阻证：证候：腹大胀满，按之软而不坚，肋下胀痛，饮食减少，食后胀甚，得暖气或矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。治法：疏肝理气，健脾利湿。方药：柴胡疏肝散合胃苓汤加减。

55. 患者，女，38岁。高热寒战，腰痛，恶心、呕吐，尿频、尿急、尿痛等膀胱刺激症状。尿沉渣镜检白细胞 $>5$ 个/HP。其诊断应首先考虑的是

- A. 尿道炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 慢性肾小球肾炎
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

答案：D

解析：本题考查的是急性肾盂肾炎的诊断：典型的急性肾盂肾炎起病急骤，临床表现为发作性的寒战，发热，腰背痛（肋脊角处有明显的叩击痛），通常还伴有腹部绞痛，恶心，呕吐，尿痛，尿频和夜尿增多。常见白细胞尿（即脓尿），离心后尿沉渣镜下 $>5$ 个/HPF，急性期常呈白细胞满视野，若见到白细胞管型则为肾盂肾炎的诊断

提供了一个重要的依据。

56. 患者，女，24岁。患再生障碍性贫血，症见：面色及唇甲苍白，食欲下降，精神萎靡，腰膝酸软，形寒肢冷，月经色淡，舌胖有齿痕苔白，脉沉细。其证型是

- A. 气血两虚
- B. 肾虚血瘀
- C. 脾气虚弱
- D. 肾阳亏虚
- E. 脾胃虚寒

答案：D

解析：再生障碍性贫血的肾阳亏虚证候：形寒肢冷，气短懒言，面色苍白，唇甲色淡，大便稀溏，面浮肢肿，出血不明显，舌体胖嫩，舌质淡，苔薄白，脉细无力。治法：补肾助阳，益气养血。方药：右归丸合当归补血汤加减。

57. 患者因胸骨疼痛、发热就诊，血液检查见到幼稚细胞增多，骨髓检查见有核细胞增生活跃，原始细胞占40%。应首先考虑的诊断是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 白血病
- C. 骨髓增生异常综合征
- D. 传染性单核细胞增多症
- E. 传染性淋巴细胞增多症

答案：B

解析：患者因胸骨疼痛、发热就诊，血液检查见到幼稚细胞增多，骨髓检查见有核细胞增生活跃，原始细胞占40%，结合临床表现，首先可诊断：白血病。

58. 康某，女性，28岁，患功能性子宫出血多年，就诊时面色萎黄，口唇色淡，爪甲无泽，神疲乏力，食少便溏，恶心呕吐，舌质淡，苔薄腻，脉细弱。血常规检查：血红蛋白 $102\text{g/L}$ ，血清铁浓度为 $8.1\mu\text{mol/L}$ ，骨髓铁染色显示：骨髓小粒可染铁消失，铁粒幼红

细胞为 12%。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 缺铁性贫血+心脾两虚证
- B. 再生障碍性贫血+脾胃虚弱证
- C. 缺铁性贫血+脾胃虚弱证
- D. 肾性贫血+脾肾阳虚证
- E. 再生障碍性贫血+脾肾阳虚证

答案: C

解析: 患者患功能性子宫出血多年, 就诊时面色萎黄, 口唇色淡, 爪甲无泽, 神疲乏力, 食少便溏, 恶心呕吐, 舌质淡, 苔薄腻, 脉细弱。血常规检查: 血红蛋白 102g/L, 血清铁浓度为  $8.1 \mu\text{mol/L}$ , 骨髓铁染色显示: 骨髓小粒可染铁消失, 铁粒幼红细胞为 12%。结合临床表现, 诊断: 缺铁性贫血。中医证型: 脾胃虚弱证。

59. 某男, 35 岁, 易疲劳, 怕冷, 少汗, 动作缓慢, 食欲减退而体重增加, 记忆力减退, 实验室检查显示:  $\text{FT}_4$  降低, TSH 正常。其可能的诊断为

- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 原发性甲状腺功能减退症
- C. 继发性甲状腺功能减退症
- D. 亚急性甲状腺炎
- E. 甲状腺瘤

答案: C

解析: 该患者易疲劳, 怕冷, 少汗, 动作缓慢, 食欲减退而体重增加, 记忆力减退可诊断为甲状腺功能减退症。当  $\text{FT}_4$  降低, TSH 明显升高为原发性甲减;  $\text{FT}_4$  降低, TSH 正常, 考虑为继发性甲减。

60. 王某, 颈前肿胀 5 个月, 伴眼突, 烦躁易怒, 手指颤抖, 多汗, 面红目赤, 头晕目眩, 口苦咽干, 大便秘结, 舌红苔黄, 脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 逍遥散
- C. 天王补心丹
- D. 柴胡疏肝散

E. 镇肝息风汤

答案: A

解析: 肝火旺盛证的主症为颈前肿胀, 眼突, 烦躁易怒, 易饥多食, 手指颤抖, 恶热多汗, 面红烘热, 心悸失眠, 头晕目眩, 口苦咽干, 大便秘结, 月经不调, 舌质红, 舌苔黄, 脉弦数。治以清肝泻火, 消瘿散结, 方用龙胆泻肝汤加减。

61. 刘某, 因发热、淋巴结肿大就诊, 骨穿诊断为急性白血病, 给以化疗药物治疗。现低热, 自汗, 盗汗, 气短, 乏力, 面色不华, 头晕, 腰膝酸软, 手足心热, 皮肤瘀点、瘀斑, 鼻衄、齿衄, 舌淡有齿痕, 脉沉细。其中医治法是

- A. 益气养阴, 清热解毒
- B. 清热化痰, 活血散结
- C. 清热解毒, 利湿化浊
- D. 清热解毒, 凉血止血
- E. 益气养阴, 利湿化浊

答案: A

解析: 患者诊断为白血病, 现低热, 自汗, 盗汗, 气短, 乏力, 面色不华, 头晕, 腰膝酸软, 手足心热, 皮肤瘀点、瘀斑, 鼻衄、齿衄, 舌淡有齿痕, 脉沉细, 中医证型: 气阴两虚证; 中医治法: 益气养阴, 清热解毒; 方剂: 五阴煎。

62. 癫痫患者, 发则突然跌仆, 目睛上视, 口吐白沫, 手足抽搐, 喉间痰鸣, 舌苔白腻, 脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 醒脾汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 左归丸
- E. 定痫丸

答案: E

解析: 癫痫患者, 发则突然跌仆, 目睛上视, 口吐白沫, 手足抽搐, 喉间痰鸣, 舌苔白腻, 脉弦滑, 结合患者



临床表现，中医证型：癫痫发作期阳痫，治法：急以开窍醒神继以泻热涤痰息风；方剂：黄连解毒汤和定痫丸。

63. 女性患者，72岁。1天前上午发现口角右偏，左手不能持物，左下肢不能行走，说话吐字不清。下午检查发现左侧鼻唇沟浅，伸舌稍向左偏，左侧上下肢肌力4级。今晨醒来说话正常，鼻唇沟对称，伸舌居中，四肢运动灵活有力。其诊断是

- A. 右侧大脑中动脉血栓形成
- B. 椎-基底动脉血栓形成
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

答案：C

解析：患者女性患者，72岁。1天前上午发现口角右偏，左手不能持物，左下肢不能行走，说话吐字不清。下午检查发现左侧鼻唇沟浅，伸舌稍向左偏，左侧上下肢肌力4级。今晨醒来说话正常，鼻唇沟对称，伸舌居中，四肢运动灵活有力，结合患者临床表现，诊断：短暂性脑缺血发作。

64. 患者突然发生神昏，半身不遂，口噤不开，四肢不温，痰涎壅盛，舌质暗淡，苔白腻，脉沉滑。西医诊断为脑出血。治疗应首选的方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 安宫牛黄丸合羚羊角汤
- C. 涤痰汤送服苏合香丸
- D. 镇肝息风汤
- E. 真方白丸子

答案：C

解析：患者突然发生神昏，半身不遂，口噤不开，四肢不温，痰涎壅盛，舌质暗淡，苔白腻，脉沉滑。西医诊断为脑出血，中医证型：痰湿壅闭心神，方剂：辛温开窍，豁痰息风；方剂：涤痰汤。

65. 患者，男，68岁。3年来无诱因逐

渐出现行动缓慢，行走时前倾屈曲体态，伴头晕目眩，耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，大便秘结。查体：面具脸，双手震颤，双侧肢体肌张力增高。无智力和感觉障碍，无锥体束损害征。舌红苔少，脉弦细。最可能的诊断是A. 帕金森病

- B. 血管性痴呆
- C. 阿尔兹海默病
- D. 肝豆状核变性
- E. 脑梗死

答案：A

解析：大部分帕金森病的患者在60岁以后发病，起病隐袭，缓慢发展，逐渐加剧。初发症状以震颤最多，其次为步行障碍、肌强直和运动迟缓。症状常自一侧上肢开始，逐渐波及同侧下肢、对侧上肢及下肢，常成“N”字形进展，亦有自一侧下肢开始者。

66. 某男，被人发现时躺在公园一角落，呈半昏迷状态，遂急送医院。查体：体温37℃，血压130/70mmHg，神志不清，两侧瞳孔针尖大小，口角流涎，口唇紫绀，呼吸急促，两肺满布水泡音，心率60次/分，肌肉有震颤。迅速洗胃，洗出液有大蒜味。其诊断是A. 有机磷杀虫药中毒

- B. 酒精中毒
- C. 一氧化碳中毒
- D. 中暑
- E. 安定中毒

答案：A

解析：有机磷杀虫药中毒的临床表现：毒蕈碱样症状有（1）腺体分泌增加表现为大汗、多泪和流涎；（2）平滑肌痉挛表现为瞳孔缩小，胸闷、气短、呼吸困难，恶心、呕吐、腹痛、腹泻；（3）括约肌松弛表现为大小便失禁；（4）气道分泌物明显增多表现为咳嗽、气促，双肺有干性或湿性啰音，严重者发生肺水肿。烟碱样症状有肌纤维颤动，全身紧缩或压迫感，甚至全身骨骼肌强直性痉挛；骨骼肌

过度兴奋后就会出现抑制，发生肌力减退甚至呼吸肌麻痹引起呼吸停止。中枢神经系统症状 由于乙酰胆碱在脑内蓄积，可出现头晕、头痛、倦怠、烦躁不安、语言不清、不同程度的意识障碍。重者可发生脑水肿，甚至呼吸中枢麻痹。根据患者 OPI 接触史、呼出气体或呕吐物或皮肤等部位有特异性的大蒜味，有胆碱能兴奋或危象的临床表现，特别是流涎、多汗、瞳孔缩小、肌纤维颤动和意识障碍等，结合及时测定的实验室检查结果，一般诊断为有机磷杀虫药中毒。

67. 患者，30 岁，煤气中毒，经过积极抢救后苏醒，2 天后又出现神志不清，右侧肢体偏瘫，体温、血压正常，两肺呼吸音粗。应首选的治疗措施是

- A. 高压氧舱
- B. 地塞米松输注
- C. 甘露醇输注
- D. 维生素 C 输注
- E. 脑营养物质

答案：A

解析：部分急性 CO 中毒患者抢救苏醒后，经过 2~60 天的“假愈期”，可出现迟发性脑病的症状：1. 精神意识障碍呈现痴呆状态、谵妄状态或去大脑皮层状态；2. 锥体外系神经障碍 出现震颤麻痹综合征（面具面容、四肢肌张力增强、静止性震颤、慌张步态等）；3. 锥体系神经损害 如偏瘫、病理反射阳性或小便失禁等；4. 大脑皮质局灶性功能障碍 如失语、失明等，或出现继发性癫痫；5. 脑神经及周围神经损害 如视神经萎缩、听神经损害及周围神经病变等。对于迟发脑病治疗 可给予高压氧、糖皮质激素、血管扩张剂、神经细胞营养药、抗帕金森病药物以及其他对症和支持治疗。

68. 患者女性，65 岁，腹痛拘急，遇寒痛甚，得温痛减，口淡不渴，形寒肢冷，小便清长，大便清稀，舌质淡，

苔白腻，脉沉紧。应首选的治疗方法是

- A. 消食导滞，理气止痛
- B. 温中补虚，缓急止痛
- C. 散寒温里，理气止痛
- D. 疏肝解郁，理气止痛
- E. 活血化瘀，和络止痛

答案：C

解析：寒邪内阻证的主症为腹痛拘急，遇寒痛甚，得温痛减，口淡不渴，形寒肢冷，小便清长，大便清稀或秘结，舌质淡，苔白腻，脉沉紧。治以散寒温里，理气止痛。方用良附丸合正气天香散。

69. 男性患者，49 岁，大便不干，排出困难，小便清长，面色㿔白，四肢不温，腹中冷痛，腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。其中医治法为

- A. 益气通便
- B. 温阳通便
- C. 补火助阳
- D. 回阳救逆
- E. 润肠通便

答案：B

解析：阳虚秘的主症为大便干或不干，排出困难，小便清长，面色㿔白，四肢不温，腹中冷痛，或腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。治以温阳通便。方用济川煎加减。

70. 顾某，男，35 岁。两天来腹中结块，时聚时散，攻窜胀痛，脘胁胀闷不适，苔薄，脉弦。其诊断是

- A. 聚证，肝气郁结证
- B. 聚证，食滞痰阻证
- C. 积证，气滞血阻证
- D. 积证，肝气郁结证
- E. 积证，正虚瘀结证

答案：A

解析：聚证以腹内结块，聚散无常，或痛或胀，以胀为主，痛无定处，时作时止为临床特征。肝气郁结证的主症为腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，

肋肋之间不适，常随情绪波动而起伏，舌淡红，苔薄，脉弦。

71. 童某，女，48岁。两肋下积块5年，积块坚硬，隐痛，饮食大减，肌肉瘦削，神倦乏力，面色黧黑，舌质淡紫，脉细数。治疗此病证首选的方剂是

- A. 木香顺气散
- B. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- C. 柴胡疏肝散合失笑散
- D. 逍遥散合鳖甲煎丸
- E. 八珍汤合化积丸

答案：E

解析：正虚瘀结证的主症为久病体弱，积块坚硬，疼痛逐渐加剧，饮食大减，肌肉瘦削，神倦乏力，面色萎黄或黧黑，甚则面肢浮肿，或呕血、便血、细血，舌质淡紫，舌光无苔，脉细数或弦细。治以补益气血，活血化瘀。方用八珍汤合化积丸加减。

72. 某患者，身目俱黄，色泽鲜明，发热口渴，腹部胀满，口干，口苦，恶心呕吐，胁胀痛而拒按，小便赤黄、短少，大便秘结，舌红，苔黄腻，脉弦滑。治疗此证应首选的方剂是

- A. 甘露消毒丹
- B. 茵陈蒿汤
- C. 茵陈四苓散
- D. 茵陈术附汤
- E. 黄芪建中汤

答案：B

解析：热重于湿证的主症为身目俱黄，色泽鲜明，发热口渴，或见心中懊侬，腹部胀满，口干，口苦，恶心呕吐，胁胀痛而拒按，小便赤黄、短少，大便秘结，舌红，苔黄腻，脉弦滑或滑数。治以清热利湿。方用茵陈蒿汤加减。

73. 张某，男性，36岁。体检时发现蛋白尿阳性，24小时定量为1.3g，下肢轻度浮肿，血压150/96mmHg，血肌酐 $124\mu\text{mol/L}$ 。其诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾功能衰竭
- E. 慢性肾盂肾炎

答案：A

解析：慢性肾小球肾炎多数起病隐匿，进展缓慢，病程较长。其临床表现呈多样性，但以蛋白尿、血尿、高血压、水肿为基本临床表现，可有不同程度的肾功能减退。病情时轻时重、迁延难愈，渐进性发展为慢性肾衰竭。实验室检查及其他检查：1、尿液检查 尿蛋白一般在 $1\sim 3\text{g/d}$ ，尿沉渣可见颗粒管型和透明管型。血尿一般较轻或完全没有，但在急性发作期，可出现镜下血尿甚至肉眼血尿。2、肾功能检查肾功能不全时，主要表现为肾小球滤过率（GFR）下降，肌酐清除率（Ccr）降低。

74. 患者，女，40岁。3年前发现患有风湿性心脏病，近半年来，体力活动明显受限，轻度活动即出现心悸，气短。其心功能为

- A. I级
- B. II级
- C. III级
- D. IV级
- E. 0级

答案：C

解析：本题考查的是心力衰竭的临床表现。心力衰竭的严重程度通常采用美国纽约心脏病学会（NYHA）的心功能分级方法：I级：患者但日常活动量不受限制，一般体力活动不引起乏力、呼吸困难等心衰症状；II级：患者的体力活动轻度受限，休息时无自觉症状，一般体力活动下可出现心衰症状；III级：患者体力活动明显受限。低于一般体力活动即可引起心衰症状。IV级：心脏病患者不能从事任何体力活动，休息状态下也出现心衰症状，活动后加重。病人原有器质性心脏疾

病，体力活动明显受限，轻度活动即出现心悸，气短，属于心功能III级。

75. 患者，男，50岁。咳痰带血二月余，近一个月食少，体重减轻。有吸烟嗜好，按肺炎治疗无效。X线检查见右肺近肺门处有一团块状阴影，痰脱落细胞检查找到癌细胞。本例患者的首选治疗方案是

- A. 放射治疗
- B. 手术切除
- C. 化学药物治疗
- D. 抗生素治疗
- E. 免疫治疗

答案：B

解析：手术是治疗肺癌的重要方法，适应证主要是非小细胞肺癌I期、II期间、IIIa期患者。非小细胞肺癌。题中X线检查见右肺近肺门处有一团块状阴影，表明原发癌肿局限在肺内，尚未发生远处转移的病例，为非小细胞性肺癌，以外科手术治疗为主。

76. 患者小便淋漓不已，时作时止，每于劳累后发作，尿热，时有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A、八正散
- B、丹栀逍遥散
- C、无比山药丸
- D、知柏地黄丸
- E、补中益气汤

答案：C

解析：患者小便淋漓不已，时作时止，每于劳累后发作，尿热，时有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细，结合临床表现，诊断：尿路感染；中医证型：脾肾亏虚湿热屡犯；治法：健脾补肾；方剂：无比山药丸。

77. 患者因乏力就诊，骨穿示增生减低，考虑为再障。现症见面色苍白，倦怠乏力，头晕心悸，手足心热，腰膝酸软，畏寒肢冷，齿鼻衄血，舌质淡，苔白，脉细无力。其中医治法是

- A. 滋阴助阳，益气补血
- B. 补肾助阳，益气养血
- C. 滋阴补肾，益气养血
- D. 清热凉血，解毒养阴
- E. 补肾活血

答案：A

解析：患者因乏力就诊，骨穿示增生减低，考虑为再障。现症见面色苍白，倦怠乏力，头晕心悸，手足心热，腰膝酸软，畏寒肢冷，齿鼻衄血，舌质淡，苔白，脉细无力，结合临床表现，中医证候：肾阴阳两虚证，治法：滋阴助阳，益气补血；方剂：左归丸、右归丸合当归补血汤。

78. 患者，男，50岁。高血压病史15年，未坚持服药。2小时前因情绪激动突然意识不清，双侧瞳孔不等大。应首先考虑的是

- A. 酒精中毒
- B. 药物中毒
- C. 高血压性脑出血
- D. 脑血栓
- E. 心功能不全

答案：C

解析：本题考查的是脑出血的诊断。患者中年男性，高血压未控制，突发意识障碍和双侧瞳孔不等大，应首先考虑高血压导致的微动脉瘤脑出血。高血压性脑出血的临床特点为突然出现剧烈头痛，并且多伴有躁动、嗜睡或昏迷。血肿对侧出现偏瘫、瞳孔的变化，早期单侧瞳孔缩小，当血肿扩大，脑水肿加重，遂出现颅内压增高，引起血肿侧瞳孔散大等脑疝危象，出现呼吸障碍，脉搏减慢，血压升高。随后即转为中枢性衰竭。出血量少时，血肿可以自行吸收消散，症状逐渐缓解。

79. 患者，女性，28岁，手术后出现表情淡漠，嗜睡，烦躁，腹胀，心跳加快，心电图早期 T 波低平、双相倒置，继之 S-T 段下降、Q-T 间期延长和 U 波出现，属

- A. 轻度缺水
- B. 中度缺水
- C. 重度缺水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

答案：D

解析：低钾血症的诊断：神经肌肉症状：表情淡漠、倦怠嗜睡或烦躁不安；肌肉软弱无力，腱反射迟钝或消失，眼睑下垂，后延及躯干四肢；当血清钾 $<2.5\text{mmol/L}$ 时，可出现软瘫、呼吸无力、吞咽困难。消化系统症状：食欲不振、纳差、口苦、恶心、呕吐、腹胀等，重者可出现肠麻痹。循环系统症状：心肌兴奋性、自律性增高，传导性降低。表现为心悸、心动过速，心律失常、传导阻滞，严重时出现室颤，心跳停止于收缩状态。泌尿系统症状：慢性失钾可影响肾小管功能，使之对抗利尿激素不敏感，导致肾脏浓缩功能障碍，出现多饮、多尿、夜尿增多，严重时出现蛋白尿和颗粒管型。可因膀胱收缩无力而出现排尿困难。对酸碱平衡的影响：低血钾时，细胞内  $\text{K}^+$  移至细胞外，细胞外  $\text{H}^+$  移入细胞内，细胞内液  $\text{H}^+$  浓度增加，而细胞外  $\text{H}^+$  浓度降低，出现细胞内酸中毒和细胞外碱中毒并存。此外，因肾小管上皮细胞内缺钾，故排  $\text{K}^+$  减少而排  $\text{H}^+$  增多，出现代谢性碱中毒，同时排出反常性酸性尿。心电图早期 T 波低平、双相倒置，继之 S-T 段下降、Q-T 间期延长和 U 波出现，或 T、U 波融合。

80. 患者，男性，35岁，出现局部隆起，红肿热痛明显，压之剧痛，有波动感，应首先考虑的诊断是

- A. 丹毒
- B. 蜂窝织炎
- C. 脓肿
- D. 疔
- E. 痈

答案：C

解析：浅表脓肿可见局部隆起，红肿热痛明显，压之剧痛，有波动感。

81. 患者，男，60岁，鼻唇沟毛囊处出现红肿热痛小结节，逐渐肿大隆起3天，近两天中央部坏死，出现脓栓，红肿热痛加重。处理不当容易引起

- A. 面部蜂窝织炎
- B. 化脓性海绵状静脉窦炎
- C. 脑脓肿
- D. 化脓性脑膜炎
- E. 败血症

答案：B

解析：急性蜂窝织炎的临床表现：发生部位浅者红肿热痛等局部症状明显，范围扩大迅速，进而中心坏死、化脓，出现波动感。

82. 患者，男，55岁，因砖头砸伤右侧头顶部，后出现昏迷，CT 检查示：右侧脑顶叶内高密度影。应首先考虑的诊断是

- A. 脑内血肿
- B. 硬膜外血肿
- C. 硬膜下血肿
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑干出血

答案：A

解析：砖头砸伤右侧头顶部，后出现昏迷，CT 检查示：右侧脑顶叶内高密度影，首先考虑脑内血肿。

83. 患者，男，汽油烧伤前臂，表皮剥脱，散在水疱，疱皮下创面微湿，红

白相间，痛觉迟钝。烧伤深度为

- A. I°
- B. 浅II°
- C. 深II°
- D. III°
- E. IV°

答案：C

解析：深II°烧伤：伤及皮肤的真皮层，介于浅II°和III°之间，也可有水疱，但去疱皮后创面微湿，红白相间，痛觉较迟钝。

84. 患者，男，50岁。夜间右足背蛇咬伤8小时，蛇种类不清，局部疼痛不剧烈，逐渐出现头昏、胸闷、恶心、四肢乏力、眼睑下垂、语言不利等。

最可能所咬的蛇毒种类为

- A. 火毒
- B. 风毒
- C. 风火毒
- D. 热毒
- E. 湿毒

答案：B

解析：风毒的临床表现：局部伤口无红肿，疼痛轻微，感觉麻木；全身症状有头昏、眼花、嗜睡、气急，严重者呼吸困难，四肢麻痹，张口困难，口角流涎，双目直视，眼睑下垂，复视，表情肌麻痹，神志模糊甚至昏迷；舌质红，苔薄白，脉弦数或迟弱。

85. 患者，男，5岁，右臂沿神经干走向出现多个肿块，质软，同时皮肤出现大小不等的咖啡色斑块。应首先考虑的诊断是

- A. 皮脂腺囊肿
- B. 神经纤维瘤病
- C. 皮样囊肿
- D. 脂肪瘤
- E. 淋巴管瘤

答案：B

解析：神经纤维瘤的特点：肿瘤沿神经干走向生长，多呈念珠状，或呈蚯蚓结节状；皮肤出现咖啡斑，大小不

定，可为雀斑小点状，或为大片状，其分布与神经瘤分布无关，是诊断本病的重要依据。

86. 患者，女，23岁，发现颈前区单一肿块3个月，随吞咽上下活动，边界清楚，应首先考虑的诊断是

- A. 甲状腺瘤
- B. 结节性甲状腺肿
- C. 甲状腺肿
- D. 甲状腺癌
- E. 甲亢

答案：A

解析：甲状腺瘤多以颈前无痛性肿块为首发症状，常偶然发现。颈部出现圆形或椭圆形结节，质韧有弹性，表面光滑，边界清楚，无压痛，多为单发，随吞咽上下移动。

87. 患者，女，42岁，颈部弥漫性肿大，伴四肢困乏，气短，纳呆体瘦；舌苔薄，脉弱无力。治疗应首选的方剂是A. 仙方活命饮

- B. 海藻玉壶汤
- C. 四海舒郁丸
- D. 柴胡疏肝散
- E. 龙胆泻肝汤

答案：C

解析：颈部弥漫性肿大，伴四肢困乏，气短，纳呆体瘦；苔薄，脉弱无力属单纯性甲状腺肿肝郁脾虚证，治法疏肝解郁健脾益气；方选四海舒郁丸。

88. 1. 患者，男，70岁。吸烟史40年，咳痰带血1个月，伴消瘦，无明显发热，应首先考虑的诊断是

- A. 肺癌
- B. 肺炎
- C. 支气管扩张症
- D. 肺结核
- E. 肺纤维瘤

答案：A

解析：肺癌主要症状：咳嗽、血痰、胸痛、发热、气短及胸闷。

88 患者，女性，26 岁，产后 1 个月双乳出现红肿热痛，可触及包块，应首先考虑的诊断是

- A. 积乳囊肿
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 乳腺增生症
- E. 急性乳腺炎

答案：E

解析：急性乳腺炎大多数发生在产后哺乳期的最初 3~4 周内，尤其以初产妇为多见。初起时患部压痛，结块或有或无，皮色微红或不红。化脓时患部肿块逐渐增大，结块明显，皮肤红热水肿，触痛显著，拒按。

89 患者，女，30 岁，双乳内多发肿块，为确定肿块为实性或囊性，最好的检查方法是

- A. 钼靶 X 线摄片
- B. CT
- C. B 超
- D. 近红外线透照检查
- E. 热图像检查

答案：C

解析：确定肿块为性质选 B 超。

90 患者，男，35 岁，消化性溃疡反复发作 10 年，突然剧烈腹痛 3 小时，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，X 线检查可见膈下游离气体，应首先考虑的诊断是

- A. 胃、十二指肠溃疡急性穿孔
- B. 急性腹膜炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性肠梗阻
- E. 急性胆囊炎

答案：A

解析：急性穿孔的临床表现：剧烈腹痛；休克症状；恶心呕吐；全身情况。腹部压痛及腹肌强直、腹腔内积气积液。

92 产妇临产 8 小时，肛诊检查头先露，宫口已开全，先露+4，此时产力的组成是

- A. 子宫收缩力
- B. 子宫收缩力+腹肌收缩力
- C. 子宫收缩力+膈肌收缩力
- D. 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力
- E. 子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力

答案：E

解析：产妇肛诊检查头先露，宫口已开全，先露+4，此时进入第二产程，即胎儿娩出期。此时产力组成应是：子宫收缩力+腹肌收缩力+膈肌收缩力+肛提肌收缩力。

93 初产妇，24 岁。从分娩后第 3 天体温在 38.5℃左右，子宫收缩好，无压痛，会阴伤口无肿胀及压痛，恶露淡红色，无臭味，双乳肿胀且硬。首先应考虑的诊断是

- A. 会阴伤口感染
- B. 乳腺炎
- C. 产褥感染
- D. 上呼吸道感染
- E. 泌乳热

答案：E

解析：产后体温多在正常范围内，若产程延长致过度疲劳时，体温可在产后 24 小时内略升高，一般不超过 38℃。产后 3~4 天可有泌乳热，持续 4~16 小时下降，不属病态。产后脉搏略缓慢，每分钟 60~70 次，产后 1 周恢复正常。产后由妊娠期的胸式呼吸变为深慢的胸腹式呼吸，每分钟 14~16 次。血压于产褥期平稳，妊娠期高血压产妇的血压于产后明显降低。

94 患者，女，30 岁。妊娠 47 天，恶心呕吐，多为食物，呕不能食，或食入即吐，脘腹胀满，不思饮食，头晕乏力，倦怠思睡，舌淡，苔白，脉缓滑无力。治疗应首选的方剂是

- A. 加味温胆汤 B. 香砂六君子汤  
C. 小半夏加茯苓汤  
D. 干姜人参半夏丸  
E. 苏叶黄连汤

答案: B

解析: 妊娠早期呕恶, 甚则食入即吐, 口淡, 吐出物为清水或食物, 头晕, 神疲倦怠, 嗜睡; 舌淡, 苔白, 脉缓滑无力; 治法: 健脾化痰, 降逆止呕; 方药: 香砂六君子汤加生姜。

95. 患者, 女, 24 岁, G<sub>1</sub>P<sub>1</sub> 现孕 36 周, “先兆子痫”入院。入院后 2 天, 经治疗血压持续在 165/120mmHg, 感视物模糊, 现自数胎动减少, 做 NST 为无反应型, 再做 B 型超声生物物理评分为 4 分。应首选的治疗措施是

- A. 立即终止妊娠  
B. 继续治疗妊娠高血压病至妊娠 37 周  
C. 次日复查 NST  
D. 吸氧观察  
E. 做 OCT

答案: A

解析: 患者入院后血压持续在 165/120mmHg, 感视物模糊, 现自数胎动减少, 做 NST 为无反应型, 再做 B 型超声生物物理评分为 4 分, 此时应立即终止妊娠。

96 患者, 女, 25 岁。产后恶露过期不止, 量较多, 色红质稠, 大便干燥, 舌红, 脉滑数。其中医证型是

- A. 血瘀型  
B. 气虚型  
C. 阴虚型  
D. 血热型  
E. 湿热型

答案: D

解析: 产后恶露过期不止, 量较多, 色红质稠, 大便干燥, 舌红, 脉滑数。其中医证型是血热证。

97 患者, 女, 34 岁。自然分娩, 产后第 3 天午后体温 37.8°C, 大小便正常。检查: 子宫底脐下 3 指, 无压痛, 乳房胀硬。首先应考虑的诊断是

- A. 产褥热  
B. 流行性感胃  
C. 伤口感染 D. 泌尿系感染  
E. 乳汁淤积 答案: E

解析: 患者自然分娩, 产后第 3 天午后体温 37.8°C, 大小便正常。检查: 子宫底脐下 3 指, 无压痛, 乳房胀硬。结合临床表现, 考虑乳汁淤积。

98 患者, 女, 48 岁。外阴瘙痒逐渐加重 3 年, 抓破后伴有局部疼痛。查见大阴唇、阴唇间沟等处皮肤有抓痕, 黏膜变白, 皮肤变薄、干燥、失去弹性。首先应考虑的诊断是

- A. 外阴增生型营养不良  
B. 外阴硬化性苔藓  
C. 外阴白癜风  
D. 外阴银屑病  
E. 外阴湿疹

答案: B

解析: 患者外阴瘙痒逐渐加重 3 年, 抓破后伴有局部疼痛。查见大阴唇、阴唇间沟等处皮肤有抓痕, 黏膜变白, 皮肤变薄、干燥、失去弹性。结合患者临床表现, 诊断: 外阴硬化性苔藓。

99 患者, 女, 31 岁。月经周期不规则, 周期、经期延长, 量偏多, 婚后 4 年不孕, 双合诊检查子宫后倾后屈, 基础体温呈单相。首先应考虑的诊断是

- A. 子宫位置异常  
B. 黄体萎缩不全  
C. 无排卵性异常子宫出血  
D. 黄体发育不全  
E. 子宫内膜修复延长

答案: C

解析: 月经周期不规则, 周期、经期延长, 量偏多, 婚后 4 年不孕, 双合



诊检查子宫后倾后屈，基础体温呈单相型，可诊断：无排卵性异常子宫出血。

10 患者，女，20岁。近半年来出现月经提前，甚则半月一行，经量时多时少，色紫红，夹有瘀块，伴胸闷胁胀，烦躁易怒，口苦咽干，舌红，苔薄，脉弦数。其中医证型是

- A. 阳盛血热型
- B. 气虚型
- C. 虚热型
- D. 血瘀型
- E. 肝郁血热型

答案：E

解析：患者近半年来出现月经提前，甚则半月一行，经量时多时少，色紫红，夹有瘀块，伴胸闷胁胀，烦躁易怒，口苦咽干，舌红，苔薄，脉弦数。结合临床表现，诊断：月经先期；中医辨证：肝郁血热证；治法：疏肝解郁，清热调经；方剂：丹栀逍遥散。

11 患者，女，34岁，已婚。近3年月经量少，渐至停闭，五心烦热，两颧潮红，骨蒸劳热，舌红，少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 保阴煎
- B. 加減一阴煎
- C. 两地汤
- D. 人参养营汤
- E. 左归丸

答案：B

解析：患者34岁，已婚。近3年月经量少，渐至停闭，五心烦热，两颧潮红，骨蒸劳热，舌红，少苔，脉细数。结合临床表现，诊断：继发性闭经；中医证型：阴虚血燥；治法：养阴清热，养血调经；方剂：加減一阴煎加丹参、女贞子、香附。

12 患者，女，50岁。因阴道不规则流血诊断为宫颈癌IIa期，其病变应累及的范围是

- A. 宫颈、阴道上1/3处，无明显宫旁浸润
- B. 宫颈、阴道上1/3处及宫旁浸润
- C. 宫颈、阴道上2/3范围内，无明显宫旁浸润
- D. 宫颈、宫旁浸润，但未达盆壁
- E. 宫颈、阴道下1/3浸润但无宫旁浸润

答案：C

解析：肿瘤已超出宫颈，但未达盆壁，阴道上2/3范围内，无明显宫旁浸润或未达阴道下1/3。

13 患者，女，48岁。月经周期正常，月经量多5年，子宫如孕2个半月大小，表面不平，宫体左侧可扪及直径约为5cm大小包块，质硬，与子宫体分不开，无压痛。首先应考虑的诊断是

- A. 多发性子宫肌瘤
- B. 卵巢实质性肿瘤
- C. 子宫腺肌瘤
- D. 盆腔炎性包块
- E. 子宫内膜异位囊肿

答案：A

解析：患者月经周期正常，月经量多5年，子宫如孕2个半月大小，表面不平，宫体左侧可扪及直径约为5cm大小包块，质硬，与子宫体分不开，无压痛，结合临床表现，诊断：子宫肌瘤。

14 患者，女，31岁。近2年经期或经后腹痛，喜温喜按，月经色淡、质稀，神疲乏力，舌淡暗，苔薄白，脉细无力，诊断为子宫内膜异位症。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 理冲汤

答案：E

解析：患者近2年经期或经后腹痛，

喜温喜按，月经色淡、质稀，神疲乏力，舌淡暗，苔薄白，脉细无力，诊断为子宫内膜异位症，中医证型：气虚血瘀证；中医治法：益气活血，化瘀散结，方剂：理冲汤。

15 患儿，6个月。每闻声响则啼哭不安。其病位是

- A. 肝
- B. 脾
- C. 心
- D. 肺
- E. 肾

答案：C

解析：小儿每闻声响则啼哭不安病位在心，心藏神，五脏六腑之大主，心者，精神之所舍也，心者。君主之官也。

16 患儿，出生7天。面目皮肤发黄，色泽晦暗精神差，吮乳少，四肢欠温，腹胀便溏，舌淡苔白腻，指纹色淡。其诊断是

- A. 新生儿黄疸，瘀积发黄证
- B. 新生儿黄疸，湿热熏蒸证
- C. 新生儿，生理性黄疸
- D. 新生儿寒冷损伤综合征 E.

新生儿黄疸，寒湿阻滞证

答案：E

解析：患儿出生7天。面目皮肤发黄，色泽晦暗精神差，吮乳少，四肢欠温，腹胀便溏，舌淡苔白腻，指纹色淡。提示新生儿黄疸寒湿阻滞证。治疗宜温中化湿退黄，方药：茵陈理中汤。

17 患儿，4岁。发热咽痛，咽部充血，软腭上有2~4mm大小的疱疹，疱疹周围有红晕。心肺听诊正常。其可能的诊断是

- A. 咽结合膜
- B. 疱疹性咽峡炎
- C. 急性化脓性扁桃体炎
- D. 支气管炎
- E. 支气管肺炎

答案：B

解析：疱疹性咽峡炎由柯萨奇A组病毒所致。好发于夏秋季。表现为急性发热，体温大多在39℃以上，流涎、咽痛等。体检时可见咽部红肿，咽腭弓、悬雍垂、软腭等处可见2~4mm大小的疱疹，周围红晕，疱疹破溃后形成小溃疡。病程约1周左右。

18 患儿，2岁。患肺炎喘嗽反复不愈2周余，低热起伏，咳嗽无力，多汗、四肢欠温，面色白，纳呆便溏，舌质偏淡，舌苔白滑，指纹淡红而滞，在风关，治疗应首选的方剂是

- A. 桂枝汤
- B. 人参五味子汤
- C. 四君子汤
- D. 补中益气汤
- E. 泻白散

答案：B

解析：患肺炎喘嗽反复不愈2周余，低热起伏，咳嗽无力，多汗、四肢欠温，面色白，纳呆便溏，舌质偏淡，舌苔白滑，指纹淡红而滞，在风关，诊断：小儿肺炎。辨证：肺脾气虚证；治法：补肺健脾，益气化痰；方药：人参五味子汤。

19 患儿，18个月。腹泻时轻时重，已经3个月，大便清稀无臭，夹不消化食物，有时便后脱肛，形寒肢冷，面色㿔白，精神萎靡，睡时露睛，舌淡苔白，指纹色淡。治疗应首选的方剂是

- A. 附子理中汤合四神丸
- B. 保和丸合二陈汤
- C. 金匮肾气丸合人参乌梅汤
- D. 参苓白术散合理中丸
- E. 异功散合平胃散

答案：A

解析：患儿，18个月。腹泻时轻时重，已经3个月，大便清稀无臭，夹不消化食物，有时便后脱肛，形寒肢冷，面色㿔白，精神萎靡，睡时露睛，舌

淡苔白，指纹色淡。结合患儿临床表现，考虑脾肾阳虚泻；治法：温补脾肾，固涩止泻。方药：附子理中汤合四神丸加减。

110 患儿，6个月。母乳喂养，腹泻已两个半月，大便每日6~7次，便中含有奶瓣，曾服用妈咪爱无效。查体：神志清，体重6.3kg，化验：大便偶见脂肪滴。应首先考虑的诊断是

- A. 生理性腹泻
- B. 大肠杆菌性肠炎
- C. 霉菌性肠炎
- D. 病毒性
- E. 过敏性肠炎

答案：A

解析：生理性腹泻：多见于6个月以内婴儿，外观虚胖，常有湿疹，生后不久即出现腹泻，除大便次数增多外，无其他症状，食欲好，不影响生长发育。近年来发现此类腹泻可为乳糖不耐受的一种特殊类型，添加辅食后，大便即转为正常。

111 患儿，3岁。反复浮肿2月余。尿蛋白(+++)，镜检(-)，尿蛋白定量>10mg/

(kg·d)，血清白蛋白25g/L，胆固醇10.4mmol/L(40mg/dL)，血压正常。尿素氮正常。首先考虑的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 尿路感染
- D. 肾盂肾炎
- E. 急进性肾炎

答案：B

解析：反复浮肿2月余。尿蛋白(+++)，镜检(-)，尿蛋白定量>10mg/(kg·d)，血清白蛋白25g/L，胆固醇10.4mmol/L(40mg/dL)，血压正常。尿素氮正常。结合该患儿临床表现，可诊断：肾病综合征。

112 患儿，2岁。起病急骤，皮肤出现

瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有齿衄鼻衄，偶见尿血，面红目赤，心烦口渴，便秘尿少，舌红，苔黄，脉数。其首选方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 桃仁汤
- C. 犀角地黄汤
- D. 大补阴丸合茜根散
- E. 归脾汤

答案：C

解析：患儿皮肤出现瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有齿衄鼻衄，偶见尿血，面红目赤，心烦口渴，便秘尿少，舌红，苔黄，脉数。结合临床表现，诊断：免疫性血小板减少性紫癜。治法：清热解毒，凉血止血；方药：犀角地黄汤。

113 患儿，2岁。发热7天，壮热，体温40℃，昼轻夜重，唇干赤裂，烦躁不宁，肌肤斑疹鲜红，手足肿胀潮红，杨梅舌，指纹紫。诊断为皮肤黏膜淋巴结综合征，其病机是

- A. 邪在肺胃
- B. 卫气同病
- C. 气营两燔
- D. 邪在太阳
- E. 邪在少阴

答案：C

解析：患儿发热7天，壮热，体温40℃，昼轻夜重，唇干赤裂，烦躁不宁，肌肤斑疹鲜红，手足肿胀潮红，杨梅舌，指纹紫。诊断为皮肤黏膜淋巴结综合征，中医辨证：气营两燔证；治法：清热解毒，凉营化瘀；方剂：清营汤。

114 患儿，2个月。足月顺产，母乳喂养，诊断佝偻病激期，为治疗服用维生素D，每日补充的合理剂量是

- A. 200IU
- B. 0IU
- C. 2000IU
- D. 4000IU
- E. 1000IU

答案：D

解析：维生素 D 口服法：初期每日 1000 ~ 2000IU；激期每日 3000 ~ 6000IU

115 患儿，3 岁。低热恶寒，鼻塞流涕，全身皮肤成批出疹，为红色斑疹和斑丘疹，继有疱疹，疱浆清亮，头面、躯干多见，舌红，苔薄白，脉浮数。其诊断是

- A. 猩红热，邪侵肺胃证
- B. 麻疹，见形期
- C. 水痘，邪郁肺卫证
- D. 风疹，邪郁肺卫证
- E. 幼儿急疹，肺卫蕴热证

答案：C

解析：低热恶寒，鼻塞流涕，全身皮肤成批出疹，为红色斑疹和斑丘疹，继有疱疹，疱浆清亮，头面、躯干多见，舌红，苔薄白，脉浮数。结合患儿临床表现，可初步诊断：水痘。中医辨证分型：邪郁肺卫证。

116 患儿，2 岁。生后至今不会站立与行走，头项歪斜。其病变脏腑主要是

- A. 心肝
- B. 心肾C.
- 肺脾D.
- 心肺E.
- 脾肾答

案：E

解析：小儿生后至今不会站立与行走，头项歪斜。其病变脏腑主要是脾肾，脾在体合肌肉，主四肢，肾在体合骨，主骨生髓，故其病变脏腑主要是脾肾。

117 新生儿，15 天。生后母乳喂养。每次哺乳后易溢乳，应采取的措施是

- A. 哺乳后轻拍其背
- B 两次喂哺时间相隔 3 小时
- C 每次哺乳时间 1 小时
- D. 减少每次哺乳量
- E. 定时喂哺，每日 6~8 次

答案：A

解析：小儿生后母乳喂养，发生溢乳后可哺乳后轻拍其背。

三、A<sub>3</sub>型选择题（118 ~ 132 题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设 3 道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

（118~122 题共用题干）

患者，男，58 岁。高血压病史 6 年。近 5 个月来夜尿增多，伴有乏力、气促、腰酸、纳呆腹胀、食欲减退。查体：轻度贫血貌，血压 170/110mmHg。舌淡红，苔白，有齿痕。脉沉细。肾功能检查：GFP50mL/min, Ccr 60mL/min, Scr256 μmol/L。

118 首先考虑的诊断是

- A. 慢性肾盂肾炎
- B. 高血压肾病
- C. 肾病综合症
- D. 慢性肾衰竭
- E. 慢性肾小球肾炎

119 以下措施不合理的是

- A. 积极纠正贫血
- B. 使用 ACEI 和 ARB 降压
- C. 低蛋白、低磷饮食
- D. 蛋白尿控制在 <0.5g/24h
- E. 使用噻嗪类利尿剂

120 中医治法是

- A. 温扶元阳，补益真阴
- B. 滋肾平肝
- C. 温补脾肾
- D. 补气健脾益肾
- E. 益气养阴，健脾补肾

121 治疗此证应首选的方剂是

- A. 参芪地黄汤加减
- B. 六君子汤加减 C.
- 济生肾气丸加减D.
- 杞菊地黄汤加减
- E. 金匱肾气丸或全鹿丸加减

122 若脾虚湿困，恶心呕吐，胸闷纳呆者，可加

- A. 苍术、藿香、佩兰、薏苡仁

- B. 黄连温胆汤
- C. 四妙丸
- D. 五皮饮或五苓散
- E. 苏叶、赭石

答案：DEDBA

解析：患者，男，58岁。高血压病史6年。近5个月来夜尿增多，伴有乏力、气促、腰酸、纳呆腹胀、食欲减退。查体：轻度贫血貌，血压170/110mmHg。舌淡红，苔白，有齿痕。脉沉细。肾功能检查：GFP50mL/min, Ccr

60mL/min, Scr256 μmol/L, 结合临床表现，诊断：慢性肾衰竭。

慢性肾衰竭的患者可根据需要应用利尿剂（呋塞米、布美他尼等）。噻嗪类利尿剂及潴钾利尿剂对CRF患者

（Scr>220 μmol/L）不宜应用，因此时疗效甚差。对严重肺水肿急性左心衰竭者，常需及时给予血液透析或持续性血液滤过，以免延误治疗时机。

患者夜尿增多，伴有乏力、气促、腰酸、纳呆腹胀、食欲减退。轻度贫血貌，血压170/110mmHg。舌淡红，苔白，有齿痕。脉沉细。结合临床表现，诊断：慢性肾衰竭。中医诊断为脾肾气虚证；治法为：补气健脾益肾；方剂：六君子汤。

脾肾气虚证；中医治法：补气健脾益肾；方剂：六君子汤。

脾肾气虚证，若脾虚湿困，恶心呕吐，胸闷纳呆者，可加苍术、藿香、佩兰、薏苡仁健脾化湿。

（123~126题共用题干）

患者，男，28岁。2天前被木刺刺伤手指，未进行消毒处理。现症见：指端剧烈跳痛，触之痛甚，畏寒、发热、头痛，体温38.7℃，食欲不振，疼痛造成夜眠不安，舌红，苔黄，脉数。123. 其诊断是

- A. 手部淋巴管炎
- B. 脓性指头炎
- C. 化脓性腱鞘炎
- D. 化脓性滑囊炎

E. 脓毒症

答案：B

解析：脓性指头炎初起时指端有针刺样疼痛，随组织肿胀，压力增高，产生剧痛，当指动脉被压时，转为搏动性疼痛。指头红肿并不明显，或反呈黄白色，轻触指头即产生剧烈疼痛。多伴有发热，全身不适，白细胞计数增高等。

124. 其证型是

- A. 风毒在表证
- B. 火毒结聚证
- C. 热盛肉腐证
- D. 风毒入里证
- E. 阴虚邪留证

答案：C

解析：热盛肉腐证：指端剧烈跳痛，触之痛甚；兼有畏寒、发热、头痛，全身不适，纳呆，失眠；舌红，苔黄，脉数。

125. 其治疗是

- A. 驱风镇痉
- B. 祛风镇痉，清热解毒
- C. 益胃养阴，疏风通络
- D. 补养气血，托毒透邪
- E. 清热解毒，透脓止痛

答案：E

解析：热盛肉腐证：清热解毒，透脓止痛。

126. 治疗应首选

- A. 玉真散合五虎追风散加减
- B. 五味消毒饮加减
- C. 清营汤加减
- D. 托里消毒散加减
- E. 附子理中汤加减

答案：B

解析：热盛肉腐证方选黄连解毒汤合五味消毒饮加减。

（127~129题共用题干）

患者，女，32岁。已婚5年，未避孕，未怀孕。患者平素月经量少，35~40天一行，带下量多，头晕头重，时有胸闷泛恶，四肢倦怠，体胖，体毛多，

舌体胖大、色淡，苔白腻，脉滑。

127. 其诊断是

- A. 异常子宫出血
- B. 闭经
- C. 多囊卵巢综合征
- D. 子宫内膜异位症
- E. 子宫腺肌病 128.

其证型是

- A. 肾阴虚证 B.
- 肾阳虚证 C.
- 肝经湿热证D.
- 痰湿阻滞证E.
- 气滞血瘀证

129. 治疗应首选

- A. 左归丸
- B. 右归丸
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 膈下逐瘀汤
- E. 苍附导痰丸合佛手散

答案：CDE

解析：患者未避孕，未怀孕。患者平素月经量少，35~40 天一行，带下量多，头晕头重，时有胸闷泛恶，四肢倦怠，体胖，体毛多，舌体胖大、色淡，苔白腻，脉滑。结合临床表现，诊断：多囊卵巢综合征。

患者平素月经量少，35~40 天一行，带下量多，头晕头重，时有胸闷泛恶，四肢倦怠，体胖，体毛多，舌体胖大、色淡，苔白腻，脉滑。结合临床表现，诊断：多囊卵巢综合征。中医证型：痰湿阻滞证；治法：燥湿除痰，活血调经选方：苍附导痰丸合佛手散。

(130~132 题共用题干)

患儿，男，4 岁。大便秘结，脘腹胀痛，不思饮食，手足心热，小便黄，恶心呕吐，舌质红，苔黄厚，脉沉有力。

130. 其诊断是

- A. 乳食积滞便秘
- B. 燥热内结便秘
- C. 气机郁滞便秘
- D. 气虚不运便秘
- E. 血虚肠燥便秘

131. 其治法是

- A. 消积导滞，清热和中
- B. 清腑泄热，润肠通便
- C. 疏肝理气，导滞通便
- D. 健脾益气，润肠通便
- E. 滋阴养血，润肠通便

132. 治疗应首选

- A. 麻子仁丸加减
- B. 六磨汤加减 C.
- 黄芪汤加减 D.
- 润肠丸加减 E.
- 保和丸加减 答

案：AAE

解析：患儿大便秘结，脘腹胀痛，不思饮食，手足心热，小便黄，恶心呕吐，舌质红，苔黄厚，脉沉有力。结合临床表现，诊断：便秘；中医辨证：乳食积滞证。

乳食积滞便秘治法：消积导滞，清热和中。

乳食积滞便秘方药：保和丸。

四、B<sub>1</sub>型选择题（133~150 题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(133~134 题共用备选答案)

- A. 长期、反复咳嗽、咯痰
- B. 反复咳嗽、咯痰，喘息，并伴有哮鸣音
- C. 咳嗽、咯痰，伴长期午后低热，消瘦，盗汗
- D. 发作性带哮鸣音的呼气性呼吸困难
- E. 夜间热睡后突然憋醒，伴咳嗽、咯痰

133. 支气管哮喘的临床表现是

134. 慢性支气管炎喘息型的临床表现是

答案：DB

解析：支气管哮喘典型表现为发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难或发作

性胸闷和咳嗽，其发作常与吸入外源性变应原有关，大多数有季节性。慢性支气管炎喘息型多见于中老年人，有慢性咳嗽史，喘息常年存在，主要症状为咳嗽、咳痰，或伴有喘息，如合并哮喘可闻及广泛哮鸣音并伴呼气期延长。

(135~136 题共用备选答案)

- A. 胸部刺痛，入夜尤甚
- B. 胸闷隐痛，时作时止
- C. 胸闷如窒，气短喘促
- D. 胸闷气短，畏寒肢冷
- E. 胸痛彻背，感寒痛甚

135. 胸痹气阴两虚证，其临床特点是

136. 胸痹阴寒凝滞证，其临床特点是

答案：BE

解析：胸闷隐痛，时作时止。见于胸痹气阴两虚证。胸痛彻背，感寒痛甚。见于胸痹之阴寒凝滞证。

(137~138 题共用备选答案)

- A. 右上腹疼痛，进食油脂食物常加重
- B. 上腹压痛，板样强直，肝浊音界消失
- C. 发作性上腹疼痛，有周期性和节律性
- D. 脐周阵痛，伴有压痛，肠鸣音亢进，有肠型
- E. 上腹部胀痛，伴有胃型和振水声

137. 胆石症和急性胆囊炎可见

138. 消化性溃疡可见

答案：AC

解析：胆囊炎表现为反复发作右上腹隐痛，进食油脂食物常加重。B 超可见胆囊炎性改变，静脉胆道造影时胆囊显影淡薄或不显影，多合并胆囊结石。消化性溃疡一般表现为发作性上腹疼痛，有周期性和节律性，好发于秋冬和冬春之交。钡餐造影可发现龛影或间接征象。胃镜检查可见黏膜溃疡。

(139~140 题共用备选答案)

- A. 噻嗪类利尿药

B. 血管紧张素 II 受体拮抗剂

C. 糖皮质激素

D. 氨基糖苷类抗生素

E. 细胞毒药物

139. 钠水潴留容量依赖性高血压患者，治疗应首选的药物是

140. 肾素依赖性高血压患者，治疗应首选的药物是

答案：AB

解析：降压药物选择 ①有钠水潴留容量依赖性高血压患者可选用噻嗪类利尿药，如氢氯噻嗪口服。②对肾素依赖性高血压应首选血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI），如贝那普利。或用血管紧张素 II 受体拮抗剂（ARB），如氯沙坦或缬沙坦。③心率较快的中、青年患者或合并心绞痛患者，可选用  $\beta$  受体阻滞剂，如阿替洛尔或美托洛尔。

④老年患者，以及合并糖尿病、冠心病患者，选用钙离子拮抗剂，如氨氯地平或硝苯地平控释片。⑤若高血压难以控制可以选用不同类型降压药联合应用。

(141~142 题共用备选答案)

- A. 桃仁四物汤合犀角地黄汤加减
- B. 启膈散合逍遥散加减
- C. 五汁安中饮加味
- D. 二陈汤合旋覆代赭汤加减
- E. 大补元煎加减

141. 食管癌痰气交阻证治疗首选

142. 食管癌痰湿内蕴证治疗首选

答案：BD

解析：食管癌痰气交阻证的治法：开郁化痰润燥，方选启膈散合逍遥散；痰湿内蕴证的治法：除湿化痰，降逆止呕，方选二陈汤合旋覆代赭汤。

(143~144 题共用备选答案)

- A. 衔接
- B. 下降
- C. 俯屈
- D. 内旋转
- E. 仰伸

143. 胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平称为

144. 胎头沿骨盆轴前进的动作称为

答案：AB

解析：胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平，称为衔接。胎头沿骨盆轴前进的动作称下降，下降动作贯穿于分娩全过程，临床上以胎头下降的程度作为判断产程进展的重要标志。

(145~146 题共用备选答案)

A. 肾气丸

B. 举元煎

C. 真武汤

D. 六味地黄丸

E. 内补丸

145. 滋补肾阴的代表方是

146. 补中益气的代表方是

答案：DB

解析：滋肾益阴适用于肾阴不足或肾精亏损所致的月经失调、绝经综合征、先兆流产、不孕症。代表方剂如六味地黄丸、左归丸、养精种玉汤等。

脾虚中气下陷，甚或统摄无权，可致月经过多、崩漏、经期延长、胎动不安、产后乳汁自出、子宫脱垂等，治宜补中益气，升阳举陷。代表方剂如补中益气汤、举元煎、固冲汤。

(147~148 题共用备选答案)

A. 42cm

B. 46cm

C. 48cm

D. 50cm

E. 54cm

147. 2 岁小儿的头围大约是

148. 5 岁小儿的头围大约是

答案：CD

解析：新生儿平均 34cm；1 岁时 46cm；2 岁时 48cm。5 岁时小儿的头围大约是 50cm。第一年的前 3 个月和后 9 个月：都约增长 6cm。

(149~150 题共用备选答案)

A. 驱蛔杀虫

B. 散结下虫

C. 安蛔定痛

D. 调理脾胃

E. 通腑排蛔

149. 治疗蛔厥证的主要方法是

150. 治疗肠蛔虫病的主要方法是

答案：CA

解析：蛔厥证治法：安蛔定痛继以驱虫；方剂：乌梅丸。蛔虫证治法：驱蛔杀虫，调理脾胃；方剂：使君子散。