



微信搜一搜



金英杰口腔学院

2021 执业医师考试

**绝密押题卷**



**2021 年**

**医师资格考试专用**



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



微信搜一搜



金英杰口腔学院



# 金英杰口腔学院

1.手术后应加压包扎的是

A.游离皮瓣移植术



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



B.中厚断层皮片移植术

C.皮管形成术后

D.旋转推进皮瓣术后

E.隧道式皮瓣转移术

答案：B

解析：皮片本身没有血供，移植成功的基本条件是受区毛细血管生长进入移植皮片，因此需加压包扎，使皮片和受区紧密接触，防止二者之间出现积血或积液，故 B 正确。皮瓣、皮管自身有血运，不需加压包扎，排除

A、C、D、E，故本题选 B。

3.碘酊用于口腔内消毒剂的浓度是

A.2.5%

B.2.0%

C.1.5%

D.1%

E.0.5%

答案：D

解析：碘酊消毒口腔时浓度一般为 1%，故 D 正确。

4.口腔门诊小手术常用

A.仅消毒，不铺消毒巾

B.孔巾铺置法

C.包头法

D.三角形手术野铺巾法

E.四边形手术野铺巾法

答案：B

解析：口腔门诊小手术常用孔巾铺置法，因此 B 正确；三角形手术野铺巾法，适用于口腔、鼻、唇及颈部手术，因此 D 错误；四边形手术野铺巾法适用于腮腺区、颌下区、颈

2.皮肤创口缝合后过度外翻是因为

A.进针点距创缘过远两侧进针深度不一致

B.皮肤切口两侧进针间距大于皮下间距

C.皮肤切口两侧进针间距小于皮下间距

D.打结过紧

E.打结过松

答案：C

解析：缝合时如皮肤切口两侧进针间距大于皮下间距会出现皮肤内卷，如果小于皮下间距会出现皮肤外翻，故 C 正确。



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



部及涉及多部位的大型手术，因此 E 错误，施行活检，故本题选 D。

故选 B。

5. 不适用干热灭菌法的物品是

A. 明胶海绵和各种粉剂

B. 棉织品和橡胶制品

C. 凡士林和油脂

D. 玻璃和陶瓷

E. 液状石蜡

答案：B

解析：干热灭菌的 160~170℃ 温度能使纤维织品变焦，所以不能使用干热灭菌，而其他选项的物品可以耐高温，故本题选 B。

6. 不宜行组织活检术的肿瘤为

A. 舌癌

B. 骨肉瘤

C. 黏液瘤

D. 颈动脉体瘤

E. 恶性淋巴瘤

答案：D

解析：颈动脉体瘤因可能造成大出血而不能

7. 颌面、颈部手术后，负压引流拔除的时机

一般为 24 小时引流量小于

A. 100ml

B. 80~90ml

C. 60~70ml

D. 40~50ml

E. 20~30ml

答案：E

解析：引流物放置时间应因手术不同而异。

污染创口或为防止积血、积液而放置的引流物，多在 24~48h 后去除；脓肿及死腔的

引流物应放置至脓液及渗出液完全消除为

止；而负压引流的去时间则是引流量的多

少而定，一般 24h 内引流量不超过 20~

30ml 时，即可拔除引流管。故本题选 E。

8. 填塞止血主要用于

A. 开放性和洞穿性创口

B. 创口内出血的血管断端

C. 广泛的组织渗血



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D.凝血机制障碍者的创面溶血

B.关节内无响声，无弹跳现象

E.骨断端出血

C.颌面部无痛，下颌部运动不偏斜

答案：A

D.下前伸自如无障碍

解析：填塞止血是用碘纱条或油纱条填塞出

E.开口度为 40mm 以上

血的窦腔，多用于开放性和洞穿性创口，选

答案：D

B 选项需要用到结扎止血，C 选项采用包扎

解析：开闭口运动正常的标志：①双侧髁突

止血，D 选项需要服用促凝药加上按压止血，

运动均匀一致；②关节内无响声，无弹跳现

D 选项按照常规骨折处理即可，故本题选 A。

象；③颌面部无痛，下颌部运动不偏斜，

无前伸动作；④开口度为 40mm 以上。故

9.对于腮腺区肿物不宜进行的检查是

此题选 D。

A.细针吸取细胞学检查

B.CT 或 MRI

11.局麻时，如将局麻区药注入血管中可发

C.涎腺造影

生

D.切取活检术

A.休克

E.B 超

B.晕厥

答案：D

C.药物过敏

解析：腮腺和下颌下腺肿瘤禁忌做活检，因

D.药物中毒

为无论良恶性肿瘤，均有瘤细胞种植危险。

E.中枢神经麻醉

所以 D 错误。

答案：D

10.开闭口运动正常的标志不包括

解析：局麻药注入血管后会引引起血药浓度过

高，进而引发中毒反应，所以 D 选项正确。

A.双侧突运动均匀一致

休克是发生严重的循环障碍的情况，局麻药





一般不会引发循环障碍，所以 A 错。晕厥是

A.10 ~ 50mg

由紧张、恐惧、焦虑等精神因素引发的，所

B.80 ~ 100mg

以 B 选项错误。药物过敏反应是药物与个体

C.300 ~ 400mg

的冲突引发的，与药物进入血管无关，所以

D.800 ~ 1000mg

C 选项错误。局麻药一般只会引起中枢神经

E.1500mg

系统的各种临床反应，而不是中枢神经麻醉，

答案：C

所以 E 选项错误，本题选 D。

解析：利多卡因临床常用阻滞麻醉浓度为

1% ~ 2%，一次最大用量为 300 ~ 400mg，

12.普鲁卡因偶能发生过敏反应的原因是\

使用时应分次小量注射，故选 C。

A.渗透性差

B.酰胺类药物

C.用量过大

D.酯类药物

E.与青霉素交叉过敏

14.拔牙的绝对禁忌证是

A.血友病

B.高血压

C.冠心病

答案：D

D.慢性肝炎

解析：普鲁卡因是酯类药物，偶能产生过敏

E.急性白血病

反应，可出现皮炎、荨麻疹或声门水肿等过

答案：E

敏反应。亦有不少病员因用普鲁卡因青霉素

解析：重型或急性白血病患者禁忌拔牙，所

制剂而致敏。故对有青霉素过敏史的病员也

以 E 选项是正确的。

应警惕使用普鲁卡因，所以 D 正确。

13.利多卡因一次最大用量为

15.口腔颌面部感染中最容易发生全身性并

发症的是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A.淋巴结炎

1.0 厘米处。

B.面部疖痈

C.颌骨骨炎

17.心律失常病员常作为首选的局部麻醉药

D.智齿冠周炎

是

E.颌面部间隙感染

A.普鲁卡因

答案：B

B.利多卡因

解析：在口腔颌面部感染中面部疖痈最易发

C.布比卡因

生全身并发症。这是由于疖痈的病原菌毒力

D.丁卡因

较强，上唇与鼻部“危险三角区”内的静脉

E.阿替卡因

又常无瓣膜，颜面表情肌和唇部的生理性运

答案：B

动易使感染扩散等因素所致。

解析：利多卡因又名赛洛卡因，局麻作用较

普鲁卡因强，其维持时间亦较长，并有较强

16.下牙槽神经阻滞麻醉口内法注射时，针

的组织穿透性和扩散性，故亦可用作表面麻

尖应在

醉。利多卡因还有迅速、安全的抗室性心律

A 下颌孔平面

失常作用，在治疗各种原因的室性心律失常

B.下颌孔上方约 0.5cm

时效果显著，因而对心律失常病员常作为首

C.下颌孔上方约 1.0cm

选的局部麻醉药。

D.下颌孔上方约 1.5cm

E.下颌孔上方约 2.0cm

18.特别适合费时较长的手术，术后镇痛时

答案：C

间也较长的是

解析：为使针尖避开下颌小舌的阻挡，接近

A.普鲁卡因

下牙槽神经注射，针尖应在下颌孔上方约

B.利多卡因



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





C.布比卡因

A.普鲁卡因

D.丁卡因

B.利多卡因

E.阿替卡因

C.布比卡因

答案：C

D.丁卡因

解析：布比卡因作用快慢与利多卡因相仿，

E.阿替卡因

而持续时间为利多卡因之 2 倍，一般可达 6

答案：A

小时以上，麻醉强度为利多卡因的 3~4 倍。

解析：普鲁卡因常用者为其盐酸盐，又名奴

特别适合费时较长的手术，术后镇痛时间也

佛卡因。麻醉效果良好，价格低廉，毒性和

较长。

副作用小，是临床应用较广的一种局麻药物。

19.临床上主要用作表面麻醉的是

21.下颌关节的负重区为

A.普鲁卡因

A.突的前斜面和关节结节的前斜面

B.利多卡因

B.突的后斜面和关节结节的前斜面

C.布比卡因

C.突的前斜面和关节结节的后斜面

D.丁卡因

D.突的后斜面和关节结节的后斜面

E.阿替卡因

E.突的横和关节结节的后斜面

答案：D

答案：C

解析：丁卡因又名地卡因，穿透力强。临床

解析：在大开口时，髁突的前斜面沿着关节

上主要用作表面麻醉。

结节的后斜面向前、下滑动。

20.麻醉效果良好，价格低廉，毒性和副作

22.下列有关预防下颌关节乱病的措施中，

用小的酯类药物是

除外



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





A.避免关节区受到寒冷刺激

B.纠正不良咀嚼习惯

C.避免长时间大张口

D.保持乐观情绪

E.下颌关节可过度运动

答案：E

解析：人类演化过程中髁突变小、关节、咀嚼肌和韧带明显变弱致关节的承重能力减低以及颞下颌关节的过度运动等均可诱发颞下颌关节紊乱病。

24.使用 2% 丁卡因作为表面麻醉的剂量不能超过

A.0.5ml

B.1ml

C.1.5ml

D.2ml

E.3ml

答案：D

解析：丁卡因黏膜穿透力强，毒性大，一般不作浸润麻醉，一次用量不应超过 40 ~ 60mg，即 2% 的丁卡因不超过 2ml。

23.根钳拔除法适用于

A.根尖处断根

B.所有残根或断根

C.低位残根

D.高位残根.颈部折断的断根

E.折断部位比较低

答案：D

解析：根钳拔除法适用于高位残根，颈部折断的断根或虽折断部位低于牙槽嵴，但在去除少许牙槽骨壁后，仍能用根钳夹住的断根。

25.下列哪项是上颌骨骨折下垂移位引起的呼吸困难最主要的抢救措施

A.头低侧卧位

B.上颌骨骨折块向上悬吊并固定

C.止血

D.清除分泌物

E.拉舌至口外

答案：B

解析：悬吊下坠的上颌骨骨块，可临时采用筷子、压舌板或类似器材横放于上颌双侧前



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



磨牙部位，将上颌骨骨折块向上悬吊，并将两端固定于头部绷带上。此类骨折好发生阻塞性窒息，应当上提并固定上颌骨，防止组织向后下方移位，阻塞气道。

泪液运行障碍，一般是由于泪囊肌瘫痪与结膜炎等原因所引起。前额皱纹消失与不能蹙眉是贝尔面瘫或周围性面瘫的重要临床表现，也是与中枢性面瘫鉴别的主要依据。

26.面瘫的贝尔征是指

- A.用力紧闭眼睑，则眼球转向外上方
- B.患侧口角下垂，健侧向上歪斜
- C.不能鼓腮、吹气
- D.脸裂过大，闭合不全
- E.结膜囊内常有泪腺积滞

答案：A

解析：面瘫的典型症状有：患侧口角下垂，健侧向上歪斜；上下唇因口轮匝肌瘫痪而不能紧密闭合，故发生饮水漏水、不能鼓腮、吹气等功能障碍。上下眼睑不能闭合的原因是由于眼轮匝肌瘫痪后，失去了受动眼神经支配的上睑提肌保持平衡协调的随意动作，致脸裂扩大、闭合不全、露出结膜；用力紧闭时，则眼球转向外上方，此称贝尔征（Bellsign）；由于不能闭眼，故易患结膜炎。在下结膜囊内，常有泪液积滞或溢出，这种

27.下颌阻生牙分类的依据是

- A.对邻牙危害的程度
- B.拔除方法
- C.拔牙并发症
- D.冠周炎发生率
- E.牙在骨内的深度

答案：E

解析：阻生牙根据在颌骨内的深度分为三类。低位：阻生牙的最高部位低于第二磨牙的牙颈部。中位：阻生牙的最高部位低于（牙合）平面，但高于第二磨牙的牙颈部。高位：阻生牙的最高部位平行或高于（牙合）平面。

28.腮腺区包块通常不作术前病理检查，而采取手术时作冰冻检查的主要原因是

- A.重复切口影响美观
- B.患者免受两次手术痛苦



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



C.增加解剖面神经的困难，并且不符合肿瘤 经

治疗原则

C.深叶肿瘤应切除肿瘤及全腮腺，均保留面

D.有面神经不易取标本

神经

E.增加刀口感染机会

D.浅叶肿瘤除切除肿瘤及浅叶保留面神经

答案：C

E.肿瘤及周围部分腮腺组织切除不保留面

解析：腮腺区包块通常不作术前病理检查， 神经

主要是防止肿瘤扩散，及形成不易愈合的涎

答案：D

痿。

解析：多形性腺瘤的治疗为手术切除，不能

作单纯肿瘤摘除，即剝除术，而应作肿瘤包

29.确定腺占位性病变首选的检查方法为

膜外正常组织处切除。腮腺肿瘤应保留面神

A.涎腺平片

经，下颌下腺肿瘤应包括下颌下腺一并切除。

B.涎腺造影术

由于肿瘤常位于腮腺后下，可考虑作连同肿

C.B 超

瘤以及周围 0.5cm 以上正常腮腺切除的腮

D.CT

腺部分切除术。这种手术方式不同于剝除术，

E.磁共振成像（MRI）

不会造成复发，但可保留腮腺导管及大部分

答案：C

腮腺的功能。

解析：B 超可确定涎腺是否有占位性病变，

简捷，价廉，可重复而无损伤。

31.腮腺手术中寻找面神经颊支的解剖标志

是

30.腮腺多形性腺瘤切除术应采取

A.腮腺上缘

A.沿包膜摘除肿瘤，保留面神经

B.腮腺上前缘

B.包膜外正常组织处切除肿瘤，不保留面神

C.腮腺前缘



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D.腮腺导管

E.X 线垂直角度为 0。

E.耳屏前

答案：C

答案：D

解析：

解析：面神经颊支多位于腮腺导管上下

10mmo

34.投照上颌尖牙根尖片时的 X 线中心线应

通过

32.不损伤面神经下颌缘支的下颌下区切口

A.鼻尖

应位于

B.鼻尖与鼻翼连线的中点

A.高于下颌下缘 0.5cm 左右

C.鼻翼

B.低于下颌下缘 0.5~1cm

D.颧骨的前方

C.低于下颌下缘 1.5~2cm

E.额骨的下缘

D.平齐下颌下缘 0.5cm 左右

答案：C

E.低于下颌下缘 2cm 以下

解析：

答案：C

解析：面神经下颌缘支位于下颌下缘约  
1.5mm 处。

35.患者投照根尖片所显示的牙齿邻面影像

木互重叠的原因是

33.投照上颌牙时

A.X 线与被检查牙齿的长轴不平行

A.X 线向头侧倾斜，称为正角度

B.X 线与被检查牙齿的长轴不垂直

B.X 线向头侧倾斜，称为负角度

C.X 线与被检查牙齿的邻面不平行

C.X 线向足侧倾斜，称为正角度

D.X 线与被检查牙齿的邻面不垂直

D.X 线向足侧倾斜，称为负角度

E.正常现象

答案：C



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



解析：

浸润生长，故称为临界瘤。

36.以下关于上颌窦癌的叙述错误的是

38.下列不是茎突过长常见症状的是

A.以鳞癌为最常见

A.吞咽时咽部疼痛

B.早期无症状而不易发觉

B.吞咽时咽部感觉异常

C.早期即有明显的骨质破坏

C.髁突后区疼痛

D.肿瘤发生部位不同可出现不同临床症状

D.颈部牵涉痛

(如鼻塞、复视、开口受限等)

E.开口困难

E.常转移至下颌下及颈上部淋巴结，远处转

答案：E

移较少见

解析：

答案：C

解析：

39.单侧翼外肌痉挛的患者开口型是

A.偏健侧

37.成釉细胞瘤为临界瘤的主要原因是

B.偏患侧

A.来源于牙源性上皮

C.正常

B.瘤体内牙根吸收

D.绞锁

C.瘤体较大

E.无法判断

D.压迫三叉神经引起相应部位麻木

答案：B

E.有局限性浸润生长

解析：翼外肌分上、下两头。上头部较小，

答案：E

起于颞下颌窝和蝶骨大翼的颞下面，部分肌

解析：临界瘤主要是由于其生物学行为介于

纤维止于颞下颌关节囊前部及内；下头部较

良性与恶性肿瘤之间，成釉细胞瘤有局限性

大，几乎呈水平向后止于髁突颈的关节翼肌



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



窝。翼外肌是主要开口肌群之一，翼外肌收缩牵拉髁突向前，产生开口运动。一侧翼外肌痉挛，对侧牵拉，开口型偏向患侧。

42.中腭突未能在一侧或两侧与侧腭突融合，则形成的畸形是

A.腭裂

B.牙槽突裂

C.面横裂

D.面斜裂

E.上唇正中裂

40.目前关节强直的病因一般不包型

A.骨折

B.火器伤

C.Ⅲ度烧伤

D.肿瘤放疗后

E.关节肿瘤

答案：A

解析：

答案：E

解析：

43.一般认为，进行双侧唇裂整复术最合适的年龄是

A.新生儿期

B.1~3个月

C.3~6个月

D.6~12个月

E.1岁以后

41.舌癌好发部位是

A.舌侧缘

B.舌腹

C.舌根

D.舌尖

E.舌背

答案：D

解析：

答案：A

解析：

44.腭裂患者最常出现的继发性牙颌畸形是

A.上颌前突



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





B.小颌畸形

D.在不完全唇裂常可发生患侧过长的现象

C.反(牙合)

E.完全唇裂患侧唇高常显不足

D.偏颌畸形

答案：E

E.下颌前突

解析：

答案：C

解析：腭裂患者可能出现上颌骨发育不足，形成反(牙合)。

47.小唾液腺肿瘤发生最多的部位是

A.唇部

B.颊部

C.舌部

D.口底

E.腭部

45.关于腭裂的临床特点，不正确的是

A.腭部解剖形态的异常

B.伴发唇裂

C.腭裂语音

D.听力降低

E.颌骨发育障碍

答案：E

解析：

答案：B

48.以下唾液腺疾病在青春期后有自愈趋势

解析：

的是

A.急性化脓性腮腺炎

B.儿童慢性复发性腮腺炎

C.流行性腮腺炎

D.舍格伦综合征

E.腮腺良性肥大

46.以下不属于三角瓣法 (Tennison) 手术

矫治单侧唇裂缺点的是

A.要切除部分正常的唇组织

B.三角瓣嵌入上唇下1/3有损正常解剖形态

C.愈合的瘢痕有损正常人中的解剖形态

答案：B



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





解析：

49.腺样囊性癌多见于

A.下颌下腺

B.舌下腺

C.唇腺

D.腭部小腺体

E.皮脂腺

答案：D

解析：

50.关于急性化脓性腮腺炎切开引流指征不

正确的是

A.局部明显凹陷性水肿

B.穿刺有脓液

C.扪及波动感

D.腮腺导管口有脓液排出

E.局部跳痛压痛

答案：C

解析：腮腺筋膜较厚韧，局部脓肿形成后一

般无波动感。

51.下列关于急性化脓性腮腺炎的叙述错误

的是

A.病原菌主要是金黄色葡萄球菌

B.常为单侧受累，双侧同时发生者少见

C.腮腺导管口红肿，可挤压出脓液

D.肿胀以耳垂为中心

E.局部皮肤红热现象不显著

答案：E

解析：急性化脓性腮腺炎局部病变表现为以

耳垂为中心的腮腺肿大，皮肤发红，皮温增

高，明显压痛。

52.OSAHS 的诊断标准是

A.睡眠时口鼻气流停止 $\geq 10$  秒，每小时暂停

加低通气 5 次以上

B.睡眠时口鼻气流停止 $\geq 15$  秒，每小时暂停

加低通气 5 次以上

C.睡眠时口鼻气流停止 $\geq 10$  秒，每小时暂停

加低通气 10 次以上

D.睡眠时口鼻气流停止 $\geq 20$  秒，每小时暂停

加低通气 10 次以上

E.睡眠时口鼻气流停止 $\geq 15$  秒，每小时暂停



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



加低通气 10 次以上

答案：A

解析：

腺的腺样囊性癌可致面瘫。

55.我国最常见引起慢性肾衰竭的病因是

A.糖尿病肾病

B.原发性慢性肾小球肾炎

C.系统性红斑狼疮

D.梗阻性肾病

E.高血压肾病

53.低钾血症是

A.临床上常表现为精神亢奋、肢体抽搐

B.机体总钾量总是减少的

C.心电图表现为 T 波高尖，呈帐篷样

D.常伴有代谢性酸中毒

E.严重时可发生室性心动过速，甚至心手颤

动

答案：B

解析：

答案：E

解析：

56.下列成分最适合需要多次输血而有发热

贫血患者的是

A.浓缩红细胞

B.全血

C.冷冻红细胞

D.少浆血

E.洗涤红细胞

54.易发生面瘫的肿瘤是

A.混合瘤

B.黏液表皮样癌

C.腺泡细胞癌

D.腺样囊性癌

E.沃辛瘤

答案：D

解析：腺样囊性癌常沿神经扩散，发生在腮

57.所谓有效循环血量是指



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A.在微循环内的总血量

B.肾上腺素

B.全身总血量

C.胰高血糖素

C.单位时间内通过心血管系统进行循环的

D.去甲肾上腺素

血量

E.抗利尿激素

D.在动脉内的血量

答案：A

E.在静脉内的血量

解析：

答案：C

解析：

60.预防破伤风最有效、最可靠的方法是

58.急性肾衰竭无尿或少尿期早期，发生水

A.彻底清创

中毒的常见原因是

B.应用青霉素

A.低蛋白血症

C.注射 TAT

B.内生水过多

D.注射破伤风人免疫球蛋白

C.抗利尿激素增加

E.注射破伤风类毒素

D.钠潴留

答案：E

E.不适当输入过多水分

解析：

答案：E

61.深度烧伤的临床表现，下列错误的是

解析：

A.有时在大腿可见树枝状栓塞血管

59.创伤、感染后的神经-内分泌反应，导致

B.创面多有水疱

分泌减少的激素是

C.创面痛觉迟钝

A.胰岛素

D.如无感染，创面 3~4 周愈合

E.愈合后多有增生性瘢痕



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



答案：A

解析：

62. 下列烧伤急救原则中，正确的是

A. 凡有呼吸道烧伤，一律作气管切开

B. 凡有烧伤者，一律用哌替啶止痛

C. 热液烫伤者，不能用较干净冷水浸泡

D. 应就地给予清创

E. 立即消除烧伤原因

答案：E

解析：

63. 下列结节性甲状腺肿的手术适应证，错

误的是

A. 有压迫症状

B. 伴有甲亢

C. 病史较长者

D. 疑有癌变

E. 胸骨后甲状腺肿

答案：C

解析：

64. 凡有创伤史者，遇有下列情况均应疑有

腹内脏器损伤，除外

A. 伤后早期出现休克征象

B. 伤后有明显腹膜刺激征

C. Grey-Turner 征

D. 有气腹表现

E. 腹部出现移动性浊音

答案：D

解析：气腹是腹腔内存在游离气体的现象，多由胃肠道穿孔等所致。

65. 腹腔穿刺抽出凝固的血液提示

A. 腹膜后血肿

B. 出血性胰腺炎

C. 肝、脾破裂

D. 腹腔内积血

E. 抽出为血管内血液

答案：E

解析：

66. 《执业医师法》适用于

A. 医疗机构中工作的人员



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



B.保健机构中的医务人员

A.医疗后勤服务

C.乡村医生

B.医疗卫生技术

D.计划生育技术服务机构的医师

C.医院安全保卫

E.疾病预防控制机构的医生

D.医院财务审计

答案：D

E.医疗器械采购

解析：医师是指依法取得执业医师资格或者  
执业助理医师资格，经注册在医疗、预防或  
者保健机构（包括计划生育技术服务机构）  
中执业的专业医务人员。

答案：B

解析：

67.医师在执业活动中，按执业规则可以

69.发生以下重大医疗过失行为时，医疗机  
构应向所在地卫生行政部门报告

A.发现患者非正常死亡时，向有关部门报告

A.可能是二级医疗事故的

B.经医院批准后，进行实验性临床医疗

B.可能是三级医疗事故的

C.在医院的 service 范围内出具医学证明文件

C.患者因病死亡的

D.使用祖传的特效药为患者治疗

D.导致一人人身损害后果的

E.发现传染病疫情时按规定向当地人民政  
府报告

E.导致两人人身损害后果的

答案：A

解析：

答案：A

解析：

70.根据母婴保健法，婚前医学检查的主要  
内容是指

68.《医疗机构管理条例》规定，医疗机构  
不得使用非卫生技术人员从事的工作为

A.进行性卫生知识、生育知识的教育

B.进行遗传病知识的教育



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



C.对有关婚配问题提供医学意见

A.由患儿家属申请并签字同意

D.对有关生育保健问题提供医学意见

B.由经治医师申请并经患儿家属签字同意

E.对严重遗传疾病、指定传染病等的检查

C.由主治医师申请并经患儿监护人同意

答案：B

D.由经治医师申请并经主治医师批准

解析：根据新修订的《传染病防治法》应强

E.由主治医师申请并经患儿家属签字同意

调该“隔离治疗”为“单独隔离治疗”，故 B

答案：B

选项描述不准确。

解析：

71.医疗机构发现甲类传染病时应当采取下列措施，除外

73.行为主义理论认为心理障碍的心理学原因是

A.对患者予以隔离治疗

A.不良的认知模式

B.对疑似患者，确诊前在指定场所隔离治疗

B.潜意识内的心理冲突

C.拒绝隔离治疗的由公安机关协助采取强制隔离治疗措施

C.获得性学习结果

D.个人成长受到阻抑

D.对病原携带者在指定场所进行医学观察和采取必要的预防措施

E.心理-神经-内分泌-免疫机制作用

E.对医疗机构内的疑似患者的密切接触者，

答案：C

解析：

在指定场所进行医学观察

答案：B

74.在医学心理学的主要理论学派中，“第三势力”是指

解析：

三势力”是指

A.精神分析理论

72.新生儿溶血病如需要换血疗法的

B.心理生理论



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





C.认知学派理论

答案：B

D.人本主义学派

解析：

E.行为学派

答案：D

77.错误的心理治疗概念是

解析：

A.治疗家受过严格训练

B.劝说是基本技能

75.人对客观现实稳定的态度和与之相适应

C.以医学心理学的某种理论体系为指导

的习惯化的行为方式是指

D.治疗的关键是帮助患者发展自己

A.态度

E.是特殊的人际关系

B.行为

答案：B

C.性格

解析：

D.气质

E.能力

78.最常见和有效的心理咨询方式是

答案：C

A.院内咨询

解析：

B.门诊咨询

C.信件咨询

76.自我意识和自然人成为社会人标志着

D.专栏咨询

A.情绪成熟

E.电话咨询

B.人格形成

答案：B

C.自我实现

解析：

D.性格成熟

E.理想我的形成

79.手术前患者最常见的情绪反应是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





A.抑郁

D.研究科学道德或科学哲学的学科

B.焦虑

E.研究医疗人际关系的学科

C.敌意

答案：B

D.愤怒

解析：

E.绝望

答案：B

81.医疗伤害带有一定的

解析：

A.可控性

B.必然性

82.医德修养的方法是

C.可预见性

A.积极参加医院的各种政治学习

D.责任性

B.让领导多督促自己

E.可知性

C.让同事多提醒自己

答案：E

D.让患者多监督自己

解析：

E.追求慎独

答案：C

83.人体试验

解析：

A.只要医学研究需要就可进行

B.只要经过大量、可靠的动物实验后就可进行

80.医学伦理学是

行

A.研究人与人之间关系的科学

C.只要课题组论证充分就可进行

B.研究人与社会之间关系的科学

D.只要在专家组的监督下就可进行

C.研究医务人员的医德意识和医德活动的

E.只要课题组上报完整、严谨的报告，经专

科学

家组及上级主管部门经规定程序审批后就



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



可进行

C.2年后

答案：E

D.3个月后

解析：

E.3年后

答案：E

84.生殖技术的合理使用必须遵循维护社会公益原则，其中规定同一供精者的精子最多只能

解析：为避免颌骨骨坏死，颌面部放疗后一般3~5年进行拔牙。

A.提供给2名妇女受孕

86.患者，男，38岁。要求拔除左下水平低位埋伏阻生智牙。此时不正确的处理是

B.提供给3名妇女受孕

A.X线片检查

C.提供给4名妇女受孕

B.行下牙槽神经麻醉

D.提供给5名妇女受孕

C.舌侧翻瓣

E.提供给6名妇女受孕

D.术后仔细清理牙槽窝

答案：D

E.术后口服抗生素

解析：

答案：C

85.患者，男，40岁。诉左下颌后牙有洞1年求补。无明显自觉症状，患者1周前刚完

解析：

成；肿瘤放疗疗程。口腔检查：左下第一磨牙残冠，已穿髓底，无法牙体修复，建议拔除。拔牙时机应选择在

87.患者，男，40岁。诉左上颌后牙出现咬合痛7天求治。口腔检查：左上第一磨牙近远中向纵折，松动I度，叩诊(+)，牙龈稍

A.半年后

红肿。拟局麻下拔除，采用的麻醉方法是

B.1年后

A.上牙槽后神经阻滞麻醉+眶下神经阻滞麻



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



醉

E.翼下颌间隙感染

B.上牙槽后神经阻滞麻醉+腭前神经阻滞麻

答案：C

醉

解析：

C.上牙槽后神经阻滞麻醉+近中颊根局部浸

润麻醉

89.患者，男，40岁。右咽旁间隙脓肿，切

D.上牙槽后神经阻滞麻醉+近中颊根局部浸

开引出大量灰白色稀薄腐臭脓液，此为何

润麻醉+眶下神经阻滞麻醉

种感染所致

E.上牙槽后神经阻滞麻醉+近中颊根局部浸

A.大肠埃希菌

润麻醉+腭前神经阻滞麻醉

B.变异链球菌

答案：E

C.混合性感染

解析：

D.肺炎双球菌

E.铜绿假单胞菌

88.患者，男，50岁。诉左上颌后牙出现肿

答案：C

痛1周，张口困难3天。口腔检查：左上第

解析：

二磨牙残冠，叩诊(++)；颊侧前庭沟稍变

浅。仔细检查后发现额弓上下及下颌支后方

90.患者，女，35岁。因智牙冠周炎造成额

稍肿，有深压痛，张口受限(1横指)。拟

间隙、颞下间隙、翼下颌间隙脓肿，切开引

诊断为

流的最佳部位是

A.眶下间隙感染

A.于上颌结节外侧前庭沟切开

B.颞间隙感染

B.于翼下颌韧带稍内侧切开

C.颞下间隙感染

C.于口内咽旁部切开

D.颊间隙感染

D.于颞部及下颌角下方切开并行贯通引流



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E.于颞部切开

答案：D

解析：

D.腮腺血管瘤

E.腮腺囊肿

答案：B

解析：腮腺腺淋巴瘤又称沃辛瘤，好发于老

91.一患者头面部外伤，昏迷约 5 分钟后清

醒，对当时情况不能回忆。主述头痛、头昏，

检查无神经系统阳性体征。其诊断应该是

A.脑挫裂伤

B.脑震荡

C.硬膜外血肿

D.颅底骨折

E.脑膜炎

答案：B

解析：

年男性，位于腮腺后下极，无痛性肿物。

93.患者，男，78 岁。左下颌后牙黏膜出现

破溃疼痛 1 年。口腔检查：|67 残冠，颊侧

黏膜上有一个直径 1.5cm 的深溃疡，周围

硬，边缘不齐，底部呈菜花状，扪诊基底部

有在结。触诊下颌下淋巴结肿大。为明确诊

断，最佳辅助诊断方法是

A.X 线片检查

B.刮片检查

C.结核菌素试验

D.活体组织病理学检查

E.超声体层检查

92.患者，男，60 岁。左耳垂下无痛性肿物

缓慢长大 4 年，局部有胀感。检查见肿块位

于腮腺后下极，表面光滑，质中偏软，不可

压缩，与皮肤无粘连。最可能的诊断是

A.腮腺混合瘤

B.腮腺腺淋巴瘤

C.腮腺内慢性淋巴结炎

答案：D

解析：

94.患者，女，50 岁。单侧腮腺无痛性进行

性肿大 6 年。有类风湿关节炎史，γ球蛋白



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



增高，活检有大量淋巴细胞。最可能的诊断

是

A.慢性化脓性腮腺炎

B.舍格伦综合征

C.腮腺多形性腺瘤

D.腮腺淋巴结核

E.腮腺放线菌病

答案：B

解析：舍格伦综合征好发于中老年女性，最常见伴发类风湿关节炎，最常见于腮腺。

96.患儿，男，9岁。舌体外伤出现部分组织

缺损，处理原则是

A.细针细线缝合

B.缝合不宜过深过宽

C.保持舌体长度

D.保持舌体宽度

E.保持舌体厚度

答案：C

解析：尽量保持舌的长度，以免影响发音。

95.患者，男，58岁。行舌大部分切除术，舌体缺损采用左前臂皮瓣游离血管吻合移植，皮瓣转移术后24小时出现皮瓣苍白发

凉、起皱。其原因是

A.静脉淤血

B.静脉缺血

C.动脉淤血

D.动脉缺血

E.动静脉同时淤血

答案：D

解析：

97.患者，男，55岁。要求拔除左上后牙残根。投照左上颌第二磨牙根尖片后，腭侧根与上颌窦底影像重叠，可根据下列哪种征象

判断牙根是否位于上颌窦内

A.上颌窦是否过大

B.上颌窦底是否突入牙根之间

C.垂直角度是否过大

D.牙周膜及骨硬板是否连续

E.根尖周是否密度减低

答案：D

解析：



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



根据患者年龄、疼痛部位、疼痛性质、疼痛

98.患者颈部外伤2周，现患者开口受限，  
拟排除髁突颈部骨折，X线检查首选片位是

- A.曲面体层
- B.下颌骨后前位
- C.下颌骨开口后前位
- D.华特位
- E.下颌升支切线位

答案：C

解析：

99.患者，男，50岁。颊部黏膜处反复出现  
电击、针刺样疼痛，每次持续数十秒，其诊  
断首先考虑是

- A.牙痛
- B.偏头痛
- C.三叉神经痛
- D.颞下颌关节疾患
- E.舌咽神经痛

答案：C

解析：三叉神经痛表现为三叉神经支配区域

电击样、针刺样剧烈疼痛，疼痛持续时间短。

时间，应首先考虑三叉神经痛。

100.患者，女，19岁。张口受限十余年，  
幼时有左侧中耳炎病史。查体：开口度不足  
1指，左侧下颌体小、面部丰满，右侧下颌  
狭长。此患者最可能的诊断是

- A.左颞下颌关节强直
- B.右颞下颌关节强直
- C.右髁突肥大
- D.左髁突肥大
- E.双侧关节强直

答案：A

解析：

101.患儿，3个月。二侧上唇部分裂开，但  
未裂至鼻底，其唇裂的分类应为

- A.I度
- B.II度
- C.III度
- D.隐性唇裂
- E.混合型唇裂



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院





答案：B

解析：

E.腺小叶内淋巴细胞浸润，腺实质萎缩，导管扩张

答案：E

102.患者，男，37岁。右下颌下区胀痛2

解析：

周，进食时痛加剧，继而可减轻。该患者体

检中最可能发现的是

A.开口困难

B.下颌下区波动

C.下颌舌沟隆起、舌上抬

D.下颌下腺导管口唾液分泌增多

E.可扪及下颌下腺导管结石

答案：E

解析：

104.患者，女。因患左舌下腺囊肿于门诊行

左舌下腺及囊肿摘除术，术后第2天左下颌

下区发生肿胀，且进食时明显。最可能的原

因是

A.因左舌下腺囊肿口外型，口外部分未处理

所致

B.因左下颌下腺导管结石所致

C.因前日术中误扎左下颌下腺导管所致

D.左下颌下淋巴结反应性肿胀

E.因急性左下颌下腺炎症所致

103.患者，女，56岁。双侧腮腺肿大，口、

眼干燥5年，类风湿关节炎3年，口内导管

口无唾液分泌。该患者行唇腺活检支持舍格

伦综合征的表现，其镜下主要表现为

A.无明显组织病理学改变

B.大量散在淋巴细胞浸润

C.大量单核细胞浸润

D.明显的组织变性、坏死

答案：C

解析：根据患者症状判断，应是下颌下腺导

管阻塞症状，误扎导管最可能。

105.患者，男，26岁。十二指肠残端瘘20

天。目前进食少，全身乏力，直立时晕倒。

血清[K<sup>+</sup>]3mmol/L，[Na<sup>+</sup>]125mmol/L。



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





其水盐代谢失调应为

答案：D

A.低钾血症，高渗性缺水

解析：

B.高钾血症，重度低渗性缺水

C.低钾血症，等渗性缺水

107.患者，女，70岁。急性心肌梗死。查

D.低钾血症，中度低渗性缺水

血压 83/60mmHg，中心静脉压

E.低渗性缺水

20cmH<sub>2</sub>O(1.96kPa)。应首先采取的措施是

答案：D

A.应用呋塞米

解析：血清正常钾离子浓度为

B.应用毛花苷丙

3.5~5.5mmol/L，正常钠离子浓度为

C.应用激素

135~145mmol/L；低于130mmol/L称为

D.适当补液

中度低钠血症。

E.继续观察

答案：D

106.患者，男，24岁。因外科疾患入院，

解析：

腹痛甚。查体：体温 38.5，血压

90/60mmHg，呼吸 30次/min，血

108.患者，女，26岁。首次妊娠2个月余，

HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 14mmol/L。产生上述改变的常见原

伴甲亢。查体：甲状腺肿大，有轻度压迫症

因不包括

状。最合适的治疗是

A.急性弥漫性腹膜炎

A.抗甲状腺药物治疗

B.感染性休克

B.手术(甲状腺大部切除)治疗

C.长期不能进食

C.终止妊娠加手术治疗

D.持续大量呕吐胃内容物

D.终止妊娠加抗甲状腺药物治疗

E.急性肾衰竭少尿期

E.终止妊娠加<sup>131</sup>I治疗





答案：B

B.颅面分离

解析：

C.复视

D.局部水肿

109.何某因意外事故受伤被同事送到医院

E.张口受限

抢救，何某被送到医院时已昏迷，此时何某

答案：A

急需输血治疗，但其家人还未赶到医院。对

解析：颅底部硬脑膜与颅底粘连紧密，颅底

何某输血时采取的以下措施，符合临床输血

硬脑膜和蛛网膜之间又多纤维性粘连，骨折

技术规范的是

常伴有硬脑膜及蛛网膜撕裂，易发生脑脊液

A.报何某所在单位同意、备案，并记入病历

漏，故脑脊液漏多发生于颅底骨折，脑脊液

B.在何某家人赶到同意后再输血

经由鼻腔、耳道或开放创口流出，是颅脑损

C.报医院主管领导同意、备案，并记入病历

伤的严重合并症，可导致颅内感染。

D.报经治医师所在科室主任同意、备案，并

记入病历

111.额弓骨折常伴有

E.由何某同事同意并签字、备案，并记入病

A.脑脊液漏

历

B.颅面分离

答案：C

C.复视

解析：无家属签字的无自主意识患者紧急输

D.局部水肿

血，应报医院职能部门或主管领导同意、备

E.张口受限

案，并记入病历。

答案：E

解析：额骨是上颌骨和颅骨之间的主要连接

110.颅底骨折常伴有

支架，对构成面部的外形具有重要作用。额

A.脑脊液漏

骨、额弓骨折内陷，移位骨折片压迫颞肌或



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



阻挡喙突运动，可发生张口困难。

的骨折如累及眶下壁，常引起眼球下降，以致左右眼球不在同一水平面而发生复视。

112. LeFort II型骨折常伴有

- A. 脑脊液漏
- B. 颅面分离
- C. 复视
- D. 局部水肿
- E. 张口受限

答案：B

解析：上颌骨 LeFort II型骨折的骨折位于上颌骨的上薄弱线，其临床特点主要表现为将形成完全的颅面分离，使面中部凹陷、变长，严重影响面形。

113. 颧上颌骨折常伴有

- A. 脑脊液漏
- B. 颅面分离
- C. 复视
- D. 局部水肿
- E. 张口受限

答案：C

解析：上颌骨是眶下壁的组成部分，上颌骨

114. 眶底骨折常伴有

- A. 脑脊液漏
- B. 颅面分离
- C. 复视
- D. 局部水肿
- E. 张口受限

答案：C

解析：眶底骨质薄弱，主要由上颌骨眶突即上颌窦上壁构成。眶底骨折时，眼下直肌嵌顿于骨折缝隙可致复视，两眼向上看时出现此症，常于急性反应消退后出现。眼球向下移位也是引起复视的原因之一。

115. 表现为髁突密质骨板下有较大的低密度影，周围有硬化边缘

- A. 髁突硬化
- B. 髁突前斜面模糊不清
- C. 髁突骨质增生
- D. 髁突小凹陷缺损



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E.髁突囊样变

答案：E

解析：

118.中性分叶核粒细胞

A.0.03~0.08(3%~8%)

B.0.50~0.70(50%~70%)

116.表现为髁突边缘呈唇样或骨赘形成

C.0.20~0.40(20%~40%)

A.髁突硬化

D.0.005-0.05(0.5%~5%)

B.髁突前斜面模糊不清

E.0.01-0.05(1%~5%)

C.髁突骨质增生

答案：B

D.髁突小凹陷缺损

解析：

E.髁突囊样变

答案：C

119.嗜酸性粒细胞

解析：

A.0.03~0.08(3%~8%)

B.0.50~0.70(50%~70%)

117.表现为髁突前斜面骨质不规则增厚、密

C.0.20~0.40(20%~40%)

度增高

D.0.005-0.05(0.5%~5%)

A.髁突硬化

E.0.01-0.05(1%~5%)

B.髁突前斜面模糊不清

答案：D

C.髁突骨质增生

解析：

D.髁突小凹陷缺损

E.髁突囊样变

120.淋巴细胞

答案：A

A.0.03~0.08(3%~8%)

解析：

B.0.50~0.70(50%~70%)



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



C.0.20~0.40(20%~40%)

解析：

D.0.005-0.05(0.5%~5%)

E.0.01-0.05(1%~5%)

123.代谢性碱中毒

答案：C

A. $[\text{HCO}_3^-]$ ↓, pH↓, PaCO<sub>2</sub> 正常

解析：

B. $[\text{HCO}_3^-]$ ↑, pH↑, PaCO<sub>2</sub> 正常

C. $[\text{HCO}_3^-]$ 正常, pH↓, PaCO<sub>2</sub>↑

121.单核细胞

D. $[\text{HCO}_3^-]$ 正常, pH↓, PaCO<sub>2</sub>↓

A.0.03~0.08(3%~8%)

E. $[\text{HCO}_3^-]$ ↓, pH↑, PaCO<sub>2</sub>↓

B.0.50~0.70(50%~70%)

答案：E

C.0.20~0.40(20%~40%)

解析：

D.0.005-0.05(0.5%~5%)

E.0.01-0.05(1%~5%)

124.大面积皮肤剥脱伤需

答案：A

A.清创及一期缝合

解析：

B.清创后不予缝合

C.清创及植皮

122.呼吸性碱中毒

D.清创后缝合

A. $[\text{HCO}_3^-]$ ↓, pH↓, PaCO<sub>2</sub> 正常

E.清创后不植皮

B. $[\text{HCO}_3^-]$ ↑, pH↑, PaCO<sub>2</sub> 正常

答案：C

C. $[\text{HCO}_3^-]$ 正常, pH↓, PaCO<sub>2</sub>↑

解析：大面积皮肤剥脱伤,由于皮下组织分

D. $[\text{HCO}_3^-]$ 正常, pH↓, PaCO<sub>2</sub>↓

离,创伤区积液,容易发生感染及皮肤坏死,

E. $[\text{HCO}_3^-]$ ↓, pH↑, PaCO<sub>2</sub>↓

应当行翻转植皮术,否则后果严重。

答案：A



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



125.受伤 6~8 小时内的战地伤口应

D.依法追究刑事责任

A.清创及一期缝合

E.依法承担赔偿责任

B.清创后不予缝合

答案：E

C.清创及植皮

解析：

D.清创后缝合

E.清创后不植皮

127.医疗机构负责人收受药品生产企业给予的财物的

答案：B

解析：伤口的处理原则：对感染伤口（包括污染严重的伤口及战地伤口）一般只行清创术，

A.由卫生行政部门给予处分，没收违法所得

以后视伤口情况或延期缝合或开放引流。对

B.由工商行政管理部门处 1 万元以上 20 万

污染伤口若在 8 小时以内均行清创后一期

C.由卫生行政部门吊销其执业证书

缝合，这一原则也适于血运丰富的头面部受

D.依法追究刑事责任

伤时间在 48 小时以内者。污染伤口若在

E.依法承担赔偿责任

12~24 小时以内者则行清创术并一期缝合，

答案：A

伤口内放置胶片引流。

解析：

126.医疗机构违反法律规定，给药品使用者

128.医疗机构在药品购销中暗中给予、收受

造成损害的

回扣或者其他利益的

A.由卫生行政部门给予处分，没收违法所得

A.由卫生行政部门给予处分，没收违法所得

B.由工商行政管理部门处 1 万元以上 20 万

B.由工商行政管理部门处 1 万元以上 20 万

元以下的罚款

元以下的罚款

C.由卫生行政部门吊销其执业证书

C.由卫生行政部门吊销其执业证书



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





D.依法追究刑事责任

E.应用抗生素

E.依法承担赔偿责任

答案：B

答案：B

解析：

解析：

131.可能发生的术中并发症不包括

129. ( 129-131 题共用题干 ) 患者，男，

A.出血

34 岁。左上第三磨牙阻生颊侧移位，要求

B.断根

拔除。行上牙槽后神经阻滞麻醉后左面颊部

C.牙槽骨骨折

立即肿胀。可能的诊断是

D.邻牙损伤

A.注射麻药过量

E.干槽症-

B.翼静脉丛损伤

答案：E

C.颊间隙感染

解析：

D.注射区水肿

E.超敏反应

答案：B

132. ( 132-135 题共用题干 ) 患者，男，

解析：

45 岁。诉左下颌后牙出现不适 6 个月求治。

口腔检查：左下第二前磨牙和第一磨牙残冠，

叩诊 ( ± )，松动度 ( - )，已做过牙髓治疗，

130.发生上述情况时，处理不迎的是

牙龈稍红，无法再修复，拟拔除。口内其他

A.立即冰敷

牙未见明显异常。X 线片示：左下第一磨牙

B.立即热敷

远中根尖有阴影，距离下颌神经管较近。拔

C.加压包扎

除左下第二前磨牙和第一磨牙时不需麻醉

D.应用止血药

的神经是



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院





A.下牙槽神经

B.舌神经

C.咬肌神经

D.颊神经

E.后牙槽神经

答案：C

解析：

133.左下第二前磨牙和第一磨牙拔除时断

根颊侧切开去骨后取出，2 天后出现剧烈步

痛，并向耳颞部、下颌下区放散。口内才查：

左下第二前磨牙和第一磨牙牙槽窝；腐败变

性的残留血凝块，有恶臭。引起疼痛的原因

是

A.下颌神经损伤

B.干槽症

C.邻牙损伤

D.邻牙牙髓炎

E.牙龈撕裂

答案：B

解析：

134.最佳应急处理方法是

A.局麻下彻底去除牙槽窝内腐败物洗后填

入碘仿纱条

B.服用大量抗生素

C.消炎漱口液含漱

D.局部封闭止痛

E.服用止痛药

答案：A

解析：

135.假如处理 7 天后疼痛消失，但左侧口颊

部麻木感，为确定诊断应做

A.牙槽窝探查

B.拍 X 线片

C.邻牙探诊

D.局麻定位检查

E.拍小视野 CT

答案：B

解析：

136.（136-138 题共用题干）患者，男，

32 岁。6 天前感冒后出现左下后牙区胀痛，



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



进食、吞咽时加重。昨日起出现局部自发性

答案：D

跳痛，张口受限，低热，头痛。检查可见左

解析：

下颌角区颊部稍肿胀，无压痛，张口度两指；

左下第三磨牙近中阻生，牙龈红肿充血，挤

138.患者如出现明显张口受限，面部肿胀不

压可见远中盲袋内少量脓液溢出，颊侧前庭

明显，仅口外升支后缘稍红肿、压痛明显，

沟丰满、充血，压痛明显、叩诊（-），无松

此时应怀疑合并

动；咽侧壁稍充血，无压痛。此患者的正确

A.翼下颌间隙感染

诊断为

B.咬肌间隙感染

A.根尖周脓肿

C.咽旁间隙感染

B.左咬肌间隙感染

D.下颌下间隙感染

C.急性根尖周炎

E.颞间隙感染

D.急性智牙冠周炎

答案：A

E.左咽旁间隙感染

解析：

答案：D

解析：

139.（139～142题共用题干）患者，男，

63岁。颊癌术后7年，术后曾行颈部及下

颌下区放疗，剂量不详。3个月前出现下颌

牙龈溃疡，经久未愈且局部骨外露伴下颌区

域针刺剧痛。此患者可能的诊断为

A.下颌牙龈癌

B.放射性颌骨坏死

C.中央性颌骨骨髓炎

137.颊侧肿胀原因为

A.根尖周脓肿

B.牙周脓肿

C.根尖周囊肿继发感染

D.炎症流注引起

E.颊间隙感染引起



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D.边缘性颌骨骨髓炎

C.三叉神经撕脱术

E.原发性三叉神经痛

D.在死骨边缘的正常骨内行死骨切除

答案：B

E.局部方块切除

解析：由于该患者舌癌术后行放射治疗，且

答案：D

局部骨外露伴下颌区域针刺样剧痛，因而可

解析：清除死骨时需将死骨边缘的正常骨内

诊断为放射性颌骨坏死。

残留病灶彻底清除干净，以防病变再发的可能。

140.对此患者疾病治疗有意义的方法是

A.高压氧治疗

142.口腔颌面部软组织对放射线平均耐受

B.局部放疗

量约为 6~8 周给予

C.全身化疗

A.20~40Gy

D.射频治疗

B.40~60Gy

E.切开引流

C.60~80Gy

答案：A

D.80~100Gy

解析：高压氧可提高局部组织的含氧量，促

E.100Gy 以上

进病变区域血液循环，加快坏死骨块的分离，

答案：C

有利于创伤愈合。

解析：

141.此患者如进行手术治疗应选择的术式

143.（143-146 题共用题干）患者，男，

为

65 岁。X 线片、造影显示颞下颌关节盘穿

A.待死骨分离后摘除死骨

孔清质破坏、吸收，关节盘不可复前移位。

B.行骨髓炎刮治术

关节盘穿孔常见部位是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A.关节盘中间带

E.弹响

B.关节盘前带

答案：C

C.关节盘后带

解析：不可复性关节盘移位患者多数有开口

D.关节盘双板区

受限。

E.任一部位

答案：D

146.应首先采取的措施是

解析：

A.关节镜检查穿孔部位

144.其开口型最有可能出现的改变是

B.手术修复穿孔

C.观察不处理

A.开口型偏患侧

D.保守治疗

B.开口型偏健侧

E.调(牙合)治疗

C.开口型不偏

答案：D

D.开口型歪曲

解析：

E.牙关紧闭

答案：A

147. ( 147-148 题共用题干 ) 患儿，9 岁。

解析：

出生时左侧唇腭部裂开，曾行唇腭裂手术。

现检查口内见左侧牙槽突部分裂开，腭部瘢痕明显。牙槽突裂修补的最佳时间为

145.其临床症状一般不龃

A.关节痛

A.2~4 岁

B.张口受限

B.6~8 岁

C.开口度过大

C.9~11 岁

D.咀嚼痛

D.12-14 岁



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E.16 岁以后

术后无疼痛不适，不影响功能。

答案：C

解析：牙槽突裂植骨多选择在9~11岁之间，尖牙萌出以前，尖牙牙根已形成1/2~2/3时。此时，上颌骨发育的高峰期已过，上颌骨发育已基本完成，可减轻手术时上颌骨生长发育的影响；在尖牙未萌出前植骨，可使尖牙线获得足够的骨基质支持，并通过植骨区萌出，刺激新骨生成，增加发育不良的牙槽突裂区牙槽嵴高度。还可使萌出牙获得良好的牙周支持。

148.若需植骨，最常用的骨源是

A.下颌骨

B.髂骨

C.肋骨

D.腓骨

E.颅骨

答案：B

解析：牙槽突裂植骨的骨源多选用髂骨性质骨。供区选用髂骨，主要是因为髂骨松质骨骨源丰富，易于采集，取骨方便，切口隐蔽，

149.（149-150题共用题干）患者，男，45岁。因上吐下泻住进某医院，每天静脉途径给庆大霉素24万U，共9天。近5天来无尿，眼结膜水肿，腹水，下肢水肿。实验室检查：BUN42mmol/L，血清肌酐1.04mmol/L，血清钾6.8mmol/L。应诊断为

A.庆大霉素过敏反应

B.庆大霉素肾中毒，导致急性肾衰竭

C.双输尿管结石梗阻

D.前列腺肥大

E.原发病导致失水

答案：B

解析：

150.最好的治疗方法是

A.5%碳酸氢钠溶液静脉注射

B.10%葡萄糖酸钙溶液静脉注射

C.离子交换树脂及山梨醇保留灌肠

D.大剂量呋塞米静脉注射



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



微信搜一搜



金英杰口腔学院

E.透析疗法

答案：E

解析：



金英杰口腔学院



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院