

1. 答案 C
2. 答案 A
3. 答案 A
4. 答案 C
5. 答案 C
6. 答案 C
7. 答案 D
8. 答案 A



病史采集 总分 15 分

评分标准	总分 15 分	
一. 问诊内容 13 分	13 分	
(一) 现病史		
1. 根据主诉及相关鉴别询问	10 分	
(1) 发病诱因: 有无剧烈运动、负重、久坐、受凉、咳嗽、用力排便		1 分
(2) 腰痛: 具体部位、性质、程度、起病缓急, 演变过程, 加重或缓解因素		1 分
(3) 左下肢放射痛: 具体部位、性质、程度、范围, 加重或缓解因素		2 分
(4) 伴随症状: 有无发热、盗汗, 有无下肢麻木、无力、间歇性跛行		2 分
2. 诊疗经过		
(1) 是否曾到医院就诊, 做过哪些检查: 腰椎 X 线片(或 CT、MRI)		1 分
(2) 治疗情况: 是否用过止痛药物或牵引按摩治疗, 疗效如何		1 分
3. 一般情况: 发病以来饮食、睡眠、大小便及体重变化情况		1 分
(二) 其他相关病史	3 分	
1. 有无药物过敏史, 预防接种史		0.5 分
2. 与该病有关的其他病史: 有无结核、外伤、肿瘤病史, 有无手术史, 职业特点及生活习惯, 月经与婚育史		2.5 分
二. 问诊技巧	2 分	
1. 条理性强, 能抓住重点		1 分
2. 能够围绕病情询问		1 分

病例分析 总分 22 分

评分标准	总分 22 分	
一、初步诊断	5 分	

1.右侧张力性气胸		4分
2.右肺损伤		1分
二、诊断依据(初步诊断错误, 诊断依据不得分)	5分	
1.右侧张力性气胸		
(1)右胸外伤史, 严重呼吸困难, 口唇发绀		1分
(2)呼吸频率、心率明显加快		1分
(3)皮下气肿, 右肺叩诊鼓音, 右肺呼吸音消失		1分
(4)胸部X线示: 右肺气胸, 右肺被完全压缩		1分
2.右肺损伤		
(1)胸部外伤史		0.5分
(2)咯血		0.5分
三、鉴别诊断	4分	
1.开放性气胸		2分
2.自发性气胸		2分
四、进一步检查	4分	
1.诊断性胸腔穿刺		2分
2.病情稳定后行胸部CT		2分
五、治疗原则	4分	
1.即行右侧胸腔穿刺减压或闭式引流		1分
2.使用抗生素防止感染		0.5分
3.止痛		1分
4.保持呼吸道通畅、吸氧		1分
5.必要时行开胸探查		0.5分

第二站 体格检查 总分 20 分

评分标准	总分 20 分	
一、眼集合反射(须口述检查内容, 须报告检查结果)	4分	
一、检查方法正确, 动作规范		
1.嘱被检者注视 1 米外目标(通常用考试的示指尖), 将目标缓慢移近距离被检者眼球约 5 ~ 10 cm 处, 观察眼球辐凑活动		1分
2.嘱被检者注视距离 1 米外目标, 将目标物快速移近距离被检者眼球约 5 ~ 10 cm 处, 观察瞳孔变化		1分
二、检查结果正确		
1.报告受检者情况		1分
2.正常表现:随目标移近, 正常人表现为眼球内聚, 瞳孔缩小		1分
二、腹壁紧张度、腹部压痛、反跳痛检查(须告知检查结果)	6分	
一、考生站位正确, 告知被检者体位、姿势正确		
1.检查者取仰卧位, 双腿屈曲, 腹部放松, 检查者站在被检者的右侧		0.5分
二、检查方法正确, 动作规范		
1.腹壁紧张度		
①考生先将全手掌放于被检者腹壁上, 让被检者适应片刻, 此时可感受被检者腹壁紧张程度, 然后以轻柔动作开始触诊		1分

②检查完一个区域后，考生的手应提起并离开腹壁，再以上述手法检查下一区域		0.5 分
③一般先从左下腹开始，逆时针方向进行触诊，最后检查病痛部位		0.5 分
2.腹部压痛、反跳痛		1 分
①考生先将全手掌放于被检者腹壁上，让被检者适应片刻，然后用手指指腹压于腹壁，检查被检者有无疼痛反应		1 分
②当出现疼痛时，手指在原处停留片刻		1 分
③然后迅速将手指抬起，观察被检者疼痛有无骤然加重		1 分
三、口述检查结果正确	0.5 分	
1.报告检查结果:有无腹壁紧张和压痛、反跳痛(正常人腹软，无腹部压痛和反跳痛)		0.5 分
三、腹股沟淋巴结检查(须报告检查结果)	4 分	
一、考生站位正确，告知被检者体位、姿势正确		
1.告知被检者取仰卧位，下肢自然伸直，暴露腹股沟区，考生位于被检者右侧		1 分
二、检查部位		
1.主要检查上下群		
①上群位于腹股沟韧带下，与韧带平行排列		1 分
②下群位于大隐静脉的上段，沿静脉走向排列		1 分
三、检查方法		
1.考生三指(示、中、环指)并拢		0.5 分
2.手指指腹紧贴腹股沟检查部位皮肤，由浅入深进行滑动触诊		1 分
3.左右腹股沟淋巴结均应进行检查		1 分
四、报告检查结果		
是否触及淋巴结		0.5 分
四、提问	2 分	
1.甲状腺听诊时，如听到低音调的连续性静脉“嗡嗡”音常见于何种疾病?		2 分
答:常见于甲状腺功能亢进		
五、职业素质	2 分	
(一)体检前能向被体检者告知，与被体检者沟通时态度和蔼，体检中动作轻柔，能体现爱护被检查者的意识，体检结束后能告知，有体现关爱被检查者的动作		1 分
(二)着装(工作服)整洁，仪表举止大方，语言文明，体检认真细致，表现出良好的职业素质		1 分

第三站 基本操作 总分 20 分

评分标准(全过程任何步骤违反无菌操作原则，一处扣 2 分)	总分 20 分	
一、操作前准备	2 分	
1.快速检测患者的主要生命征(口述)		1 分
2.准备止血带、夹板等		1 分
二、止血、固定操作过程		
1.止血带位置选择:右上臂上 1 / 3 处		2 分
2.绕扎止血带:在扎止血带处置衬垫物，绕扎松紧程度以控制出血、右侧桡动脉摸不到搏动为宜		2 分

3.在标志牌上记录使用止血带的开始时间		2 分
4.充分暴露右前臂，伤口创面用无菌纱布或棉垫覆盖并固定		1 分
5.夹板长度超过肘关节和腕关节，置于前臂四侧		2 分
6.固定前用毛巾等软物铺垫在夹板与肢体之间		2 分
7.用绷带捆扎固定夹板，上端固定至上臂，下端固定至手掌		1 分
8.先捆扎骨折的下部，以减轻水肿，松紧度以绷带上下可移动 1 c m 为宜		2 分
三、提问	2 分	
1.压迫止血有哪些方法?		1 分
答:指压止血法、加压包扎止血法、填塞止血法以及止血带止血法		
2.请问四肢外伤时动脉出血有什么特点?		1 分
答:多呈喷射状出血，速度快、量大、色鲜红，出血频率与脉搏一致		
四、职业素质	2 分	
(一) 1.在操作过程中，无菌观念强，动作规范，体现出爱护患者的意识		1 分
(二)着装(工作服)整洁，仪表举止大方，语言文明，体检认真细致，表现出良好的职业素质		1 分