

# 近 8 年临床笔试重复考点 98 条汇总

## 近 8 年重复考点

1. 关于新生儿硬肿症，错误的是：**多发生在夏季。**
2. 符合萎缩的描述正确的是：**萎缩器官实质细胞数减少或体积缩小。**
3. 子宫峡部的特点是：**上端为解剖学内口，下端为组织学内口。**
4. 手术后的体位以下哪项是错误的：**臂部手术后需取半卧位**
5. 关于休克型肺炎的治疗，下列哪项是不正确的：**慎用糖皮质激素。**
6. 婴幼儿每日维生素 D 的需要量为：**400~800IU.**
7. 早期妊娠最常见的临床表现：**停经。**
8. 原发性肝癌最常见的主要体征是：**肝不规则肿大。**
9. 神经系统实现其调节功能的基本方式是：**条件反射与非条件反射。**
10. 关于 DNA 的二级结构（双螺旋结构）正确的是：**两条反向的多核苷酸链。**
11. 右心功能不全的体征不包括：**心尖部舒张期奔马律。**
12. 产生药物副作用是由于：**药物作用的选择性低。**
13. 肝昏迷病人前驱期（Ⅰ期）最早的临床表现是：**性格改变。**
14. 关于小儿静脉补钾浓度，哪项正确：**0.1%—0.3%.**
15. 弥漫性血管内凝血，下列哪项实验室检查不正确：**血小板计数正常。**
16. 血胸的治疗下列哪项是错误的：**机化性血胸一般应在伤后 3 个月以后行手术治疗。**
17. 构成医疗事故的要件之一是：**过失。**
18. 以下哪项不是肾小管性蛋白尿的常见病：**肾小球肾炎。**

## 近 6 年重复试题

19. 产后心脏负担最重的时期是：**产后 72 小时。**
20. 关于标准差，下面哪个说法是正确的：**标准差必定大于或等于零。**
21. 急性心梗的常见先兆症状是：**心绞痛。**
22. 新生儿缺氧缺血性脑病的主要原因是：**围产期窒息。**
23. 引起垂体前叶功能减退的最常见原因是：**产前产后大出血。**
24. 下列哪项是骨折的晚期并发症：**创伤性关节炎。**

25. 与血栓形成关系密切的疾病是：**冠状动脉粥样硬化。**

## 近 5 年重复试题

26. 关于上尿路结石治疗中不正确的是：**结石直径大于 0.100px，均不能采取非手术治疗。**
27. 人体内 O<sub>2</sub>，CO<sub>2</sub> 进出细胞膜是通过：**单纯扩散。**
28. 脑出血最常见的部位是：**内囊。**
29. 施行麻醉前的禁食时间：**12 小时。**
30. 关于系统红斑狼疮，错误的是：**过敏性疾病。**
31. 心力衰竭细胞是指肺淤血：**肺泡内吞噬含铁血黄素巨噬细胞。**
32. 心功能分级是根据：**对体力活动的耐受性。**
33. 下列哪项不是成分血制品：**右旋糖酐。**
34. 关于胸腔漏出液的描述，下列不正确的是：**粘蛋白定性试验阳性。**
35. 下列关于血液组成的叙述，错误的是：**与抗凝剂混匀的血液待血细胞沉降后，上面的液体部分称为血清。**

## 近 4 年重复试题

36. 早期发现直肠癌最重要的检查方法是：**直肠指检。**
37. 关于化生下列不正确的是：**机化属于间质性化生。**
38. **干酪样坏死**是一种特殊的凝固性坏死。
39. 血管玻璃样变性常见于：**良性高血压病的细动脉。**
40. 微血栓的主要成分是：**纤维素。**
41. 淤血常见的原因中没有：**动脉栓塞。**
42. 炎症渗出病变错误的是：**所有渗出的白细胞都具有吞噬作用。**
43. 急性炎症局部组织变红的主要原因是：**血管扩张，血流加快。**
44. 不是恶性肿瘤：**畸胎瘤。**
45. 高血压心脏病的病变特征：**左心室向心性肥大。**
46. 执业医师法适用于：**计划生育技术服务机构的医师。**
47. 医师出生接产后，**医疗机构可以出具的证明文件是：出生证明书。**
48. 医疗机构施行特殊检查时：**征得患者同意，并取得其家属或关系人同意及签字后实施。**
49. 慢性支气管炎最主要的病因是：**长期吸烟。**
50. 诊断慢支急性发作伴细菌感染主要依据是：**痰量较多呈脓性。**
51. 我国引起肺心病最常见的病因：**慢性阻塞性肺疾病。**
52. 导致哮喘反复发作的重要原因：**气道高反应。**
53. 医院内获得性肺炎，最常见的致病菌是：**革兰阴性杆菌。**
54. 不能做支气管造影：**病变较重累及双侧肺**

55. 细胞内结核无效的杀菌药是：乙胺丁醇。

56. II 型呼吸衰竭时氧疗吸 O<sub>2</sub> 浓度：25% ~ 34%. 57. 关于咳嗽描述正确的是：支

气管扩张症咳嗽往往于清晨或夜间被动体位时加重，并有咳痰。

### 近 3 年重复试题

58. 直接引起心脏容量负荷加重的疾病为：主动脉瓣关闭不全。

59. 冠心病的危险因素，除了：Hb 异常。

60. 可引起低血钾的药物是：呋塞米，别名：速尿。

61. 动脉粥样硬化病变最常见累及哪一支冠状动脉：左冠状动脉前降支。

62. 急性心肌梗死最常见的心律失常是：室性期前收缩。

63. 震颤常见于：动脉导管未闭。

64. 二尖瓣狭窄最严重的并发症是：急性肺水肿。

65. 最容易引起心绞痛的是：主动脉狭窄。

66. 亚急性感染性心内膜炎的发病机制中不包括哪一项：血液高凝状态。

67. 扩张型心肌病的临床表现错误的是：发病年龄大多数为老年人。 68. 心包压塞

体征中不包括：心包摩擦音。

69. 以下哪类心律失常，心律规则，心室率正常：心房扑动伴 4:1 房室传导。

70. 有关心包摩擦音正确的是：胸骨左侧 3~4 肋间最响。

71. 上消化道出血不正确的是：急性大出血时血象检查为早期诊断和病情观察的依据。

72. 判断慢性胃炎是否属于活动性的病理依据是：粘膜中有无中性粒细胞浸润。

73. 胃溃疡多见于胃角和胃窦。

74. 回盲部是肠结核好发的部位。

75. 对结核性腹膜炎最具有诊断价值的是：腹腔镜检查。

76. X 线钡检呈跳跃征象 (Stier — linsing) 提示为：肠结核

77. 急性腹痛发病一周后，对胰腺炎有诊断价值是：血清脂肪酶。

78. 诱发肝性脑病除外的是：多次灌肠或导泻。

79. 肝硬化最可靠的证据：肝穿刺活检示假小叶形成。

80. 贫血根据病因可分为：红细胞生成减少，红细胞破坏过多，失血三类。

81. 红细胞增多常见于：严重慢性肺心病。

82. 急粒与急淋的鉴别要点是：前者原始细胞 POX 染色阳性。

83. 对白血病化疗不正确的是：VP 方案中：P 指柔红霉素。

84. 各种蛋白质平均含氮量约为：16%.

85. 关于 DNA 二级结构，描述错误的是：碱基配对是 A 与 U，G 与 C.

86. 下列关于酶的论述中错误的是：酶能催化化学上不可能进行的反应。

87. VitD<sub>3</sub> 活性形式是：1,25(OH)<sub>2</sub>D<sub>3</sub>.

88. 含金属钴的维生素是：VitB<sub>12</sub>.

89. 糖酵解途径的关键酶是：磷酸果糖激酶。

90. 在糖酵解和糖异生中均有作用的酶是：磷酸丙糖异构酶。

91. 呼吸链中的递氢体是：辅酶 Q. 92. 属于必需脂肪酸的是：亚油酸。

93. 载脂蛋白生理功能的叙述，错误的是：转运游离脂肪酸。

94. 贫血概念是指单位容积外周血液中：HB、WBC、MCA 低于正常。

95. 不属于甲亢临床表现的有：月经过多。

96. 卵巢肿瘤并发症哪项是错误的：卵巢肿瘤嵌顿。

97.认识活动的最基本的心理过程是：**感觉**。

98.新斯的明最强的作用：**兴奋骨骼肌**。

▼关注山东金英杰医学公众号

▼免费领取更多临床医考资料

