



一、A1型题

答题说明：以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 不是子宫韧带的是
 - A. 圆韧带
 - B. 阔韧带
 - C. 骨盆漏斗韧带
 - D. 主韧带
 - E. 宫骶韧带

2. 关于骨盆测量，下列哪项是错的
 - A. 骨盆出口横径与后矢状径之和大于15cm时，表示骨盆出口无明显狭窄
 - B. 根据髂棘间径可间接推测中骨盆横径的长度
 - C. 髂棘间径可间接推测骨盆入口横径的长度
 - D. 骶耻外径值减去1/2尺桡周径值，即相当于骨盆入口前后径值
 - E. 测量坐骨结节间径，若其间能容纳人拳头，则大于8.5cm

3. 属于骨盆分界的项目，错误的是
 - A. 假骨盆即为大骨盆
 - B. 前方为下腹壁
 - C. 两侧为髂骨翼
 - D. 后方为第5腰椎
 - E. 假骨盆与产道有直接联系

4. 骨盆的类型不包括
 - A. 女型
 - B. 扁平型
 - C. 类人猿型
 - D. 男型
 - E. 漏斗型

5. 属于骨盆组成的项目，正确的是
 - A. 由骶骨、耻骨及左右髋骨组成
 - B. 由骶骨、坐骨及左右髋骨组成
 - C. 由骶骨、尾骨及左右髋骨组成
 - D. 骶骨由4~5块骶椎融合而成
 - E. 每块髋骨由髌骨及骶椎骨组成

6. 与骨盆形态、大小及生长发育无关的项目为
 - A. 种族
 - B. 遗传
 - C. 营养
 - D. 性激素
 - E. 地区

7. 属于女性骨盆底解剖关系的项目，错误的是
 - A. 前方为耻骨联合和耻骨弓
 - B. 两侧为耻骨降支、坐骨升支及坐骨结节
 - C. 后方为第5骶椎
 - D. 前三角区为尿生殖三角



- E. 后三角区为肛门三角
8. 下列哪项属于盆底内层的肌肉
- A. 球海绵体肌
 - B. 膀胱括约肌
 - C. 尿道括约肌
 - D. 会阴深横肌
 - E. 肛提肌
9. 属于女性生殖器淋巴回流项目, 正确的是
- A. 阴蒂周围淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
 - B. 阴道下段淋巴汇入腹股沟深淋巴结
 - C. 阴道上段和宫颈淋巴汇入腹股沟浅淋巴结
 - D. 输卵管和卵巢淋巴主要汇入腰淋巴结
 - E. 宫体两侧淋巴沿圆韧带汇入腹股沟深淋巴结
10. 属于阴道上段淋巴回流的项目, 正确的是
- A. 小部分汇入髂外淋巴结
 - B. 大部分汇入闭孔淋巴结和髂外淋巴结
 - C. 与阴道下段引流基本相同
 - D. 与宫颈引流不相同
 - E. 主要汇入腹股沟淋巴结
11. 周期不规则的阴道流血, 最多见于
- A. 宫颈癌
 - B. 子宫肌瘤
 - C. 子宫内膜癌
 - D. 卵巢肿瘤
 - E. 无排卵性功能失调性子宫出血
12. 下列检查卵巢功能的方法, 准确性最高的是
- A. B 超检查
 - B. 阴道细胞学检查
 - C. 基础体温测定
 - D. 子宫内膜病理检查
 - E. X 线检查
13. 下列关于两性畸形的表述, 不正确的是
- A. 真两性畸形的确诊是性腺活检
 - B. 对两性畸形的治疗一律按女性抚养为妥
 - C. 男性假两性畸形患者有部分或全部女性表型
 - D. 真两性畸形患者体内睾丸和卵巢两种性腺同时存在
 - E. 假两性畸形患者体内有男性或女性一种性腺
14. 关于阴道发育异常的说法, 下列哪项是正确的
- A. 绝大多数阴道纵隔症状明显
 - B. 阴道下段闭锁症状与处女膜闭锁相似
 - C. 先天性无阴道患者多数有发育正常的子宫
 - D. 阴道横膈厚者一般不影响胎儿经阴道娩出
 - E. 先天性无阴道患者检查时可见外阴和第二性征发育异常
15. 关于临终关怀的叙述, 正确的是
- A. 临终关怀应以所有住院患者为服务对象
 - B. 临终关怀应以治疗疾病为主要服务内容
 - C. 临终关怀应以延长患者的生存时间为目的
 - D. 临终关怀面向的仅仅是临终患者个体
 - E. 临终关怀应以提高临终患者的生存质量为宗旨



16. 医德修养的根本途径是
- A. 不断地学习医德理论知识
 - B. 创造一个良好的医德修养氛围
 - C. 向医德高尚的医务人员学习
 - D. 坚持在医疗卫生保健实践中修养
 - E. 坚持有的放矢的医德修养
17. 正确处理医际关系的原则是
- A. 根据职务、职称不同, 区别对待
 - B. 根据学历、职务的高低, 分配发展机会
 - C. 彼此信任、互相协作和监督
 - D. 互相尊重, “井水不犯河水”
 - E. 互相尊重, 坚持独立, 注重自我发展
18. 术中识别输卵管的标志是
- A. 输卵管伞部
 - B. 输卵管间质部
 - C. 输卵管系膜
 - D. 输卵管漏斗部
 - E. 输卵管外侧端
19. 成年妇女的卵巢大小为
- A. 3cm×2cm×1cm
 - B. 4cm×3cm×2cm
 - C. 5cm×4cm×3cm
 - D. 4cm×3cm×1cm
 - E. 4cm×2cm×1cm
20. 成年女性子宫颈管的长度为
- A. 2.0~2.5cm
 - B. 1.0~2.0cm
 - C. 2.5~3.0cm
 - D. 25~3.5cm
 - E. 3.0~3.5cm
21. 能确诊子宫内膜异位症的辅助检查是
- A. 诊断性刮宫
 - B. CA125 值测定
 - C. 腹腔镜检查
 - D. B 型超声检查
 - E. 宫腔镜检查
22. 青春期开始的重要标志是
- A. 第一性征发育
 - B. 第二性征发育
 - C. 月经初潮
 - D. 卵泡开始发育
 - E. 周期性排卵
23. 月经后子宫内膜由哪层再生
- A. 基底层
 - B. 海绵层
 - C. 致密层
 - D. 功能层
 - E. 子宫肌层
24. 能维持子宫正常位置的是
- A. 腹腔压力作用
 - B. 子宫四对韧带的作用
 - C. 膀胱和直肠的支柱作用
 - D. 骨盆底肌肉及其上下支柱作用
 - E. 子宫 4 对韧带及盆底肌肉筋膜的支柱作用
25. 正常妊娠满 12 周时, 子宫底高度为
- A. 脐耻之间
 - B. 腹部不易扪及
 - C. 脐下 2~3 横指
 - D. 耻骨联合上 1 横指
 - E. 耻骨联合上 2~3 横指
26. 妊娠末期发生跨耻征阳性最大的可能是



- A. 扁平骨盆
B. 出口狭窄
C. 妇女型骨盆
D. 漏斗型骨盆
E. 中骨盆狭窄
27. 关于分娩期的子宫缩复环, 以下哪项正确
A. 腹壁均可见到
B. 位于子宫下段
C. 缩复环局部有压痛
D. 若达脐平, 已为病理性
E. 由局部肌纤维收缩形成
28. 高直前位胎儿枕部若能向一侧转多少度至枕左前位或枕右前位, 即有可能正常分娩
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°
E. 180°
29. 关于输卵管的伞部, 下列叙述正确的是
A. 是受精的场所
B. 肌层较厚, 黏膜层较薄
C. 位于子宫肌壁内, 由较厚的肌层包围
D. 主要功能是拾卵
E. 占输卵管的三分之一
30. 下丘脑和垂体产生正反馈作用, 形成 LH 和 FSH 峰, 两者协同作用, 促使成熟卵泡排卵, 此时成熟卵泡分泌的雌激素达到
A. 180pg/ml 以上, 并持续 12 小时
B. 200pg/ml 以上, 并持续 24 小时
C. 180pg/ml 以上, 并持续 24 小时
D. 200pg/ml 以上, 并持续 48 小时
E. 220pg/ml 以上, 并持续 48 小时
31. 外阴部外伤后最易发生血肿的部位是
A. 阴阜
B. 阴蒂
C. 大阴唇
D. 小阴唇
E. 会阴部
32. 关于子宫峡部形态学特征, 正确的是
A. 为子宫较宽的部分
B. 上端为组织学内口
C. 非孕期长度约为 2cm
D. 妊娠期长度不变
E. 妊娠末期可达 7~10cm, 形成子宫下段, 成为软产道的一部分
33. 横行于子宫颈两侧和骨盆侧壁之间的韧带是
A. 圆韧带
B. 阔韧带
C. 主韧带
D. 宫骶韧带
E. 卵巢固有韧带
34. 右侧卵巢动脉来自
A. 腹主动脉
B. 髂总动脉
C. 髂外动脉
D. 髂内动脉
E. 肾动脉
35. 前置胎盘的患者简单易行的首选检查是
A. 胸片
B. 阴道检查



- C. B 超
D. CT
E. MRI
36. 胎盘早剥大出血时，紧急处理方法是下列何项
A. 行子宫切除术
B. 宫腔填满纱布
C. 输血、输液
D. 治疗肾功能衰竭
E. 治疗 DIC
37. 下列选项中，不属于双胎妊娠引产指征的是
A. 合并羊水过多，压迫症状明显甚至出现呼吸困难
B. 孕妇有严重并发症
C. 孕 14 周一胎死亡，一胎存活
D. 胎儿畸形
E. 预产期已到尚未临产，胎儿出现呼吸窘迫
38. 过期妊娠需立即终止妊娠的指征是
A. 12 小时胎动为 15 次
B. B 超显示羊水指数 6cm
C. Ⅲ度羊水粪染
D. 无应激试验为反应型
E. 尿雌激素/肌酐比值为 16
39. 下列关于过期妊娠的叙述，不正确的是
A. 过期妊娠时若胎盘功能正常，胎儿可继续生长成为巨大儿
B. 过期妊娠可伴羊水过少
C. 过期妊娠时胎盘功能常减退，胎儿为小样儿时，因所需营养等物质少，故对胎儿危害比巨大胎儿小
D. 过期妊娠是影响围产儿发育与生存的病理妊娠
E. 过期妊娠可能与遗传有关
40. 子痫前期的临床表现不正确的是
A. 可有头疼、视力模糊等症状
B. 尿蛋白必须高达 2g/24h
C. 一般是 20 周以后出现
D. 血压 $\geq 140/90$ mmHg，且尿蛋白 ≥ 0.3 g/24h 或(+)
E. 可伴有上腹部不适
41. 重度子痫前期孕妇应用硫酸镁治疗时，尿量 24 小时不应少于
A. 400ml
B. 500ml
C. 600ml
D. 700ml
E. 800ml
42. 有关死胎的叙述，下列哪项不正确
A. 胎死宫内约有一半为胎儿缺氧所致
B. 胎死宫内 3 周以上未娩出可引发血凝障碍
C. 死胎是死产的一种
D. 雌激素能提高死胎患者子宫对催产素的敏感性
E. 颅骨重叠或脊柱成角变曲是死胎的征象
43. 关于羊水过多的处理，以下哪项是正确的
A. 高位破膜后不需要加用催产素引产
B. 一旦诊断胎儿畸形，立即终止妊娠
C. 一旦确诊，首选前列腺素抑制剂治疗
D. 羊膜腔穿刺放羊水，一次量至少 2000ml
E. 确诊羊水过多，应立即终止妊娠



44. 下列羊水过多的概念恰当的是哪项
- A. 妊娠末期羊水量大于 2000ml
 - B. 妊娠足月羊水量大于 2000ml
 - C. 妊娠任何时期羊水量大于 2000ml
 - D. 妊娠近足月羊水量 ≥ 2000 ml
 - E. 妊娠 32 周以后羊水量 ≥ 2000 ml
45. 羊水过少是指
- A. 妊娠晚期羊水量少于 500ml
 - B. 妊娠晚期羊水量少于 400ml
 - C. 妊娠晚期羊水量少于 300ml
 - D. 妊娠晚期羊水量少于 200ml
 - E. 妊娠晚期羊水量少于 100ml
46. 输卵管妊娠可以采取保守治疗, 但下列哪项不合适
- A. 输卵管妊娠未破裂或流产
 - B. 血 hCG 持续升高
 - C. 无明显内出血
 - D. B 超检查未见胚芽
 - E. 无明显闭经史
47. 下列哪一项不是急性宫外孕的病人在进行妇科检查时出现的体征
- A. 阴道后穹隆饱满有触痛
 - B. 宫颈有明显的牵拉痛
 - C. 子宫稍大稍软
 - D. 宫颈外口松, 开大, 容一指
 - E. 子宫有漂浮感
48. 针对骨盆狭窄的说法, 下列说法正确的是
- A. 骶耻外径小于 16cm, 骨盆入口前后径小于 8.5cm, 足月应剖宫产
 - B. 轻度的头盆不称不可以试产
 - C. 均小骨盆都应剖宫产
 - D. 中骨盆狭窄双顶径达坐骨棘不能经阴道助产
 - E. 出口横径与出口后矢状径之和小于 15cm, 可试产
49. 颈横位时, 多数可向前转多少度以颈前位娩出
- A. 30
 - B. 60
 - C. 90
 - D. 135
 - E. 180
50. 属于臀先露发生率的项目, 正确的是
- A. 混合臀先露发生率最高
 - B. 腿直臀先露发生率最低
 - C. 早产发生率高于足月产
 - D. 脐带脱垂发生率不比枕先露高
 - E. 早期减速发生率高于枕先露
51. 妊娠期及分娩期发现横位, 哪项处理正确
- A. 忽略性横位, 若为死胎可经阴道娩出
 - B. 临产后胎膜已破, 胎心正常, 可行外倒转术
 - C. 忽略性横位, 胎心已消失, 子宫下段有压痛, 行内倒转术
 - D. 足月活胎, 于临产前行择期剖宫产
 - E. 忽略性横位, 胎心正常, 可从阴道分娩
52. 关于臀助产术描述, 错误的是
- A. 胎肩娩出后, 即将胎背转向前方, 向下牵拉, 娩出胎头
 - B. 助娩胎头困难时, 可用后出胎头产钳术助产分娩
 - C. 胎臀娩出至脐部后, 由接产者协助胎肩



及胎头娩出

- D. 可通过滑脱法助娩胎肩
- E. 可通过旋转胎体法助娩胎肩

53. 若妊娠 26 周时发现臀先露，应采取的措施是

- A. 等待自然转为头先露
- B. 胸膝卧位
- C. 内服转胎中药
- D. 胸膝卧位
- E. 激光或艾灸至阴穴

54. 临产后发现是臀先露，处理正确的是

- A. 破膜后胎心减慢，给予药物治疗
- B. 阴道口已见胎臀拨露时应尽快结束分娩
- C. 宫缩时见胎便流出证明胎儿宫内窘迫，应行臀牵引
- D. “堵”臀时间越长越好
- E. 从脐部至胎头娩出不宜超过 8 分钟

55. 下列因素中与臀位无关的是

- A. 羊水过少
- B. 羊水过多
- C. 子宫肌瘤
- D. 前置胎盘
- E. 胎盘早剥

56. 胎儿娩出后 5 分钟，产妇出现多量阴道流血，最可能的原因为

- A. 胎盘部分剥离
- B. 宫颈裂伤
- C. 子宫收缩乏力
- D. 阴道静脉破裂
- E. 凝血功能障碍

57. 下列哪项不是导致软产道裂伤的因素

- A. 巨大胎儿
- B. 会阴水肿
- C. 阴道瘢痕
- D. 宫缩过强
- E. 羊水栓塞

58. 以下关于晚期产后出血的表述，错误的是

- A. 以产后 3~4 周发病最常见
- B. 阴道流血少、中、大量流血都有可能
- C. 剖宫产术后多由切口愈合不良所致
- D. 产后黏膜下肌瘤可引起
- E. 残留胎盘息肉可引起

59. 下列关于晚期产后出血的概念的描述，正确的是

- A. 分娩后的 2 小时内发生的大出血
- B. 分娩后的 2~24 小时之间发生的大出血
- C. 产后 24 小时至产后 1 周之内的大出血
- D. 分娩 24 小时以后，在产褥期内发生的阴道大量出血
- E. 分娩 2 小时以后，在产褥期内发生的阴道大量出血

60. 胎儿娩出后、胎盘娩出前，阴道大出血，适宜的处理方法是

- A. 肌肉注射缩宫素
- B. 强行剥离胎盘
- C. 按摩子宫
- D. 结扎盆腔血管
- E. 徒手剥离胎盘



二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

61. 女，47 岁，月经不规律伴经量增多 2 年。本次停经 3 个月后出血已 12 天，量仍多，今以出血多伴头晕就诊。妇科检查：阴道内有多量鲜血和血块，宫颈光滑，宫体大小正常，附件无异常。首选的诊疗措施是
- A. 止血药和抗生素静脉滴注
B. 口服止血药
C. 诊断性刮宫，支持疗法
D. 大剂量雌激素止血并支持疗法
E. 大剂量孕激素止血并支持疗法
62. 女，35 岁，孕 3 产 1，稀薄白带增多 3 个月。妇科检查见宫颈中度糜烂样改变，液基细胞学检查示非典型鳞状细胞，HPV 提示 68 型阳性。其处理方法是
- A. 无须处理
B. 电熨疗法
C. 按炎症处理后重复液基细胞学检查 + HPV 检查
D. 阴道镜检查
E. 子宫分段诊刮术
63. 患者，女，35 岁。G₃P₂，孕 20⁺周，子宫双阴道畸形，3 年前头胎 30 周早产，第二胎孕 34 周胎膜早破。孕妇血型 O 型，Rh (+)，丈夫血型 A 型 Rh (+)。前两次妊娠无生存儿，胎儿外表未见异常。引起该孕妇不良妊娠史最可能的原因是
- A. 年龄大
B. 子宫畸形
C. ABO 血型不合
D. 宫内感染
E. 遗传性疾病
64. 患者，女，18 岁。周期性下腹疼痛伴肛门坠胀 3 个月，且症状逐渐加重入院。月经初潮未至。妇科检查：处女膜向外膨胀，表面紫蓝色，无阴道开口。根据以上情况考虑该患者最可能的诊断是
- A. 卵巢肿瘤蒂扭转
B. 盆腔炎症疾病
C. 子宫肌瘤
D. 处女膜闭锁
E. 子宫内异位症
65. 初孕妇，24 岁，孕 37 周。1 周前有少量阴道流血，未作处理，自行停止，昨晚阴道再次流血，量多，伴阵发性腹痛。检查：血压 105/68mmHg，胎心率 166 次/分钟，臀位。此时最好的处理方法是
- A. 期待疗法
B. 行足牵引压迫胎盘止血
C. 输液+止血药物
D. 给氧纠正胎儿窘迫
E. 剖宫产
66. 经产妇，25 岁。妊娠 33 周，枕右前位出现少量阴道流血 2 日，胎心 140 次/分，诊断为前置胎盘。本例正确的处理是
- A. 行剖宫产术
B. 静脉滴注缩宫素
C. 立即行人工破膜
D. 给予子宫收缩抑制药
E. 卧床休息，给予镇静药



67. 妊娠 36 周，突然发生剧烈腹痛，面色苍白，血压降至 80/60mmHg，脉弱，腹部检查子宫硬如板状，有压痛，胎位触不清，胎心听不清，确诊为重型胎盘早期剥离。宫口开大 1cm，本病例最恰当的处理是

- A. 人工破膜后头皮钳牵引
- B. 人工破膜减张后，观察
- C. 输液、输血、尽快剖宫产
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 人工破膜后静脉滴注缩宫素

68. 妊娠 37 周，早晨醒来时发现躺在血泊中，急诊送入院，查：血压 90/60mmHg，脉率 120 次/分，神清，宫高 37cm，臀先露，高浮，胎心音 100 次/分，骨盆正常，阴道少量活动性流血。选哪项处理最恰当

- A. 臀位牵引术
- B. 缩宫素滴注引产
- C. 人工破膜
- D. 期待疗法
- E. 在输血输液同时行剖宫产

69. 30 岁，初孕 34 周，检查 BP 180/112mmHg，拒绝住院治疗，3 小时前突然腹痛伴阴道流血，BP 75/30mmHg，P 120 次/分，宫底剑突下 2 指，板状腹，胎位不清，胎心音消失，宫颈未消失，最正确处理应是

- A. 抢救休克，因胎死宫内不急于引产
- B. 抢救休克，尽快剖宫产，终止妊娠
- C. 立即剖宫产终止妊娠
- D. 抢救休克，滴注缩宫素引产
- E. 人工破膜，滴注催产素引产

70. 初孕妇，26 岁，停经 6 周时出现阴道断续少量流血来院。妇科检查子宫大，软，

宫口未开，见有少许新鲜血液自宫口流出。尿妊娠试验阳性。本例正确的项目为

- A. 不存在葡萄胎的可能性
- B. 安静卧床，保胎治疗
- C. 尽早行刮宫术
- D. 服用止血药物
- E. 尿妊娠试验阳性提示胚胎正常

71. 女性，23 岁，婚后 2 年，因漏服避孕药后停经 50 天，妊娠试验阳性，阴道流血 1 周，略少于经量，时伴有腹痛，最佳的处理措施是

- A. 口服大量甲羟孕酮
- B. 卧床休息，服用苯巴比妥
- C. 注射黄体酮保胎
- D. 复查妊娠试验
- E. 咨询孕妇的意见后决定

72. 女，25 岁，停经 68 天，阵发性腹痛伴多量阴道流血 1 天，妇科检查：子宫 6 周妊娠大小，宫口开，有血液不断流出，处理首选

- A. 剖腹探查
- B. 输血
- C. 立即抗感染
- D. 按摩子宫
- E. 立即清宫

73. 25 岁女性，妊娠 12 周，阴道流血 7 天，体温 38℃，白细胞 $13 \times 10^9/L$ ，首选的处理方法是

- A. 立即刮宫后再给抗生素
- B. 保胎治疗
- C. 立即给麦角新碱注射
- D. 立即给抗生素后再刮宫
- E. 观察阴道出血时再刮宫



74. 女性, 29岁, 停经8周。7天前自行服用药物流产药物, 现体温 38.8℃, 脉搏 130次/分, 阴道分泌物有异味, 子宫如孕2个月大小, 软, 压痛明显。血常规: 白细胞 $20 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.90。给予抗感染治疗中突然大量阴道出血, 下列哪项处理为宜

- A. 催产素肌内注射
- B. 卵圆钳钳夹残留胚胎组织, 术后继续应用抗生素
- C. 即刻刮宫去除病灶, 术后应用抗生素
- D. 抗生素及催产素
- E. 抗生素及止血治疗

75. 停经80天, 下腹痛伴阴道流水5小时。妇科检查: 宫口容1指, 子宫孕10周大小, 质软。应采取下列哪项紧急处理

- A. 给予孕激素保胎治疗
- B. 给予子宫收缩抑制剂
- C. 开放静脉通路, 行钳刮术
- D. 给予止血药物
- E. 紧急宫颈环扎

76. 患者女性, 28岁, 已婚, 因频繁呕吐, 不能进食7天, 乏力、头晕2天, 严重口渴1天入院。查体: BP 90/60mmHg, 面色苍白, 皮肤干燥。体重减轻7kg。查尿常规示酮体(+++)。电解质示钠 120mmol/L, 钾 3.35mmol/L。尿妊娠试验阳性。此患者最可能的诊断是

- A. 妊娠剧吐
- B. 急性肠炎
- C. 急性胃炎
- D. Wernicke 综合征
- E. 妊娠期肝内胆汁淤积症

77. 初产妇, 26岁。妊娠34周, 孕期检查正常, 近2周皮肤黄, 皮肤瘙痒, 检查血胆红素 $51.3 \mu\text{mol/L}$, ALT 正常, 血胆酸明显升高, 血压 120/80mmHg。本例最可能的疾病是

- A. 子痫前期
- B. 药物性肝损害
- C. 急性病毒性肝炎
- D. 妊娠期急性脂肪肝
- E. 妊娠期肝内胆汁淤积症

78. 初孕妇, 25岁。妊娠37周。既往血压正常。未做产前检查。7日前突觉头痛, 逐渐加重。血压 166/112mmHg, 尿蛋白 6g/24小时, 水肿(++), 血细胞比容 0.40。此时正确的处置是

- A. 胍屈嗪 40mg 静脉滴注
- B. 25%硫酸镁 20ml 缓慢静注后改静滴硫酸镁
- C. 立即终止妊娠
- D. 做头部 CT 检查
- E. 呋塞米 40mg 静注

79. 初产妇, 27岁。妊娠37周, 抽搐2次, 控制抽搐后4小时, 血压 160/100mmHg, 胎心 164次/分, 无应激试验无反应型, 无宫缩。本例恰当的处理是

- A. 产钳助娩
- B. 剖宫产
- C. 胎头吸引助娩
- D. 人工破膜
- E. 缩宫素静脉滴注引产

80. 初产妇, 25岁, 36周妊娠, 孕早、中期无特殊反应, 近一周来感头晕, 今早8点突感头痛继而抽搐1次, 早9点入院,



查体：神志清楚，血压 170/110mmHg，尿蛋白(+++)，头先露，胎心 140 次/分，正确的处理是

- A. 积极治疗 24h 后行剖宫产
- B. 立即剖宫产
- C. 促胎肺成熟，1 周后终止妊娠
- D. 静滴硫酸镁与缩宫素，引产
- E. 控制抽搐 6~12h 内终止妊娠

81. 某孕妇，28 岁。20 周妊娠，近 1 个月面部及下肢水肿，尿蛋白微量(+)。近 3 天血压增高至 160/110mmHg，尿蛋白(++~+++)，有时可见颗粒管型，经治疗于孕 34 周行剖宫产，术后血压 120/75mmHg，尿蛋白持续(++~++)，最可能的诊断是

- A. 妊娠合并急性肾炎
- B. 慢性肾炎合并重度妊娠期高血压疾病
- C. 妊娠合并嗜铬细胞瘤
- D. 重度妊娠期高血压疾病
- E. 原发性高血压合并重度妊娠期高血压疾病

82. 26 岁经产妇，停经 8 周，下腹阵发性剧烈疼痛 10 小时伴多量阴道流血，超过月经量，检查宫口开大近 2cm，本例最恰当的处理应是

三、B 型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

- A. 致密层
- B. 海绵层
- C. 基底层
- D. 海绵层与基底层
- E. 海绵层与致密层

- A. 静脉滴注止血药物
- B. 口服舒喘灵(硫酸沙丁胺醇)
- C. 肌注硫酸镁
- D. 肌注黄体酮
- E. 行负压吸宫术

83. 孕 1 产 0，妊娠 35 周，因外伤后持续腹痛，伴少许阴道出血，胎心变快，B 超拟诊为胎盘早剥，正确处理是

- A. 立即内诊，根据宫口开大情况，进一步决定分娩方式
- B. 因孕月小，有胎心，尽量等待，保守观察
- C. 进行肛查宫口开大情况
- D. 给止痛镇静剂以减轻症状
- E. 立即剖宫产

84. 孕妇 35 岁，妊娠 38 周，有原发不孕史，B 型超声检查提示羊水指数 5cm，宫颈 Bishop 评分 4 分，进一步处理是

- A. 继续观察至 40 周妊娠
- B. 羊膜腔内输液治疗
- C. 低浓度缩宫素点滴引产
- D. 剖宫产结束分娩
- E. 羊水穿刺行染色体核型分析，除外胎儿畸形

85. 患者人工流产后长期闭经，而基础体温为双相，其原因是上述哪组子宫内膜遭到破坏

86. 在整个月经周期中无明显变化，月经期并不脱落的是



87. 随月经周期而有周期性变化的是
- A. 阴道
 - B. 子宫颈
 - C. 子宫内膜和输卵管
 - D. 输卵管峡部及壶腹部交界处
 - E. 输卵管伞部
88. 精子获能的主要部位是
89. 拾取卵子的主要部位是
90. 卵子在哪个位置等待受精
- A. 真蜕膜、叶状绒毛膜、滑泽绒毛膜
 - B. 底蜕膜、叶状绒毛膜、羊膜
 - C. 底蜕膜、真蜕膜、叶状绒毛膜
 - D. 底蜕膜、包蜕膜、真蜕膜
 - E. 羊膜、绒毛膜
91. 依据受精卵与蜕膜的部位关系, 将蜕膜分为
92. 构成胎盘的是
93. 构成胎膜的是
- A. 10%
 - B. 30%
 - C. 40%~45%
 - D. 35%
 - E. 50%
94. 心脏容量至妊娠末期约增加
95. 至妊娠 32~34 周心搏量约增加
96. 至妊娠 32~34 周血容量约增加
97. 妊娠期比非孕期肾小球滤过率约增加
98. 妊娠期比非孕期肾血浆流量约增加
- A. 骶耻外径
 - B. 坐骨棘间径和坐骨结节间径过短
 - C. 出口横径(坐骨结节间径)过短
 - D. 坐骨结节间径加后矢状径 $\leq 15\text{cm}$
 - E. 髂棘间径过短
99. 骨盆出口狭窄
100. 漏斗型骨盆



2022 年妇产科主治医师《相关专业知识》模拟试卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 正常足月分娩时，胎头以哪个径线通过中骨盆
A. 枕下前凶径
B. 枕额径
C. 枕颞径
D. 双顶径
E. 双颞径
- 真假骨盆的交界面是
A. 骨盆入口平面
B. 中骨盆平面
C. 骨盆出口平面后三角
D. 骨盆出口平面前三角
E. 以上都不对
- 分娩期宫颈扩张主要依靠下列何项
A. 子宫收缩及缩复向上牵拉
B. 腹压
C. 宫腔内压
D. 通过羊水传导的压力
E. 宫缩时前羊水的回流，以利胎先露直接压迫
- 对于妊娠期间阑尾的位置描述不恰当的是
A. 使盲肠向外、向上、向后移位
B. 阑尾相对位置较深，并将壁层腹膜撑开
C. 妊娠 5 个月末，阑尾位于髂嵴水平
D. 妊娠 3 月末位于髂嵴下 2 横指
E. 妊娠 8 月末上升至髂嵴上 3 横指
- 关于孕妇感染 HIV，下述哪项是错误的
A. 可以通过母婴间垂直传播
B. 不可以哺乳
C. 孕母在妊娠期间进行了治疗，新生儿出生后不用服药干预
D. 感染 HIV 的孕妇产前、产时、产后正规治疗可以减少其新生儿的感染率
E. 新生儿出生 1 年后查血清 HIV 抗体确定是否被感染
- 关于妊娠合并尖锐湿疣恰当的描述是
A. 胎儿宫内感染并不少见
B. 通过软产道感染胎儿罕见
C. 出生的新生儿常患喉乳头瘤
D. 妊娠期病灶增长缓慢
E. 妊娠期间容易患尖锐湿疣
- 下述哪种疾病与 HPV 感染关系不大
A. 外阴尖锐湿疣
B. 外阴癌
C. CIN
D. 卵巢癌
E. 宫颈癌



8. 妊娠合并尖锐湿疣可引起
- A. 新生儿乳头状瘤
 - B. 新生儿小头畸形、智力障碍
 - C. 新生儿结膜炎、肺炎
 - D. 新生儿红斑
 - E. 新生儿鹅口疮
9. 有关先天性弓形虫病的特征, 下列叙述中错误的是
- A. 全身感染性疾病
 - B. 视网膜、脉络膜炎、脑内钙化、脑积水
 - C. 分为全身型及中枢神经症状型
 - D. 先天感染较后天感染病情轻微
 - E. 以上都不是
10. 妊娠合并巨细胞病毒感染可引起
- A. 新生儿乳头状瘤
 - B. 新生儿小头畸形、智力障碍等
 - C. 新生儿结膜炎、肺炎
 - D. 新生儿红斑
 - E. 新生儿鹅口疮
11. 下列外阴良性肿瘤不是来源于中胚叶的是
- A. 乳头瘤
 - B. 脂肪瘤
 - C. 纤维瘤
 - D. 平滑肌瘤
 - E. 血管瘤
12. 外阴鳞状上皮增生的临床表现正确的是下列何项
- A. 外阴瘙痒重, 难以忍受
 - B. 多发生于生育年龄
 - C. 病变多在一侧
 - D. 主要累及小阴唇
 - E. 早期病变呈白色为其特征
13. 外阴 Paget 病出现浸润时, 最佳治疗方案是下列哪一种
- A. 外阴根治术
 - B. 外阴单纯切除
 - C. 外阴根治术加双侧腹股沟淋巴结清扫术
 - D. 激光治疗
 - E. 放疗
14. 关于妊娠合并心脏病孕妇分娩期血流动力学变化, 叙述错误的是
- A. 第一产程: 规律宫缩使周围循环阻力增加, 回心血量减少
 - B. 第二产程: 宫缩加上腹压, 周围阻力增大
 - C. 第二产程: 腹压增高使内脏血流涌向心脏, 回心血量增加
 - D. 第三产程: 子宫迅速缩小, 腹压减低, 大量血液流回内脏血管, 回心血量减少
 - E. 第三产程: 胎儿娩出后子宫胎盘循环停止, 大量血液进入体循环, 回心血量增加
15. 关于病毒性肝炎, 下述哪项是不恰当的
- A. 以乙型肝炎最常见
 - B. 病原主要包括甲、乙、丙、丁、戊五型
 - C. 常见发生于妊娠中晚期
 - D. 孕妇肝炎的发生率高于非孕妇女
 - E. 暴发性肝炎的发生率明显高于非孕妇女
16. 关于肺结核对妊娠的影响, 下述哪项是不恰当的
- A. 非活动性肺结核病变范围不大, 对妊娠经过和胎儿发育影响不大
 - B. 肺结核患者除非同时患有生殖器结核, 一般不影响受孕



- C. 活动性肺结核患者妊娠, 可致流产、胎死宫内
- D. 严重肺结核合并妊娠, 围产儿死亡率可高达 30%~40%
- E. 结核病孕妇在产前不会将结核菌传给胎儿
17. 关于急性肾盂肾炎对妊娠的影响, 下列哪项不恰当
- A. 妊娠早期高热可使胎儿神经管发育障碍
- B. 高热可引起流产、早产
- C. 无脑儿的发生率较正常者高
- D. 患急性肾盂肾炎孕妇中有 3% 可发生中毒性休克
- E. 患急性肾盂肾炎孕妇中有 10% 可发生中毒性休克
18. 关于妊娠合并糖尿病, 下述哪项是不恰当的
- A. 孕期控制饮食
- B. 用胰岛素控制血糖, 不影响胎儿
- C. 已有严重心血管病史, 肾功能减退不宜妊娠
- D. 产后继续用产前所用胰岛素剂量
- E. 孕晚期估计胎儿成熟度
19. 关于妊娠期糖尿病, 下述哪项是恰当的
- A. 如果一次筛查结果阴性, 即不用再重复检查
- B. 一般情况孕妇应在 32 周左右进行糖筛查
- C. 如果 2 次空腹血糖 $\geq 5.8\text{mmol/L}$, 则不用进行口服糖耐量试验, 即可确诊
- D. 妊娠期糖尿病患者产后均可恢复正常
- E. 如果孕妇任何一次血糖 $\geq 11.1\text{mmol/L}$, 即可诊断
20. 妊娠合并心脏病孕妇的高危时期是
- A. 妊娠 24~27 周
- B. 妊娠 28~31 周
- C. 妊娠 32~34 周
- D. 妊娠 35~38 周
- E. 产褥期 7 天以后
21. 脑脊髓和脑干神经根的髓鞘形成于妊娠第()个月。
- A. 3 个月
- B. 4 个月
- C. 5 个月
- D. 6 个月
- E. 7 个月
22. 关于外阴鳞状细胞癌的叙述不正确的是
- A. 癌组织较脆
- B. 边界清楚
- C. 基底硬
- D. 癌灶可发生在外阴的任何部位
- E. 有结节状、菜花状两种类型
23. 妊娠中期, 胎儿内耳、外耳及中耳已形成, 妊娠(), 胎儿在宫内已能听见一些声音。
- A. 20~22 周
- B. 22~24 周
- C. 24~26 周
- D. 26~28 周
- E. 28~30 周
24. 关于急性宫颈炎的诊断, 下列说法不正确的是
- A. 于子宫颈管或子宫颈管棉拭子标本上, 肉眼见到脓性或黏液脓性分泌物可诊断
- B. 用棉拭子擦拭子宫颈管时, 容易诱发子



宫颈管内出血可诊断

C. 白细胞检测中子宫颈管分泌物或阴道分泌物中白细胞计数增多可诊断，后者需排除引起白细胞计数增多的阴道炎症

D. 白细胞检测中子宫颈管脓性分泌物涂片做革兰染色，中性粒细胞 $>30/HP$

E. 白细胞检测中阴道分泌物湿片检查白细胞 >20 个/HP

25. 子宫内膜癌已侵犯宫颈管应做下列哪种治疗

A. 单纯子宫全切术及盆腔淋巴结清除术

B. 子宫颈锥切术

C. 子宫次全切术及双附件切除

D. 较广泛子宫切除加盆腔淋巴结清除术

E. 广泛性全子宫及双附件加盆腔淋巴结清除术

26. 子宫内膜癌手术治疗开腹后应首先进行

A. 立即全面探查盆腹腔

B. 取腹水或腹腔冲洗液

C. 钳夹宫角，以防癌细胞由输卵管溢出

D. 切除双附件

E. 用化疗药液冲洗盆腹腔，消灭转移到子宫外的癌细胞

27. 子宫肉瘤的诊断方法中不包括下列哪项

A. 手术切除的子宫肌瘤病理切片

B. 血 CA-125

C. 分段诊刮

D. 盆腔检查

E. B 超

28. 子宫肉瘤 II 期首选的治疗措施为

A. 全子宫切除及双附件切除术

B. 全子宫切除术

C. 广泛子宫切除术加盆腔淋巴结清扫术

D. 扩大子宫全切术加双附件切除术

E. 广泛子宫切除术加盆腔淋巴结清扫术加腹主动脉旁淋巴结活检术

29. 对放疗敏感性较差的是

A. 子宫平滑肌肉瘤

B. 低度恶性子宫内膜间质肉瘤

C. 高度恶性子宫内膜间质肉瘤

D. 恶性苗勒管混合瘤

E. 癌肉瘤

30. 关于子宫平滑肌肉瘤哪项不正确

A. 可由子宫肌瘤恶变而成

B. 肉瘤剖面无漩涡状结构

C. 肉瘤位于肌层内，依靠刮宫无法诊断

D. 其恶性程度低

E. 易转移到肺部

31. 侵蚀性葡萄胎行清宫术时，下列哪项处理是不正确的

A. 一旦确诊后应及时清宫

B. 一般采用吸宫术

C. 首先应选择小号吸管至大号吸管

D. 子宫缩小后可慎重刮宫

E. 刮出物送组织学检查

32. 侵蚀性葡萄胎的诊断标准正确的是

A. 侵入子宫内膜层，滋养细胞高度增生

B. 子宫肌层及子宫以外转移的切片中可见到绒毛或绒毛的蜕变痕迹

C. 肉眼可见多量细小水泡组织

D. 伴有肺内及阴道转移

E. 葡萄胎清宫 6 周以后，血 hCG 持续不降至正常水平



33. 绒毛膜癌最可靠的确诊依据是
- A. 阴道可见紫蓝色转移结节
 - B. X线胸片可见转移阴影
 - C. 刮宫术后血hCG持续阳性不转阴
 - D. 卵巢黄素囊肿持续不消失
 - E. 子宫病理学检查仅见滋养细胞而无绒毛
34. 下列有关血清hCG变化的描述, 不正确的是
- A. 足月产、流产后4周左右血清hCG转为阴性
 - B. 停经8~10周血清hCG达高峰
 - C. 产后超过4周血清hCG仍持续升高就可诊断滋养细胞肿瘤
 - D. hCG>100000U/L为高危葡萄胎
 - E. 完全性葡萄胎血清hCG可达240万U/L
35. 诊断孕激素试验阴性的闭经患者, 正确的是下列哪项
- A. 首先应除外妊娠
 - B. 继之做雌激素试验, 阳性者表示子宫性闭经
 - C. 说明生殖道通畅
 - D. 继之行垂体兴奋试验
 - E. 体内有一定雌激素水平
36. 闭经患者, 其雌激素试验(-); 说明病变在
- A. 丘脑下部
 - B. 卵巢
 - C. 垂体
 - D. 子宫
 - E. 肾上腺
37. 关于经前期紧张综合征, 下列哪项不正确
- A. 多见于围绝经期妇女
 - B. 在前3个月经周期中周期性出现至少一种精神神经症状, 如疲劳乏力、急躁、抑郁、焦虑、忧伤、过度敏感、猜疑、情绪不稳等和一种体质性症状, 如乳房胀痛、四肢肿胀、腹胀不适、头痛等
 - C. 症状出现于月经前1周
 - D. 发生周期性躯体、精神及行为方面的改变
 - E. 症状在月经来潮后迅速减轻至消失
38. 与雌激素减少有关的绝经后心血管系统变化为
- A. 血胆固醇水平升高, 各种脂蛋白增加, 高密度脂蛋白/低密度脂蛋白比率降低
 - B. 血胆固醇水平降低, 各种脂蛋白降低, 高密度脂蛋白/低密度脂蛋白比率降低
 - C. 血胆固醇水平升高, 各种脂蛋白增加, 高密度脂蛋白/低密度脂蛋白比率增加
 - D. 血胆固醇水平降低, 各种脂蛋白增加, 高密度脂蛋白/低密度脂蛋白比率增加
 - E. 血胆固醇水平升高, 各种脂蛋白降低, 高密度脂蛋白/低密度脂蛋白比率降低
39. 下列关于HRT的叙述, 错误的是
- A. 治疗绝经相关症状
 - B. 采用HRT时, 应对妇女进行个体化的风险/受益评估
 - C. HRT应在综合考虑治疗目的和风险的前提下, 采用最低有效剂量和最短疗程
 - D. HRT在出现绝经相关症状后即可应用
 - E. HRT可用于心血管疾病的一级、二级预防
40. 绝经期综合征激素补充治疗, 下述哪项是正确的



- A. 所有绝经期综合征患者均可用
B. 原因不明的阴道流血需明确诊断
C. 主要使用孕激素治疗
D. 主要使用雌激素治疗
E. 经阴道给药效用等同于口服
41. 绝经期尿中促性腺激素的变化哪项正确
A. 排出量不变
B. 不确定
C. 增加
D. 水平极低
E. 减少
42. 痛经患者口服避孕药治疗, 其目的是为了
A. 降低雌激素的水平
B. 降低孕激素的水平
C. 使子宫内膜萎缩
D. 抑制排卵
E. 增加子宫肌张力、缓解痛经
43. 关于排卵性功能出血的治疗, 下列哪项是正确的
A. 排卵期出血可从月经第 1 天起服雌激素
B. 排卵性月经过多用大量雌激素止血
C. 内膜脱落不全用氯芪酚胺(克罗米芬)治疗
D. 黄体功能不全可在体温升高第 3 天起用 hCG 治疗
E. 黄体功能不全亦可给甲基睾丸素治疗
44. 关于子宫内膜异位症的描述中, 错误的是
A. 异位内膜对激素不敏感
B. 最常见的转移部位为卵巢
C. 盆腔内异症确诊的金标准为腹腔镜
D. 极少发生恶变
E. 痛经不是内异症诊断的必需症状
45. 子宫内膜异位症引起的盆腔疼痛的特点错误的是
A. 与病变程度不完全平行
B. 多为继发性痛经
C. 疼痛程度与 AFS 分期一致
D. 非经期疼痛为慢性盆腔疼痛
E. 有大便困难疼痛和性交痛
46. 进行性痛经病人出现肾积水最可能的原因是
A. 宫颈癌
B. 泌尿系结核
C. 盆腔炎性包块压迫
D. 输尿管子宫内膜异位症
E. 卵巢癌
47. 测定雌激素对下列无临床意义的是
A. 判断闭经原因
B. 检测卵泡发育
C. 诊断子宫内膜异位症
D. 诊断无排卵月经
E. 女性性早熟
48. 关于子宫内膜异位症痛经的特点正确的是
A. 原发性痛经
B. 继发性痛经
C. 运动性痛经
D. 偶发痛经
E. 功能性痛经
49. 下列关于子宫内膜异位症发病机制, 被公认的是



- A. LUFs 学说
 - B. 种植学说
 - C. 移植学说
 - D. 良性转移学说
 - E. 体腔上皮化生学说
50. 关于子宫内膜异位症的临床特点, 错误

- 的是
- A. 痛经是子宫内膜异位症的典型症状
 - B. 痛经多随局部病变加重而逐年加剧
 - C. 疼痛多位于下腹部及腰骶部
 - D. 疼痛在经期第一日最剧, 以后逐渐减轻, 月经干净消失
 - E. 疼痛程度与病灶大小成比例

二、A2 型题

答题说明: 以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

51. 28 岁, 女, 有不洁性生活史。现孕 5 个月, 于大阴唇出现圆形直径 1~2cm 边界清晰的皮疹, 表面略高于皮肤, 可见溃烂。下列哪项表示先天风疹综合征
- A. 白内障
 - B. 动脉导管未闭
 - C. 血小板减少性紫癜
 - D. 骨干骺端的骨变化
 - E. 以上均是
52. 女, 28 岁, 孕 1 产 0, 妊娠合并类风湿关节炎(伴关节畸形), 孕期应用口服泼尼松(强的松)治疗, 于孕 40 周行剖宫产术。术后第 5 天失眠, 情绪低落, 无食欲, 反应迟钝, 考虑为产褥期抑郁症。该病人的最恰当处理是下列哪项
- A. 耐心地进行心理治疗
 - B. 耐心地进行心理治疗, 必要时给予药物治疗
 - C. 必须给予药物治疗
 - D. 不予处理, 可自然缓解
 - E. 观察病情变化, 产科住院期间不予处理
53. 女, 17 岁, 大阴唇外侧及阴蒂包皮处见一 6cm×3cm 大小的白色病损区域, 表面

- 光滑润泽, 边界清晰, 弹性正常, 无压痛, 无瘙痒不适。应首选的处理方法是
- A. 局部丙酸睾酮外用
 - B. 局部病损区切除
 - C. 外阴切除
 - D. 激光治疗
 - E. 定期随访
54. 女, 60 岁, 发现外阴皮肤变白 10 余年, 外阴瘙痒 1 个月就诊。查体: 小阴唇皮肤变白变薄, 与大阴唇内侧部分融合, 阴蒂萎缩, 且与其包皮粘连。为确诊应选用
- A. 外阴活检
 - B. 外阴分泌物细胞学检查
 - C. 宫颈刮片细胞学检查
 - D. 阴道镜
 - E. B 超
55. 女, 32 岁。G₁P₀, 孕 39⁺⁴周, 不规则宫缩 2 天, 阴道少许血性分泌物, 查血压 120/80mmHg, 宫高 35cm, 腹围 100cm, 胎心位于左下腹, 基线 160 次/分, 宫缩 20 秒/10~15 分, 肛查宫口容指尖, NST 出现频发晚期减速。哪项诊断不正确
- A. 先兆临产



- B. 胎方位 LOA
- C. 胎儿宫内窘迫
- D. 潜伏期延长
- E. 宫内足月妊娠

56. 初产妇, 28 岁。临产后静脉滴注缩宫素, 破膜后不久突然出现烦躁不安、呛咳、呼吸困难、发绀, 数分钟后死亡。本例最可能的诊断是

- A. 子宫破裂
- B. 羊水栓塞
- C. 重度子痫前期
- D. III 度胎盘早剥
- E. 前置胎盘

57. 初产妇, 26 岁。妊娠 40 周。临产后宫缩强, 宫口开大 9cm 时自然破膜。破膜后不久突然发生呛咳、呼吸困难、发绀, 血压测不到。此时首选的措施是

- A. 立即结束分娩
- B. 静注阿托品 1mg
- C. 静注地塞米松 40mg
- D. 静脉缓注罂粟碱 90mg
- E. 加压给氧, 准备行气管切开

58. 初产妇, 孕 40 周, 估计胎儿体重 3900g, 临产 15 小时, 宫口开 4cm, 以 5% 葡萄糖、缩宫素 5U 静脉点滴, 4 小时后宫口开 9cm, 先露 S = +1, 但产妇烦躁不安, 疼痛难受。腹部检查, 脐下两指处呈环状凹陷, 下段有压痛。胎心音正常, 导尿呈血性。立即采取的处理方法为

- A. 立即产钳助产
- B. 继续滴缩宫素, 待宫口开全后做会阴切开助产
- C. 立即肌肉注射哌替啶

- D. 会阴切开后头皮钳牵引助产
- E. 立即停注缩宫素

59. 初产妇, 因第二产程延长, 行左侧会阴切开及低位产钳助产, 娩出 3900g 活婴。产后 2 小时伤口疼痛, 肛门坠胀并有便意, 阴道流血量不多。体检: 贫血貌, 血压 96/66mmHg。此时应进行的处置项目是下列何项

- A. 肌肉注射子宫收缩药
- B. 阴道镜检查
- C. 静滴广谱抗生素
- D. 肛门指诊
- E. 给予止血药

60. 经产妇 36 岁, 孕 40 周, 晨 3 时突然大量阴道出血, 急诊来院。体检: 血压 120/75mmHg, 尿蛋白(-)。腹部检查: 子宫高 35cm, 胎头高浮, 子宫前壁无压痛。该产妇分娩后 5 分钟突然发生烦躁不安, 寒战, 呕吐, 咳嗽, 呼吸困难, 发绀, 血压 10.7/5.3kPa(80/40mmHg), 脉细弱。阴道检查: 阴道内有手拳大的凝血块, 宫颈软, 宫口开大一指, 先露部未及胎盘组织。应即刻采取的措施中下列哪一项应除外

- A. 加压给氧改善呼吸循环功能
- B. 盐酸罂粟碱静脉缓注
- C. 抗过敏治疗
- D. 抗休克治疗
- E. 立即切除子宫

61. 经产妇, 32 岁。产后第 3 天突然出现畏寒、高热, 体温 40℃, 伴有恶心、呕吐, 下腹剧痛, 压痛、反跳痛、腹肌紧张感明显。其最可能的诊断是

- A. 阑尾炎



- B. 下肢血栓性静脉炎
- C. 腹腔内出血
- D. 急性盆腔腹膜炎
- E. 产后宫缩痛

62. 28岁女性，4日前在家分娩，手取胎盘完整，阴道流血约400ml，未行其他处理。自昨日晨起寒战达39.4℃，呈弛张热，下腹有压痛，盆腔有边缘不规整包块，不活动。该患者最可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 慢性输卵管炎
- D. 急性盆腔结缔组织炎
- E. 盆腔肿瘤

63. 女，25岁，孕1产1，第1胎，产钳助产。产后第4天，患者寒战、高热39℃以上，下腹压痛，子宫增大，压痛，一侧子宫旁组织增厚，压痛明显。最可能的诊断为

- A. 乳腺炎
- B. 慢性盆腔炎
- C. 急性胃肠炎
- D. 急性盆腔结缔组织炎
- E. 急性子宫内膜炎

64. 某产妇，产后2周出现弛张热，下腹疼痛并且压痛明显，下肢肿胀疼痛，皮肤紧张发白。最可能的诊断是

- A. 子宫肌炎
- B. 血栓性静脉炎
- C. 急性盆腔结缔组织炎
- D. 急性盆腔腹膜炎
- E. 产后关节炎

65. 女，37岁，外阴奇痒，分泌物不多。妇检：两侧小阴唇增厚，外阴黏膜不红，阴道畅，皱襞正常，无异常分泌物，宫颈柱状，光滑，I度肥大，子宫前位，常大，双附件(-)。为确诊应选用下列何种检查

- A. 外阴活检
- B. 阴道分泌物涂片
- C. 宫颈涂片
- D. 阴道镜
- E. 盆腔B超

66. 女，30岁。继发不孕5年，经后4天突起高热、寒战，下腹痛，右侧甚，血压110/80mmHg，P 120次/分，体温39℃，白细胞 $18 \times 10^9/L$ ，中性80%，下腹轻压痛，妇查：宫颈稍大稍软，有压痛(+)，双侧附件增厚，压痛，诊断为

- A. 急性阑尾炎
- B. 急性盆腔结缔组织炎
- C. 急性盆腔腹膜炎
- D. 急性子宫内膜炎
- E. 急性附件炎

67. 女性，37岁，已婚，曾因过期流产行刮宫术，术后1个月出现轻度下腹痛及腰骶部坠胀感，并逐渐加重。本次性生活后突感下腹疼痛，体温升高达38.5℃妇科检查：子宫中后位，正常大小，活动度差，宫体压痛明显，双侧附件明显增厚、压痛，阴道分泌物多、脓性。采用的治疗方法，错误的是

- A. 支持疗法
- B. 抗生素治疗
- C. 中药治疗
- D. 手术
- E. 采用物理降温



68. 女, 36 岁。有盆腔炎性疾病病史, 近 4 日高热伴下腹痛, 妇科检查: 子宫正常大小; 左附件区触及 7cm×6cm 包块, 压痛, 静脉使用抗生素 72 小时无效, 腹胀明显, 该病合理处理是

- A. 物理治疗
- B. 中药活血化瘀治疗
- C. 继续抗生素治疗
- D. 阴道后穹隆切开引流
- E. 剖腹探查

69. 女, 22 岁。初潮 16 岁, 以后月经周期较规律。2 年前患病后经量逐渐减少, 半年前闭经, 基础体温呈双相型曲线, 本例应考虑的疾病是

- A. 宫颈管狭窄
- B. 子宫发育不良
- C. 子宫内膜结核
- D. 垂体功能减退
- E. 卵巢支持细胞-间质细胞瘤

70. 女性, 30 岁, 诊断为左侧前庭大腺囊肿, 直径 4cm。首选的治疗方法是

- A. 抗生素治疗
- B. 随访观察
- C. 前庭大腺囊肿剥除术
- D. 前庭大腺囊肿造口术
- E. 前庭大腺囊肿抽液术

71. 女性 56 岁, 外阴痒 1 个月, 白带乳块状, 镜检发现真菌菌丝, 合理的处理是

- A. 阴道内放置咪康唑栓
- B. 阴道内放置甲硝唑栓
- C. 阴道内放置乙炔雌酚栓
- D. 外阴应用氢化可的松软膏
- E. 外阴应用 0.5% 醋酸液清洗

72. 女性患者, 外阴瘙痒、灼痛 2 天, 坐卧不宁, 痛苦非常, 来院就诊。妇科检查见白带较多, 呈白色稠厚豆渣样, 小阴唇内侧附着有白色膜状物, 擦除后露出红肿黏膜面。其最可能的诊断为

- A. 滴虫阴道炎
- B. 念珠菌阴道炎
- C. 细菌性阴道炎
- D. 淋病
- E. 生殖器疱疹

73. 女性, 28 岁, 会阴部肿块 5 天, 伴发热 3 天。妇科检查: 左侧小阴唇下方一肿块, 约 4cm×3cm×3cm 大小, 局部皮肤充血, 有波动感, 压痛明显。首先应考虑的诊断是

- A. 急性前庭大腺炎
- B. 前庭大腺炎、脓肿
- C. 前庭大腺癌
- D. 外阴脂肪瘤
- E. 外阴疝肿

74. 患者, 女性, 29 岁。阴道分泌物增多伴外阴瘙痒 10 日, 查体外阴及阴道黏膜无明显异常, 阴道分泌物灰白色, 稀薄, 均匀一致。首选考虑的辅助检查是

- A. 阴道脱落细胞学检查
- B. 分泌物查真菌
- C. 分泌物查找线索细胞
- D. 分泌物细菌培养
- E. 生理盐水悬滴法查阴道分泌物滴虫

75. 已婚妇女, 49 岁。因肝脓肿住院, 应用抗生素 20 天, 近 1 周来外阴瘙痒明显, 白带呈凝乳状或豆渣状。检查发现阴道黏膜发红, 有白色膜状物, 擦除后露出红肿黏膜面。最可能的诊断是



- A. 细菌性阴道炎
- B. 慢性阴道炎
- C. 滴虫性阴道炎
- D. 真菌性阴道炎
- E. 外阴瘙痒症

76. 女性, 38岁。外阴瘙痒伴烧灼感3天。妇科检查: 外阴局部充血, 阴道黏膜表面有白色凝状物覆盖, 阴道分泌物镜检找到假菌丝。该患者首选的治疗药物是

- A. 干扰素
- B. 甲硝唑
- C. 雌激素
- D. 制霉菌素
- E. 糖皮质激素

77. 女性, 40岁, 不规则阴道流血1个月。妇科检查: 宫颈呈菜花样, 约5cm×4cm×4cm大小, 质脆易出血。三合诊左侧主韧带结节状增粗, 近达盆壁。宫颈活检示鳞状细胞癌。适合的治疗是

- A. 宫颈癌根治术
- B. 化疗
- C. 化疗后行宫颈癌根治术
- D. 放疗
- E. 宫颈癌根治术后加化疗

78. 61岁, 外阴瘙痒2年, 近期加重。查体右侧大小阴唇皮肤色素脱失, 可触及直径2.5cm结节。右侧腹股沟可及黄豆大小质硬固定结节2个, 该处活检报告为鳞状细胞癌。治疗方法应是

- A. 外阴广泛切除及双侧腹股沟浅层淋巴结清扫术
- B. 外阴广泛切除及双侧腹股沟浅层淋巴结和腹股沟深层淋巴结清扫术

- C. 外阴广泛切除及右侧淋巴结清扫术
- D. 右侧外阴切除及右侧腹股沟淋巴结清扫术
- E. 较广泛切除局部病灶及双侧腹股沟淋巴结清扫术

79. 女, 50岁, 因外阴瘙痒1个月余就诊。首先考虑的诊断是

- A. 外阴癌
- B. 外阴阴道炎
- C. 外阴鳞状上皮增生
- D. 外阴硬化性苔藓
- E. 药物过敏或化学品刺激

80. 54岁, 绝经1年, 不规则阴道出血伴浆液血性白带1月余。妇科检查: 阴道内无异常, 宫颈光滑, 子宫体略大, 质软, 双附件正常。此患者最可能的诊断是

- A. 更年期功能失调性子宫出血
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫肉瘤
- E. 输卵管癌

81. 女, 33岁, 感外阴瘙痒1个月, 可触及左侧小阴唇结节状物, 直径1cm。查体发现肿物处有明显色素沉着, 表面有溃疡。诊断是

- A. 外阴鳞癌
- B. 纤维瘤
- C. 外阴上皮内瘤变(VIN)
- D. 外阴恶性黑色素瘤
- E. 外阴基底细胞癌

82. 女, 69岁, 发现外阴部肿物2个月, 肿物生长快, 伴有少量出血。查体阴蒂肿大,



直径3cm，质硬，右腹股沟触及3个黄豆大小淋巴结，不活动。活检报告为鳞癌。患者患有扩张型心肌病4年，平时服用地高辛治疗，心功能Ⅲ级。采用哪种治疗方法最合适

- A. 较广泛切除外阴病灶及双侧腹股沟淋巴结清扫
- B. 单纯外阴切除及双侧腹股沟淋巴结切除
- C. 单纯外阴切除及右侧腹股沟淋巴结切除
- D. 外阴及腹股沟区放射治疗
- E. 经动脉插管化疗

83. 女，52岁，外阴瘙痒3年；反复不愈。体检外阴有多个灰白丘疹，活检示VINⅡ级。最佳的治疗方法是

- A. 5%氟尿嘧啶外涂
- B. 激光治疗
- C. 微波治疗
- D. 单纯外阴切除
- E. 广泛外阴切除

84. 女，25岁。停经49日，尿hCG阳性，B型超声证实宫内妊娠，卵巢囊性附件区肿物直径6cm，内见密集光点。妇科检查肿物活动，囊性感。本例的处理方针是

- A. 立即手术
- B. 密切观察随访
- C. 等至妊娠3个月后手术
- D. 等待至妊娠中期后引产
- E. 等待至妊娠足月，剖宫产同时切除肿瘤

三、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

- A. 外阴鳞状上皮细胞增生
 - B. 外阴白癜风
 - C. 外阴尖锐湿疣
 - D. 外阴硬化性苔藓
 - E. 念珠菌性阴道炎
85. 外阴及肛周皮肤萎缩变薄，失去弹性，可能为
86. 外阴孤立、散在或簇状分布粉色乳头状或菜花状赘生物，质稍硬，可能为
87. 外阴皮肤增厚，纹理突出，角化过度部位呈白色，严重者可因搔抓引起破损、皲裂、溃疡，可能为

- A. 胎儿感染
- B. 胎儿畸形
- C. 心脏病

- D. 颅内出血
 - E. 胎盘早剥
88. 重度子痫前期孕妇易并发
89. 重度缺铁性贫血的孕妇可发生
90. 重度巨幼细胞性贫血的孕妇胎儿易发生
91. 重度再生障碍性贫血孕妇易死于

- A. 严密监测下继续妊娠
- B. 应终止妊娠
- C. 手术助产缩短第二产程
- D. 等待自然分娩
- E. 剖宫产

92. 患者，女，38岁。G₂P₀，风心病10年，停经8周，做家务时，心慌、憋气1周，查体：心率115次/分，呼吸24次/分
93. 孕中期合并病毒性肝炎



94. 轻度子痫前期，38 周自然临产，宫口开全 30 分，突感心慌、憋气，心率 115 次/分，呼吸 26 次/分，肺底布满啰音
- A. 单绒毛膜、双羊膜囊、单卵双胞胎
B. 双绒毛膜、双羊膜囊、单卵双胞胎
C. 单羊膜囊、单卵双胞胎
D. 双卵双胞胎
E. 联体双胞胎
95. 双胎妊娠在原始胚盘形成后又复制而成的类型是
96. 双胎妊娠在羊膜囊形成后复制而成的类型是
97. 双胎妊娠在桑葚期复制而成的类型是
- A. 器官发育不成熟
B. 成熟障碍
C. 胎儿脊柱成角弯曲
D. 胎儿监护 NST 呈正弦波
E. 新生儿水肿、贫血、肝脾大
98. 早产儿
99. 过期妊娠
100. 死胎



2022 年妇产科主治医师《专业知识》模拟试卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 关于骨盆内测量，下列选项不正确的是
A. 对角径减去 1.5~2cm 即为骨盆的真结合径
B. 坐骨结节间径为 7.5cm 时，必须剖宫产终止妊娠
C. 骨盆内测量时间为妊娠 24~36 周
D. 对角径为耻骨联合下缘至骶岬上缘中点
E. 对角径正常值为 12.5~13cm
- 下列哪项不属于胎盘剥离的征象
A. 宫底升高且软
B. 子宫底升高且硬
C. 阴道少量出血
D. 外露脐带延长
E. 压耻骨联合上方，脐带不回缩
- 经阴道分娩时，为预防产后出血，静脉注射麦角新碱应在
A. 胎盘娩出后
B. 胎头着冠时
C. 胎头拨露使阴唇后联合紧张时
D. 胎肩娩出后
E. 胎头娩出后
- 下列关于子宫复旧的表现，哪项是正常的
A. 产后第 2 天宫底平脐
B. 产后 1 个月子宫恢复正常大小
C. 产后宫底每天下降 1~2cm
D. 产后 10 天为血性恶露
E. 产后 14 天宫底在耻骨联合上 2cm
- 下列关于胎儿急性缺氧的原因，说法正确的是
A. 脐带脱垂
B. 胎膜早破
C. 妊娠合并高血压疾病
D. 胎盘功能异常
E. 妊娠合并糖尿病
- 关于脐带过短的概念，以下正确的是
A. <20cm
B. <30cm
C. <40cm
D. <50cm
E. <55cm
- 如果胎膜未破，下述哪项可以考虑有脐带先露的可能
A. 宫缩时，胎心率突然变慢
B. 胎动时，胎心率突然变慢
C. 宫缩后，胎心率突然变慢
D. 平静时，胎心率突然变慢
E. 胎动、宫缩后胎心率突然变慢，改变体位、上推先露部及抬高臀位后迅速恢复



8. 第二产程心脏负担最重不是由于
- A. 血容量增加
 - B. 肺循环压力升高
 - C. 周围阻力更为升高
 - D. 心排血量及平均动脉压升高
 - E. 腹压加大, 内脏血液涌向心脏
9. 早期妊娠的辅助诊断, 下列哪项最可靠
- A. 妊娠试验阳性
 - B. 黄体酮试验阳性
 - C. 双合诊检查子宫增大
 - D. 双相型基础体温持续 3 周未降
 - E. 超声检查可见胎心搏动、胎囊
10. 关于产褥期保健的指导错误的是
- A. 不哺乳者可采用药物避孕
 - B. 哺乳可使产后宫缩痛加重
 - C. 哺乳期月经复潮前可不用采取避孕措施
 - D. 产褥早期排汗增多, 以夜间和初醒时更明显
 - E. 产后 42 天产妇应到门诊做全身及妇科检查
11. 阴道分娩镇痛需将神经阻滞范围控制在 () 之间。
- A. 胸 8~骶 3
 - B. 胸 10~骶 5
 - C. 胸 11~骶 4
 - D. 胸 7~骶 5
 - E. 胸 9~骶 4
12. 产后应适当补充维生素和铁剂, 推荐补充铁剂
- A. 1 个月
 - B. 2 个月
 - C. 3 个月
 - D. 4 个月
 - E. 5 个月
13. 胎头双顶径长 98~100mm, 股骨长 78~80mm, 腹围(), 应考虑巨大胎儿, 同时排除双胎、羊水过多及胎儿畸形。
- A. >330mm
 - B. >340mm
 - C. >350mm
 - D. >360mm
 - E. >370mm
14. 黄体功能不足的患者子宫内膜的病理改变是
- A. 增生期子宫内膜
 - B. 萎缩型子宫内膜
 - C. 内膜分泌反应不良
 - D. 子宫内膜增生过长
 - E. 分泌期和增生期共存
15. 关于不协调性子宫收缩乏力, 下列处理正确的是
- A. 人工破膜术
 - B. 即刻行剖宫术
 - C. 静脉滴注缩宫素
 - D. 第一产程中可肌注哌替啶
 - E. 宫口开全准备助产前应再次给予哌替啶
16. 对于假丝酵母菌阴道炎, 下列哪项是恰当的
- A. 典型的白带为黄色泡沫状
 - B. 顽固病例要注意并发糖尿病
 - C. 患假丝酵母菌阴道炎的孕妇可暂不治疗
 - D. 用 1: 5000 的高锰酸钾冲洗阴道可提高疗效
 - E. 致病的白色假丝酵母菌主要来源于手足



癍，因交叉感染而致病

17. 子宫脱垂与下列哪项病因无关

- A. 腹腔压力增加
- B. 盆底组织损伤
- C. 先天性盆底组织发育不良
- D. 妊娠后子宫增大压力增加
- E. 绝经后雌激素水平降低

18. 妊娠期肝内胆汁淤积症的诊断依据不包括下列哪项

- A. 孕晚期出现瘙痒
- B. 肝区压痛明显
- C. 肝胆酸及牛磺酸比值为 3:1
- D. 病理切片毛细胆管扩张合并微绒毛水肿
- E. 肝功能测定天冬氨酸转氨酶、丙氨酸转氨酶轻至中度升高

19. 为避免早产儿发生呼吸窘迫综合征，可在分娩前使用

- A. 地塞米松
- B. 碳酸氢钠
- C. 尼可刹米
- D. 山梗菜碱
- E. 维生素 K

20. 老年性阴道炎的治疗以下哪项是正确的

- A. 1%龙胆紫涂阴道
- B. 阴道内用少量雌激素
- C. 白带化验 3 次阴性为治愈
- D. 用碱性液冲洗阴道可提高疗效
- E. 口服或肌注抗生素以彻底治疗

21. 对于输卵管间质部妊娠的术式，下列说法恰当的是

- A. 行子宫次全切除术

B. 行患侧输卵管切除术

C. 行子宫角部楔形切除术

D. 行子宫角部楔形切除及患侧附件切除术

E. 行子宫角部楔形切除及患侧输卵管切除术

22. 妊娠 10 周时出现阵发性下腹痛及大量阴道出血伴小块组织物排出，并发生失血性休克，应首先考虑为

- A. 难免流产
- B. 不全流产
- C. 完全流产
- D. 稽留流产
- E. 先兆流产

23. 子宫脱垂 II、III 度者的主要临床表现为

- A. 尿潴留
- B. 腰背酸痛
- C. 有下坠感
- D. 排便困难
- E. 排使用力时，阴道口有一肿物脱出

24. 子宫内膜异位症最典型的症状为

- A. 不孕
- B. 性交痛
- C. 月经异常
- D. 异位囊肿破裂
- E. 继发性进行性痛经

25. 下述哪种情况导致宫缩乏力时，可用缩宫素处理

- A. 宫颈水肿
- B. 头盆不称
- C. 协调性宫缩乏力
- D. 子宫痉挛性狭窄环
- E. 不协调性宫缩乏力



26. 念珠菌阴道炎的临床表现, 哪项是错误的
- A. 尿频、尿痛
 - B. 外阴瘙痒、灼痛
 - C. 阴道粘连、灼痛
 - D. 白色豆腐渣样分泌物
 - E. 阴道壁上可见白色假膜, 擦去后可见浅表溃疡
27. 引起膀胱阴道瘘的主要因素为
- A. 长期便秘
 - B. 妇科手术损伤
 - C. 子宫托安放不当
 - D. 放射治疗宫颈癌
 - E. 第二产程延长组织挤压而缺血坏死
28. 下列胎盘因素中, 哪一项不会引起出血症状
- A. 胎盘植入
 - B. 胎盘全部粘连
 - C. 胎盘剥离不全
 - D. 胎盘剥离后滞留
 - E. 胎盘、胎膜残留
29. 为预防子宫内膜异位症, 下列禁忌的是
- A. 防止经血倒流
 - B. 人工流产时, 不要突然降低负压
 - C. 月经期应避免不必要的盆腔检查
 - D. 避免手术操作时引起的内膜种植
 - E. 输卵管通液术应在月经前期进行
30. 关于急性盆腔炎, 下列哪项不正确
- A. 可有寒战、高热
 - B. 慢性盆腔炎急性发作
 - C. 可发生于产后或流产后感染
 - D. 急性期定期做盆腔检查, 了解病情
 - E. 治疗应彻底, 以免形成慢性盆腔炎
31. 子宫内膜癌癌前病变指的是
- A. 增生期子宫内膜
 - B. 萎缩型子宫内膜
 - C. 子宫内膜不典型增生
 - D. 子宫内膜腺囊型增生过长
 - E. 子宫内膜腺瘤型增生过长
32. 哪项不能作为判断妊娠期高血压疾病严重程度指标
- A. 水肿
 - B. 血压
 - C. 球蛋白测定
 - D. 眼底动脉痉挛程度
 - E. 肝肾功能损害程度
33. 关于人工流产并发症, 下列错误的是
- A. 术后感染
 - B. 吸宫不全并不常见
 - C. 双子宫易发生漏吸
 - D. 瘢痕子宫易发生子宫穿孔
 - E. 宫体过度屈曲易发生吸宫不全
34. 先兆流产的症状出现最早的是
- A. 宫口扩张
 - B. 持续性腹痛
 - C. 少量阴道出血
 - D. 大量阴道出血
 - E. 子宫停止增大
35. 在产褥感染处理中错误的是
- A. 半卧位
 - B. 纠正全身一般情况
 - C. 选用有效的抗生素
 - D. 胎盘残留者, 应控制感染后清宫
 - E. 禁用肾上腺皮质激素, 避免感染扩散



二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

36. 产妇李某，孕 41 周自然临产入院待产，孕期定期检查未发现明显异常，现已临产 8 小时，宫口开大 4cm，宫缩规律有力，胎心间断出现 113 次/分，下列哪项检查不能提示胎儿窘迫

- A. 胎儿心电监护提示晚期减速
- B. 胎动 1~2 次/小时
- C. 头先露破膜羊水黄绿色
- D. CST: I 类
- E. 胎儿头皮血 pH<7.25

37. 初产妇，33 岁。产程进展顺利，宫口开全 1 小时，胎头已拨露，胎心监护为早期减速，此时应采取的处理是

- A. 立即剖宫产
- B. 产钳助产
- C. 立即静滴葡萄糖液
- D. 静滴缩宫素
- E. 等待自然分娩

38. 24 岁初产妇，妊娠 38 周，规律宫缩 7 小时。BP 110/70mmHg，骨盆不小，预测胎儿体重为 2800g，枕左前位，胎心良。肛查宫口开大 4cm，S=0。本例正确处置应是

- A. 人工破膜
- B. 肌注哌替啶 100mg
- C. 静脉推注地西洋 10mg
- D. 不需干涉产程进展
- E. 静脉滴注缩宫素

39. 27 岁初产妇，妊娠 39 周，规律宫缩 6 小时。枕左前位，估计胎儿体重 2700g，胎心 142 次/分。阴道检查：宫口开大 3cm，

未破膜，S=+1，骨盆外测量未见异常。此时恰当处理应是

- A. 抑制宫缩，使其维持至妊娠 40 周
- B. 等待自然分娩
- C. 人工破膜加速产程进展
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 行剖宫产术

40. 36 岁妇女，停经 52 天，阴道少量流血 3 日，伴阵发性下腹痛并逐渐加重，检查发现子宫增大如孕 50 天，宫口松，并见有组织物堵塞，下列哪项处理恰当

- A. B 超检查
- B. 肌内注射黄体酮
- C. 验血常规
- D. 动态观察
- E. 立即清宫

41. 某足月孕妇入院后进行缩宫素引产，第 1 天出现规律宫缩，但引产 12 小时后，宫颈未开，停缩宫素后宫缩很快消失，第 2 天再次复查 B 超，羊水指数为 5，各种临床资料未显示破水，下列处理比较恰当的是

- A. 改用米索前列醇引产
- B. 继续缩宫素引产
- C. 在严密胎心监护下进行缩宫素引产
- D. 择期剖宫产
- E. 可以急症剖宫产

42. 育龄女性，停经 50 天，阴道大量出血，急诊来院。查：脉搏 110 次/分，血压 90/40mmHg，内诊查宫口处有胚胎组织堵塞，宫体略大。正确处理方法是



- A. 纠正休克后再行刮宫
- B. 边纠正休克边行刮宫
- C. 输血，缩宫素静脉点滴
- D. 立即行刮宫术
- E. B 型超声检查后行刮宫术

43. 25 岁，初孕妇，孕 31 周产前检查正常，孕 34 周出现头痛、眼花症状。检查：血压 180/110mmHg，尿蛋白 2.6g/24h，水肿(++)，眼底 A:V=1:2，视网膜水肿。本例应诊断为

- A. 轻度子痫前期
- B. 重度子痫前期
- C. 妊娠期蛋白尿
- D. 妊娠合并慢性高血压
- E. 妊娠合并慢性肾炎

44. 25 岁，妊娠 38 周初孕妇，晨起突然剧烈头痛伴喷射性呕吐，血压 160/110mmHg，尿蛋白(+++)，不恰当的治疗措施是

- A. 静注硫酸镁 4g 后，继续静脉滴注 1g/h
- B. 快速静滴 20%甘露醇 250ml
- C. 静注地西洋 10mg
- D. 静注地塞米松 20mg
- E. 立即行剖宫产术

45. 26 岁，初孕妇，妊娠 34 周，血压 150/90mmHg，尿蛋白 0.4g/24 小时，下肢明显水肿，有头痛自觉症状。既往无高血压病史。本例应诊断为

- A. 妊娠期水肿
- B. 妊娠期高血压
- C. 轻度子痫前期
- D. 重度子痫前期
- E. 妊娠期蛋白尿

46. 初孕妇，29 岁，妊娠 37 周。头痛 1 周，今晨喷射性呕吐 1 次，1 小时前突然抽搐并随即昏迷入院。查体：BP 180/120mmHg。尿蛋白(+++)。该患者最可能的诊断是

- A. 子痫
- B. 脑出血
- C. 分离(转换)性障碍
- D. 癫痫
- E. 脑血栓形成

47. 女性，27 岁。妊娠 38 周，伴头痛、头晕、视物不清 1 天。体格检查：BP 180/110mmHg，尿蛋白(+)，水肿(+)，胎心 140 次/分。肛诊：子宫颈管未消失，NST 为无反应型。最恰当的处理是

- A. 静脉滴注硫酸镁，继续妊娠
- B. 降压利尿
- C. 治疗 4 天无好转行剖宫产术
- D. 促宫颈成熟
- E. 治疗同时立即剖宫产

48. 26 岁已婚妇女，G₀P₀，诊断为葡萄胎，下列哪些是不恰当的

- A. 应取近子宫壁的刮出物送病理检查
- B. 子宫过大者，应行第二次刮宫
- C. 一经诊断，应尽快清宫
- D. 葡萄胎排出后，均应进行预防性化疗
- E. 40 岁以上的妇女，水泡较小，滋养层细胞增生明显，可考虑切除子宫

49. 27 岁已婚妇女，停经 45 天，剧烈腹痛 2 天，阴道不规则流血 1 天，今晨从阴道排出三角形膜样组织，检查贫血外貌，下腹部压痛、反跳痛明显， β -hCG ≥ 18 ku/L，阴道超声检查未见到宫内妊娠囊。正确的治疗措施应选择



- A. 立即行刮宫术
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 肌内注射麦角新碱
- D. 行剖腹探查术
- E. 应用止血药

50. 初产妇平素月经规则，诊断为“妊娠期糖尿病”，现停经 28 周。停经 20 周开始自觉胎动，但近 3 周自觉胎动消失，行 B 型超声检查发现“宫内死胎，胎儿大小相当于 24 周”。该患者引产前必须特别注意的是

- A. 监测血糖
- B. 检查肾功能
- C. 检查心功能
- D. 做相关凝血功能检查
- E. 检查肝功能

51. 患者，女，30 岁，G₁P₁，孕 39 周，因第二产程延长，行会阴左侧-后侧切开术及产钳助产术，经阴道分娩一男活婴，胎盘、胎膜娩出完整。产后检查：宫底脐下 1 指，血压 110/80mmHg。产后 1 小时，患者感心悸、恶心、口渴、出冷汗，检查阴道出血量不多，色暗红，有凝血块，宫底脐上 1 指，软，血压 80/50mmHg。考虑该患者是子宫收缩乏力导致的宫腔内隐匿性出血。那么针对该情况，首先需要做的处理是

- A. 注射缩宫素
- B. 给予止血药
- C. 给予抗生素
- D. 按摩子宫排出宫腔内积血
- E. 切除子宫

52. 25 岁初孕妇，G₁P₀，孕 39 周，阵发性腹痛 6 小时入院。骶耻外径 18cm，坐骨结节间径 8cm，查宫高 38cm，腹围 98cm，骶

左前，胎心 140 次/min，肛查，宫口开 3cm，未破膜，足先露，入院后 5 小时宫缩 30 秒/6~7 分，产程无进展。最恰当的处理是

- A. 静滴催产素
- B. 温肥皂水灌肠
- C. 人工破膜
- D. 不需处理，继续观察
- E. 剖宫产

53. 28 岁初孕妇，妊娠 40 周，规律宫缩 12 小时。近 2 小时产程无进展，产妇呼喊疼痛，腹部拒按，子宫呈痉挛性收缩，胎位触不清，胎心 152 次/min。肛查宫口开大 3cm，胎头 S+1。正确处理方式是

- A. 阴道检查后再决定分娩方式
- B. 静脉滴注缩宫素
- C. 肌内注射哌替啶 100mg
- D. 人工破膜后静滴缩宫素
- E. 立即行剖宫产术

54. 26 岁女性，G₁P₀，孕 38 周，估计胎儿体重 3600g，在人工破膜和缩宫素静脉滴注下，5 小时宫口开大 9cm，突然脐下 2 指处可见病理性缩复环，导尿呈浅粉色。那么针对该患者最适宜的处理是

- A. 立即停用缩宫素，等待自然分娩
- B. 给予镇静剂后等待自然分娩
- C. 给予镇静剂后行阴道助产
- D. 立即行胎头吸引助产术
- E. 立即行剖宫产术

55. 患者，女，31 岁，药物流产后 5 天，高热伴右下腹痛 2 天。妇科检查：T 38.5℃，WBC 10×10⁹/L，白带脓性，宫颈举痛，宫体如妊娠 6 周，右附件区有明显压痛。最



可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 宫外孕
- C. 急性盆腔炎
- D. 卵巢巧克力囊肿破裂
- E. 肠穿孔

56. 患者，女，50岁，血性白带1个月，妇科检查：阴道未受肿瘤侵犯，宫颈菜花样，宫体正常大小，宫旁明显增厚，未达盆腔，宫颈活检为鳞癌。其分期是

- A. Ia期
- B. Ib期
- C. IIa期
- D. IIb期
- E. IIIa期

57. 患者，女，60岁，绝经4年，反复阴道流血3次，量中等，平时白带少许，B超示子宫相对增大，宫腔内可见实质不均回声区，形态不规则宫腔线消失。首先考虑的诊断是

- A. 输卵管癌
- B. 子宫内膜癌
- C. 子宫颈癌
- D. 子宫内膜炎
- E. 老年性阴道炎

58. 患者，女，28岁，人流术后3天，突起右下腹剧痛伴呕吐，向右侧卧时腹痛加重，查体温37.8℃，脉搏100次/min，痛苦病容，下腹软，有压痛，右侧明显；妇科检查：子宫大小、质地正常，后倒，欠活动，子宫右侧可扪及一拳头大小，不活动囊性肿块，近子宫处压痛明显；血象：WBC $11 \times 10^9/L$ ，N 0.80。其诊断为

- A. 右输卵管炎

- B. 阑尾周围脓肿
- C. 盆腔脓肿
- D. 卵巢囊肿蒂扭转
- E. 右输卵管妊娠流产

59. 葡萄胎清宫术后3个月，阴道不规则流血，子宫稍大，尿hCG(+)，组织学检查在子宫、肌层内见到退化的绒毛阴影。胸片示双下肺有多处片状阴影。最可能的诊断是

- A. 绒毛膜癌
- B. 先兆流产
- C. 异位妊娠
- D. 葡萄胎残留
- E. 侵蚀性葡萄胎

60. 某产妇，25岁，自然分娩，哺乳期应采取的避孕措施是

- A. 哺乳期内禁止性交
- B. 哺乳期内卵巢停止排卵不必避孕
- C. 自然避孕
- D. 工具避孕
- E. 药物避孕

61. 患者，女，25岁，停经48天，1个月前曾不正规服用过探亲避孕药，现阴道少量出血5天，伴腹痛。B超示宫内早孕。最佳处理方案为

- A. 注射黄体酮
- B. 注射绒毛膜促性腺激素
- C. 吸宫术终止妊娠
- D. 中药安胎
- E. 注射催产素

62. 30岁初产妇，妊娠40周，宫缩规律，枕左前位，胎心良好，肛查宫口开大2cm，



胎头未衔接。符合本产妇实际情况的骨盆测量数据应是

- A. 髂棘间径 24cm
- B. 骶耻外径 17cm
- C. 髂嵴间径 27cm
- D. 坐骨棘间径 10cm
- E. 坐骨结节间径 8.5cm

63. 第2胎产妇, 27岁。孕34周, 曾作产前检查未发现异常。足月临产5小时后破膜, 随羊水流出现有胎儿手臂脱出阴道口而转送来院。检查: 血压130/90mmHg, 脉搏114次/min, 宫缩频、强, 子宫下段平脐, 压痛明显。胎儿是横位, 胎头在子宫左侧, 胎儿右手臂脱于阴道口, 阴道内有脐带, 宫口开大6~7cm, 胎心消失, 导尿为肉眼血尿, 诊为忽略性横位。处理应为

- A. 给镇静剂, 止痛, 等待自然分娩
- B. 全麻下, 做内倒转术
- C. 全麻下, 还纳手臂, 做外倒转
- D. 立即行剖宫产术
- E. 做内倒转及臀牵引

64. 患者, 女, 29岁, 孕34周, 规律性腹痛3小时, 无阴道流水及流血, 阴道检查宫口未开, 宫颈管未消失。此时, 最恰当的处理是

- A. 缩宫素引产
- B. 尽快终止妊娠
- C. 促胎肺成熟同时等待自然分娩
- D. 促胎肺成熟同时剖宫产
- E. 抑制宫缩同时促胎肺成熟

65. 患者, 女, 40岁, 已婚, G₃P₁。既往月经规律, 现停经50天, 与他人争吵后突发腹痛、呕吐、腹泻, 阴道点滴流血就诊。查体: BP 80/50mmHg, P 120次/min。右下腹压痛, 移动性浊音(+), 尿HCG(+). 有助于简单、快速明确诊断的检查措施是

- A. 阴道后穹隆穿刺
- B. 血hCG测定
- C. 宫腔镜
- D. 阴道镜
- E. B超

三、A3/A4型题

答题说明: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

40岁女性患者, 白带增多伴外阴瘙痒5天就诊。妇科检查: 见外阴黏膜充血, 阴道壁充血, 分泌物黄色、稀薄、泡沫状, 草莓样宫颈。

66. 此患者应进行下列哪项检查

- A. 血常规
- B. 阴道镜检查
- C. 阴道分泌物细菌培养及药敏试验
- D. 阴道分泌物悬滴法查滴虫
- E. 阴道细胞学检查

67. 此患者最可能的诊断为

- A. 滴虫阴道炎
- B. 外阴阴道念珠菌病
- C. 老年性阴道炎
- D. 非特异性阴道炎
- E. 细菌性阴道病

68. 治疗不妥的是

- A. 甲硝唑 2g, 单次口服
- B. 甲硝唑阴道泡腾片 200mg, 每晚1次,



连用7~10日

- C. 阴道局部应用小苏打冲洗
- D. 性伴侣同时治疗, 治疗期间禁止性交
- E. 治疗后应于每次月经后复查白带, 3次均阴性方为治愈

经产妇, 36岁, 孕32周, 水肿1周, 血压150/100mmHg, 宫高26cm, 胎心144次/分, 水肿(++), 尿蛋白(++).

69. 最可能的诊断是
- A. 轻度妊娠期高血压疾病
 - B. 中度妊娠期高血压疾病
 - C. 重度妊娠期高血压疾病
 - D. 先兆子痫
 - E. 子痫

70. 最主要的检查是

- A. 血细胞比容
- B. 血总蛋白量
- C. 凝血功能
- D. 眼底
- E. B超

71. 不需采取的措施是

- A. 卧床休息行左侧卧位
- B. 给予地塞米松
- C. 给予硫酸镁
- D. 给予地西洋
- E. 给予胍屈嗪

72. 预防该病的措施不包括

- A. 指导孕妇减少脂肪及过多盐摄入
- B. 保持情绪愉快
- C. 积极用钙制品
- D. 增加产前检查次数
- E. 在妊娠晚期开展预测工作

患者女性, 34岁, 结婚10年, G₄P₀, 人流3次, 孕32周, 阴道少量出血3天, 不伴腹痛。检查: 儿头高浮, 胎心140次/分, 耻骨联合上方可闻及胎盘杂音。

73. 诊断此病需做的检查是

- A. B超
- B. 腹部CT
- C. 消毒内诊
- D. 血、尿常规
- E. 心电图

74. 最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 前置胎盘
- C. 胎盘早剥
- D. 先兆子宫破裂
- E. 胎盘边缘血窦破裂

75. 最恰当的处理是

- A. 即刻人工破膜
- B. 人工破膜及催产素静脉滴注
- C. 催产素引产
- D. 即刻剖宫产
- E. 期待疗法

女性, 32岁, 已婚。2个月前妇科检查正常。今突然左下腹痛阴道少量出血就诊。检查: 面色苍白, 心率110次/分, 血压90/60mmHg。B超检查: 子宫正常大小, 左侧4cm×4cm×3cm非均质包块, 盆腔中量积液。检查尿HCG(-)。

76. 本病例最有价值的病史是

- A. 腹痛情况
- B. 有无恶心、呕吐
- C. 有无停经
- D. 有无晕厥



E. 有无外伤史

77. 需立即采取的诊断方法是

- A. 子宫镜检查
- B. 腹腔镜检查
- C. X线检查
- D. 后穹窿穿刺或腹穿
- E. 血常规检查

78. 可能的诊断是

- A. 左卵巢肿物
- B. 左侧输卵管妊娠
- C. 先兆流产
- D. 痛经
- E. 功血

79. 如确诊为输卵管妊娠破裂, 其最佳处理方法是

- A. 腹腔镜或剖腹探查
- B. 观察
- C. 输血、输液
- D. 保守治疗
- E. 化学药物治疗

初产妇, 23岁, 妊娠39周临产, 破水7小时入院。查体: 腹围97cm, 宫高30cm, LOA, 胎心140次/分。肛查: 宫口开大3cm, 宫缩间歇时有血性羊水流出。6小时后阴道出血较多, 胎心音变慢不规律, 经积极治疗, 2小时后分娩出一男婴, 苍白窒息, 经抢救无效死亡。

80. 此产妇最可能的诊断是

- A. 重型胎盘早剥
- B. 脐带帆状附着的前置血管破裂
- C. 部分性前置胎盘
- D. 胎盘边缘血窦破裂

E. 轮廓状态盘

81. 此患者的临床诊断主要根据下列哪项

- A. 产前诊断通过阴道检查来确诊
- B. 取阴道血涂片找到有核红细胞或幼红细胞
- C. 脐血流图
- D. 彩色超声多普勒
- E. B超检查

82. 此患者产后检查胎盘, 可能的阳性发现为

- A. 脐带附着于胎盘边缘, 胎膜破口处有一主干血管破裂
- B. 胎盘表面为一黄白色环, 胎盘边缘薄弱破裂
- C. 胎盘边缘有陈旧性凝血块附着
- D. 胎盘呈马蹄状, 并有副胎盘
- E. 胎盘表面呈现紫色, 有血块压迹

初产妇, 孕40周, 估计胎儿体重3900g, 临产15小时, 宫口开4cm, 以5%葡萄糖、糖、缩宫素5U静脉点滴, 4小时后宫口开9cm, 先露S+1, 但产妇烦躁不安, 疼痛难受, 腹部检查见脐下两指处呈环状凹陷, 下段有压痛。胎心音正常, 导尿呈血性。

83. 最可能的诊断是

- A. 先兆子宫破裂
- B. 完全子宫破裂
- C. 膀胱破裂
- D. 不完全性子宫破裂
- E. 脾破裂

84. 立即采取的处理方法为

- A. 立即产钳助产
- B. 继续滴缩宫素, 待宫口开全后做会阴切开助产
- C. 立即肌内注射哌替啶



- D. 会阴切开后头皮钳牵引助产
E. 立即停注缩宫素
85. 应选择的分娩方式为
- A. 立即产钳助娩
B. 会阴切开后自然分娩
C. 立即行胎头吸引器助娩
D. 立即剖宫产
E. 给予缩宫素，待宫口开全后，按压宫底自娩

孕妇 24 岁初，妊娠 43 周，自觉胎动减少已 2 日。血压 110/70mmHg，枕左前位，无头盆不称征象。

86. 该孕妇可以省略的检查项目是
- A. B 型超声监测
B. 测量子宫长度和腹围
C. 胎儿监护仪监测胎心变化
D. Bishop 宫颈成熟度评分
E. 超声多普勒测胎心率
87. 为能恰当处理，最重要的检查项目是
- A. 测羊水卵磷脂/鞘磷脂比值
B. 测羊水胆红素类物质值
C. 测孕妇尿液雌激素/肌酐比值
D. 测羊水肌酐值
E. 测羊水脂肪细胞百分率
88. 不能证明胎盘功能低下的项目是
- A. 羊膜镜观察羊水性状
B. 测胎儿头皮血 PH
C. 测孕妇血胎盘泌乳素值
D. 胎儿监护仪行缩宫素激惹试验
E. 超声多普勒检查胎心率
89. 经上述检查证实胎盘功能减退，此时最

- 恰当的处理应是
- A. 静滴缩宫素使其经阴道分娩
B. 行剖宫产术结束分娩
C. 左侧卧位，吸氧，等待自然分娩
D. 刺激乳头诱发宫缩
E. 静滴维生素 C，吸氧，等待自然分娩

90. 该例于产前及产后，胎儿及新生儿不常发生的疾病是

- A. 新生儿窒息
B. 胎儿窘迫
C. 新生儿硬肿症
D. 新生儿吸入性肺炎
E. 新生儿颅内出血

24 岁孕妇，妊娠 40 周，已临产 10 小时，宫缩时胎心 100 次/分，内诊查宫颈口开大 2cm，先露 S-3，骨产道无异常。

91. 此时最适宜的诊断为

- A. 正常产程
B. 潜伏期延长
C. 胎儿宫内窘迫
D. 活跃期阻滞
E. 头盆不称

92. 宫口开大 3cm 时，宫缩每 2~3 分钟一次，持续 40 秒，宫缩间歇时听胎心 165 次/分，下列除哪项措施外均可采取

- A. 人工破膜，观察羊水性状
B. 给予缩宫素静滴加速产程
C. 嘱产妇左侧卧位
D. 给予地西洋静脉滴注加速产程
E. 给予孕妇氧气吸入

93. 如果做胎心监护，除下列哪项外，均有助于诊断



- A. 胎心率无反应型
- B. 胎心晚期减速
- C. 胎心变异减速
- D. 胎心基线缺乏变异
- E. 胎心率减慢

94. 临产 18 小时，宫口已开全，先露 S+2，胎心持续在 165 次/分，此时最恰当的处理应是

- A. 左侧卧位，面罩吸氧
- B. 立即剖宫产
- C. 静脉滴注葡萄糖、维生素 C 及尼可刹米
- D. 静脉滴注 5% 碳酸氢钠
- E. 阴道助产分娩

经产妇，产后第 1 天，诉下腹痛。查体：有低热，出汗，咽无充血，无恶心呕吐、腹泻，脐下二横指处触及一硬块上界，白细胞 $11.0 \times 10^9/L$ ，中性 0.75。

95. 最可能的诊断是
- A. 产后子宫内膜炎
 - B. 产后宫缩痛
 - C. 子宫肌瘤红色变性
 - D. 卵巢囊肿扭转
 - E. 子宫肌炎

96. 正常产后第 3 天，乳房胀痛，无红肿，乳汁少，伴低热。解决方法首选

- A. 芒硝敷乳房
- B. 生麦芽煎汤喝
- C. 用吸奶器吸乳汁
- D. 让新生儿多吸吮双乳
- E. 少喝汤水

97. 产后第 4 天，双乳房胀，乳汁排流不畅，最常见原因是

- A. 进食少
- B. 卧床不活动
- C. 未及早按摩、热敷乳房
- D. 未给新生儿早吸吮、多吸吮
- E. 乳头凹陷

28 岁已婚妇女，平素月经规则，周期均为 28 天。末次月经为 2020-5-7，于 2020-6-14 来院就诊，主诉为“少量阴道血性分泌物 3 天”，无腹痛。

98. 本患者首先应检查

- A. 尿 HCG 检查
- B. 基础体温检查
- C. 尿常规检查
- D. 子宫颈黏液涂片
- E. 诊断性刮宫

99. 假设该妇女已妊娠，确诊宫内妊娠应选择

- A. 最早在停经 4 周时行阴道 B 型超声查看宫内妊娠囊
- B. 最早在停经 5 周时行阴道 B 型超声检查看是否妊娠囊内有胚芽和原始心管搏动
- C. 最早在停经 6 周时行阴道 B 型超声检查看是否妊娠囊内有胚芽和原始心管搏动
- D. 行妇科检查看子宫是否增大变软
- E. 进行子宫颈黏液检查

100. 若本例患者于停经 6 周行 B 型超声检查，宫内未见妊娠囊，见左附件区低回声包块，应高度怀疑是

- A. 葡萄胎
- B. 左附件异位妊娠
- C. 左卵巢囊肿
- D. 左输卵管积水
- E. 左卵巢黄体



2022 年妇产科主治医师《专业实践能力》模拟试卷

一、案例分析题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设有 3~12 个问题。每个问题的备选答案至少 6 个，最多 12 个，正确答案及错误答案的个数不定(≥1)。请从备选项中选出正确答案。答案可能包括正确选项、关键选项、无关选项和错误选项，考生每选对 1 个正确选项给 1 个得分点，选错 1 个扣 1 个得分点，选对 1 个关键选项给 2 个得分点，选无关选项不得分也不扣分，直扣至本问题得分为 0(即无得负分的情况)。

患者，女，28 岁，G₁P₀。因“停经 34 周，咳嗽伴白色痰 7 天。食欲缺乏、恶心呕吐 2 天，自觉胎动消失 1 天”入院。患者有糖尿病病史 10 年，孕前口服降糖药治疗。本次妊娠后改用胰岛素治疗，自 22 周妊娠开始调整为应用诺和灵 30R 18U，16U，16U 三餐前 1h。此后未随诊及监测血糖。7 天前患者受凉后出现咳嗽，伴低热。口服阿奇霉素，效果不佳。近 2 天食欲减退，伴恶心、呕吐。呕吐物为胃内容物。伴乏力、头痛。胎动明显较前减少，近 1 日未觉胎动。入院查体：T 37.2℃，P 96 次/分，R 22 次/分，BP 135/80mmHg。神志清，烦躁。双肺呼吸音粗，未闻及明显的干湿性啰音。腹部膨隆，宫高 30cm，腹围 90cm，LOA。未闻及胎心。水肿(+)。B 超：死胎。尿酮体(++++)。

1. 根据现有临床资料，患者初步诊断包括

- A. 34 周妊娠，G₁P₀
- B. 34 周妊娠临产，G₁P₀
- C. LOA
- D. 死胎
- E. 妊娠期糖尿病
- F. 糖尿病合并妊娠

- G. 妊娠合并上呼吸道感染
- H. 妊娠合并肺炎
- I. 妊娠合并急性胃炎
- J. 妊娠合并肝炎
- K. 妊娠合并甲亢
- L. 可疑糖尿病酮症酸中毒

2. 患者入院以后，病情进一步恶化。出现嗜睡、皮肤潮红，呼吸深快、尿量减少，脉搏细弱，血压下降。呼气带有烂苹果味道。高度怀疑为酮症酸中毒。需要完善的实验室检查包括

- A. 尿常规
- B. 随机血糖
- C. 空腹血糖
- D. 餐后 1 小时血糖
- E. 餐后 2 小时血糖
- F. 糖化血红蛋白测定
- G. 血常规
- H. 肾功能检查
- I. 血气分析
- J. 肝功能

3. 患者尿糖(++++)，尿酮体(++++)。随



机血糖 21mmol/L。K⁺ 3.0mmol/L，Na⁺ 133mmol/L。pH 7.28，CO₂ CP 16mmol/L。诊断为酮症酸中毒。酮症酸中毒主要需要和一些异常情况鉴别诊断，正确的是

- A. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- B. 乳酸性酸中毒
- C. 饥饿性酮症
- D. 乙醇性酸中毒
- E. 低血糖昏迷
- F. 急性胰腺炎
- G. 肾小管性酸中毒
- H. Wernicke 脑病

4. 此时正确的处理措施包括

- A. 普通胰岛素，入生理盐水，静脉滴注
- B. 普通胰岛素，入 5% 葡萄糖氯化钠注射液，静脉滴注
- C. 普通胰岛素，入 5% 葡萄糖注射液，静脉滴注
- D. 胰岛素静滴速度 2~8U/h，平均 6U/h
- E. 胰岛素静滴速度 2~4U/h，平均 3U/h
- F. 胰岛素静滴速度 1~2U/h
- G. 每 1~2 小时复查血糖，调整胰岛素滴速
- H. 尿量超过 30ml/h 方可补钾
- I. 快速补液，第一个 2 小时可以滴注 1000ml
- J. 快速补液，第一个 2 小时可以滴注 1500ml
- K. 此后按照患者体重的 10% 估计补液量，以 150ml/h 滴速滴注
- L. 此后按照患者体重的 10% 估计补液量，以 250ml/h 滴速滴注

5. 经积极处理，2 小时后监测血糖已降至 13.6mmol/L。此时正确的处理措施包括

- A. 维持原治疗措施

B. 将输注胰岛素的生理盐水改为 5% 葡萄糖氯化钠注射液

C. 将输注胰岛素的生理盐水改为 5% 葡萄糖注射液

D. 将输注胰岛素的生理盐水改为 10% 葡萄糖注射液

E. 胰岛素用量按照葡萄糖：胰岛素 = (2~4) : 1

F. 胰岛素滴速 1~2U/h

G. 胰岛素滴速 2~3U/h

H. 胰岛素滴速 3~4U/h

I. 停用静脉胰岛素

J. 胰岛素皮下注射以防血糖反跳

K. 补液速度调整为 150ml/h

6. 酮症酸中毒如果处理不当，可能发生的严重并发症包括以下哪些情况

- A. 心力衰竭
- B. 心律失常
- C. 心肌梗死
- D. 休克
- E. 猝死
- F. 栓塞性疾病
- G. 脑水肿
- H. 急性肾功能衰竭
- I. 严重感染和败血症
- J. DIC
- K. 急性阑尾炎
- L. 乳酸酸中毒

患者 24 岁，G₂P₁，30 周妊娠，因阴道流血 2 天，无明显腹痛收入院。产前检查无明显异常。胎动无异常。否认发热或寒战。既往史和手术史无异常。查体：BP 100/60mmHg，HR 90 次/分，T 38.2℃。肺部听诊清晰，肋脊角处无触叩痛。产科检查：



宫底高度为 30cm，未及明显宫缩，宫底部轻微压痛，胎心率波动于 170~175 次/分，无减速。

7. 可能的诊断为

- A. 胎儿窘迫
- B. 泌尿系感染
- C. 30 周妊娠 G₂P₁
- D. 先兆早产
- E. 胎膜早破
- F. 宫内发育迟缓
- G. 羊膜腔感染
- H. 早产临产
- I. II 度胎盘早剥

8. 入院后处理正确的是

- A. 应用宫缩抑制剂
- B. 应用地塞米松 10mg 肌肉注射促进胎儿肺成熟
- C. 患者采取臀高位，减少脐带脱垂
- D. 严禁阴道检查
- E. 应用抗生素
- F. 终止妊娠，以剖宫产为宜
- G. 利凡诺引产
- H. 为缓解产妇紧张情绪，给予度冷丁 50mg
- I. 新生儿应当按照早产儿处理

9. 剖宫产术中孕妇突然出现烦躁不安，咳嗽，呼吸困难，心率升至 130 次/分，血压降至 70/40mmHg，下列叙述正确的是

- A. 立即应用宫缩抑制剂
- B. 抗过敏首选氢化可的松
- C. 首先考虑失血性休克
- D. 胎膜早破是发生此种情况的诱因之一
- E. 盐酸罂粟碱是解除肺动脉高压的首选药物
- F. 常用多巴胺或间羟胺提升血压

- G. 发病早期高凝状态时用肝素效果较好
- H. 应预防产后出血

患者，女性，60 岁。绝经 10 年。近半年内阴道少量出血 2 次，现阴道淋漓出血半个月余，G₃P₁。查体：心率 70 次/分，血压 140/90mmHg，身高 160cm，体重 60kg。腹软，无压痛，未触及肿物。妇科检查：老年外阴，阴道通畅，内有少量暗红色血；宫颈光滑，质韧；子宫水平位，增大如妊娠 40 天大，质中，活动，无压痛；双附件区未触及异常。

10. 该患者考虑的诊断包括

- A. 慢性宫颈炎
- B. 宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 无排卵性功能失调性子官出血
- E. 有排卵性功能失调性子官出血
- F. 子宫黏膜下肌瘤
- G. 子宫内膜息肉
- H. 子宫肉瘤
- I. 输卵管癌
- J. 卵巢恶性肿瘤

11. 提示：行分段诊刮提示：颈管长 3cm，刮出少量质脆组织；宫腔深 8cm，刮出较多质脆组织。病理回报：子宫颈管及宫腔刮出物，浆液性乳头状腺癌。该病理类型的临床特点是

- A. 雌激素依赖性
- B. 非雌激素依赖性
- C. 恶性度低
- D. 恶性度高
- E. 病程时间长
- F. 病程时间短
- G. 常局限于宫腔



H. 易发生肌层浸润及转移

12. 该患者有可能转移的部位有

- A. 双侧卵巢、输卵管转移
- B. 盆腔、腹腔腹膜种植
- C. 早期可有血行转移
- D. 腹股沟淋巴结转移
- E. 肺转移
- F. 腹主动脉旁淋巴结转移
- G. 横膈表面腹膜种植
- H. 大网膜种植

13. 提示：B超及MRI提示双附件未见异常，子宫肌层受累最深约1/2，散在盆腔淋巴结肿大。该患者应采取的治疗方案为

- A. 全子宫加双附件切除术
- B. 筋膜外全子宫加双附件切除术
- C. 广泛全子宫加双附件切除术
- D. 筋膜外全子宫加双附件切除+盆腔淋巴结切除术
- E. 筋膜外全子宫切除+双附件切除+盆腔淋巴结切除术、大网膜及阑尾切除
- F. 广泛性子宫切除+双附件切除+盆腔淋巴结切除术
- G. 广泛性子宫切除+双附件切除+盆腔淋巴结切除+腹主动脉旁淋巴结切除+大网膜+阑尾切除术提示：病理检查结果为子宫内膜浆液性乳头状腺癌，侵及肌层约1/2，累及宫颈黏膜，宫颈间质未侵及，卵巢、输卵管未见癌侵及，左髂外淋巴结可见癌转移。

14. 该患者分期应为

- A. Ia期
- B. Ib期
- C. II期
- D. IIIa期

E. IIIb期

F. IIIc期

G. IVa期

H. IVb期

15. 术后应结合的治疗有

- A. 化学治疗
- B. 放射治疗
- C. 口服甲羟孕酮，每天200~400mg，共6个月75mg，皮下注射，每月1次，连用6个月
- D. 己酸孕酮500mg，肌内注射，每周1次，共6个月
- E. 口服他莫昔芬，每天20mg，共6个月
- F. 亮丙瑞林

患者，女性，36岁。G₂P₁，平时月经3~5天/28~30天，量中。末次月经2017年4月11日，自觉胎动1周余，于2017年7月27日来门诊就诊，要求终止妊娠。腹部检查：宫底位于脐下1~2指。妇科检查：子宫增大，如妊娠18~20周大、软，附件未及异常。超声检查提示：胎儿双顶径4.5cm。

16. 该患者可选择的常用终止妊娠的方法是

- A. 钳刮术
- B. 水囊引产
- C. 负压吸宫术
- D. 利凡诺羊膜腔内注射引产
- E. 剖宫取胎术
- F. 药物流产

17. 提示：拟定采用依沙吡啶羊膜腔内注射引产。该方法的禁忌证是

- A. 生殖系统急性炎症
- B. 卵巢囊肿



- C. 羊水偏少
- D. 急、慢性肝、肾疾病，伴肝、肾功能不全
- E. 依沙吖啶过敏
- F. 产前诊断发现胎儿畸形
- G. 腹部皮肤感染
- H. 前置胎盘

18. 提示：完善各项辅助检查(包括腹部超声波检查)后收住院。该患者术前行盆腔超声检查的目的是

- A. 胎儿性别鉴定
- B. 核实胎位
- C. 胎盘定位
- D. 穿刺点定位
- E. 测定羊水量
- F. 抽取羊水做染色体检查

19. 提示：收住院后于2017年7月29日上午10时行依沙吖啶羊膜腔内注射引产术。

术中，违反常规的操作有

- A. 选择囊性感最明显的部位穿刺
- B. 根据B超定位选择穿刺点，尽量避开胎盘附着处进行穿刺
- C. 用7号带芯的腰椎穿刺针，在合适的穿刺点垂直刺入，一般通过3个阻力层，有落空感，即提示进入羊膜腔内
- D. 当拔出穿刺针芯后，回抽见血液或鲜血溢出，可调整穿刺部位、方向，重复穿刺直至进入羊膜腔
- E. 依沙吖啶药量可注入120mg，粉剂应用0.9%生理盐水溶解
- F. 注入药液过程中无须重复回抽羊水

20. 提示：2017年7月30日16:00开始规律宫缩，20:10自然破膜，20:20胎儿娩

出，20:25胎盘娩出，阴道出血约300ml。此时采取的处理是

- A. 宫颈注射缩宫素10U
- B. 输血
- C. 软产道检查
- D. 检查胎盘、胎膜
- E. 检查凝血功能
- F. 腹腔镜检查
- G. 开放外周静脉，静脉滴注缩宫素

21. 提示：检查胎盘完整，胎膜缺如2/3；宫颈3点处可见裂伤，长约3cm，伴有活动性出血。此时适宜的处理是

- A. 给予缩宫素
- B. 立即行清宫术
- C. 缝合宫颈裂伤
- D. 宫颈裂伤处压迫止血
- E. 口服米索前列醇
- F. 阴道放置卡前列甲酯栓

患者，女，25岁。G₁P₀，因继发不孕3年来就诊。3年前人工流产1次，术后发热1周。平时月经规则，但伴痛经，基础体温呈双相型。妇科检查：宫颈轻度糜烂，子宫后位，固定，正常大小，两侧附件未扪及肿块。

22. 继发不孕原因考虑主要是

- A. 子宫因素
- B. 配偶精液异常
- C. 宫颈因素
- D. 输卵管因素
- E. 下丘脑性排卵障碍
- F. 免疫因素
- G. 垂体性排卵障碍
- H. 子宫内膜异位症
- I. 卵巢功能不全



- J. 心理因素
- K. 子宫肌瘤
- L. 阴道因素

23. 如考虑为输卵管因素，应该首先进行的检查是

- A. 子宫输卵管碘油造影
- B. 腹腔镜检查
- C. 宫腔镜检查
- D. B超检查
- E. 排卵监测
- F. 配偶精液检查
- G. CT检查
- H. 超声下造影
- I. 激素测定
- J. 染色体检查
- K. 性交后试验
- L. 结核菌素试验

24. 提示：如果检查结果提示输卵管伞端阻塞，积水。建议的治疗方法有

- A. 手术切除输卵管
- B. IVF-ET
- C. IUI
- D. AID
- E. AIH
- F. 物理治疗
- G. 腹腔镜下输卵管分粘手术
- H. 腹腔镜下切除双输卵管，然后进行IVF-ET
- I. 开腹手术分离输卵管粘连+造口

- J. 输卵管通液治疗
- K. 宫腔镜治疗
- L. 中药治疗

患者，女性，49岁。G₃P₁，因痛经21年，加重6年，持续性下腹痛4个月，阴道流血20余天就诊。

25. 提示：妇科检查发现宫颈光滑，子宫正常大小，左附件有11cm包块，边界不清，右卵巢区扪及6cm包块，后穹隆触及结节。患者5年前院外B超检查发现附件包块。为明确诊断，应立即进行的辅助检查有

- A. 血CA125
- B. 血子宫内膜抗体
- C. 盆腔B超检查
- D. 血β-hCG测定
- E. 血常规
- F. 宫腔镜检查
- G. 腹腔镜检查
- H. 诊刮

26. 提示：血β-hCG正常，CA125 312U/L，抗内膜抗体升高，B超检查结果提示双附件包块。此时可能的诊断包括

- A. 子宫内膜异位症
- B. 卵巢癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 盆腔炎
- E. 陈旧性异位妊娠
- F. 盆腔结核
- G. 消化道肿瘤



2022 年妇产科主治医师《基础知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1.【正确答案】 C

【答案解析】阔韧带由前后两叶，其上缘游离，内 2/3 部包绕输卵管(伞部无腹膜遮盖)，外 1/3 部包绕卵巢动静脉，形成骨盆漏斗韧带，又称卵巢悬韧带，内含卵巢动静脉。骨盆漏斗韧带不直接与子宫相连。所以不属于子宫的韧带。

2.【正确答案】 B

【答案解析】根据髂棘间径可间接推测骨盆入口横径的长度。

3.【正确答案】 E

【答案解析】真骨盆是胎儿娩出的骨产道，与产道有直接联系。

4.【正确答案】 E

【答案解析】骨盆的类型包括女型、扁平型、类人猿型、男型。

5.【正确答案】 C

【答案解析】骨盆由骶骨、尾骨及左右两块髋骨组成。每块髋骨又由髌骨、坐骨和耻骨融合而成；骶骨由 5~6 块骶椎融合而成，呈楔(三角)形，其上缘明显向前突出，称为骶岬，是妇科腹腔镜手术的重要标志之一及产科骨盆内测量对角径的重要据点。尾骨由 4~5 块尾椎合成。

6.【正确答案】 E

【答案解析】骨盆形态、大小及生长发育受种族、遗传、营养和性激素的影响，对于地区没有特异性的差异。

7.【正确答案】 C

【答案解析】后方为尾骨尖，所以选项 C 错误。

8.【正确答案】 E

【答案解析】盆底内层由肛提肌及其上下筋膜组成，尿道、阴道和直肠贯穿其中。

9.【正确答案】 D

【答案解析】女性生殖器淋巴分外生殖器淋巴与内生殖器淋巴两组：一、外生殖器淋巴分深浅两部分，腹股沟浅淋巴结分为上下两组，上组沿腹股沟韧带排列，收纳外生殖器、阴道下段及肛门部的淋巴；下组位于大隐静脉末端周围，收纳会阴及下肢的淋巴。腹股沟深淋巴结位于股静脉内侧之股管内，收容阴蒂、腹股沟浅淋巴，汇入髂外及闭孔等淋巴结。二、内生殖器淋巴：分为 3 组，①髂淋巴结组由闭孔、髂内、髂外及髂总淋巴结组成；②骶前淋巴结位于骶骨前面；③腰淋巴结(也称腹主动脉旁淋巴结)位于腹主动脉旁。阴道下段淋巴主要汇入腹股沟浅淋巴结。阴道上段淋巴回流基本与子宫颈淋巴回流相同，大部汇入髂内及闭孔淋巴结，小部汇入髂外淋巴结，经髂总淋巴结



汇入腰淋巴结和(或)骶前淋巴结。子宫底、输卵管、卵巢淋巴大部分汇入腰淋巴结,小部分汇入髂内外淋巴结。子宫体前后壁淋巴可分别回流至膀胱淋巴结和直肠淋巴结。子宫体两侧淋巴沿圆韧带汇入腹股沟浅淋巴结。

10.【正确答案】A

【答案解析】阴道上段淋巴回流基本与宫颈淋巴回流相同,大部汇入闭孔淋巴结与髂内淋巴结,小部汇入髂外淋巴结。

11.【正确答案】E

【答案解析】周期不规则的阴道出血最常见的原因是无排卵性功血,子宫肌瘤多见月经量多,经期时间长;子宫内膜癌多为绝经后异常阴道出血或阴道排液现象,卵巢肿瘤以腹部肿块多见,或出现不规则阴道流血或绝经后出血。

12.【正确答案】D

【答案解析】卵巢分泌的激素作用于子宫内膜,使子宫内膜发生周期性改变,故子宫内膜的病理检查可以提示卵巢功能。

13.【正确答案】B

【答案解析】两性畸形诊断明确后应根据患者原社会性别、本人愿望以及畸形程度予以矫治。原则上无论何种两性畸形,除外生殖器阴茎发育良好者,均以按女性抚养为妥。

14.【正确答案】B

【答案解析】阴道下段闭锁为尿生殖窦未参与形成阴道下段,该处阴道被纤维组织替代所致。闭锁段厚2cm以上,其上为正常阴道。临床症状与处女膜闭锁相似,但闭锁处位置较处女膜闭锁者高。治疗应尽早手术。

15.【正确答案】E

【答案解析】临终关怀应以提高临终患者的生存质量为宗旨。

16.【正确答案】D

【答案解析】医德修养的根本途径是坚持在医疗卫生保健实践中修养。

17.【正确答案】C

【答案解析】正确处理医际关系的原则是彼此信任、互相协作和监督。

18.【正确答案】A

【答案解析】术中识别输卵管的标志是输卵管伞部。

19.【正确答案】D

【答案解析】生育期妇女卵巢大小约4cm×3cm×1cm,重约5~6g,灰白色;绝经后卵巢逐渐萎缩变小变硬,妇科检查时不易触到。

20.【正确答案】C

【答案解析】子宫颈内腔呈梭形,称为子宫颈管,成年妇女长2.5~3.0cm,其下端称为子宫颈外口,通向阴道。子宫颈以阴道为界,分为上下两部,上部占子宫颈的2/3,两侧与子宫主韧带相连,称为子宫颈阴道上部;下部占子宫颈的1/3,伸入阴道内,称为子宫颈阴道部。未产妇的子宫颈外口呈圆形;经产妇受阴道分娩影响形成横裂,将子宫颈分为前唇和后唇。

21.【正确答案】C

【答案解析】子宫内膜异位症的确诊检查是腹腔镜检查。



22.【正确答案】 C

【答案解析】 青春期开始的重要标志是月经初潮。

23.【正确答案】 D

【答案解析】 月经后子宫内膜由功能层再生。

24.【正确答案】 E

【答案解析】 子宫 4 对韧带及盆底肌肉筋膜的支柱作用维持了子宫的正常位置。

25.【正确答案】 E

【答案解析】 正常妊娠满 12 周时，子宫底高度为耻骨联合上 2~3 横指。

26.【正确答案】 A

【答案解析】 妊娠末期发生跨耻征阳性最大的可能是扁平骨盆。

27.【正确答案】 D

【答案解析】 由于子宫体部肌纤维的缩复作用，使上段肌壁越来越厚，下段肌壁被动牵拉而越来越薄；在子宫内面的上、下段交界处形成环状隆起，称生理性缩复环；生理情况时，此环不能从腹部见到；分娩期的子宫缩复环若达脐平，已为病理性。

28.【正确答案】 B

【答案解析】 高直前位胎儿枕部若能向一侧转 45 度至枕左前位或枕右前位，即有可能正常分娩。

29.【正确答案】 D

【答案解析】 输卵管伞部主要功能是拾卵。

30.【正确答案】 D

【答案解析】 下丘脑和垂体产生正反馈作用，形成 LH 和 FSH 峰，两者协同作用，促使成熟卵泡排卵，此时成熟卵泡分泌的雌激素达到 200pg/ml 以上，并持续 48 小时。

31.【正确答案】 C

【答案解析】 大阴唇邻近两股内侧的一对长隆起的皮肤皱褶，起自阴阜，止于会阴。大阴唇皮下脂肪层含有丰富的血管，淋巴管和神经，受伤后易出血形成血肿。

32.【正确答案】 E

【答案解析】 为子宫体与子宫颈之间最狭窄的一部分；上端为解剖学内口，下端为组织学内口；在非孕时长约 1cm；妊娠末期形成子宫下段可伸展至 7~10cm，成为软产道的一部分。

33.【正确答案】 C

【答案解析】 主韧带又称宫颈横韧带，在阔韧带的下部，横行于宫颈两侧和骨盆侧壁之间。圆韧带起于子宫角的前面、输卵管近端的稍下方，向前外伸展达两侧骨盆壁，经腹股沟管止于大阴唇前端；阔韧带是位于子宫两侧的翼状双层腹膜皱襞，自子宫侧缘向两侧延伸达盆壁；宫骶韧带起自子宫体和子宫颈交界处后面的上侧方，向两侧绕过直肠到达第 2、3 骶椎前面的筋膜；卵巢固有韧带将卵巢与子宫相连。

34.【正确答案】 A

【答案解析】 右侧卵巢动脉来自腹主动脉。

35.【正确答案】 C

【答案解析】 前置胎盘的患者一般不做阴道检查，B 超就可以清楚的显示子宫壁、胎先露部、胎盘和子宫的位置，明确前置胎盘



的类型。

36.【正确答案】 A

【答案解析】 胎盘早剥时，出血向子宫肌壁间渗透，造成肌纤维断裂坏死，子宫出现卒中，如果卒中面积大，不切除子宫则引发严重后果，应选择子宫切除，而不是压迫止血。

37.【正确答案】 C

【答案解析】 双胎妊娠终止妊娠指征：①合并急性羊水过多，压迫症状明显，孕妇腹部过度膨胀，呼吸困难，严重不适；②胎儿畸形；③母亲有严重并发症，如子痫前期或子痫，不允许继续妊娠时；④已到预产期尚未临产，胎盘功能减退者。孕3~4个月一胎死亡后，因其骨骼未完成骨化，可被存活胎儿挤压成纸样儿。

38.【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠40周以后胎盘功能逐渐下降，42周以后明显下降，因此，在妊娠41周以后，即应考虑终止妊娠，尽量避免过期妊娠。若妊娠41周后无任何并发症（妊娠期高血压疾病、妊娠期糖尿病、胎儿生长受限、羊水过少等），也可密切观察，继续等待。一旦妊娠过期，则应终止妊娠。应根据胎儿安危状况、胎儿大小、宫颈成熟度综合分析，选择恰当的分娩方式。

39.【正确答案】 C

【答案解析】 过期妊娠的胎盘，由于逐渐退化，绒毛间腔变窄，绒毛的合体细胞层下，出现广泛纤维蛋白沉积而发生梗死和钙化现象，即所谓“胎盘老化”。胎盘功能衰退，胎儿脐静脉血中氧的饱和度下降，因此供给胎儿的氧气和营养逐渐减少，同时胎儿

越成熟，对缺氧的耐受能力越差，故当临产子宫收缩较强时，过期胎儿就容易发生窘迫，甚至在子宫内死亡。

40.【正确答案】 B

【答案解析】 轻度子痫前期：妊娠20周后出现收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$ 伴蛋白 $\geq 0.3\text{g}/24\text{h}$ ，或随机尿蛋白(+)。可伴有头痛、视力模糊、上腹疼痛等症状。

41.【正确答案】 A

【答案解析】 使用硫酸镁必备条件：①膝腱反射存在；②呼吸 ≥ 16 次/分钟。③尿量 $\geq 17\text{ml}/\text{h}$ 或 $\geq 400\text{ml}/24\text{h}$ ；④备有10%葡萄糖酸钙。镁离子中毒时停用硫酸镁并静脉缓慢推注(5~10分钟)10%葡萄糖酸钙10ml。如患者同时合并肾功能不全、心肌病、重症肌无力等，则硫酸镁应慎用或减量使用。

42.【正确答案】 C

【答案解析】 胎儿在分娩过程中死亡，称为死产，是死胎的一种。

43.【正确答案】 B

【答案解析】 羊水过多的处理取决于胎儿有无畸形和孕妇的症状。一旦诊断胎儿畸形，立即终止妊娠。前列腺素抑制剂有抑制利尿作用，可致动脉导管闭合，不宜长期使用。一次放羊水量不应超过1500ml。高位破膜后应加用催产素引产。

44.【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠期间羊水量超过2000ml，称为羊水过多。

45.【正确答案】 C



【答案解析】妊娠晚期羊水量少于 300ml 者，称为羊水过少。

46.【正确答案】 B

【答案解析】血 hCG 持续升高，应行手术治疗。

47.【正确答案】 D

【答案解析】宫颈外口松，开大不是宫外孕时的表现。

48.【正确答案】 A

【答案解析】骶耻外径小于 16cm，骨盆入口前后径小于 8.5cm，属于骨盆狭窄，足月应剖宫产。轻度的头盆不称可以试产，均小骨盆不一定都要剖宫产，中骨盆狭窄双顶径达坐骨棘可试经阴道助产，出口横径线与出口后矢状径之和大于 15cm，可试产。

49.【正确答案】 C

【答案解析】颏横位时，多数可向前转 90°以颏前位娩出，而持续性颏横位不能自然娩出。

50.【正确答案】 C

【答案解析】胎龄愈小臀先露发生率愈高，如晚期流产儿及早产儿臀先露高于足月产儿。

51.【正确答案】 D

【答案解析】发现横位在临产前剖宫产结束妊娠；初产妇临产后横位胎膜无论破否，胎儿存活者均应剖宫产结束分娩；如胎儿已死，无先兆子宫破裂征象，宫口近开全，在全麻下行断头术或碎胎术。

52.【正确答案】 A

【答案解析】当胎肩通过会阴时，胎头矢状

缝衔接于骨盆入口左斜径或横径，并沿此径线逐渐下降，同时胎头俯屈。当枕骨达骨盆底时，胎头向母体左前方旋转 45°，使枕骨朝向耻骨联合。胎头继续下降，当枕骨下凹到达耻骨弓下时，以此处为支点，胎头继续俯屈，使颏、面及额部相继自会阴前缘娩出，随后枕部自耻骨弓下娩出。

53.【正确答案】 A

【答案解析】臀先露与妊娠 30 周前多能自行转为头先露，不需处理。妊娠 30 周后仍未臀先露应予矫正。

54.【正确答案】 E

【答案解析】臀位助产有胎心异常需检查有无脐带脱垂，若有脐带脱垂，立即行剖宫产挽救胎儿；“堵”臀为等待宫口完全开全。臀位分娩时应注意：脐部娩出后一般应于 8 分钟内结束分娩，以免因脐带受压而致死产。

55.【正确答案】 E

【答案解析】臀位是最常见的异常胎位。形成臀位的原因主要有：(1)胎儿在宫腔内活动过大，比如产妇腹壁松弛、羊水过多或胎儿较小等，使胎儿在宫腔内活动过于自由；(2)胎儿在宫腔内活动受限，比如初产妇腹壁紧张。双胎、羊水过少及子宫畸形等，影响胎头不能自然下转；(3)胎头衔接受阻，比如骨盆狭窄、头盆不称、前置胎盘、软产道阻塞及脐带过短等；(4)胎儿畸形，如脑积水、无脑儿等，皆不易以胎头衔接入盆。这些原因通过妇科及 B 超检查大多能够及时发现并妥善处理。

56.【正确答案】 A

【答案解析】胎盘娩出前阴道多量流血时首



先考虑为胎盘因素所致。胎盘部分粘连或部分植入时，胎盘未粘连或植入部分可发生剥离而出血不止；胎盘剥离不全或剥离后滞留宫腔，常表现为胎盘娩出前阴道流血量多伴有子宫收缩乏力；胎盘嵌顿时在子宫下段可发现狭窄环。根据胎盘尚未娩出，或徒手剥离胎盘时胎盘与宫壁粘连面积大小、剥离难易程度以及通过仔细检查娩出的胎盘胎膜，容易作出诊断。但应注意与软产道裂伤性出血鉴别。胎盘因素所致出血在胎盘娩出、宫缩改善后常立即停止。软产道裂伤出血特点是出血发生在胎儿娩出后，此点与子宫乏力所致产后出血有所不同。软产道裂伤流出的血液能自凝，若裂伤损及小动脉，血色较鲜红。

57.【正确答案】 E

【答案解析】 宫缩过强，产程进展过快，胎儿过大，可致会阴、阴道裂伤。

58.【正确答案】 A

【答案解析】 晚期产后出血以1~2周发病最常见。

59.【正确答案】 D

【答案解析】 晚期产后出血的定义为分娩24小时以后，在产褥期内发生的阴道大量出血。

60.【正确答案】 E

【答案解析】 考虑胎盘因素引起的出血，所以徒手剥离胎盘后促使子宫收缩。

二、A2型题

61.【正确答案】 C

【答案解析】 功能失调性子宫出血长期多量

出血时，彻底刮宫有助于诊断，并有迅即止血的效果。

62.【正确答案】 D

【答案解析】 HPV提示高危型感染，液基细胞提示非典型鳞状细胞，应行阴道镜检查，染色异常处取活检。

63.【正确答案】 B

【答案解析】 在子宫畸形中双子宫更容易流产及早产。

64.【正确答案】 D

【答案解析】 先天性处女膜闭锁的表现有：青春期乳房发育，迟迟未见月经来潮，周期性下腹胀痛。外阴检查可见向外凸出的处女膜，表面紫色，无孔。

65.【正确答案】 E

【答案解析】 前置胎盘剖宫产术指征：孕妇反复大量出血致贫血甚至休克者；胎龄达36周以后；胎儿成熟度检查提示胎儿肺成熟者。该病例为臀位，37周妊娠，胎儿已成熟，应选择剖宫产终止妊娠。

66.【正确答案】 E

【答案解析】 期待疗法：目的是在孕妇安全的前提下，继续延长胎龄，以期提高围生儿的存活率。适用于妊娠<34周、胎儿体重<2000g、胎儿存活、阴道流血量不多、一般情况良好的妇女。

67.【正确答案】 C

【答案解析】 一旦确诊重型胎盘早剥，应及时终止妊娠。



68.【正确答案】 E

【答案解析】 本题考虑前置胎盘。前置胎盘剖宫产指征：完全性前置胎盘，持续大量阴道流血；部分性和边缘性前置胎盘出血量较多，先露高浮，胎龄达妊娠 36 周以上，短时间内不能结束分娩，有胎心、胎位异常。

69.【正确答案】 B

【答案解析】 诊断重度子痫前期引起的胎盘早剥，应该抗休克同时尽快剖宫产结束分娩，防止 DIC 发生。

70.【正确答案】 B

【答案解析】 考虑患者为先兆流产：妊娠 28 周前先出现少量阴道流血，无妊娠物排出，随后出现阵发性下腹痛。妇科检查宫口未开，胎膜未破，子宫大小与停经周数相符。治疗后症状消失，可继续妊娠。先兆流产应卧床休息，禁性生活，必要时给予对胎儿危害小的镇静剂。

71.【正确答案】 E

【答案解析】 该孕妇在妊娠前有服避孕药史，有可能会造成胎儿畸形，现出现先兆流产的症状，应尊重患者的意愿是否要继续妊娠。

72.【正确答案】 E

【答案解析】 流产的主要症状为停经后出现阴道流血和腹痛。妇科检查见宫颈口已扩张，宫颈口有妊娠物堵塞及持续性血液流出，子宫小于停经周数，为不全流产。已经确诊，应及时行吸宫术或钳刮术，以清除宫腔内残留组织。流血多有休克者应同时输血输液，出现时间长者，应给予抗生

素预防感染。

73.【正确答案】 D

【答案解析】 流产合并感染的治疗原则是首先控制感染。若流血不多应控制感染后再行刮宫，清除宫腔内残留组织。若流血量多，静脉给予广谱抗生素及输血的同时，用卵圆钳将宫腔残留组织夹出，减少出血，忌用刮匙全面搔刮宫腔，避免感染扩散。

74.【正确答案】 B

【答案解析】 根据题干考虑流产合并感染，又称感染性流产，治疗原则为迅速控制感染，尽快清除宫内残留物。阴道流血多时，以卵圆钳钳夹残留胚胎组织，忌用刮匙全面搔刮，以免感染扩散。

75.【正确答案】 C

【答案解析】 根据题干提示胎膜破裂考虑诊断为难免流产，应尽早排出宫内组织物，题目中宫口容 1 指，提示宫口开放，可行钳刮术。

76.【正确答案】 A

【答案解析】 患者已婚，尿妊娠试验阳性，考虑早期妊娠可能性大。目前出现呕吐、不能进食，出现严重脱水表现伴电解质紊乱，考虑最可能的诊断是妊娠剧吐。

77.【正确答案】 E

【答案解析】 妊娠期肝内胆汁淤积症以皮肤瘙痒和胆汁酸高值为特点，主要危及胎儿安全。多数患者首发症状为妊娠晚期发生无损伤的皮肤瘙痒，瘙痒程度不一，常呈现持续性，白昼轻，夜间加剧。



78.【正确答案】 B

【答案解析】 患者血压 $\geq 160/110\text{mmHg}$ ，尿蛋白 $\geq 5\text{g}/24\text{h}$ ，出现水肿、头痛，考虑为重度子痫前期，治疗原则为解痉、扩容、镇静、降压及适时终止妊娠。

79.【正确答案】 B

【答案解析】 子痫控制 2 小时后可考虑终止妊娠。胎儿心率较快，无应激试验无反应型，考虑胎儿有缺氧，应剖宫产尽快终止妊娠。

80.【正确答案】 E

【答案解析】 子痫的处理原则：控制抽搐，纠正缺氧和酸中毒，控制血压，抽搐控制后终止妊娠。

81.【正确答案】 B

【答案解析】 根据病史、临床表现、体征及辅助检查不难诊断。蛋白尿是诊断慢性肾炎的主要依据，尿蛋白一般在 $1\sim 3\text{g}/\text{d}$ ，尿沉渣可见颗粒管型和透明管型。

82.【正确答案】 E

【答案解析】 患者有停经史、腹痛重、阴道流血多、宫颈口扩张，为难免流产的表现，早期流产应行负压吸宫术。而静脉滴注止血药物、口服硫酸舒喘灵、肌肉注射硫酸镁和黄体酮不能治疗本病。故选 E。

83.【正确答案】 E

【答案解析】 胎盘早剥虽属轻型，但有胎儿窘迫征象，需抢救胎儿，所以应及时剖宫产。

84.【正确答案】 D

【答案解析】 羊水过少是胎儿危险的重要信

号，此次妊娠已足月，所以应终止妊娠，又因该孕妇为高龄初产，宫颈未成熟，故选择剖宫产结束分娩。

三、B 型题

85.【正确答案】 C

【答案解析】 在人工流产过程中，过多地损伤了子宫内膜基底层，则子宫内膜不能再生，这样使病人发生长期闭经。

86.【正确答案】 C

【答案解析】 子宫内膜分为 3 层：致密层、海绵层和基底层。内膜表面 $2/3$ 为致密层和海绵层，统称为功能层，受卵巢性激素影响，发生周期变化而脱落。基底层为靠近子宫肌层的 $1/3$ 内膜，不受卵巢性激素影响，不发生周期变化。

87.【正确答案】 E

【答案解析】 子宫内膜分为 3 层：致密层、海绵层和基底层。内膜表面 $2/3$ 为致密层和海绵层，统称为功能层，受卵巢性激素影响，发生周期变化而脱落。

88.【正确答案】 C

【答案解析】 精液射入阴道内，精子离开精液经宫颈管、子宫腔进入输卵管腔，在此过程中精子顶体表面的糖蛋白被生殖道分泌物中的 α 、 β 淀粉酶降解，同时顶体膜结构中胆固醇与磷脂比率和膜电位发生变化，降低顶体膜稳定性，此过程称为精子获能，需 7 小时左右。

89.【正确答案】 E

【答案解析】 卵子(次级卵母细胞)从卵巢排出，经输卵管伞部进入输卵管，在输卵管



内与获能的精子相遇，精子头部顶体外膜破裂，释放出顶体酶(含顶体素、玻璃酸酶、酯酶等)，溶解卵子外围的放射冠和透明带，称为顶体反应。

90.【正确答案】D

【答案解析】卵子与精子在输卵管峡部及壶腹部交界处受精。

91.【正确答案】D

【答案解析】按蜕膜与囊胚的关系，将蜕膜分为3部分：①底蜕膜：囊胚着床部位的子宫内层，与叶状绒毛膜相贴，以后发育成为胎盘的母体部分；②包蜕膜：覆盖在囊胚表面的蜕膜，随囊胚发育逐渐突向宫腔；③真蜕膜：底蜕膜及包蜕膜以外覆盖子宫腔其他部分的蜕膜，妊娠14~16周羊膜腔明显增大，包蜕膜和真蜕膜相贴，宫腔消失。

92.【正确答案】B

【答案解析】胎盘由胎儿部分的羊膜和叶状绒毛膜以及母体部分的底蜕膜构成。

93.【正确答案】E

【答案解析】胎膜是由外层的平滑绒毛膜和内层的羊膜组成。囊胚表面非着床部位的绒毛膜在发育过程中缺乏营养逐渐退化萎缩成为平滑绒毛膜。

94.【正确答案】A

【答案解析】心脏容量至妊娠末期约增加10%，心率先于妊娠晚期休息时每分钟增加10~15次。

95.【正确答案】B

【答案解析】伴随着外周血管阻力下降，心

率增加以及血容量增加，心排出量自妊娠10周逐渐增加，至妊娠32~34周达高峰，持续至分娩，左侧卧位测量心排出量较未孕时约增加30%。

96.【正确答案】C

【答案解析】血容量于妊娠6~8周开始增加，至妊娠32~34周达高峰，增加40%~45%，平均约增加1450ml，维持此水平直至分娩。

97.【正确答案】E

【答案解析】肾血浆流量(RPF)及肾小球滤过率(GFR)于妊娠早期均增加，整个妊娠期间维持高水平。与非孕时相比，RPF约增加35%，GFR约增加50%。

98.【正确答案】D

【答案解析】肾血浆流量(RPF)及肾小球滤过率(GFR)于妊娠早期均增加，整个妊娠期间维持高水平。与非孕时相比，RPF约增加35%，GFR约增加50%。

99.【正确答案】D

【答案解析】出口后矢状径可弥补稍小的坐骨结节间径，若坐骨结节间径加后矢状径>15cm，表示出口狭窄不明显；若坐骨结节间径加后矢状径≤15cm，表示出口狭窄。

100.【正确答案】B

【答案解析】漏斗骨盆：骨盆入口各径线值正常。由于两侧骨盆壁向内倾斜，状似漏斗，故称漏斗骨盆。特点是中骨盆及骨盆出口平面均明显狭窄，使坐骨棘间径、坐骨结节间径缩短，耻骨弓角度<90°。坐骨结节间径与出口后矢状径之和≤15cm，常见于男型骨盆。



2022 年妇产科主治医师《相关专业知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1.【正确答案】 A

【答案解析】 胎头以枕下前凶径通过中骨盆。

2.【正确答案】 B

【答案解析】 中骨盆平面是真假骨盆的交界面。

3.【正确答案】 A

【答案解析】 分娩期宫颈扩张主要依靠子宫收缩及缩复向上牵拉。

4.【正确答案】 E

【答案解析】 妊娠期子宫增大，使盲肠向外、向上、向后移位，阑尾相对位置较深，并将壁层腹膜撑开，使阑尾炎症不易局限而致穿孔、腹膜炎。妊娠 3 月末位于髂嵴下 2 横指，妊娠 5 月末达髂嵴水平，妊娠 8 月末上升至髂嵴上 2 横指，妊娠足月可达胆囊区。产后 10~12 日恢复至非孕水平。

5.【正确答案】 C

【答案解析】 新生儿出生后，体内留有其母亲的抗体，此时立即检查，可能会因受母体影响诊断错误。新生儿生后 8~12 小时开始服药，持续 6 周，保护率可达 67%。

6.【正确答案】 E

【答案解析】 一般认为胎儿通过软产道时因吞咽 HPV 羊水、血或分泌物而感染。妊娠期细胞免疫功能降低，甾体激素水平增高，局部血循环丰富，容易患尖锐湿疣，且病灶生长迅速，数目多，体积大，多区域，多形态。孕妇患尖锐湿疣，有垂直传播危险，宫内感染极罕见，少数情况下可引起新生儿呼吸道乳头状瘤。

7.【正确答案】 D

【答案解析】 HPV 感染与 CIN、宫颈癌有关，还与外阴尖锐湿疣、外阴癌有关，与卵巢癌关系不大。

8.【正确答案】 A

【答案解析】 妊娠合并尖锐湿疣可引起新生儿乳头状瘤。

9.【正确答案】 D

【答案解析】 先天性感染远较后天性感染严重，这种感染是全身性的，主要表现为全身感染中毒症状和中枢神经系统及眼部等多器官病变。

10.【正确答案】 B

【答案解析】 妊娠合并巨细胞病毒感染可引起新生儿小头畸形、智力障碍等。

11.【正确答案】 A



【答案解析】 外阴良性肿瘤一是由上皮来源的肿瘤，有乳头状瘤、色素病和汗腺瘤；二是中胚叶来源的肿瘤，有纤维瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、颗粒细胞肌母细胞瘤、血管瘤与淋巴管瘤等。

12. **【正确答案】** A

【答案解析】 鳞状上皮细胞增生是外阴局部皮肤受到刺激而产生的一种增生性、主要临床表现为瘙痒的外阴病变。

13. **【正确答案】** C

【答案解析】 对于病变下方已有浸润性癌者，必要时可行外阴根治术及腹股沟淋巴结清扫术。如切除范围较大，创面较大，则需植皮。

14. **【正确答案】** A

【答案解析】 分娩期为心脏负担最重的时期。子宫收缩使孕妇动脉压与子宫内压之间压力差减小，且每次宫缩时有 250 ~ 500ml 液体被挤入体循环，增加了全身血容量；每次宫缩时心排量约增加 24%，同时有血压增高、脉压增宽及中心静脉压升高。第二产程时由于孕妇屏气，先天性心脏病孕妇有时可因肺循环压力增加，使原来左向右分流转为右向左分流而出现发绀。胎儿胎盘娩出后，子宫突然缩小，胎盘循环停止，回心血量增加。加之腹腔内压骤减，大量血液向内脏灌注，造成血流动力学急剧变化。此时，患心脏病孕妇极易发生心力衰竭。

15. **【正确答案】** C

【答案解析】 妊娠期、产褥期肝脏结构、功能均发生变化并不增加肝脏对肝炎病毒的

易感性，但由于妊娠期、产褥期的生理变化，可加重病情。

妊娠对肝炎的影响——妊娠加重肝脏负担，易导致重症肝炎(10 倍)

病毒性肝炎对妊娠的影响：①早期可使早孕反应加重，流产、胎儿畸形发生率高 2 倍；②中晚期可导致 PIH、肝性脑病、早产、死胎、垂直传播、DIC 等；③分娩期可因凝血因子合成减少而导致产后出血。

16. **【正确答案】** E

【答案解析】 肺结核对妊娠的影响肺结核患者除非同时有生殖器结核，一般不影响受孕。一般认为，非活动性结核或病变范围不大、肺功能无改变者，对妊娠经过和胎儿发育多无大影响。而活动性肺结核的妇女发生流产、胎死宫内、早产、低体重儿的可能性增大。结核病的治疗药物可能对母儿有不良作用。孕妇可在产前、产时及产后将结核菌传给下一代。活动性肺结核未经治疗的母亲，其新生儿在生后第一年有 50% 感染的可能性。因此，产后需隔离新生儿。

17. **【正确答案】** E

【答案解析】 急性肾盂肾炎与妊娠的相互影响妊娠后患急性肾盂肾炎的危险增加；残余尿增多，为细菌在膀胱的繁殖创造了条件；增大的子宫压迫输尿管，形成机械性梗阻，易造成排尿不畅、尿滞留或尿液反流；妊娠期常有生理性糖尿，有利于细菌生长。致病菌以大肠埃希菌最多见。临床上起病急骤，突然出现高热、寒战，体温有时可高达 40℃。伴有头痛、周身酸痛、恶心及腰痛，出现尿频、尿急、尿痛、排尿未尽感等膀胱刺激症状。排尿时常有下



腹部疼痛。患急性肾盂肾炎孕妇中有 3% 可发生中毒性休克。高热可引起流产、早产。若在妊娠早期，高热还可使胎儿神经管发育异常，无脑儿发病率明显增高。

18.【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠期糖尿病产后处理：大部分 GDM 患者在分娩后即不再需要使用胰岛素，仅少数患者仍需胰岛素治疗。胰岛素用量应减少至分娩前的 $1/3 \sim 1/2$ ，并根据产后空腹血糖值调整用量。产后 6~12 周行 OGTT 检查，若仍异常，可能为产前漏诊的糖尿病患者。

19.【正确答案】 C

【答案解析】 (1) 推荐医疗机构对所有尚未被诊断为 PGDM 或 GDM 的孕妇，在妊娠 24~28 周及 28 周后首次就诊时行 75g OGTT。75g OGTT 的诊断标准：空腹及服糖后 1 小时、2 小时的血糖值分别低于 5.1mmol/L、10.0mmol/L、8.5mmol/L。任一点血糖值达到或超过上述标准即诊断为 GDM。

(2) 孕妇具有 GDM 高危因素或者医疗资源缺乏地区，建议妊娠 24~28 周首先检查 FPG。FPG ≥ 5.1 mmol/L，可以直接诊断为 GDM，不必行 75g OGTT。

20.【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠合并心脏病孕妇的高危时期是妊娠 32~34 周。

21.【正确答案】 D

【答案解析】 脑脊髓和脑干神经根的髓鞘形成于妊娠第 6 个月。

22.【正确答案】 E

【答案解析】 有结节状、菜花状、溃疡状。

23.【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠中期，胎儿内耳、外耳及中耳已形成，妊娠 24~26 周，胎儿在宫内已能听见一些声音。

24.【正确答案】 E

【答案解析】 白细胞检测：子宫颈管分泌物或阴道分泌物中白细胞增多，后者需排除引起白细胞增多的阴道炎症。1) 子宫颈管脓性分泌物涂片作革兰染色，中性粒细胞 $> 30/HP$ 。2) 阴道分泌物涂片检查白细胞高倍视野 $> 10/HP$ 。

25.【正确答案】 E

【答案解析】 子宫内癌已侵犯宫颈管分期为 II 期，应行广泛性全子宫及双附件加盆腔淋巴结清除术。

26.【正确答案】 B

【答案解析】 子宫内癌腹腔冲洗液细胞学阳性直接改变分期。在开腹后第一步即应该留取腹水或者腹腔冲洗液送做细胞学检查，其他操作进行后，可能影响细胞学检查结果。

27.【正确答案】 B

【答案解析】 血 CA-125，常用于评估卵巢癌的治疗效果。

28.【正确答案】 E

【答案解析】 主要考察子宫肉瘤分期治疗，子宫肉瘤 II 期的治疗措施是广泛子宫切除术加盆腔淋巴结清扫术加腹主动脉旁淋巴



结活检术。

29.【正确答案】 A

【答案解析】 子宫平滑肌肉瘤对放疗不敏感。

30.【正确答案】 D

【答案解析】 子宫肉瘤罕见，是恶性程度高的女性生殖器肿瘤。

31.【正确答案】 C

【答案解析】 确诊后及时清宫。清除宫腔内容物，使用大号吸管，亦可用卵圆钳钳取胎块，必要时术中使用缩宫素静脉滴注加强宫缩，可减少失血及子宫穿孔，但需在宫口充分扩张后给药，以防滋养细胞压入宫壁血窦，诱发肺栓塞或转移。尽量一次吸刮干净，子宫过大者可在1周后行第二次刮宫，刮出物送病理检查。

32.【正确答案】 B

【答案解析】 根据病史及临床表现，结合hCG连续测定，葡萄胎清除后8周以上，hCG持续阳性，或已降至正常又升高，结合临床表现，可诊断为侵蚀性葡萄胎。组织学诊断在子宫肌层或转移灶的切片中，有绒毛或绒毛蜕变痕迹，可确诊为侵蚀性葡萄胎。

33.【正确答案】 E

【答案解析】 绒癌多发生在子宫，子宫不规则增大，柔软，形成单个或多个宫壁肿瘤，表面呈紫蓝色而切面为暗红色。直径2~10cm，镜检可见滋养细胞成堆地侵入子宫肌层、血管或其他组织，组织出血坏死，但找不到绒毛结构。可有肺转移、阴道转

移、脑转移、肝转移。

34.【正确答案】 C

【答案解析】 产后超过4周血清hCG仍持续升高，需除外妊娠物残留或再次妊娠后即可诊断滋养细胞肿瘤。

35.【正确答案】 A

【答案解析】 诊断孕激素试验阴性的闭经患者，首先应除外妊娠。

36.【正确答案】 D

【答案解析】 雌激素试验：己烯雌酚1mg每日1次，口服，共20天，最后5天加用黄体酮20mg肌注，每日1次，停药3~7天出现撤药性出血为阳性，提示子宫内膜功能正常，闭经是由于缺乏雌激素引起。病变部位可能在卵巢或垂体。如无撤药性出血为阴性，提示子宫内膜缺陷或病变，应诊为子宫性闭经。

37.【正确答案】 A

【答案解析】 育龄妇女在月经前7~14天（即在月经周期的黄体期），反复出现一系列精神、行为及体质等方面的症状，月经来潮后症状迅即消失。

38.【正确答案】 A

【答案解析】 绝经后妇女冠心病发生率高，因雌激素水平降低引起胆固醇水平升高，各种脂蛋白增加，高密度脂蛋白/低密度脂蛋白比率降低，易诱发动脉粥样硬化。

39.【正确答案】 E

【答案解析】 HRT是激素替代疗法的简称，是指通过补充激素来治疗激素分泌减退或



者缺乏所引起的疾病的治疗方法。有适应证且无禁忌证时选用。HRT 是针对绝经相关健康问题而采取的一种医疗措施，可有效缓解绝经相关症状，从而改善生活质量。绝经对心血管疾病的发生有负面影响，HRT 对降低心血管疾病发生有益，但一般不主张 HRT 作为心血管疾病的二级预防。

40.【正确答案】 D

【答案解析】 绝经期综合征主要应用雌激素替代治疗。

41.【正确答案】 C

【答案解析】 绝经后，促性腺激素水平由于性激素水平低落，负反馈刺激增高。

42.【正确答案】 D

【答案解析】 痛经患者口服避孕药治疗，其目的是为了抑制排卵，缺乏黄体，从而使月经前列腺素浓度降低，降低子宫肌张力，缓解痛经。

43.【正确答案】 D

【答案解析】 排卵型功能性出血的治疗为：下次月经前 10~14 日开始，每日口服甲羟孕酮 10mg。作用是调节下丘脑-垂体-卵巢轴的功能，使黄体及时萎缩，内膜及时完整脱落。还可促卵泡发育和排卵，以利于正常黄体的形成。基础体温上升后 3 天起注射 hCG 2000~3000U 肌注，隔日一次，共 5 次，有刺激及维持黄体功能的作用。

44.【正确答案】 A

【答案解析】 子宫内膜异位性疾病包括子宫内膜异位症和子宫腺肌病，两者均由具有生长功能的异位子宫内膜所致，临床上常

可并存。但两者的发病机制及组织发生学不尽相同，临床表现及其对卵巢激素的敏感性亦有差异，前者对孕激素敏感，后者不敏感。

45.【正确答案】 C

【答案解析】 痛经和持续下腹痛：继发性痛经是子宫内膜异位症的典型症状，且多随局部病变加重而逐年加剧。疼痛多位于下腹部及腰骶部，可放射至会阴部、肛门或大腿，常于月经来潮前 1~2 日开始，经期第一日最剧，以后逐渐减轻，至月经干净时消失。疼痛的程度与病灶大小并不一定成正比。病变严重者如较大的卵巢子宫内膜异位囊肿可能疼痛较轻，而散在的盆腔腹膜小结节病灶反可导致剧烈痛经。偶有周期性腹痛出现稍晚而与月经不同步者。少数晚期患者诉长期下腹痛，至经期更剧。疼痛程度与 AFS 分期不一致。

46.【正确答案】 D

【答案解析】 进行性痛经病人出现肾积水最可能的原因是内异症。异位病灶侵犯和(或)压迫输尿管时，引起输尿管狭窄、阻塞，出现腰痛和血尿，甚至形成肾积水和继发性肾萎缩。

47.【正确答案】 C

【答案解析】 子宫内膜异位症的发生与雌激素有关，但雌激素不是诊断子宫内膜异位症的因素，腹腔镜检查是目前诊断子宫内膜异位症的最佳方法。超声检查和血清 CA125 测定可以起到辅助诊断的作用。

48.【正确答案】 B

【答案解析】 继发性痛经是子宫内膜异位症



的典型症状，主要原因包括卵巢子宫内膜异位囊肿破裂刺激腹膜；腹膜粘连刺激神经；子宫内膜异位症病灶位于宫骶韧带以及盆腔神经走行引起的疼痛。

49.【正确答案】 B

【答案解析】 关于子宫内膜异位症发病机制主要是种植学说。

50.【正确答案】 E

【答案解析】 疼痛程度与病灶大小不成比例。

二、A2型题

51.【正确答案】 E

【答案解析】 妊娠早期患风疹的妇女分娩的婴儿表现为营养不良、白内障、心脏畸形、血小板减少性紫癜、骨病变、先天性耳聋、肝脾肿大、中枢神经系统炎症、智能低下、贫血等，临床上称为三联征——心血管畸形、先天性白内障和耳聋。

52.【正确答案】 B

【答案解析】 对于产褥期抑郁症的患者，应耐心地进行心理治疗，必要时给予药物治疗。

53.【正确答案】 E

【答案解析】 外阴白癜风青春期发病者居多。由于在外阴发白区周围皮肤往往有过度色素沉着，故白色区界限分明，特别醒目。但病变区皮肤光滑润泽，弹性正常，不致转化为癌，患者也无自觉不适。故除伴发皮炎应按炎症处理外，一般不需治疗。

54.【正确答案】 A

【答案解析】 外阴活检可明确诊断。

55.【正确答案】 D

【答案解析】 该孕妇尚未进入产程，属于假临产或先兆临产，不能诊断潜伏期延长。但是出现频发晚期减速，胎心基线快，考虑有胎儿窘迫。

56.【正确答案】 B

【答案解析】 羊水栓塞发病迅猛，常来不及做许多实验室检查患者已经死亡，因此为及早诊断，必须熟悉发病诱因和前驱症状。多数病例在发病时常首先出现寒战、烦躁不安、咳嗽、气急、发绀、呕吐等症。如羊水侵入量极少，则症状较轻，有时可自行恢复。如羊水混浊或入量较多时相继出现典型的临床表现。

57.【正确答案】 E

【答案解析】 该患者破膜后不久突然发生呛咳、呼吸困难、发绀，血压测不到，考虑发生羊水栓塞，应立即抢救，保持呼吸道通畅，加压给氧，必要时行气管插管或气管切开。

58.【正确答案】 E

【答案解析】 脐下三横指处呈环状凹陷在此指子宫病理性缩复环（该患者考虑先兆子宫破裂），应立即停注缩宫素。

59.【正确答案】 D

【答案解析】 根据患者表现考虑是阴道壁血肿，故行肛门指诊。

60.【正确答案】 E

【答案解析】 根据患者表现考虑羊水栓塞，



阴道检查：阴道内有手拳大的凝血块，宫颈软，宫口开大一指，先露部未及胎盘组织考虑阴道前壁血肿。治疗中不应该立即切除子宫。

61.【正确答案】 D

【答案解析】产褥感染，炎症扩散至子宫浆膜，形成盆腔腹膜炎，继而发展成弥漫性腹膜炎，出现全身中毒症状，如高热、恶心、呕吐、腹胀，检查时下腹部有明显压痛，反跳痛、可有腹肌紧张。

62.【正确答案】 D

【答案解析】产妇在家分娩，手取胎盘，产后出血，未行抗感染治疗，现高热、盆腔有边缘不规整包块，考虑为急性盆腔结缔组织炎。

63.【正确答案】 D

【答案解析】发热、疼痛、异常恶露，为产褥感染三大主要症状，依感染发生部位，分为会阴、阴道、宫颈、腹部伤口、子宫切口局部感染，急性子宫内膜炎，急性盆腔结缔组织炎、腹膜炎，血栓静脉炎，脓毒血症及败血症等。急性盆腔结缔组织炎、急性输卵管炎病原体沿宫旁淋巴和血行达宫旁组织，出现急性炎症反应而形成炎性包块，同时波及输卵管系膜、管壁。产妇表现为寒战、高热、下腹痛，严重者侵及整个盆腔形成“冰冻骨盆”。淋病奈瑟菌沿生殖道黏膜上行感染，达输卵管与盆腹腔，形成脓肿后，高热不退。

64.【正确答案】 B

【答案解析】根据产后下肢肿胀疼痛，皮肤紧张发白，考虑为血栓性静脉炎。

65.【正确答案】 A

【答案解析】确诊靠组织学检查；活检应在色素减退区、皲裂、溃疡、隆起、硬结和粗糙处进行，注意多点活检。

66.【正确答案】 B

【答案解析】双侧附件增厚，压痛，便可以诊断：急性盆腔结缔组织炎急性盆腔结缔组织炎是指内生殖器急性炎症时或阴道、宫颈有创伤时，病原体经淋巴管进入盆腔结缔组织而引起结缔组织充血、水肿及中性粒细胞浸润。临床表现为寒战、高热、下腹部疼痛，妇科检查：开始局部增厚，质地较软，边界不清，严重者侵及整个盆腔，形成“冰冻骨盆”。

67.【正确答案】 D

【答案解析】根据题干描述，考虑盆腔炎，目前需手术治疗。

68.【正确答案】 E

【答案解析】患者存在两种情况：一是盆腔炎性疾病的再次发作，形成输卵管卵巢炎性包块或输卵管卵巢脓肿，抗生素治疗无效，并且出现腹胀的炎性中毒症状，需行剖腹探查行病灶切除或引流。也可能为其他疾病，如肿瘤的坏死或感染，也要行剖腹探查明确诊断。

69.【正确答案】 C

【答案解析】由于结核病变的影响，早期子宫内膜可以充血或形成溃疡，出现月经过多；晚期，子宫内膜受到破坏，影响了内膜的功能，使月经稀少，甚至闭经。

70.【正确答案】 D



【答案解析】前庭大腺囊肿系因前庭大腺管阻塞，分泌物积聚而成，前庭大腺囊肿多为单侧，造口术方法简单，损伤小，术后还能保留腺体功能。

71. **【正确答案】** A

【答案解析】外阴瘙痒，白带乳凝块，真菌菌丝均支持假丝酵母菌型阴道炎的诊断，治疗常采用下列药物放于阴道内：咪康唑栓剂、克霉唑栓剂或制霉菌素栓剂，0.5%~1%甲紫液涂擦阴道。故选 A。选项 B 用于治疗细菌性阴道病，C、D、E 用于老年性阴道炎。

72. **【正确答案】** B

【答案解析】外阴阴道假丝酵母菌病为假丝酵母菌感染所致，临床表现为外阴瘙痒、灼痛，典型的白带呈白色稠厚豆渣样。检查时见小阴唇内侧及阴道黏膜附有白色膜状物，擦除后露出红肿黏膜面。

73. **【正确答案】** B

【答案解析】小阴唇下方为前庭大腺，故此处为前庭大腺炎，会阴部肿块，提示脓肿形成。

74. **【正确答案】** C

【答案解析】根据题干描述，考虑细菌性阴道病，分泌物查找线索细胞。

75. **【正确答案】** D

【答案解析】念珠菌感染主要症状是外阴瘙痒和白带增多。典型的白带量凝乳状或豆渣状，并发有细菌混合感染时可呈脓性白带。检查时见阴道黏膜、前庭部有白色膜状物黏附，擦去后露出红肿的黏膜、浅表

溃疡及渗血。取白带用悬滴法或涂片染色法镜检。可发现白色念珠菌的芽胞和假菌丝即可诊断。

76. **【正确答案】** D

【答案解析】根据患者的临床表现，结合分泌物检查，首先诊断为外阴阴道假丝酵母菌病，本病主要是由真菌感染引起，因此治疗首选的是抗真菌药物，如咪康唑、克霉唑、制霉菌素和伊曲康唑等。

77. **【正确答案】** D

【答案解析】宫颈癌根治术适用于 I b~II a 期患者。根据患者症状、体征及辅助检查诊断为宫颈癌 II b 期，不适合用宫颈癌根治术，而放疗适用于各期患者，故选 D。

78. **【正确答案】** B

【答案解析】腹股沟淋巴结阳性，考虑外阴癌 III 期，可行外阴广泛切除及双侧腹股沟浅层淋巴结和腹股沟深层淋巴结清扫术。

79. **【正确答案】** C

【答案解析】鳞状上皮细胞增生是以外阴瘙痒为主要症状但病因不明的外阴疾病，此病多见于 50 岁以前的中年妇女，但亦可发生在老年期。外阴瘙痒是此病最主要的症状，患者多难耐受。

80. **【正确答案】** C

【答案解析】阴道流血为子宫内膜癌最主要症状，常发生在绝经后又出现不规则阴道流血，血量一般不多，未绝经者表现为经量增多、经期延长或经间期出血。阴道排液早期多为浆液性或浆液血性白带。晚期并发感染则为脓性或脓血性分泌物，伴



恶臭。

81.【正确答案】D

【答案解析】外阴恶性黑色素瘤任何年龄妇女均可发生，多见于小阴唇、阴蒂，特征是病灶稍隆起，有色素沉着，结节状或表面有溃疡；患者常诉外阴癌痒、出血，色素沉着范围增大。

82.【正确答案】D

【答案解析】扩张型心肌病4年，平时服用地高辛治疗，心功能Ⅲ级，不适宜手术治疗，应行放疗。

83.【正确答案】D

【答案解析】广泛性VIN采用单纯外阴切除术。

84.【正确答案】C

【答案解析】早孕合并卵巢囊肿，可等待至妊娠3个月后进行手术，以免诱发流产，术后注意保胎。

三、B型题

85.【正确答案】D

【答案解析】外阴硬化性苔癣，晚期病变特征为皮肤黏膜变白、变薄，失去弹性，干燥易皲裂，小阴唇缩小变薄甚至于大阴唇融合，皮肤变菲薄，阴道口挛缩狭窄。

86.【正确答案】C

【答案解析】根据外阴赘生物形态，考虑尖锐湿疣可能。

87.【正确答案】A

【答案解析】外阴鳞状上皮细胞增生：早期

皮肤暗红或粉红色，角化过度部位则呈白色；晚期则皮肤增厚，皮纹加深，色素增加，呈多角性扁平丘疹，出现苔藓样变，并可见搔抓痕迹。

88.【正确答案】E

【答案解析】重度子痫前期可发生胎盘早剥、肺水肿、凝血功能障碍、脑出血、急性肾衰、HELLP综合征、产后出血及产后血循环衰竭等并发症，严重者可致死亡。

89.【正确答案】C

【答案解析】缺铁性贫血对孕妇的影响：轻度贫血影响不大，重度时，因心肌缺氧可导致贫血性心脏病即缺血性心肌病；贫血时对失血耐受性降低，易发生失血性休克；贫血使孕妇抵抗力降低，易发生产褥感染。

90.【正确答案】B

【答案解析】巨幼细胞贫血对孕妇的影响：严重贫血时，贫血性心脏病、妊高征、胎盘早剥、早产、产褥感染等发病率明显增多。对胎儿的影响：畸形胎儿（以神经管缺损最常见）、胎儿发育迟缓、死胎等。

91.【正确答案】D

【答案解析】再障孕产妇多死于颅内出血、心力衰竭及严重的呼吸道、泌尿道感染或败血症。

92.【正确答案】B

【答案解析】停经8周，原有疾病发作加重，建议终止妊娠。

93.【正确答案】A

【答案解析】妊娠合并病毒性肝炎可在严密



监测下继续妊娠。轻症急性肝炎，经积极治疗后好转可继续妊娠，慢性活动性肝炎者妊娠后可加重，治疗效果不好应考虑终止妊娠。

94.【正确答案】 C

【答案解析】 轻度子痫前期，宫口已开全，出现心衰症状，手术助产尽快结束分娩。

95.【正确答案】 E

【答案解析】 双胞胎妊娠在原始胚盘形成后又复制为联体双胎。

96.【正确答案】 C

【答案解析】 双胞胎妊娠在羊膜囊形成后复制：单羊膜囊、单卵双胎。

97.【正确答案】 B

【答案解析】 双胞胎妊娠在桑葚期复制形成：双绒毛膜、双羊膜囊、单卵双胎。

98.【正确答案】 A

99.【正确答案】 B

100.【正确答案】 C

【答案解析】 早产儿或未成熟儿，其器官功能和适应能力较足月儿差，应给予早产儿特殊护理。过期妊娠的胎儿围产病率和死亡率增高，并随妊娠延长而加剧。初产妇过期妊娠胎儿较经产妇者危险性增加。对胎儿和母亲的危害由胎儿窘迫、羊水量减少、分娩困难及损伤。10%~20%过期妊娠并发胎儿成熟障碍综合征，与慢性胎盘功能不良引起胎儿缺氧，营养耗竭有关。死胎X线检查：气体形成、胎头周围晕征、胎儿颅板塌陷、脊柱成角现象。



2022 年妇产科主治医师《专业知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1.【正确答案】 B

【答案解析】 妊娠 24~36 周进行骨盆内测量；对角径为耻骨联合下缘至骶岬上缘中点的距离，正常值为 12.5~13cm，此值减去 1.5~2.0cm，即为骨盆入口前后径的长度，又称真结合径。坐骨结节间径小于正常值时，应加测出口后矢状径，若两者之和大于 15cm，可经阴道试产。

2.【正确答案】 A

【答案解析】 胎盘剥离征象：

1. 子宫体变硬呈球形，胎盘剥离后降至子宫下段，下段被扩张，子宫体呈狭长形被推向上，子宫底升高达脐上。
2. 剥离的胎盘降至子宫下段，阴道口外露的一段脐带自行延长。
3. 阴道少量流血。
4. 用手掌尺侧在产妇耻骨联合上方轻压子宫下段时，子宫体上升而外露的脐带不再回缩。

3.【正确答案】 A

【答案解析】 若胎盘娩出后出血多时，可经下腹部直接注入宫体肌壁内或肌注麦角新碱 0.2~0.4mg，并将缩宫素 20U 加于 5%葡萄糖液 500ml 内静脉滴注。

4.【正确答案】 C

【答案解析】 胎盘娩出后，子宫圆而硬，宫底在脐下一指。产后第 1 日略上升至脐平，以后每日下降 1~2cm，至产后 10 日子宫降入盆腔内。

5.【正确答案】 A

【答案解析】 脐带脱垂通常发生在胎先露不能衔接时，常见原因有胎位异常、先露高浮、胎儿偏小等情况，若脐带受压，可发生胎心减慢，是急性胎儿窘迫的重要原因。

6.【正确答案】 B

【答案解析】 脐带过短是指脐带长度小于 30cm。

7.【正确答案】 E

【答案解析】 如果胎膜未破，胎动、宫缩后胎心率突然变慢，改变体位、上推先露部及抬高臀位后迅速恢复，应考虑脐带先露的可能(隐性脐带脱垂)。

8.【正确答案】 A

【答案解析】 第二产程时由于孕妇屏气，先天性心脏病孕妇有时可因肺循环压力增加，使原来左向右分流转为右向左分流而出现发绀。胎儿胎盘娩出后，子宫突然缩小，胎盘循环停止，回心血量增加。加之腹腔内压骤减，大量血液向内脏灌注，造成血流动力学急剧变化。此时，患心脏病孕妇



极易发生心力衰竭。

9.【正确答案】 E

【答案解析】 超声检查可见胎心搏动、胎囊可确诊早期妊娠。

10.【正确答案】 C

【答案解析】 哺乳期月经复潮前也需要采取避孕措施，由于哺乳期可能会有排卵。

11.【正确答案】 C

【答案解析】 阴道分娩镇痛需将神经阻滞范围控制在胸 11~骶 4 之间。

12.【正确答案】 C

【答案解析】 产后应适当补充维生素和铁剂，推荐补充铁剂 3 个月。

13.【正确答案】 A

【答案解析】 胎头双顶径长 98~100mm，股骨长 78~80mm，腹围>330mm，应考虑巨大胎儿，同时排除双胎、羊水过多及胎儿畸形。

14.【正确答案】 C

【答案解析】 黄体功能不足的患者子宫内膜的病理改变是子宫内膜分泌反应不良。

15.【正确答案】 D

【答案解析】 不协调性子宫收缩乏力给予吸氧的同时应用宫缩抑制剂，如特布他林或硫酸镁等，可在第一产程必要时使用哌替啶。

16.【正确答案】 B

【答案解析】 凝乳块状或豆渣样白带为外阴

阴道假丝酵母菌病的特征，常伴严重外阴瘙痒或灼痛。顽固病例要注意并发糖尿病；患假丝酵母菌阴道炎的孕妇必须治疗；用 1: 5000 的高锰酸钾冲洗阴道无效。

17.【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠后子宫增大压力增加是生理性因素不是子宫脱垂的病因。

18.【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠期肝内胆汁淤积症的诊断依据包括：孕晚期出现瘙痒；肝区压痛明显；肝胆酸及牛磺酸比值为 3: 1；肝功能测定天冬氨酸转氨酶、丙氨酸转氨酶轻至中度升高。

19.【正确答案】 A

【答案解析】 在分娩前使用地塞米松，可以避免早产儿发生呼吸窘迫综合征。

20.【正确答案】 B

【答案解析】 老年性阴道炎的治疗可以阴道内用少量雌激素。

21.【正确答案】 E

【答案解析】 输卵管间质部妊娠的术式为行子宫角部楔形切除及患侧输卵管切除术。

22.【正确答案】 B

【答案解析】 不全流产是宫颈口已扩张，不断有血自宫颈口内流出，有时还可见有胎盘或胎儿组织堵塞在扩张的宫颈口内。B 超检查子宫内没有完美的胚胎外形，没有心跳，只见血块和边界不规则的块状物，宫颈口张开，有时见宫颈口内有组织物。如果不完全流产的症状发生后，持续出血时



间长引起贫血，患者有面色苍白、头昏等表现，血液检查可见红细胞和血红蛋白减少；出血过多引起休克的，出现心跳加快、出冷汗、少尿、晕厥、甚至昏迷。

23.【正确答案】 E

【答案解析】 子宫脱垂Ⅱ、Ⅲ度者的主要临床表现为排使用力时，阴道口有一肿物脱出。

24.【正确答案】 C

【答案解析】 子宫内腺异位症最典型的症状为月经异常。

25.【正确答案】 C

【答案解析】 协调性宫缩乏力时可用缩宫素处理。

26.【正确答案】 C

【答案解析】 念珠菌阴道炎的临床表现为尿频、尿痛；外阴瘙痒、灼痛；白色豆腐渣样分泌物；阴道壁上可见白色假膜，擦去后可见浅表溃疡。

27.【正确答案】 E

【答案解析】 引起膀胱阴道瘘的主要因素为第二产程延长组织挤压而缺血坏死。

28.【正确答案】 B

【答案解析】 胎盘全部粘连不会引起出血症状。

29.【正确答案】 E

【答案解析】 为预防子宫内膜异位症禁忌输卵管通液术应在月经前期进行。

30.【正确答案】 D

【答案解析】 急性盆腔炎不可以在急性期做盆腔检查，以了解病情。

31.【正确答案】 E

【答案解析】 子宫内膜癌癌前病变指的是子宫内膜腺瘤型增生过长。

32.【正确答案】 A

【答案解析】 判断妊娠期高血压疾病严重程度的指标是血压；球蛋白测定；眼底动脉痉挛程度；肝肾功能损害程度。

33.【正确答案】 B

【答案解析】 人工流产并发症：术后感染；双子宫易发生漏吸；瘢痕子宫易发生子宫穿孔；宫体过度屈曲易发生吸宫不全。

34.【正确答案】 C

【答案解析】 先兆流产的症状出现最早的是少量阴道出血。

35.【正确答案】 E

【答案解析】 产褥感染处理：半卧位；纠正全身一般情况；选用有效的抗生素；胎盘残留者，应控制感染后清宫。

二、A2型题

36.【正确答案】 D

【答案解析】 CST/OCT的评估及处理中Ⅰ类提示观察时胎儿酸碱平衡正常，可常规监护，不需采取特殊措施。其满足以下条件：①胎心率基线110~160次/分；②基线变异为中度变异；③没有晚期减速及变异减速；④存在或者缺乏早期减速、加速。



37.【正确答案】 E

【答案解析】 早期减速一般发生在第一产程，为宫缩时胎头受压引起。子宫收缩后迅速恢复正常。等待自然分娩即可。

38.【正确答案】 D

【答案解析】 题中胎儿无缺氧表现，骨产道无异常，产程时间也无异常，S=0，提示胎头最低点在坐骨棘水平，考虑为D。待产程进一步进展，再酌情处理。

39.【正确答案】 B

【答案解析】 患者从临产后规律宫缩6h，枕左前位，估计胎儿体重2700g，胎心142次/分。无头盆不称及胎儿异常宫口开大3cm，说明已进入第一产程的活跃期，而骨盆外测量未见异常，故可等待自然分娩。故选B。

40.【正确答案】 E

【答案解析】 本题停经52天，子宫增大50天，说明子宫增大与停经周数相符，宫口已松，有组织物堵塞，考虑为难免流产。所以选清宫或吸宫术。

41.【正确答案】 E

【答案解析】 对妊娠已足月、胎儿可宫外存活者，应及时终止妊娠。合并胎盘功能不良、胎儿窘迫，或破膜时羊水少且胎粪严重污染，估计短时间不能结束分娩者，应采用剖宫产术终止妊娠。

42.【正确答案】 B

【答案解析】 本题考虑为难免流产，血压较低，所以正确的方法为边纠正休克边行刮宫。

43.【正确答案】 B

【答案解析】 本题血压超过160/110mmHg，有尿蛋白和水肿及眼底异常，视网膜水肿，诊断为重度子痫前期。

44.【正确答案】 E

【答案解析】 终止妊娠时机：①妊娠期高血压、子痫前期患者可期待治疗至37周终止妊娠。②重度子痫前期患者：妊娠<24周经治疗病情不稳定者建议终止妊娠；孕24~28周根据母儿情况及当地医疗条件和医疗水平决定是否期待治疗；孕28~34周，若病情不稳定，经积极治疗24~48小时病情仍加重，促胎肺成熟后应终止妊娠；若病情稳定，可考虑继续期待治疗，并建议提前转至早产儿救治能力较强的医疗机构；妊娠≥34周患者应考虑终止妊娠。本题38周可以考虑终止妊娠，但是不是立即剖宫产。

45.【正确答案】 C

【答案解析】 根据病史，本题诊断为轻度子痫前期。

46.【正确答案】 A

【答案解析】 妊娠期高血压已经发生子痫。最可能的诊断是子痫。

47.【正确答案】 E

【答案解析】 重度子痫前期患者：妊娠<24周经治疗病情不稳定者建议终止妊娠；孕24~28周根据母儿情况及当地医疗条件和医疗水平决定是否期待治疗；孕28~34周，若病情不稳定，经积极治疗24~48小时病情仍加重，促胎肺成熟后应终止妊娠；若病情稳定，可考虑继续期待治疗，



并建议提前转至早产儿救治能力较强的医疗机构；妊娠 ≥ 34 周患者应考虑终止妊娠。本题38周，NST无反应型提示胎儿窘迫可能，所以立即剖宫产。

48.【正确答案】D

【答案解析】葡萄胎排出后，预防性化疗不常规推荐，其仅适用于有高危因素和随访困难的完全性葡萄胎患者。

49.【正确答案】D

【答案解析】根据“停经，腹痛，阴道流血， β -hCG和阴道超声检查结果”可判断该患者为异位妊娠；再根据“贫血外貌，下腹部压痛、反跳痛”可判断该患者有腹腔内出血的征象，因此目前正确的治疗措施是行剖腹探查术。

50.【正确答案】D

【答案解析】胎儿死亡3周尚未排出，退行性变的胎盘组织释放凝血活酶入母体循环，激活血管内凝血因子，可导致弥散性血管内凝血。因此引产前应检测凝血功能。

51.【正确答案】D

【答案解析】该患者的病史信息显示患者分娩后子宫收缩可，产后1小时子宫收缩变差，阴道出血量不多，但血压下降，首先应考虑子宫收缩乏力导致的宫腔内隐匿性出血。针对该情况，首先的处理是按摩子宫并挤压宫底部刺激宫缩，可促使淤血排出。

52.【正确答案】E

【答案解析】根据“骶耻外径18cm，坐骨结节间径8cm”可判断该产妇骨盆偏小，且为

不完全臀先露，故需剖宫产。

53.【正确答案】C

【答案解析】肌肉注射哌替啶，使不协调性子宫收缩乏力的极性倒置宫缩经充分休息，恢复为协调性子宫收缩。

54.【正确答案】E

【答案解析】根据病例提供信息，考虑该患者是先兆子宫破裂，所以应立即采取有效措施抑制子宫收缩，如乙醚全麻或肌注哌替啶，并尽快行剖宫产术，迅速结束分娩。

55.【正确答案】C

【答案解析】急性阑尾炎和肠穿孔妇科检查无特殊异常。宫外孕有停经史。卵巢巧克力囊肿应有痛经史，破裂时可引起突发性剧烈腹痛。急性盆腔炎常见症状为下腹痛、发热，阴道分泌物增多且为脓性臭味，宫颈举痛，宫体稍大，有压痛，活动受限，附件区有压痛。其诱因有宫腔内手术操作后感染、下生殖道感染、性活动及性卫生不良等。故本病例可诊断为急性盆腔炎。

56.【正确答案】D

【答案解析】宫旁明显增厚提示有癌灶宫旁浸润，但未达盆腔，所以其分期为Ⅱb期。Ⅰ期时癌灶局限于子宫颈；Ⅱa期时无宫旁浸润；Ⅲa期时癌累及阴道，已达下1/3。

57.【正确答案】B

【答案解析】根据题干信息，该患者首先考虑的诊断是子宫内膜癌。输卵管癌早期无症状，临床上主要表现为输卵管“三联征”。子宫颈癌表现为接触性出血。子宫内膜炎阴道有大量脓性分泌物且有臭味。老年性



阴道炎主要为阴道分泌物增多及外阴瘙痒、灼热感。

58.【正确答案】D

【答案解析】该患者人流术后子宫位置改变为诱因，除急腹症临床表现外，子宫右侧拳头大小不活动囊性肿块在近子宫处压痛明显，并有感染征象，全部表现均符合卵巢囊肿蒂扭转。

59.【正确答案】E

【答案解析】根据葡萄胎排空后出现阴道流血和/或转移灶及其相应症状和体征，应考虑滋养细胞肿瘤可能。对于葡萄胎排空后1年以上发病者一般临床诊断为绒毛膜癌，半年内多诊断为侵蚀性葡萄胎。故该患者最可能的诊断是侵蚀性葡萄胎。葡萄胎残留、先兆流产、异位妊娠无潜伏期(可直接排除)。

60.【正确答案】D

【答案解析】产后6周复查，生殖器官复原可恢复性生活。排卵可在月经未复潮前即先恢复，故应采取避孕措施，可选用工具法、口服避孕药，如哺乳的母亲不宜口服避孕药，因药物可通过乳汁而影响婴儿，应选用工具避孕。

61.【正确答案】C

【答案解析】患者有停经史，B超提示早孕。曾服过探亲避孕药，探亲避孕药的避孕作用主要是在服药后12小时开始改变宫颈黏液的黏稠度，至16小时达到高峰，使精子不能穿过宫颈管；或是使子宫内膜发生变化，不利于受精卵着床。现阴道少量出血伴腹痛，可能导致流产，故最佳处理

方案为吸宫术终止妊娠。

62.【正确答案】B

【答案解析】骨盆入口狭窄是临产后胎头不衔接的主要原因，B符合骨盆入口狭窄情况。

63.【正确答案】D

【答案解析】胎位不正，先兆子宫破裂，需急诊行剖宫产术终止妊娠。

64.【正确答案】E

【答案解析】此患者考虑为先兆早产，可通过休息和药物治疗控制宫缩并促胎肺成熟，尽量延长孕周。

65.【正确答案】A

【答案解析】育龄期女性短暂停经后阴道流血，尿hCG(+)，腹部有移动性浊音，有失血体征，推测患者可能为异位妊娠破裂大出血，血液集中在子宫直肠陷凹。通过阴道后穹窿穿刺进入子宫直肠陷凹，若抽出暗红色不凝血，结合症状体征，即可明确诊断。

三、A3/A4型题

66.【正确答案】D

【答案解析】患者白带增多伴外阴瘙痒，分泌物黄色、稀薄、泡沫状，草莓样宫颈，考虑可能为滴虫性阴道炎，可以阴道分泌物悬滴法查滴虫以明确诊断。

67.【正确答案】A

【答案解析】患者白带增多伴外阴瘙痒，分泌物黄色、稀薄、泡沫状，草莓样宫颈，考虑可能为滴虫性阴道炎。



68.【正确答案】 C

【答案解析】 滴虫性阴道炎不妥的治疗是阴道使用碱性洗液。

69.【正确答案】 B

【答案解析】 孕妇血压 150/100mmHg，诊断为中度妊娠期高血压疾病。

70.【正确答案】 D

【答案解析】 注意检查眼底，妊高症容易导致眼底病变。

71.【正确答案】 B

【答案解析】 患者目前中度妊娠期高血压，不需要给予地塞米松激素治疗。

72.【正确答案】 E

【答案解析】 预防该疾病的措施应该在妊娠早期就开展预测工作，而不是等到妊娠晚期。

73.【正确答案】 A

【答案解析】 患者孕 32 周，胎头高浮，胎心 140 次/分，需做 B 超进一步检查。

74.【正确答案】 B

【答案解析】 患者多次人流，孕 32 周，阴道少量出血 3 天，不伴腹痛，耻骨联合上方可闻及胎盘杂音。考虑为前置胎盘的可能性大。

75.【正确答案】 E

【答案解析】 患者现孕 32 周，阴道少量出血 3 天，儿头高浮，胎心 140 次/分，耻骨联合上方可闻及胎盘杂音。建议观察等胎儿到 37 周进行剖宫产，所以选择期待

疗法。

76.【正确答案】 C

【答案解析】 有无停经是对目前患者病情的最有价值的病史。

77.【正确答案】 D

【答案解析】 患者左下腹痛阴道出血，血压低休克，子宫大小正常，左侧包块，盆腔中量积液，考虑为输卵管妊娠破裂的可能性大，需立即行后穹窿穿刺或腹穿，以明确诊断。

78.【正确答案】 B

【答案解析】 患者左下腹痛阴道出血，血压低休克，子宫大小正常，左侧包块，盆腔中量积液，考虑为输卵管妊娠破裂的可能性大。

79.【正确答案】 A

【答案解析】 如确诊为输卵管妊娠破裂，需行腹腔镜或剖腹探查。

80.【正确答案】 B

【答案解析】 妊娠 39 周临产，破水 7 小时入院，宫缩间歇时有血性羊水流。6 小时后阴道出血较多，胎心音变慢不规律，考虑为脐带帆状附着的前置血管破裂。

81.【正确答案】 B

【答案解析】 取阴道血涂片找到有核红细胞或幼红细胞可诊断为脐带帆状附着的前置血管破裂。

82.【正确答案】 A

【答案解析】 患者产后检查胎盘，可能的阳



性发现为脐带附着于胎盘边缘，胎膜破口处有一主干血管破裂。

83.【正确答案】 A

【答案解析】 产妇烦躁不安，疼痛难受，腹部检查见脐下两指处呈环状凹陷，下段有压痛。胎心音正常，导尿呈血性。考虑为先兆子宫破裂。

84.【正确答案】 E

【答案解析】 脐下三横指处呈环状凹陷在此指子宫病理性缩复环(该患者考虑先兆子宫破裂)，应立即停注缩宫素。

85.【正确答案】 D

【答案解析】 根据患者表现考虑是子宫破裂，应立即行剖宫产。

86.【正确答案】 E

【答案解析】 可以使用胎儿监护仪监测胎心变化，可以省略超声多普勒测胎心数。

87.【正确答案】 C

【答案解析】 妊娠 43 周，自觉胎动减少已 2 日，无头盆不称征象，建议测孕妇尿液雌激素/肌酐比值。

88.【正确答案】 E

【答案解析】 超声多普勒检查胎心数，胎心变慢也不能证明胎盘功能低下。

89.【正确答案】 B

【答案解析】 证实胎盘功能减退，可以行剖宫产术结束分娩。

90.【正确答案】 C

【答案解析】 胎儿不小，不易发生新生儿硬肿症，而容易发生在早产儿时。

91.【正确答案】 A

【答案解析】 妊娠 40 周，已临产 10 小时，宫缩时胎心 100 次/分，内诊查宫颈口开大 2cm，先露 S-3，骨产道无异常。考虑为正常产程。

92.【正确答案】 B

【答案解析】 考虑为产妇此时为正常产程，不建议给予缩宫素静滴加速产程。

93.【正确答案】 A

【答案解析】 做胎心监护，胎心率无反应型不能有助于诊断。

94.【正确答案】 E

【答案解析】 临产 18 小时，宫口已开全，先露 S+2，胎心持续在 165 次/分，此时不宜行剖宫产，应阴道助产分娩。

95.【正确答案】 B

【答案解析】 在产褥早期因子宫收缩引起下腹部阵发性剧烈疼痛，称为产后宫缩痛，一般在产后 1~2 日出现，持续 2~3 日自然消失。

96.【正确答案】 D

【答案解析】 乳房胀痛，无红肿，考虑乳汁过多积聚在乳房内，应让新生儿多吸吮。

97.【正确答案】 E

【答案解析】 一般产后如果乳头凹陷，导致吸乳障碍。



98.【正确答案】 A

【答案解析】 对于平时月经规则的已婚妇女，若月经过期应该考虑其是否妊娠，临床上尿 HCG 阳性基本上可以确定早期妊娠。

99.【正确答案】 C

【答案解析】 停经 6 周时，阴道 B 型超声见妊娠囊内有胚芽和原始心管搏动，可以确

诊为宫内妊娠、活胎。

100.【正确答案】 B

【答案解析】 阴道 B 型超声最早在停经 4~5 周时，宫腔内见到圆形或椭圆形的妊娠囊。本患者尿 HCG 阳性，停经 6 周尚未见宫内妊娠囊，左附件区见包块，且临床上有关阴道血性分泌物，考虑异位妊娠的可能性大。



2022 年妇产科主治医师《专业实践能力》 模拟试卷答案解析

一、案例分析题

1. 【正确答案】ACDFGL

【答案解析】患者孕前即已诊断为糖尿病，所以为糖尿病合并妊娠。有较明确的上呼吸道感染，尚未达到肺炎程度。患者具有发生酮症酸中毒的高危因素。妊娠期胎盘产生 HPL、雌激素、孕激素等多种具有抗胰岛素作用的激素，自妊娠 24 周开始，对胰岛素的需要量增加，至妊娠 34 周达到峰值。患者孕前监护不规范，没有相应调整胰岛素用量。同时，患者合并感染，这也是导致酮症酸中毒的高危因素。患者的临床表现也符合酮症酸中毒的表现。但是相关实验室检查尚未完善，仅仅依据尿酮体增高不能排除饥饿性酮症的可能性。

2. 【正确答案】ABGHI

【答案解析】妊娠合并糖尿病酮症酸中毒患者实验室检查主要表现为：尿糖、尿酮阳性；血糖增高（在 16.7~33.3mmol/L）；血白细胞增高（感染或脱水）；BUN 增高；二氧化碳结合力、pH 下降；电解质紊乱。

3. 【正确答案】ABCDE

【答案解析】高渗性非酮症糖尿病昏迷：此类患者亦可有脱水、休克、昏迷等表现，老年人多见。但血糖常超过 33.3mmol/L，血钠超过 155mmol/L，血浆渗透压超过 330mmol/L，血酮体为阴性或弱阳性。乳酸

性酸中毒：此类患者起病急，有感染、休克、缺氧史，有酸中毒、呼吸深快和脱水表现，虽可有血糖正常或升高，但其血乳酸显著升高（超过 5mmol/L），阴离子间隙超过 18mmol/L。乙醇性酸中毒：有酗酒习惯，多在大量饮酒后发病，患者因剧吐致血羟丁酸升高，血酮可出现阳性，但在有酸中毒和阴离子隙增加的同时其渗透压亦升高。饥饿性酮症：因进食不足造成，患者脂肪分解，血酮呈阳性，但尿糖阴性，血糖多不高。低血糖昏迷：患者曾有进食过少的情况，起病急，呈昏睡、昏迷，但尿糖、尿酮阴性，血糖低，多有过量注射胰岛素或过量服用降血糖药史。急性胰腺炎：半数以上糖尿病酮症酸中毒患者会出现血、尿淀粉酶非特异性升高，有时其升高幅度较大。

4. 【正确答案】ADGIL

【答案解析】确诊酮症酸中毒后，测血糖 $\geq 13.9\text{mmol/L}$ ，普通胰岛素，入生理盐水，静脉滴注。按 $0.1\text{U}/(\text{kg} \cdot \text{h})$ 小剂量持续静滴；酮体消失前胰岛素用量为 $4\sim 6\text{U/h}$ ，使血糖每小时下降 $3.9\sim 5.6\text{mmol/L}$ ；酮体消失后胰岛素用量为 $2\sim 3\text{U/h}$ ，使血糖维持于 11.1mmol/L ，以免低血糖及脑水肿。每 1~2 小时复查血糖，调整胰岛素滴速。若血糖下降 $<30\%$ ，则将胰岛素加倍，否则维持不变。按照患者体重的 10% 估计补液量，第



一个 2 小时可以滴注 1000ml，此后以 250ml/h 滴速滴注。见尿补钾，每 500ml 液体加入 10% KCl 不超过 15ml，每小时不超过 1.5g，24 小时总量为 6~10g。要在 4~6 天补足。轻、中度酸血症不必补碱。pH < 7.1、CO₂ CP < 8.9mmol/L、HCO₃⁻ < 10mmol/L 者需要补碱。可用 5% NaHCO₃ 液，0.5ml/kg，使二氧化碳结合力升高 0.449mmol/L。

5.【正确答案】 BEF

【答案解析】当血糖降至 13.9mmol/L 及以下后，将输注胰岛素的生理盐水改为 5% 葡萄糖氯化钠注射液，胰岛素用量按照葡萄糖：胰岛素 = (2~4)：1，胰岛素滴速 1~2U/h。尿酮体(-)，尿糖(+)后继续点滴 12~24 小时。停用胰岛素滴注前 1 小时，皮下注射一次胰岛素以防血糖反跳。当血糖 < 11.1mmol/L，补液速度调整为 150ml/h。

6.【正确答案】 ABCDEFGHIJL

【答案解析】酮症酸中毒如果处理不当，可能发生的严重并发症包括：心血管系统：补液过多过快时，可导致心力衰竭；失钾或高钾时，易出现心律失常，甚至心脏停搏；降低血糖的速度太快或血糖太低时，可发生心肌梗死，甚至休克或猝死；血液浓缩，凝血因子加强时，可引起脑血栓、肺栓塞等并发症。脑水肿：为严重并发症之一，病死率颇高，必须随时警惕。急性肾功能衰竭：大多由于严重脱水、休克、肾循环严重下降而易并发本症。严重感染和败血症：常使病情恶化，难以控制，影响预后。弥散性血管内凝血(DIC)：由于败血症等严重感染及休克、酸中毒等。糖尿

病高渗性昏迷和乳酸性酸中毒：糖尿病酮症酸中毒可伴发此二症。

7.【正确答案】 ACEG

【答案解析】胎膜在临产前破裂称胎膜早破。患者体温较高，宫底压痛，考虑存在羊膜腔感染。

8.【正确答案】 BCEFI

【答案解析】目前存在羊膜腔感染，胎心率较快，应尽快剖宫产终止妊娠，用地塞米松促胎儿肺成熟，采取头低臀高位避免脐带脱垂，患者有感染，应用抗生素。新生儿应按早产儿处理，做好新生儿复苏准备。

9.【正确答案】 BDFGH

【答案解析】患者在剖宫产术中孕妇突然出现烦躁不安，咳嗽，呼吸困难，心率升高，血压降低，考虑发生了羊水栓塞，一旦初步诊断为羊水栓塞，必须立即积极抢救。纠正肺动脉高压：盐酸罂粟碱：30~90mg 溶于 25% 葡萄糖液 20ml 缓慢静注，解除平滑肌张力、扩张冠状动脉及脑血管。阿托品 0.5~1mg，每 10~15 分钟静注一次，直至面部潮红或呼吸困难好转为止。解除肺动脉高压推荐使用磷酸二酯酶-5 抑制剂、一氧化氮及内皮素受体拮抗剂等特异性舒张肺血管平滑肌的药物。发病时正在静滴缩宫素者应立即停止。

10.【正确答案】 BCFGH

【答案解析】均为老年女性出现异常阴道流血可考虑的诊断。

11.【正确答案】 BDFH

【答案解析】均为子宫内膜浆液性乳头状腺



癌特征。

12.【正确答案】 ABF

【答案解析】 均为可能的转移部位。

13.【正确答案】 G

【答案解析】 患者分期为Ⅲc期。

14.【正确答案】 F

【答案解析】 Ⅲc期指盆腔淋巴结阳性。

15.【正确答案】 A

【答案解析】 子宫内膜浆液性乳头状腺癌对化疗敏感。

16.【正确答案】 BD

【答案解析】 患者为中期妊娠。

17.【正确答案】 ADEG

【答案解析】 A、D、E、G为依沙吖啶羊膜腔内注射引产的禁忌证。

18.【正确答案】 CE

【答案解析】 C、E均为依沙吖啶中期引产前行盆腔超声的目的。

19.【正确答案】 DEF

【答案解析】 依沙吖啶粉剂应用无菌蒸馏水溶解，注入过程应重复回抽。

20.【正确答案】 ACD

【答案解析】 患者出血较多，查找出血原因。

21.【正确答案】 BC

【答案解析】 有胎盘、胎膜残留及宫颈裂伤。

22.【正确答案】 D

【答案解析】 基础体温双相说明卵巢功能正常。上次人工流产后发热，可能引起盆腔粘连，导致输卵管阻塞。

23.【正确答案】 ABH

【答案解析】 确诊输卵管梗阻的方法包括输卵管造影，或超声引导下造影，腹腔镜探查术是金标准。

24.【正确答案】 BGHIL

【答案解析】 治疗输卵管梗阻方法可选择手术分离粘连或者伞端造口。解决生育要求的方法还有体外受精-胚胎移植术，宫腔镜通液术，中药治疗等。

25.【正确答案】 ABCDEH

【答案解析】 主要用于鉴别有无子宫内膜异位症、卵巢恶性肿瘤、流产及子宫内膜癌。

26.【正确答案】 ABCD

【答案解析】 均为该患者可能的诊断。