



一、A1型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 患者管理的基本内容

- A. 安慰或解释
- B. 告诫或建议
- C. 开处方
- D. 转诊
- E. 以上均是

2. 世界上全科医生还有哪种称谓

- A. 家庭医生
- B. 通科医生
- C. 社区医生
- D. 专科医生
- E. 住院医生

3. 关于全科医学的描述正确的是

- A. 自 20 世纪 60 年代起源的新型二级临床专业学科
- B. 正式建立于 20 世纪 60 年代的新型临床二级专业学科
- C. 临床医学、预防医学、康复医学与人文社会科学等的综合体
- D. 包含了“六位一体”服务所有内容的医学保健专业学科
- E. 以内科为主的综合临床学科

4. 下列哪项不是全科医学的特征

- A. 综合性服务

B. 可及性服务

- C. 以疾病为中心
- D. 持续性服务
- E. 以社区为基础

5. 全科医学与全科医疗取得良好效果的关键是

- A. 高超的医疗技术
- B. 高度的责任感
- C. 良好的医患关系
- D. 患者对医生的信任
- E. 以上都是

6. 下列哪项不是核心家庭的特征

- A. 家庭内部资源的可用性大
- B. 规模小
- C. 成员之间的关系较单纯
- D. 结构简单
- E. 相对容易达成一致意见

7. 现代社会推崇的家庭权力结构类型是

- A. 传统权威型
- B. 工具权威型
- C. 分享权威型
- D. 感情权威型
- E. 以上都是



8. “人人享有卫生保健”战略目标是在何时提出的
- A. 1977 年 5 月第 30 届世界卫生大会
 - B. 1948 年 WHO 成立时
 - C. 1980 年第 33 届世界卫生大会
 - D. 1978 年国际初级卫生保健大会
 - E. 1997 年第 50 届世界卫生大会
9. 下列不属于我国基本卫生保健制度主要内容的是
- A. 以政府财政投入为主导
 - B. 以农村和城市社区卫生服务为载体
 - C. 以全体城乡居民为对象
 - D. 以现代尖端医学技术为手段
 - E. 免费为群众提供预防保健服务和按成本收费为群众提供基本医疗服务
10. 人人享有卫生保健的含义并不是指
- A. 医护人员将为世界上每一个人治愈全部疾病
 - B. 人们能运用比现在更好的办法去预防疾病, 减少不可避免的疾病和伤残导致的痛苦
 - C. 公平地分配一切卫生资源
 - D. 卫生保健进入家庭、学校、工厂和社区
 - E. 使所有的个人和家庭能在可接受和提供的范围内通过充分参与, 享受到基本的卫生保健服务
11. 小概率事件 P 的取值一般认为是
- A. $P \leq 0.005$
 - B. $P \leq 0.001$
 - C. $P \leq 0.05$
 - D. $P = 0$
 - E. P 的绝对值 ≤ 0.005
12. 下列哪项描述不是正态分布的特征
- A. 曲线位于横轴上方均数处最高
 - B. 以零为中心, 左右对称
 - C. 均数为其位置参数
 - D. 标准差为其变异度参数
 - E. 正态分布曲线下面积有一定分布规律
13. 对于一个分布不明的资料或是分布一端或两端出现不确定值。用于描述其集中趋势是
- A. 均数
 - B. 几何均数
 - C. 中位数
 - D. 标准差
 - E. 四分位数间距
14. 五因素传播模式的正确表述是
- A. 传者-信息-传播途径-受者-效果
 - B. 传者-传播途径-信息-效果-受者
 - C. 信息-传者-传播途径-受者-效果
 - D. 信息-传者-传播途径-效果-受者
 - E. 受者-信息-传播途径-传者-效果
15. 下列关于健康教育和健康促进的叙述错误的是
- A. 健康教育的教育活动是有组织、有系统和有评价的活动
 - B. 健康教育着重于健康知识的传播, 一般不重视人们行为的改变
 - C. 健康促进是包括健康教育及能促使行为和环境有益于健康的相关政策、法规、组织的综合
 - D. 健康促进比健康教育意义更为广泛
 - E. 健康促进要以健康教育为先导, 否则就缺乏基础, 而健康教育如不向健康促进发展, 其作用就会受到极大限制



16. 健康教育要提供人们行为改变所必须的
- A. 医疗技术
 - B. 诊断技术
 - C. 救护技术
 - D. 生化检测技术
 - E. 知识、技术与服务
17. 关于学校健康促进的特征的表述, 哪项是错误的
- A. 承认学校的社会文化精神对于维持积极的学习及支持心理健康等方面的重要性
 - B. 把区域和地方的卫生服务与学校联系起来, 满足学校儿童的特殊健康问题的需求
 - C. 通过鼓励参与其儿童健康知识和技巧的发展而使家庭参与进来
 - D. 增加妇女在社区内享有教育和保护健康方面的公平性
 - E. 以上都不是
18. “规划实施 3 年后, 100% 的孕妇接受产前检查”这一目标属于
- A. 总目标
 - B. 行为目标
 - C. 技能目标
 - D. 知识目标
 - E. 信念目标
19. 实施健康教育计划要从哪些方面控制
- A. 社区卫生服务资源
 - B. 社区特定的家庭健康
 - C. 社区特定的个人健康
 - D. 社区特定的人群健康
 - E. 时间控制、质量控制、对象控制
20. 心理健康的标准不包括
- A. 身体健康
 - B. 人格健全
 - C. 情绪乐观稳定
 - D. 智力正常
 - E. 行为和生活方式健康
21. 母乳喂养维持泌乳的最重要的因素是
- A. 催乳的药物
 - B. 乳母的饮食
 - C. 每次哺乳的时间
 - D. 哺乳的次数
 - E. 哺乳的姿势
22. 正常足月儿生后可抱至母亲处给予吸吮的时间是
- A. 生后半小时左右
 - B. 生后 1 小时左右
 - C. 生后 2 小时左右
 - D. 生后 4 小时左右
 - E. 生后 8 小时左右
23. 足月儿的定义是
- A. 37 周 ≤ 胎龄 < 42 周的新生儿
 - B. 胎龄 > 40 周的新生儿
 - C. 胎龄 > 28 周的婴儿
 - D. 胎龄 < 37 周
 - E. 出生体重在同胎龄体重第 5 ~ 90 百分位者
24. 不符合早产儿特点的是
- A. 早产儿各种消化酶不足, 胆酸分泌少, 不易将脂肪乳化, 脂肪消化吸收差, 在缺氧缺血和喂养不当时, 易发生坏死性小肠结肠炎
 - B. 早产儿肝不成熟, 生理性黄疸较足月儿重, 持续时间长, 同时肝糖原储存少, 肝合成蛋白质不足, 易发生代谢性酸中毒



- C. 早产儿呼吸中枢相对不成熟，呼吸常不规则，甚至出现呼吸暂停
- D. 早产儿因肺泡表面活性物质少，易发生肺透明膜病
- E. 早产儿出生后心率平均为 120 ~ 140 次/分，血压平均为 9.3/6.7kPa
25. 妇女保健范畴为
- A. 妇女一生常见疾病的防治
- B. 妇科常见疾病的防治
- C. 妇科恶性肿瘤的早期发现及治疗
- D. 性传播疾病的防治
- E. 妇女一生性器官及性功能的保健和疾病防治
26. 婚前医学检查包括对下列疾病的检查
- A. 遗传性疾病、指定传染病、有关精神病
- B. 遗传性疾病、传染病、精神病
- C. 严重遗传性疾病、传染病、精神病
- D. 严重遗传性疾病、传染病、有关精神病
- E. 严重遗传性疾病、指定传染病、有关精神病
27. 属于速效避孕药避孕主要机制为
- A. 增加宫腔分泌液
- B. 抑制卵泡生长发育
- C. 阻止受精卵着床
- D. 抑制排卵
- E. 使宫颈黏液变稠
28. 属于口服短效避孕药副反应的项目，不正确的是
- A. 类早孕反应系雌激素刺激胃黏膜所致
- B. 服药期间出现阴道流血，多发生在漏服药物之后
- C. 能使经血量多，不适用于经量多的妇女
- D. 白带增多系口服长效避孕药作用的结果
- E. 体重增加系因雌、孕所致
29. 女性青春期最早出现的体征
- A. 声调高
- B. 乳房发育
- C. 月经来潮
- D. 身高和体重增加
- E. 出现阴毛和腋毛
30. 孕中期保健的重点之一是
- A. 防致畸
- B. 防胎位不正
- C. 防早产
- D. 加强营养指导
- E. 预防产前出血
31. 下列不违反保密原则的做法是
- A. 透露患者家庭隐私
- B. 泄露患者个人信息
- C. 随意公开患者的病历资料
- D. 在公开场合议论患者的情况
- E. 将病人不良病情告知家属
32. 医学模式转变对医师提出的根本性医德要求是
- A. 学习伦理学
- B. 学习生命价值论
- C. 学习公益理论
- D. 注重改变传统的医学道德观念
- E. 更加关注处于社会关系中的、作为一个整体的病人的人文方面
33. 下列关于医德评价的叙述错误的是
- A. 医德评价可分为社会评价和自我评价两种类型



- B. 医德评价的方式有社会舆论、内心信念和传统习俗
- C. 医德评价只需要考察医务人员行为的动机
- D. 医德评价的对象是医疗活动
- E. 医德评价对医务人员的职业行为的善恶具有裁决作用
34. 医学道德评价的方式有
- A. 患者评价、同行评价和内心信念
- B. 传统习俗、患者评价和自我反省
- C. 社会舆论、传统习俗和内心信念
- D. 患者评价、同行评价和自我评价
- E. 社会舆论、同行评价和自我评价
35. 以下哪项不属于疾病统计指标
- A. 发病率
- B. 罹患率
- C. 患病率
- D. 病死率
- E. 出生率
36. 青春期是指从儿童期到成人期所经历的一个转变时期,世界卫生组织(WHO)将青春期的年龄范围规定为
- A. 8~10岁
- B. 10~18岁
- C. 10~20岁
- D. 9~20岁
- E. 10~22岁
37. 全科医疗中病人管理的基本内容不包括
- A. 问诊
- B. 开处方
- C. 转诊
- D. 告诫或建议
- E. 安慰和解释
38. 衡量疾病预后最常用的指标是
- A. 病死率
- B. 继发性
- C. 患病率
- D. 感染率
- E. 引入率
39. 引起婴儿佝偻病的主要原因是
- A. 缺乏维生素 A
- B. 缺乏维生素 B
- C. 缺乏维生素 C
- D. 缺乏维生素 D
- E. 食物中钙、磷比例不当
40. 产褥期变化最大的器官是
- A. 乳房
- B. 卵巢
- C. 阴道
- D. 输卵管
- E. 子宫
41. 阻止精子进入宫腔的避孕方法是
- A. 利用安全期
- B. 使用避孕套
- C. 口服短效避孕药
- D. 口服长效避孕药
- E. 放置宫内节育器
42. 全科医学的理论基础是
- A. 通科医生的发展
- B. 社区卫生服务
- C. 生物-心理-社会医学模式
- D. 预防医学和临床医学
- E. 传统医学和现代医学基本理论



43. 鼻出血时正确的处理方法是
- A. 嘱患者将流入口中的血液尽量吐出，以免咽下刺激胃黏膜
 - B. 不应给予镇静剂
 - C. 休克时取坐位或半坐位
 - D. 无休克时应取平卧头低位
 - E. 无论有无休克，均应取坐位或半卧位
44. 对准备结婚的男女双方在结婚登记前进行的健康保健服务称为
- A. 围生期保健
 - B. 性保健指导
 - C. 婚前保健
 - D. 新婚节育指导
 - E. 婚前卫生咨询
45. 关于产褥期保健描述不正确的是
- A. 产后出血是引起产妇死亡的主要原因，必须加强防治
 - B. 为了预防感染和有利于康复，产后休养环境要安静、舒适，室内保持整齐、清洁、空气流通，防止过多探视
 - C. 产褥期产妇的心理障碍与分娩后体内环境发生调整，性激素的比例重新调配及家庭关系、环境等因素都可能有关，做好产褥早期产妇的心理适应工作非常必要，以防止产后心理障碍
 - D. 产后新生儿 40 分钟内即应开始早期吸吮，并实行产后母婴同室，按需喂哺，为母乳喂养的进行打下良好的基础，应坚持纯母乳喂养 4~6 个月
 - E. 产后 42 日应对母婴进行一次全面检查，以确定母亲身体是否恢复正常，婴儿生长状况是否良好
46. 新生儿疾病筛查的注意事项错误的是
- A. 对 PKU、甲状腺功能低下需采血检测，应在出生后 36 小时进行
 - B. 采血部位在新生儿足跟
 - C. 听力筛查应在出生 72 小时后，通过耳声发射，自动听力脑干反应和声阻抗等电生理技术，在新生儿自然睡眠或安静状态下进行客观、快速和无创的检查
 - D. 对筛查阳性者应进行 1~2 次的复查以确诊
 - E. 患儿一旦被确诊即应开始治疗，并应长期随访
47. 妊娠期需合理使用药物，妊娠期的用药依据不正确的是
- A. 使用对代谢有清楚说明的药物
 - B. 药物实验证明对灵长类动物胚胎无影响的药物
 - C. 妊娠前 3 个月应尽量避免服用药物，以防止诱发畸形，若必须用药，应在医生的指导下，选用无致畸作用的药物
 - D. 在妊娠期中，可用可不用的药物尽量不用，暂时可停用的药物不能停止使用
 - E. 妊娠期用药时，要把握用药时间，尽可能选用对胎儿安全性大的药物
48. 以下药物可引起粪便变色的铁制剂是
- A. 水杨酸钠
 - B. 胶体果胶铋
 - C. 双香豆素
 - D. 山梨醇
 - E. 羟基保泰松
49. 下列不是必须在分娩开始前入院的产妇是
- A. 妊娠合并心脏病
 - B. 胎儿臀位
 - C. 重症妊娠高血压疾病



- D. 胎儿左枕前位
- E. 胎儿横位

50. 以下哪些不属于大环内酯类抗生素

- A. 林可霉素
- B. 克拉霉素
- C. 阿奇霉素
- D. 罗红霉素
- E. 螺旋霉素

51. 全科医学的学科特点是

- A. 是将各个学科知识和技术叠加或集合, 知识范围较广
- B. 服务范围宽泛, 满足所有患者的需求
- C. 定位于基层卫生保健领域
- D. 统一各地域的健康问题
- E. 统一各地域的服务需求

52. 全科医生应具备的能力是

- A. 能够掌握就诊患者 90% 以上的常见健康问题或疾病
- B. 提供以疾病为中心、针对健康促进和健康维护服务
- C. 在团队管理和卫生资源协调过程中, 具有良好的协调和沟通能力

二、A2 型题

答题说明: 以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

56. 家庭成员之间相互理解、表达和交流彼此的深层情绪与感受, 表现了家庭的

- A. 经济功能
- B. 社会化功能
- C. 赋予成员地位的功能
- D. 性和生殖需求功能
- E. 满足情感需要的功能

- D. 注重提供临床预防服务
- E. 满足患者各种要求

53. “以患者为中心”的诊疗模式原则不包括

- A. 建立以全科医生为核心的工作团队
- B. 发挥团队效应
- C. 重视疾病的同时, 更重视患者的患病感受和价值观
- D. 满足患者提出的各种要求
- E. 给予患者情感支持, 减少痛苦

54. “以患者为中心”的医学模式为基本点的描述是

- A. 帮助患者建立正确的健康信念模型
- B. 进入患者的世界
- C. 提高患者的遵医行为
- D. 以医生的眼光去看待疾病
- E. 提高患者的自我服务能力

55. 促使全科医学产生的背景不包括

- A. 人口的迅速增长与老龄化
- B. 人群疾病谱与死因谱的变化
- C. 医疗费用的高涨
- D. 健康观的变化
- E. 环境污染的加剧

57. 某农村妇女, 31 岁, 在城里打工, 因婚后 8 年不能生育就诊。患者婚前曾有 2 次人工流产, 婚后一直未孕。2 年前因不堪忍受家里及周围人的嘲讽进城打工, 每次回家都十分紧张、恐惧, 尤其是性生活时。此次就诊下列处理不恰当的是

- A. 给予心理上的支持和疏导



- B. 提供性生活知识
- C. 确诊何种原因导致不孕后再予处理
- D. 进行常规检查
- E. 提供不孕不育的相关知识

58. 患者男, 51 岁, 高血压病史 15 年, 2018 年 11 月因脑血管意外而致偏瘫, 已接受家庭病床服务。社区护士对该患者的家访属于

- A. 连续照顾性家访
- B. 评估性家访
- C. 治疗性家访
- D. 急诊性家访
- E. 护理随访

59. 居民赵某 2 天前因胃癌术后出院, 现申请接受家庭病床服务。全科医生对该患者的首次家访属于

- A. 治疗性家访
- B. 评估性家访
- C. 急诊性家访
- D. 连续照顾性家访
- E. 看望性家访

60. 晚期胃癌患者吴某在 1 个月前因医生估计其存活期在 3 个月内, 所以放弃住院治疗转回社区接受家庭护理。在此期间社区护士对该患者的家访属于

- A. 治疗性家访
- B. 评估性家访
- C. 急诊性家访
- D. 连续照顾性家访
- E. 看望性家访

61. 居民王某为儿子管教问题与先生意见不合, 甚至出现互不理睬现象。近日她又因

儿子成绩不合格留级而情绪激动致高血压病有所加重。从家庭治疗角度出发, 最重要的干预措施是

- A. 安慰患者
- B. 嘱患者认真遵医嘱服药, 控制血压
- C. 设法协助患者夫妇协调关系
- D. 研究改善患者儿子的学习态度与方法
- E. 为患者介绍家教老师

62. 陈老伯, 70 岁, 平素体健, 今晨出现腹泻 5~6 次, 大便稀薄, 些许黏液, 无发热、腹痛, 精神尚可。目前对陈老伯最重要的初步处理是

- A. 卧床休息
- B. 禁食
- C. 输液
- D. 立即送检大便标本
- E. 清洁肛门周围

63. 某城市为了提高市民的健康状况, 决定在今后五年内, 建一个大型的生态娱乐公园和两个现代化的体育馆。这些措施是社会预防中的

- A. 第一级预防措施
- B. 第二级预防措施
- C. 第三级预防措施
- D. 第一、二级预防措施
- E. 第二、三级预防措施

64. 实验流行病学研究是流行病学常用的一种研究方法, 现拟进行一项实验研究, 在饮水中加入氟, 以观察氟防龋的效果, 实验首先要确定样本量, 说法不正确的是

- A. 要以龋齿在一般人群中的发生率高低为依据
- B. 样本量大小与检验的显著性水平有关



- C. 单尾检验和双尾检验对样本量的大小要求无差别
D. 样本量过小, 检验效能偏低, 所得结论不可靠
E. 可以参照样本量计算公式进行计算

65. 某地区 2020 年平均人口为 20 万, 该地区 2019 年结核病患者为 1226 人, 其中治愈 134 例, 死亡 16 例。2020 年年底结核病患者为 1854 人, 则该地区 2020 年结核病发病率为

- A. 927/10 万
B. 389/10 万
C. 314/10 万
D. 613/10 万
E. 无法计算

66. 设某人群的身高 X 服从 $N(155.4, 5.32)$ 分布, 现从该总体中随机抽出一个 $n = 10$ 的样本, 得均值为 $\bar{X} = 158.36$, $S = 3.83$, 求得 μ 的 95% 置信区间为 $(155.62, 161.10)$, 发现该区间竟然没有包括真正的总体均数 155.4。若随机从该总体抽取含量 $n = 10$ 的样本 200 个, 每次都求 95% 置信区间, 那么类似上面的置信区间 (即不包括 155.4 在内) 大约有

- A. 5 个
B. 20 个
C. 10 个
D. 1 个
E. 190 个

67. 现随机抽取调查某市区某年男孩 200 人出生体重, 得均数为 3.29 (kg), 标准差为 0.438 (kg)。按 95% 可信度估计该市男孩出生体重均数所在范围, 宜用

- A. $\bar{X} \pm 1.96S$
B. $\bar{X} \pm 1.96S_x$
C. $\bar{X} \pm t_{(0.05, v)} S$
D. $\bar{X} \pm t_{(0.01, v)} S$
E. $\mu \pm 1.96\sigma_x$

68. 为了解某地区老年人的血脂相关指标, 评价老年人群胆固醇的变化, 需要进行

- A. 形成评价
B. 过程评价
C. 效应评价
D. 结局评价
E. 总结评价

69. 人的一生需经历多个阶段, 人生三阶段中, 人生保护阶段针对的是

- A. 婴幼儿时期和儿童时期
B. 青春期
C. 中年时期
D. 老年时期
E. 孕产期

70. 从健康传播效果的角度, 认同社区预防慢性非传染性疾病健康教育的健康信念的是

- A. 认为合理膳食有利于防病
B. 清楚肥胖对健康的危害
C. 经常参加有氧健身运动
D. 常吃新鲜蔬菜、水果
E. 愿意接受健康指导

71. 多数老年人认为合理膳食、适度运动很有必要, 但不知道如何合理膳食或运动没有场所, 则应重点考虑

- A. 倾向因素
B. 促成因素



- C. 强化因素
D. 加强因素
E. 其他因素
72. 为降低 5 岁以下儿童死亡率而进行的健康教育项目的一级目标人群是
- A. 婴幼儿母亲
B. 婴幼儿
C. 妇幼保健医护人员
D. 乡村医生
E. 儿科医生
73. 首届国际健康促进大会通过的《渥太华宣言》中，健康促进的 5 个主要活动领域不包括
- A. 制定促进健康的公共政策
B. 创造支持环境
C. 发展个人技能
D. 开展疾病控制
E. 加强社区行动
74. 李小姐，27 岁，近来自觉身体不适，遂至全科门诊就诊。李小姐去医院看病属于
- A. 预警行为
B. 求医行为
C. 遵医行为
D. 患者角色行为
E. 预防保护性行为
75. 某大学为控制学习吸烟开展了“校园禁烟日”活动，并规定所有在校教师不允许吸烟。这属于健康促进干预策略中的
- A. 政策倡导策略
B. 环境支持策略
C. 健康教育策略
D. 监测评价策略
E. 综合干预策略
76. 小郑，25 岁。怀孕后体重增长较快，孕妇整个妊娠期的体重增加平均为
- A. 6.5kg
B. 8.5kg
C. 10.5kg
D. 12.5kg
E. 14.5kg
77. 小任，28 岁。因妊娠期高血压发生子痫，使用硫酸镁解痉时，应停用药物的情况是
- A. 血压 130/90mmHg
B. 自觉症状减轻
C. 呼吸 18 次/min
D. 尿量 700ml/d
E. 膝反射消失
78. 陈女士早晨来社区卫生服务站诉说，起床后发现昨晚 12 时睡觉前，漏服短效避孕药，现又忘了补服时间。医生应告知其补服的时间为
- A. 10 小时内
B. 12 小时内
C. 16 小时内
D. 20 小时内
E. 24 小时内
79. 30 岁妇女，外阴部被踢伤半小时后，外阴部出现肿块，疼痛难忍，不敢行走。最可能发生的是
- A. 前庭大腺血肿
B. 阴蒂血肿
C. 阴阜血肿
D. 大阴唇血肿



E. 小阴唇血肿

80. 患者，29岁，已婚3年，长期服用避孕药避孕，现计划怀孕，建议孕前应停服避孕药

- A. 2个月
- B. 3个月
- C. 4个月
- D. 5个月
- E. 6个月

81. 《国家基本公共卫生服务规范——老年人健康管理规范》中服务内容要求每年需要查的辅助检查不包括

- A. 便常规
- B. 尿常规
- C. 血常规
- D. 空腹血糖
- E. 血脂

82. 为了对辖区内老年人施行健康管理，其中对身体健康的老年人的健康管理服务频次为

- A. 每年1次
- B. 每月1次
- C. 每季度1次
- D. 每半年1次
- E. 每月2次

83. 患者女，68岁，肥胖，血清甘油三酯、胆固醇长期升高，降脂药效果不明显，一

次在赶乘公共汽车时，突然感觉胸下部闷紧，窒息感，停步后2~3分钟后才缓解。此时应首先考虑

- A. 心绞痛
- B. 心肌梗死
- C. 脑供血不足
- D. 运动量太大之故
- E. 老年性痴呆

84. 患者男，65岁，体格检查时发现早期白内障，追问病史有皮肤经常发生化脓性毛囊炎，肢端刺麻，空腹血糖2次分别为7.9mmol/L，8.0mmol/L。该患者可诊断为

- A. 单纯白内障
- B. 皮肤不清洁
- C. 颈腰椎肥大
- D. 糖尿病
- E. 肢端肥大症

85. 患者男，65岁，胃溃疡病史20年，常于餐后出现中上腹疼痛，服氢氧化铝可缓解，近1年来疼痛不似从前有规律，且服氢氧化铝也难缓解，伴消瘦，来诊，查：大便隐血阳性。最可能的诊断是

- A. 胃溃疡伴溃疡出血
- B. 胃十二指肠溃疡出血
- C. 胃癌出血
- D. 慢性胃炎出血
- E. 食管出血

三、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

A. 红霉素

B. 头孢曲松钠



- C. 盐酸四环素
- D. 阿昔洛韦
- E. 青霉素
- 86. 妊娠合并早期梅毒治疗首选
- 87. 妊娠合并早期梅毒治疗对青霉素过敏患者选用
- 88. 妊娠合并生殖道生殖器疱疹治疗选用

- A. 为病人保守医密
- B. 有利、不伤害
- C. 权利、义务
- D. 按章办事
- E. 医乃仁术
- 89. 属于医学伦理学基本原则的是
- 90. 属于医学伦理学基本规范的是
- 91. 属于医学伦理学基本范畴的是

- A. 零级预防
- B. 一级预防
- C. 二级预防
- D. 三级预防
- E. 四级预防
- 92. 健康教育属于
- 93. 周期性健康检查属于
- 94. 健康促进属于
- 95. 社区筛检属于
- 96. 预防接种属于
- 97. 脑卒中患者的康复属于

- A. 人体生物学上异常
- B. 自我感觉不适
- C. 社会状态不适应
- D. 社会地位不承认
- E. 以上都不是
- 98. 全科医生的患者的范畴中，Disease 指
- 99. 全科医生的患者的范畴中，Sickness 是指
- 100. 全科医生的患者的范畴中，Illness 是指



2022 年全科主治医师《相关专业知识》模拟试卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 关于卵巢肿瘤，下述哪项是正确的
 - 实质性肿瘤多为恶性
 - 卵巢恶性肿瘤的分期在手术前确定
 - 伴有腹腔积液的卵巢肿瘤不适合手术
 - 无性细胞瘤多发生于更年期
 - 粘液性囊腺癌对放疗敏感性高
- 关于葡萄胎随访，下述哪项不需要
 - 定期做阴道细胞学涂片检查
 - 避孕措施不可采取上环
 - 相当时期内指导避孕
 - 定期作 hCG 定量检查
 - 必要时作胸部 X 线检查
- GTT 指的是下列哪种疾病
 - 妊娠滋养细胞疾病
 - 妊娠滋养细胞肿瘤
 - 胎盘部位滋养细胞肿瘤
 - 上皮样滋养细胞肿瘤
 - 葡萄胎
- 黄体功能不足的发病机制不包括
 - LH 不足
 - 卵巢功能衰退
 - 卵泡期 FSH 缺乏
 - 孕激素分泌减少
 - 卵泡期雌激素分泌减少
- 关于子宫内膜异位症的预防，哪项是禁忌的
 - 防止经血倒流
 - 月经期应避免不必要的盆腔检查
 - 避免手术操作时引起的内膜种植
 - 人工流产时，不要突然降低负压
 - 输卵管通液术，应在月经前期进行
- 典型急性肾炎临床表现不包括
 - 少尿
 - 血尿
 - 水肿
 - 高血压
 - 大量蛋白尿
- 迁延性腹泻病程是
 - 病程<1 周
 - 病程>1 个月
 - 病程<2 周
 - 病程>2 个月
 - 病程 2 周~2 个月
- 口腔健康教育的最终目的是
 - 建立口腔健康行为
 - 增长口腔保健知识
 - 定期口腔健康检查
 - 了解口腔保健措施



- E. 积极治疗口腔疾病
9. 斑秃脱发区的特点不包括
- A. 境界清楚
 - B. 进展期拉发试验多为阳性
 - C. 无鳞屑
 - D. 炎性红斑
 - E. 无瘢痕
10. 痤疮的最主要好发部位为
- A. 面部
 - B. 颈部
 - C. 胸部
 - D. 背部
 - E. 肩部
11. 藿香正气水的功能主治正确的是
- A. 解表通里，清热解毒
 - B. 补气健脾，调中止泻
 - C. 解表化湿，理气和中
 - D. 温中补虚，缓急止痛
 - E. 行气化湿，健脾和胃
12. 粪便中发现巨噬细胞有助于诊断
- A. 上消化道出血
 - B. 霍乱
 - C. 急性细菌性痢疾
 - D. 肠隐孢子原虫感染
 - E. 直肠癌
13. 以下哪项酶类不能反映肝细胞损伤
- A. α -淀粉酶
 - B. 转氨酶
 - C. 异柠檬酸脱氢酶
 - D. 鸟氨酸氨基甲酰酶
 - E. 谷氨酸脱氢酶
14. 肝炎病毒中为 DNA 病毒的是
- A. 甲肝病毒
 - B. 乙肝病毒
 - C. 丙肝病毒
 - D. 丁肝病毒
 - E. 戊肝病毒
15. 下列说法错误的是
- A. 生殖腺胚胎性肿瘤(如睾丸癌、畸胎瘤)，病毒性肝炎、肝硬化，AFP 也可升高
 - B. 结肠癌、直肠癌、乳腺癌，CEA 可升高
 - C. 类风湿因子对诊断类风湿关节炎有特异性
 - D. 前列腺癌时可见 PSA 水平明显升高
 - E. C 反应蛋白的含量变化对炎症、组织损伤、恶性肿瘤等疾病的诊断及疗效观察有重要意义
16. 肾小球可以滤过血浆是依靠
- A. 有效渗透压作用
 - B. 有效滤过压作用
 - C. 逆流倍增作用
 - D. 主动转运
 - E. 易化扩散
17. 导致嘌呤分解增加的疾病有
- A. 多发性骨髓瘤
 - B. 红细胞增多症
 - C. 白血病
 - D. 以上都是
 - E. 以上都不是
18. 中性粒细胞减少可见于
- A. 急性化脓性胆管炎
 - B. 伤寒
 - C. 心肌梗死



- D. 消化道大出血
E. 败血症
19. 当白细胞和血小板计数下降到什么程度时, 应考虑减少放射剂量
A. 白细胞小于 $6 \times 10^9/L$, 血小板小于 $100 \times 10^9/L$
B. 白细胞小于 $5 \times 10^9/L$, 血小板小于 $100 \times 10^9/L$
C. 白细胞小于 $4 \times 10^9/L$, 血小板小于 $100 \times 10^9/L$
D. 白细胞小于 $3 \times 10^9/L$, 血小板小于 $100 \times 10^9/L$
E. 白细胞小于 $2 \times 10^9/L$, 血小板小于 $100 \times 10^9/L$
20. 恶性肿瘤异型性主要表现在
A. 肿瘤细胞胞浆嗜碱性
B. 可见核分裂
C. 肿瘤细胞核的多形性
D. 肿瘤细胞分泌减少
E. 组织结构紊乱
21. 老年抑郁症与老年性痴呆的主要鉴别点是
A. 痴呆
B. 自杀倾向
C. 失眠
D. 躯体无名疼痛和不适
E. 口干、出汗等自主神经功能紊乱
22. 结核病最主要的传染源是
A. 浸润性肺结核患者
B. 原发性结核病患者
C. 结核性胸膜炎患者
D. 急性血型播散型肺结核患者
E. 慢性纤维空洞型肺结核患者
23. 确定胎儿安危最简便而较准确的方法是
A. 缩宫素激惹试验
B. 胎动计数
C. 尿雌三醇测定
D. 电子监护胎儿
E. 羊膜镜检查
24. 循证医学的证据中质量最高的是
A. 专家意见
B. 多个质量可靠的大样本随机对照试验所做的系统评价或 Meta 分析
C. 单个样本量足够的随机对照试验结果
D. 设有对照组但未用随机方法分组的研究
E. 无对照的系列病例观察
25. 下列疾病可引起先昏迷后发热的是
A. 败血症
B. 脑出血
C. 流行性出血热
D. 流行性乙型脑炎
E. 流行性脑脊髓膜炎
26. 青春期无排卵型功能失调性子宫出血的原因是
A. 缺乏孕激素
B. 缺乏雌激素
C. 凝血功能异常
D. 子宫内膜增生过度
E. 子宫内膜发育不良
27. 老年抑郁症是老年人常见的精神问题, 主要临床表现是
A. 感知觉减退
B. 情绪抑郁、思维障碍



- C. 痴呆
D. 认知能力减低、失活
E. 肢体活动不灵活
28. 下列哪一项属于卵巢良性肿瘤
A. 内胚窦瘤
B. 库肯勃瘤
C. 颗粒细胞瘤
D. 卵泡膜细胞瘤
E. 无性细胞瘤
29. 咽壁非感染性咽痛的病因不包括
A. 咽壁异物
B. 恶性肿瘤
C. 扁桃体炎
D. 茎突过长
E. 舌咽神经痛
30. “星烁征”也叫“灯塔征”，可见于
A. 耳硬化症
B. 慢性化脓性中耳炎
C. 大疱性鼓膜炎
D. 急性化脓性中耳炎
E. 以上均是
31. 对于卵巢子宫内膜异位囊肿，最佳的诊断和治疗方法是
A. 假绝经疗法
B. 腹腔镜
C. 假孕疗法
D. 囊肿穿刺
E. 开腹手术
32. 子宫内膜异位症最好的检查方法是
A. 诊刮
B. 血清 CA125 检查
C. β -hCG
D. 腹腔镜检查
E. 影像学检查
33. 子宫内膜异位症的典型症状是
A. 阴道不规则流血
B. 接触性出血
C. 阴道分泌物增多
D. 继发性痛经
E. 月经量增多
34. 盆腔炎药物治疗，病情改善后，也应巩固治疗
A. 1~3 天
B. 5~7 天
C. 10~14 天
D. 15~20 天
E. 一个月到两个月
35. 盆腔炎手术治疗的指征不包括
A. 体温不降
B. 脓肿破裂
C. 输卵管积脓
D. 包块减小
E. 症状加重
36. 盆腔炎性疾病诊断的最低标准是
A. 宫颈举痛
B. 阴道有脓性分泌物
C. 血沉加快
D. 口腔温度 $\geq 38.3^{\circ}\text{C}$
E. CRP 升高
37. 急性盆腔炎出现下列症状宜行手术治疗除了以下哪一项
A. 并发急性子宫肌炎



- B. 药物治疗 2~3 天无效, 患者中毒症状加重
C. 经药物治疗 2~3 天无效, 且原有肿块增大
D. 出现输卵管积脓或输卵管卵巢脓肿
E. 可疑脓肿破裂
38. 宫颈癌发病的主要原因是
A. 饮酒
B. 性生活紊乱
C. 过早性生活
D. 多产
E. 人乳头状瘤病毒感染
39. 宫颈癌的病因主要为
A. 早婚、早育、多产
B. 包皮垢的影响
C. 疱疹病毒 II 型及人类乳头瘤病毒感染
D. 慢性宫颈炎及宫颈裂伤
E. 以上多种因素的协同作用
40. 确诊宫颈癌的可靠方法是
A. 白带涂片检查
B. 宫颈活检
C. 宫颈刮片细胞学检查
D. 阴道镜检查
E. 宫颈锥形切除
41. 有关牙周脓肿的表现, 不正确的是
A. 牙龈局限性肿胀
B. 无牙髓活力

- C. 肿胀区疼痛
D. 牙石较多, 松动明显
E. 有深牙周袋
42. 不利于慢性龈缘炎防治的措施是
A. 洁治术
B. 餐后漱口
C. 经常用牙签剔牙
D. 定期口腔检查
E. 养成正确刷牙的好习惯
43. 小学生应重点预防龋坏的牙是
A. 乳切牙
B. 第一乳磨牙
C. 第一恒磨牙
D. 第二恒磨牙
E. 恒切牙
44. 采用窝沟封闭最适宜的年龄是
A. 牙刚萌出
B. 在萌出后 2 年内
C. 乳磨牙在 5~6 岁
D. 第一恒磨牙在 6~7 岁
E. 第二恒磨牙在 14~16 岁
45. 闭经是妇科疾病中常见的症状, 可分为
A. 生理性和病理性
B. 原发性和继发性
C. 子宫性
D. 卵巢性
E. 垂体性

二、A2 型题

答题说明: 以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

46. 女, 21 岁。由于和父母争吵, 继发性 | 闭经 8 个月。本例闭经的病变部位是



- A. 子宫
- B. 下丘脑
- C. 卵巢
- D. 腺垂体
- E. 肾上腺

47. 患儿，6个月。腹泻20余天，每日10余次稀水样便，体重5.3kg，精神萎靡，皮肤弹性极差，前囟及眼窝明显凹陷，四肢凉，血压偏低，口渴轻度，尿量极少，血钠125mmol/L。考虑诊断为

- A. 中度等渗脱水
- B. 重度等渗脱水
- C. 中度低渗脱水
- D. 重度低渗脱水
- E. 重度高渗脱水

48. 26岁初产妇，妊娠39周，规律宫缩8小时，血压110/70mmHg，骨盆正常，预测胎儿体重2700g，枕左前，胎心良。产妇疼痛难忍，可以用哪种药物镇痛

- A. 布洛芬
- B. 阿司匹林
- C. 对乙酰氨基酚
- D. 利多卡因
- E. 吗啡

49. 患儿，1岁。发热3天，流涕、咳嗽，咽部及眼结膜充血，在下眼睑边缘见Stimson线，口腔粘膜充血，既往未接种麻疹疫苗，该患儿诊断麻疹，属麻疹病程哪一期

- A. 潜伏期
- B. 前驱期
- C. 卡他期
- D. 出疹期

E. 恢复期

50. 女，34岁，近3个月来在不用场合频繁发作“心脏病”，表现胸口憋闷，呼吸困难，浑身冷汗，手足麻木，脑子里一片空白，并感觉自己快要死去，有时是感到不能自控地快要发疯。当时神志清楚。每次发作不超过半小时，因此多次送到急诊室时即已好转。各项身体检查均未发现异常。以下诊断中最应该考虑的是

- A. 恐怖症
- B. 抑郁症
- C. 焦虑症
- D. 躯体形式障碍
- E. 癔症转换症状

51. 女，24岁，半年来无原因认为同事指桑骂槐地议论她，街上行人的举动及电视内容都针对她。为之心情烦躁，不敢上班。该患者的精神症状最可能是

- A. 情感脆弱
- B. 被害妄想
- C. 影响妄想
- D. 关系妄想
- E. 焦虑

52. 患者女性，60岁，症见头晕，气短，畏风自汗，大便质烂，脱肛，可选用下列哪一种中成药治疗

- A. 四神丸
- B. 益母丸
- C. 人参归脾丸
- D. 天麻丸
- E. 补中益气汤

53. 男性，65岁，慢性咳嗽、咳痰13年，



气急2年，逐渐加重。胸部X线片显示肋间隙增宽，双肺透亮度增加，两下肺纹理紊乱。最可能的诊断是

- A. 慢性支气管炎
- B. 肺源性心脏病
- C. 支气管周围炎
- D. 支气管扩张
- E. 慢性支气管炎、肺气肿

54. 女性，27岁，月经频发，经血量正常，婚后3年未孕，前来就诊。查体：子宫正常大小，双附件无异常，基础体温呈双相型。最可能的诊断是

- A. 卵巢癌
- B. 子宫肌瘤
- C. 黄体功能不全
- D. 子宫内膜脱落不全
- E. 子宫内膜炎

55. 1岁小儿，发热、咳嗽、气促1周，近1天惊厥4次，意识不清。查体：嗜睡，双眼凝视，球结膜水肿，前凶隆起，根据病例诊断最大的可能是

- A. 肺炎合并轻度缺氧
- B. 肺炎合并结脑
- C. 肺炎合并化脑
- D. 肺炎合并心衰
- E. 肺炎合并脑水肿

56. 45岁，G₁P₁，月经过多继发贫血2年。妇科检查：宫颈轻度糜烂，子宫孕3个月大小，凹凸不平，双附件无异常。血红蛋白65g/L。患者最可能的诊断是

- A. 子宫内膜癌
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫肌瘤

- D. 子宫内膜息肉
- E. 功能失调性子宫出血

57. 38岁女性，月经紊乱1年余，25~35天一次，每次9天左右，量无明显增加，晨起触及下腹正中有一肿块而就诊，经检查发现盆腔肿物如孕3个月大小，质硬、活动，无压痛，形状不规则。最可能的诊断是

- A. 子宫肌瘤
- B. 妊娠子宫
- C. 卵巢肿瘤
- D. 巧克力囊肿
- E. 充盈膀胱

58. 患者，女，38岁。婚后5年未孕，痛经逐年加重3年。妇科检查：子宫后位，后壁可及多个触痛结节，右侧附件可扪及一6cm×5cm大小的包块，活动差，囊实性。该患者首选确诊的方法是

- A. 妇科B超检查
- B. 诊断性刮宫
- C. 腹腔镜取病理活检
- D. CA125检查
- E. 宫腔镜检查

59. 患者女，35岁，习惯性流产5次，每次自然流产均在孕5~6个月发生，最可能的原因是

- A. 黄体功能不全
- B. 胎儿染色体异常
- C. 宫颈内口机能不全
- D. 宫内病毒感染
- E. 妊娠合并子宫肌瘤

60. 患者女，32岁，孕8⁺周。下腹痛伴阴



道流血 10 天。为决定妊娠是否继续，首选的辅助诊断是

- A. 基础体温测定
- B. 超声检查
- C. 尿或血 β -HCG 测定
- D. 甲胎蛋白测定
- E. 血 PRL 测定

61. 患者女，29 岁，阴道不规则流血 3 个月，来院就诊。尿妊娠试验阳性，给予刮宫，但刮出物未见绒毛，病理检查显示为蜕膜组织。该患者最可能的诊断为

- A. 晚期妊娠反应
- B. 异位妊娠
- C. 功血
- D. 子宫内膜炎
- E. 葡萄胎

62. 患者女，24 岁，1 周前因停经 41 天，妊娠试验阳性，行吸宫流产术，今晨突然晕倒在地，体温 37.5°C ，血压 $75/52.5\text{mmHg}$ ，脉搏 $100\text{次}/\text{min}$ ，下腹压痛及反跳痛明显，外阴少量流血，宫颈举痛明显，宫口闭，子宫稍大，稍软，右侧似有一包块边缘不清，压痛。查 $\text{WBC } 10 \times 10^9/\text{L}$ ， $\text{N } 0.70$ 。最准确的诊断是

- A. 人工流产不全
- B. 宫颈粘连
- C. 急性阑尾炎
- D. 流产后右附件炎
- E. 右输卵管妊娠破裂

63. 患者女，35 岁，下腹部肿物 3 年，逐渐增大，自右下腹部开始如拳头大小，现已如妊娠足月大小，但仍能做轻微的家务劳动。最可能的肿瘤为

- A. 卵巢畸胎瘤
- B. 卵巢浆液性囊腺瘤
- C. 卵巢黏液性囊腺瘤
- D. 子宫内膜样肿瘤
- E. 卵泡膜细胞瘤

64. 患者女，27 岁，昨晚跳舞后突感右下腹痛剧烈，伴恶心，畏冷，无发热，月经正常。查体： $T 37.2^{\circ}\text{C}$ ，右下腹有压痛，子宫前位，正常大，右宫角处压痛明显，右附件区触及一个张力大的囊性肿物，约 $5\text{cm} \times 6\text{cm} \times 4\text{cm}$ 大小，轻压痛。其最可能的诊断是

- A. 阑尾周围脓肿
- B. 输卵管脓肿
- C. 输卵管妊娠
- D. 卵巢囊肿蒂扭转
- E. 卵巢囊肿感染

65. 患者女，56 岁，绝经 5 年，近 1 个月阴道不规则流血伴臭味。妇科检查：宫颈光滑，子宫如孕 40 天大，质软，有压痛，双附件无异常。分泌物血性有臭味。入院后首先应采取的措施是

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 检查血、尿常规
- C. 子宫切除术
- D. 抗炎同时分段诊刮病理检查
- E. 广谱抗生素消炎治疗

66. 患者，男，10 个月。阵发性哭闹 12 小时，呕吐 3 次，无腹泻，无发热。体检：精神萎靡，腹软略胀，哭闹使得触诊不满意，肠鸣音略亢进。腹部 B 超提示：右中腹部可见同心圆样结构。应诊断为

- A. 阑尾包块



- B. 急性出血性肠炎
- C. 肠套叠
- D. 肠梗阻
- E. 急性肠扭转

67. 患儿，男，9岁，眼睑水肿3天，伴茶色尿，血压16/12kPa，2周前有发热、咽痛。尿常规：蛋白(++)，红细胞：40~50/HP，白细胞8~10/HP。该患儿最可能的临床诊断是

- A. IgA肾病
- B. 狼疮性肾炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 肾炎性肾病
- E. 急性肾炎

68. 男孩，7岁，因尿少、水肿、肉眼血尿诊断为急性肾炎入院，入院当天出现头痛、呕吐，惊厥1次，嗜睡，眼眶周围见针刺状出血点，此时最可能的并发症是

- A. 心力衰竭
- B. 败血症
- C. 癫痫
- D. 高血压脑病
- E. 急性肾衰竭

69. 患儿男，10岁，少尿、水肿5天。病前2周有发热、咽痛史。尿蛋白(++)，红细胞15~20个/HP，血Cr 170 μ mol/L。肾活检最可能的改变是

- A. 膜增生性肾小球肾炎
- B. 毛细血管内增生性肾小球肾炎
- C. 微小病变肾病
- D. 局灶节段性肾小球硬化
- E. IgA肾病

70. 患者，女，7岁，曾发热伴咽痛，2周后眼睑浮肿，尿色如“茶”，近3天浮肿加重，尿量亦减少。诊断为急性肾炎。本病中哪种肾小球细胞增生最显著

- A. 肾小球囊壁层上皮细胞
- B. 肾小球囊球上皮细胞
- C. 肾小球毛细血管内皮细胞
- D. 肾小球血管间质细胞
- E. 肾小球足细胞

71. 8岁男孩，3周前曾患脓疱疮，现头晕、食欲减退，晨起有眼睑水肿，血压正常，怀疑急性肾炎。为明确诊断首先的检查是

- A. 尿培养
- B. 肾活检
- C. 肾功能
- D. 肾脏B超
- E. 尿常规

72. 7个月男孩，确诊川崎病后，经治疗症状缓解出院，2个月后又无明显诱因猝死家中，其死因最可能是

- A. 冠状动脉瘤破裂
- B. 心包炎
- C. 脑栓塞
- D. 心肌炎
- E. 颅内出血

73. 患者男，20岁。上前牙咀嚼时出现不适感1个月余。曾有外伤史。半年前牙体变色。口腔检查：左右上1牙体变色，无明显龋损及其他牙体硬组织病变。牙髓活力测试无反应。叩诊(+)。X线片示：根尖部有圆形的透射影像，边界清晰，直径<0.5cm。可能的诊断是

- A. 根尖周囊肿



B. 根尖周肉芽肿

C. 慢性根尖周脓肿

D. 根尖周致密性骨炎

E. 牙髓坏死

74. 婴儿男，出生5天，啼哭拒食，口腔黏膜出现微凸的软白小点，擦去后可露出血面，拟诊

A. 早萌乳牙

B. 白斑

C. 婴儿雪口

D. 角化上皮珠

E. 以上都不是

75. 患者女，37岁。诉牙齿自发性剧痛3天。有放射痛、夜间痛。口腔检查：患牙无明显龋损及其他牙体硬组织疾病，牙周袋深达根尖，温度刺激有激发痛，松动Ⅱ°。叩诊(+)。可能的诊断是

A. 急性牙周炎

B. 急性牙龈炎

C. 逆行性牙髓炎

D. 急性根尖周炎

E. 残髓炎

76. 女，6岁。8月中旬以“发热、腹泻3天，抽搐、意识不清4小时”为主诉入院。查体：BP 90/60mmHg，P 90次/分，T 39.5℃，意识不清，呼之不应，双侧瞳孔不等大，颈强，心肺未见异常。化验末梢血WBC $20 \times 10^9/L$ ，N 85%，L 15%。该患儿应立即给予下列哪种药物治疗

A. 甘露醇

B. 多巴胺

C. 头孢菌素

D. 糖皮质激素

E. 哥拉灌肠

77. 患儿女，4岁，来自农村。7月份因发热、头痛4天，伴呕吐、抽搐住院。体检：神志欠清，压眶有反应，双侧瞳孔4mm，对光反射存在，颈有阻力，心、肺无异常，腹软，腹壁反射未引出，四肢肌张力较高，克氏征、布氏征、巴氏征均阳性。最可能的诊断是

A. 中毒性菌痢

B. 病毒性脑炎

C. 结核性脑膜炎

D. 流行性乙型脑炎

E. 化脓性脑膜炎

78. 13个月患儿，发热3天后右下肢活动障碍，当地农村有类似病史，该患儿生后未接种疫苗，体检：体温38.5℃，神志清，心肺正常，右下肢肌力Ⅰ级，膝反射未引出，病理反射阴性，最大可能为

A. 格林-巴利综合征

B. 化脓性脑膜炎

C. 流行性乙型脑炎

D. 脊髓灰质炎

E. 坐骨神经炎

79. 某乡镇医院连续发现10例患儿有高热、嗜睡、头痛、呕吐抽搐，当地确诊为流行性乙型脑炎，下列哪种是其主要传染源

A. 马

B. 鼠

C. 人

D. 牛

E. 猪

80. 患者女性，13岁，因发热伴剧烈头痛、



频繁呕吐、抽搐 2 天，于 8 月 15 日来诊。家中住平房，蚊子多，周围有类似患者。查体：T 39.8℃，P 120 次/分，BP 150/90mmHg，意识不清，皮肤无皮疹，瞳孔等大等圆，对光反射存在，颈无抵抗，Kernig 征及 Babinski 征 (+)。实验室检查：血 WBC $15 \times 10^9/L$ ，N 0.75，CSF 检查：压力 230mmH₂O，外观清亮，有核细胞数 $200 \times 10^6/L$ ，单核 0.9，蛋白轻度升高，糖、氯化物正常。首先考虑的诊断是

- A. 钩端螺旋体病
- B. 肾综合征出血热
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 结核性脑膜炎

81. 男孩，10 岁，郊县人，因发热 5 天，头痛，喷射性呕吐 3 次，神萎，嗜睡，夏季就诊。体检：体温 39.8℃，神志清，神萎，入睡状，咽充血，颈有抵抗，心肺无异常。腹软，提睾反射未引出，膝反射亢进，克氏征、布氏征均阳性。该病儿询问病史的要点是

- A. 当地有无洪水、居住环境及周围有无鼠类
- B. 居住环境有无蚊虫及乙型脑炎疫苗接种史
- C. 有无皮肤感染，如疖、脓疱疮等
- D. 有无不洁饮食史或腹泻病人接触史
- E. 当地有无疟疾流行

82. 男孩，10 岁。因癫痫发作入院，经检查确诊为小儿良性癫痫伴中央颞区棘波。描述不正确的

- A. 常有家族性癫痫病史，且系常染色体显性遗传
- B. 抗癫痫药物需终身治疗

C. 常在睡眠中发生部分性发作或全身性大发作

D. 脑电图在中央区颞中部有棘波或棘-慢波灶

E. 智力发育正常，神经系统无异常发现

83. 女性，30 岁，诊断为左侧前庭大腺囊肿，直径 4cm。首选的治疗方法是

- A. 抗生素治疗
- B. 随访观察
- C. 前庭大腺囊肿剥除术
- D. 前庭大腺囊肿造口术
- E. 前庭大腺囊肿抽液术

84. 患者，女，42 岁。发现外阴包块 2 个月，坠胀 3 天。检查：左侧外阴后下方有直径约 3cm 的皮下囊肿，活动、无压痛，向大阴唇内侧突起。阴道及子宫未见异常。血常规检查：白细胞 $4.3 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.69。恰当的处理是

- A. 静滴氧氟沙星和甲硝唑
- B. 20% 碘伏坐浴
- C. 外用抗生素软膏
- D. 手术切除外阴包块
- E. 外阴包块开窗引流

85. 女性，25 岁，26 周妊娠，白带增多臭味 2 天，查体：阴道分泌物稀薄均质，白带常规线索细胞阳性。诊断为妊娠合并细菌性阴道病，关于细菌性阴道病的叙述错误的是下列哪项

- A. 该病为混合菌感染，以厌氧菌为主
- B. 厌氧菌繁殖产生胺类物质，使分泌物增多并有臭味
- C. 10%~40% 的患者无临床症状
- D. 妊娠期患此病可能导致绒毛膜羊膜炎、



胎膜早破、早产等

E. 清水外洗即可，不必药物治疗

三、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

A. 脓性白带

B. 稀薄脓性、黄绿色、泡沫状

C. 血性白带

D. 稀薄、均匀、白色分泌物

E. 白色豆渣样白带

86. 滴虫性阴道炎分泌物为

87. 老年性阴道炎分泌物为

88. 婴幼儿阴道炎分泌物为

A. 急性盆腔炎

B. 慢性盆腔炎

C. 生殖器结核

D. 输卵管卵巢囊肿

E. 子宫内膜异位症

89. 患者女性，34岁，月经后4天突发高热，右下腹痛。妇检：子宫后倾、触痛，双侧附件增厚，压痛。应考虑的诊断是

90. 患者女性，29岁，结婚4年不孕，经量多，经期长，痛经明显加重，妇检：子宫后倾，固定，双侧附件增厚，宫骶韧带处扪及多个触痛性结节。应考虑的诊断是

A. 0.025%地塞米松

B. 0.1%无环鸟苷

C. 10%磺胺醋酰钠

D. 1%毛果云香碱

E. 1%阿托品

91. 急性单纯性疱疹性角膜炎溃疡期应严禁

92. 急性闭角型青光眼应严禁使用

A. 雌激素

B. 口服甲硝唑

C. 克霉唑栓外用

D. 广谱抗生素静滴

E. 2%醋酸冲洗阴道

93. 念珠菌性阴道炎治疗可選用

94. 老年性阴道炎治疗可選用

95. 滴虫性阴道炎治疗可選用

A. 观察

B. 感染治疗

C. 化学药物治疗

D. 输卵管保守性手术

E. 一侧输卵管切除

96. 患者女性，26岁，G₁P₀，陈旧性宫外孕，包块直径小于3cm。临床处理为

97. 患者女性，40岁，G₁P₁，输卵管妊娠破裂，失血性休克。临床处理为

98. 患者女性，25岁，G₁P₀，输卵管壶腹妊娠不全流产，血压正常。临床处理为

A. 腹腔镜

B. 剖腹探查

C. 中药

D. 刮宫

E. 催产素静滴

99. 急性异位妊娠休克患者，最适宜使用的诊治方法为

100. 早期壶腹部妊娠，最适宜使用的诊治方法为



2022 年全科主治医师《专业知识》模拟试卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 引起器质性便秘的疾病有
 - 结肠冗长
 - 肠易激综合征
 - 先天性巨结肠症
 - 滥用泻药造成对泻药的依赖
 - 进食量少或食物缺乏纤维素
- 下列哪种疾病呈黏液脓性鲜血便同时伴里急后重肛门重坠感
 - 白血病
 - 肠结核
 - 直肠息肉
 - 消化性溃疡
 - 急性细菌性痢疾
- 引起黏液脓血便的结肠疾病是
 - 肠伤寒
 - Crohn 病
 - 肠结核病
 - 急性细菌性痢疾
 - 急性出血性坏死性肠炎
- 下面关于抽搐说法错误的是
 - 抽搐是指骨骼肌的强直性、持续性的收缩或间歇性的收缩
 - 阿-斯综合征会引起抽搐
 - 停药综合征不包括抽搐的表现
 - 缺氧可引起抽搐的发生
 - 大脑神经元异常放电可引起抽搐
- 下面说法正确的是
 - 病程长于 6 个月的是慢性抽动
 - 无意识障碍的抽搐见于癫痫
 - 有意识障碍的抽搐见于破伤风
 - 抽搐包括功能性和器质性的抽搐
 - 癔症性抽搐为器质性抽搐
- 体温常在 39℃ 以上，波动幅度大，24 小时内波动范围超过 2℃，但都在正常水平以上的是
 - 弛张热
 - 间歇热
 - 波状热
 - 稽留热
 - 不规则热
- 下列哪项不是感染性发热
 - 急性肾盂肾炎
 - 急性菌痢
 - 多发性肌炎
 - 流行性出血热
 - 乙脑
- 导致肥胖的主要原因有哪些



- A. 精神因素
 - B. 高胰岛素血症
 - C. 遗传因素
 - D. 代谢因素
 - E. 以上都是
9. 下列关于肥胖的说法错误的是
- A. 轻度肥胖一般没有自觉症状
 - B. 肥胖的诊断标准是根据所测指标与疾病危险的相关程度和其在一定人群中的分布状况而制定的
 - C. 单纯性肥胖是以药物治疗为主
 - D. 肥胖者对感染的抵抗力降低, 易发生感染
 - E. 肥胖者应激反应差, 耐受手术及麻醉能力低, 术后恢复慢
10. 下列关于腹水的性质说法错误的是
- A. 漏出液外观不定
 - B. 渗出液为炎症、肿瘤、化学或物理性刺激所致
 - C. 漏出液的比重低于 1.018
 - D. 漏出液 LDH 小于 200U
 - E. 渗出液多混浊
11. 脑出血最常见的病因为蛛网膜下腔出血的治疗哪一项不正确
- A. 绝对卧床
 - B. 止痛镇静
 - C. 早期应用血管扩张剂
 - D. 降颅压
 - E. 止血治疗
12. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是
- A. 脑外伤
 - B. 出血性疾病
 - C. 抗凝治疗
 - D. 脑血管畸形
 - E. 腰椎穿刺损伤
13. 下列哪项不符合痫性发作
- A. 痫性发作分部分性发作和全面性发作两个主要类型
 - B. 单纯部分性发作起始于脑局部, 不伴意识障碍
 - C. 全面性发作起始于脑局部, 伴意识障碍
 - D. 痫性发作起始的异常放电源于一侧脑部的, 为局灶性发作
 - E. 痫性发作起始的异常放电源为两侧脑部的, 为全面性发作
14. 下列关于癫痫的说法哪项不符合
- A. 按照病因可分特发性癫痫和症状性癫痫
 - B. 遗传因素和环境因素均可影响痫性发作
 - C. 每一位癫痫患者只有一种发作类型
 - D. 女性患者通常在月经期和排卵期发作频繁
 - E. 癫痫的临床表现可分痫性发作和癫痫症两方面
15. 目前最常应用于评定痴呆发生的量表是
- A. SCL-90 量表
 - B. MMSE 量表
 - C. HAMA 量表
 - D. HAMD 量表
 - E. 都不是
16. 震颤麻痹的病人哪类药物禁止使用
- A. 金刚烷胺
 - B. 抗胆碱能药物
 - C. 单胺氧化酶抑制剂
 - D. 多巴胺受体激动剂



- E. 吩噻嗪类药物
17. 有关感染性心内膜炎描述错误的是
- A. 感染性心内膜炎为心脏内膜表面的微生物感染，伴赘生物形成
- B. 赘生物大小不一、形状不一的血小板和纤维素团块
- C. 瓣膜为最常累及的部位
- D. 感染不发生在瓣膜以外别的部位
- E. 根据病程分为急性和亚急性
18. 我国高血压最常见的并发症是
- A. 冠心病、心肌梗死
- B. 肾衰竭
- C. 糖尿病
- D. 眼底出血
- E. 脑血管意外
19. 提示继发性高血压可能的线索血压大于
- A. 160/110mmHg
- B. 180/100mmHg
- C. 170/110mmHg
- D. 180/110mmHg
- E. 200/110mmHg
20. 血清 TC 正常范围为
- A. 200mg/dl 以下
- B. 250mg/dl 以下
- C. 300mg/dl 以下
- D. 350mg/dl 以下
- E. 400mg/dl 以下
21. 疑诊 PTE 时应进行的检查，除了
- A. X 线胸片
- B. 心电图
- C. 肺活检
- D. 血浆 D-二聚体
- E. 下肢深静脉超声
22. 以下哪项对 PTE 发病过程和预后没有重要影响
- A. 栓子大小和数量
- B. 是否同时存在其他心肺疾病
- C. 个体反应的差异
- D. 血栓溶解的快慢
- E. 患者肺活量
23. PTE 溶栓治疗的禁忌证不包括
- A. 活动性内出血
- B. 肘窝静脉穿刺
- C. 预产期 3 天内
- D. 1 周内大手术
- E. 近期自发性颅内出血
24. 肺部革兰阴性菌感染的共同点是
- A. 肺实变组织坏死后易形成多发性脓肿
- B. 呼吸道症状逐渐加重
- C. 呼吸道症状较轻
- D. 并发胸腔积液
- E. 很少发生肺脓肿
25. 下列哪一项不符合 HAP 发生的地点
- A. 护理院
- B. 老人院
- C. 康复院
- D. 医院内
- E. 社区
26. 诊断慢性支气管炎的主要依据
- A. 病史和症状
- B. 阳性体征
- C. 胸部 X 线检查



- D. 心电图改变
E. 肺功能检查
27. 阻塞性肺气肿最早出现的变化是
A. 动脉血 CO₂分压升高
B. 最大通气量降低
C. 胸部 X 线显示肺动脉段略突出
D. 心电图显示电轴右偏
E. 心界缩小
28. 急性上呼吸道感染分为五型，其中不是这五型之一的是
A. 普通感冒
B. 咽结膜热
C. 急性咽喉炎
D. 细菌性咽-扁桃体炎
E. 食管炎
29. 引起上呼吸道感染最常见的病原是
A. 病毒
B. 细菌
C. 支原体
D. 衣原体
E. 真菌
30. 急性上呼吸道感染直接蔓延不引起哪种疾病
A. 风湿热
B. 中耳炎
C. 支气管炎
D. 肺炎
E. 咽后壁脓肿
31. 无尿路刺激征的尿路感染
A. 急性肾盂肾炎
B. 急性膀胱炎
C. 无症状细菌尿
D. 尿道综合征
E. 慢性肾盂肾炎急性发作
32. 防止肾病综合征并发感染，正确的是
A. 必须预防应用抗生素预防感染
B. 应选用广谱抗生素
C. 尽快去除明确感染灶
D. 免疫增强剂可预防感染
E. 因治疗原发病不可停用激素
33. 微小病变型肾病综合征最主要的治疗是
A. 正常量优质蛋白低盐饮食
B. 卧床休息
C. 糖皮质激素
D. 利尿剂
E. 非激素类免疫抑制剂
34. 肾病综合征最常见的并发症为
A. 低钠、低钾、低钙血症
B. 呼吸道感染
C. 高凝状态及血栓形成
D. 低血容量性休克
E. 急性肾功能不全
35. 急性肾炎 2 周，血压 160/100mmHg，尿红细胞散在满视野。首先选用
A. 降压对症治疗
B. 抗炎治疗应用抗菌药物
C. 应用止血药物治疗
D. 强的松
E. 中药治疗
36. 急性肾小球肾炎最主要的治疗措施是
A. 激素及免疫抑制剂
B. 利尿剂消除水肿



- C. 休息与控制病灶感染
- D. 血肌酐、尿素氮升高是予以透析
- E. 不需要治疗，因为大部分可治愈

37. 凝血酶原时间(PT)正常见于

- A. 维生素 K 缺乏
- B. 慢性肝病肝功能失代偿
- C. 血友病
- D. 口服双香豆素
- E. 先天性 V 因子缺乏

38. 下列不是贫血患者临床症状重的原因的是

- A. 贫血较重
- B. 贫血发生较快
- C. 患者年龄较大
- D. 患者伴有心血管疾病
- E. 红细胞内的 2, 3-DPG 增高

39. 关于溶血性贫血的定义，哪一项是正确的

- A. 红细胞寿命缩短
- B. 红细胞破坏增加
- C. 骨髓造血功能亢进
- D. 红细胞破坏增加，骨髓能代偿
- E. 红细胞破坏增加，超过骨髓代偿能力

40. 原位溶血时红细胞破坏的部位最主要是在

- A. 肝脏
- B. 脾脏
- C. 血
- D. 骨髓
- E. 以上都不是

41. 感染过程的五种表现在不同传染病中各

有侧重，一般最常见的是

- A. 病原体被清除
- B. 隐性感染
- C. 显性感染
- D. 潜伏性感染
- E. 病原携带状态

42. 传染性非典型性肺炎的病原体为

- A. 轮状病毒
- B. 新型冠状病毒
- C. 衣原体
- D. 支原体
- E. EB 病毒

43. 肺结核引起的干湿啰音多见于

- A. 左肺下部
- B. 右肺下部
- C. 上肺局部
- D. 右肺中叶区
- E. 舌叶区

44. 关于耐多药肺结核的治疗错误的是

- A. 至少已对异烟肼和利福平产生耐药的结核病
- B. 药物选择最好根据药敏试验
- C. 治疗药物方案不宜超过 4 种药物
- D. 用药应个体化
- E. 采用多药联合最强方案在住院条件下直接观察治疗至痰菌阴性后 2 个月

45. 肺结核临床表现错误的是

- A. 咳嗽、咳痰可伴胸痛、咯血、气短等症状
- B. 发热，午后明显，可伴盗汗、乏力
- C. 结核菌素皮肤试验：当阳性时表现处于超敏感状态，发病几率高
- D. 可伴食欲缺乏、体重减轻、月经失调



E. 体征常不明显

46. 霍乱与其他细菌引起的腹泻，最主要的鉴别点

- A. 流行病学史
- B. 有无腹痛及里急后重
- C. 有无“米泔水”样粪便
- D. 有无严重的脱水表现
- E. 细菌学检查结果

47. 在预防麻疹的被动免疫中，下列哪项正确

- A. 在接触麻疹后 10 天内立即给予免疫血清球蛋白 0.25ml/kg 可预防发病
- B. 在接触麻疹后 5 天内立即给予免疫血清球蛋白 0.25ml/kg 可预防发病
- C. 在接触麻疹后 5 天内立即给予免疫血清球蛋白 0.05ml/kg 可预防发病
- D. 在接触麻疹后 10 天内立即给予免疫血清球蛋白 0.05ml/kg 可预防发病
- E. 以上都不是

48. 麻疹易感者密切接触麻疹后，立即采取

哪项措施可阻止发病

- A. 口服板蓝根
- B. 注射抗生素
- C. 注射干扰素
- D. 注射丙种球蛋白
- E. 注射利巴韦林

49. 关于麻疹流行病学下述错误的是

- A. 麻疹患者是唯一传染源
- B. 出疹前 5 天至出疹后 5 天均有传染性
- C. 病毒存在于眼结膜、鼻、口咽和气管等分泌物中
- D. 通过喷嚏、咳嗽等由飞沫传播
- E. 也可通过粪便传播

50. 肾综合征出血热少尿期治疗原则哪一项是错的

- A. 稳定内环境
- B. 高蛋白饮食
- C. 促进利尿
- D. 导泻和放血
- E. 透析

二、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

51. 男性，56 岁，患右侧腹股沟疝斜疝病史 3 年。今晨便后疝突出，不能回纳，局部疼痛，伴恶心，无呕吐 6 小时就诊。此时首要的处理是

- A. 还纳内容物
- B. 判断有无肠梗阻症状
- C. 判断是否有绞窄疝
- D. 应用止痛药，解除痉挛
- E. 以上都不是

52. 男性，33 岁，既往健康，有烟酒嗜好。1 年前发现左上肢“红线”，伴肿硬，压痛。5 个月前感觉右下肢凉、怕冷，麻木，行走 200m 出现小腿疼痛。近 1 个月症状加重，出现夜间疼痛。查体：右下肢发绀，皮温凉，右股动脉弹性好。足背胫后动脉搏动未触及。考虑诊断为

- A. 右下肢血栓性浅静脉炎
- B. 下肢静脉曲张



- C. 动脉硬化闭塞症
- D. 血栓闭塞性脉管炎
- E. 下肢深静脉血栓

53. 男性, 34岁, 心悸、气短1年。双下肢水肿3个月余。查体: BP 90/60mmHg, 颈静脉怒张, 心界向两侧扩大, 第一心音减弱, 心尖可闻及Ⅱ级收缩期风吹样杂音, 双肺底可闻及湿啰音, 肝大, 双下肢水肿。心电图示左束支传导阻滞。患者最可能的诊断是

- A. 扩张型心肌病
- B. 二尖瓣脱垂
- C. 心包积液
- D. 急性左心衰竭
- E. 冠心病

54. 女性, 22岁, 无明确诱因出现新鲜血便。查体: 皮肤与黏膜可见成簇细小的呈鲜红色的毛细血管扩张, 肝脾未触及。最可能的诊断是

- A. 过敏性紫癜
- B. 白血病
- C. 流行性出血热
- D. 血小板减少性紫癜
- E. 遗传性毛细血管扩张症

55. 男性, 11岁, 食用新鲜蚕豆后出现黄疸及排酱油色尿, 下列最有诊断意义的检查是

- A. 酸溶血试验阳性
- B. 尿含铁血黄素试验阳性
- C. 红细胞脆性试验
- D. 高铁血红蛋白还原试验
- E. 抗人球蛋白试验

56. 男性, 57岁, 反酸、上腹痛10年, 每次持续1个月左右, 未系统治疗。近半年, 持续腹痛不能缓解, 无反酸, 伴头晕, 乏力, 消瘦, 低热。查体: 贫血貌, 剑突下压痛(+), 未触及异常包块, 肠鸣音正常。最可能的诊断是

- A. 胃癌
- B. 十二指肠溃疡
- C. 胃溃疡
- D. 萎缩性胃炎
- E. 胆汁反流性胃炎

57. 女性, 55岁, 上腹轻压痛。胃镜见胃粘膜充血、水肿, 充血区和水肿区可交叉存在, 形成红白相间, 并以充血的红色为主, 有小出血点及糜烂面。该患者诊断首先考虑为

- A. 早期胃癌
- B. 慢性浅表性胃炎
- C. 急性胃黏膜病变
- D. 慢性肥厚性胃炎
- E. 慢性萎缩性胃炎

58. 女性, 65岁, 慢性支气管炎和肺气肿10年。1天前于剧咳后突感右侧胸痛, 呼吸困难加重最可能的诊断是

- A. 气胸
- B. 心肌梗死
- C. 胸腔积液
- D. 急性左心衰竭
- E. 肺梗死

59. 女性, 69岁, 慢性咳嗽、伴喘45年, 平素生活规律, 注意耐寒锻炼, 晨起坚持散步。2天前因着凉后咳嗽、白痰、流涕, 伴咽疼, 4小时前突然左胸疼, 伴进行性气



短加重。最佳处理原则

- A. 抗生素静脉点滴
- B. 强烈镇咳、止痛剂
- C. 氨茶碱静脉点滴
- D. 强心、利尿、扩冠剂
- E. 吸氧、对症治疗，进一步检查

60. 患者，男性，55岁。黑便6月，乏力，消瘦。查体：贫血貌，右下腹可触及一3cm×5cm×4cm的包块，质硬，表面凹凸不平，边缘不规整，有压痛。该患者高度怀疑

- A. 慢性阑尾炎
- B. 肠结核
- C. 回盲部肿瘤
- D. 克罗恩病
- E. 卵巢囊肿

61. 患者，女性，28岁。尿频、尿急、尿痛、小腹痛伴终末血尿2天。尿常规示镜下有许多RBC、WBC。下列诊断哪项是正确的

- A. 泌尿系结石
- B. 泌尿系结核
- C. 膀胱肿瘤
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 急性膀胱炎

62. 男性，62岁，急性重症胰腺炎患者，于保守治疗中，尿量逐渐减少，无尿2日，出现气促、全身水肿，血压180/92mmHg，心率120次/分，听诊闻及两下肺布满细湿啰音，查血钾6.9mmol/L，BUN 25.2mmol/L，肌酐577μmol/L，目前应采取的最有效治疗手段是

- A. 袢利尿剂静脉注射

- B. 静滴甘露醇利尿
- C. 口服甘露醇或硫酸镁导泻
- D. 控制入液量，停止补钾
- E. 及时紧急透析

63. 男性，50岁，诊断肾病综合征，目前高度水肿，尿量400~500ml/d，持续2周，尿蛋白(++++)，血液清蛋白20g/L，肌酐清除率为100ml/min，本患者的治疗主要是

- A. 肾上腺皮质激素
- B. 消炎药
- C. 输血浆或清蛋白
- D. 呋塞米
- E. 血浆透析

64. 男，36岁。水肿、少尿1个月，鼻出血3天，查体贫血貌，BP 160/90mmHg，Hb 80g/L，尿蛋白(++)，尿隐血(++)，尿RBC 6~8/HP，血肌酐846μmol/L，B超左肾9.1cm×4.1cm×4.2cm，右肾8.6cm×4.3cm×4.1cm，最可能的诊断是

- A. 急进性肾炎
- B. 慢性肾炎急性发作
- C. 急性肾功能衰竭
- D. 慢性肾功能衰竭
- E. 高血压肾动脉硬化

65. 18岁男孩，溺水后昏迷，关于淹溺的叙述下列哪项不正确

- A. 湿性淹溺约占淹溺者的90%
- B. 淹溺患者的肾脏呈急性肾小管坏死性病变
- C. 可出现高钾血症
- D. 可出现高钠血症
- E. 常出现致命性电解质紊乱



66. 患者女, 20 岁, 因与家人争吵, 口服一瓶安眠药后出现嗜睡入院。患者呈嗜睡状态, 呼吸浅慢, 有低血压, 肌张力下降。以下治疗措施错误的是

- A. 维持患者重要器官功能
- B. 可以给予葡萄糖、维生素 B₁ 和纳洛酮促进意识恢复
- C. 应用洗胃、活性炭、碱化尿液与利尿等措施清除毒物
- D. 氟马西尼是特效解毒剂, 可以应用
- E. 无特效解毒药物

67. 女性, 26 岁。Crohn 病史 4 年。近日突然出现剧烈腹痛, 伴恶心、呕吐胃内容物, 3 天未排大便。其原因可能是

- A. Crohn 病复发
- B. 并发肠梗阻
- C. 并发癌变
- D. 瘻管形成
- E. 发生急性阑尾炎

68. 女, 36 岁, 反复腹泻 2 年, 有脓血便, 粪培养阴性, 多种抗生素治疗无效, 为明确诊断, 首选的检查是

- A. X 线胃肠钡餐检查

- B. 钡剂灌肠造影
- C. 腹部 CT
- D. 腹部平片
- E. 结肠镜检查

69. 男, 35 岁。间断腹泻、脓血便 4 年, 再发 1 个月, 口服抗生素无缓解。结肠镜检查示: 直肠和乙状结肠弥漫充血水肿、黏膜粗颗粒样改变, 质地脆, 易出血。其黏膜活检可能的病理发现是

- A. 非干酪样肉芽肿
- B. 可见阿米巴滋养体
- C. 抗酸染色阳性
- D. 隐窝脓肿
- E. 干酪样肉芽肿

70. 男性, 54 岁, 间断上腹不适疼痛 4 年, 餐后加重, 暖气。胃液分析 BAO 为 0, MAO 为 5mmol/h, 胃 pH 4.5, 最大可能是

- A. 慢性浅表性胃窦炎
- B. 慢性萎缩性胃窦炎
- C. 慢性肥厚性胃炎
- D. 十二指肠溃疡
- E. 十二指肠球后溃疡

三、A3/A4 型题

答题说明: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息, 在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

男性, 60 岁, 突发胸骨后压榨性疼痛 2 小时, 并向左肩放射, 伴多汗、恶心、气短。

71. 首先应做下列哪项检查对确立初步诊断最重要

- A. 胸部 X 线
- B. 胸部 CT
- C. 心电图

- D. 超声心动图
- E. 运动负荷试验

72. 假定上述患者在社区医院就诊, 诊断为急性心肌梗死, 除下列哪项处理外均为正确措施

- A. 立即吸氧



- B. 立即应用吗啡镇痛
- C. 立即口服阿司匹林
- D. 立即含服硝酸甘油
- E. 不必上述处理, 争取第一时间转送上级医院

男, 51岁, 胸骨后剧烈疼痛4小时, 伴大汗淋漓, 血压 10.7/8.0kPa (80/60mmHg), 心率 134次/分。面色苍白, 四肢冰冷。心电图示急性广泛前壁心肌梗死。

73. 该患者血压低的原因是
- A. 血容量不足
 - B. 合并右室梗死
 - C. 舒张期充盈不足
 - D. 心源性休克
 - E. 感染性休克
74. 对指导治疗最有帮助的辅助检查是
- A. 心电图和血压监测
 - B. 心肌酶谱监测
 - C. 漂浮导管血流动力学监测
 - D. 超声心动图
 - E. 胸部 X 线片
75. 对该患者最理想有效的治疗措施是
- A. 毛花苷丙强心
 - B. 多巴胺升压
 - C. 尿激酶溶栓
 - D. 主动脉内球囊反搏泵
 - E. 直接 PTCA 术

患者, 男性, 60岁。慢性肺心病患者, 近10余天来受凉后出现病情加重, 神志欠清, 发绀、躁动、痰不易咳出。双肺呼吸音低, 可闻及干湿性啰音。白细胞计数及分类增高。

76. 为提供有效治疗, 首要检查手段是下列哪个

- A. 痰培养+药敏
- B. 胸片
- C. 动脉血气分析
- D. 电解质测定
- E. 二氧化碳结合力测定

77. 若血气分析结果为 PCO_2 70mmHg, PO_2 55mmHg, PH 7.56, BE +23mmol/L, HCO_3^- 48mmol/L, 则应考虑为

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 呼吸性酸中毒+代谢性酸中毒
- C. 呼吸性酸中毒+代谢性碱中毒
- D. 代谢性碱中毒
- E. 呼吸性碱中毒+代谢性酸中毒

78. 根据上述血气分析结果, 治疗应首选

- A. 综合治疗+加强镇咳祛痰
- B. 综合治疗+精氨酸静脉滴注
- C. 提高吸氧浓度
- D. 加用地西洋镇静
- E. 地塞米松静脉滴注

一青年女性, 因心悸、气短、咯血2小时来诊。查体: 双肺布满湿啰音和哮鸣音, 心尖部闻及舒张期杂音, 肺动脉瓣区第二心音亢进。

79. 最可能的诊断是

- A. 肺感染
- B. 风湿性心脏病心衰
- C. 支气管扩张
- D. 肺结核
- E. 肺癌

80. 首先选择的治疗是



- A. 毛花苷丙缓慢静注和呋塞米静注
- B. 止血芳酸静滴
- C. 血管加压素静注
- D. 气管切开
- E. 立即转送上级医院

女性，38岁，反复上腹痛伴反酸10多年，近来疼痛加剧，服抗酸药等不能缓解。近1周来上腹痛伴呕吐，呕吐量有时较大，呕吐物带有发酵味，查体：上腹部压痛，有振水音。

81. 以下哪项治疗是错误的

- A. 奥美拉唑
- B. 甲氧米胍
- C. 硫糖铝
- D. 胶态次枸橼酸铋
- E. 山莨菪碱

82. 为明确诊断，上述病例需采取的措施是

- A. 腹部B超
- B. 上消化道气钡双重造影
- C. 直接内腹腔镜检查
- D. 胃肠减压后内镜检查
- E. 腹部CT

83. 上述病例最可能的诊断是

- A. 复合性溃疡
- B. 胃窦癌伴幽门梗阻
- C. 神经性呕吐
- D. 胆汁反流性胃炎
- E. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻

50岁，女性患者，因右上肢抽搐和昏迷而急诊，陪人诉近半月来患者反复畏寒、发热、恶心欲呕、精神不振，4小时前开始神志不清，既往史不详，有糖尿病家族史。

体检：肥胖体型，双瞳直径3mm，尿糖(+++)，尿酮(+)，二氧化碳结合力19mmol/L，血钠155mmol/L，血糖35mmol/L。

84. 此病人最可能的诊断是

- A. 脑血栓形成
- B. 糖尿病酮症酸中毒
- C. 脑出血
- D. 非酮症高渗性糖尿病昏迷
- E. 低血糖

85. 为确诊，首选下列哪项检查能最快得到结果

- A. 测血 K^+ 、 Na^+
- B. 测血糖、 Na^+ 及BUN浓度
- C. 测血渗透压(用渗透压计)
- D. 测尿渗透压(用渗透压计)
- E. 测阴离子间隙

86. 此病人的治疗，下列哪一项不需要

- A. 补碱
- B. 静脉滴注普通胰岛素
- C. 补钾
- D. 大量补液
- E. 对症处理

男性，38岁，发热38~39.5°C，疲倦、盗汗伴咳嗽、少量痰半个月。既往体健。肺部体检：右上实变体征伴两下肺散在湿性啰音。

87. 最合适的首选检查是

- A. 血常规
- B. 胸部CT
- C. 血培养
- D. 胸部X线摄片
- E. 痰涂片革兰染色



88. 最有助于诊断的检查是
- A. 痰培养
 - B. 结核菌素试验
 - C. 痰找抗酸杆菌
 - D. 痰找癌细胞
 - E. 血酶联免疫吸附试验(ELISA)

89. 初步诊断为
- A. 大叶性肺炎
 - B. 肺脓肿
 - C. 肺不张伴感染
 - D. 肺癌
 - E. 干酪性肺炎

90. (假设信息)若痰检抗酸杆菌阴性, 尽管症状、体征明显, 下列除哪项疾病外都应该怀疑

- A. 干酪性肺炎
- B. 肺炎球菌性肺炎
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 金黄色葡萄球菌肺炎
- E. 肺脓肿

女, 25岁, 产后3周, 左乳房肿胀, 伴发热。查左乳房内上象限压痛, 有波动感。

91. 确诊应先做
- A. B超
 - B. CT检查
 - C. 乳腺穿刺
 - D. 细胞学检查
 - E. 以上都不是

92. 乳腺脓肿确诊后, 最重要的治疗是

- A. 全身应用抗生素
- B. 局部温热敷
- C. 沿乳管做放射状切开引流

- D. 吸进乳汁, 停止哺乳
- E. 局部应用抗生素

患者, 女, 45岁, 诊断为特发性血小板减少性紫癜, 正规泼尼松治疗1年后, 血小板 $20 \times 10^9/L$, 但仍在维持服用泼尼松 30mg/d 治疗。

93. 应进一步选择的治疗方法是

- A. 泼尼松加量
- B. 脾切除
- C. 服用叶酸
- D. 预防性输血小板
- E. 骨髓移植

94. 关于该患者的下列叙述正确的是

- A. Ham 试验阳性
- B. 血块收缩正常
- C. 骨髓巨核细胞减少
- D. 血小板生存时间明显缩短
- E. 骨髓增生低下

95. 该疾病发病最可能的重要原因是

- A. 凝血功能异常
- B. 血小板功能异常
- C. 免疫因素导致自身抗体产生
- D. 脾脏增大致血小板破坏增加
- E. 骨髓造血功能低下

女性, 68岁, 慢性支气管炎20年, 咳喘、呼吸困难1周。查体: 神志淡漠, 嗜睡, 球结膜水肿, 呼吸30次/分, 血压100/60mmHg, 双肺呼吸音低, 可闻及干鸣及哮鸣音。血气分析: 氧分压(PaO_2): 50mmHg, 二氧化碳分压($PaCO_2$): 90mmHg。X线检查: 肺动脉高压双肺纹理增多。



96. 考虑诊断为

- A. 慢性支气管炎
- B. 呼吸衰竭合并肺性脑病
- C. 肺气肿
- D. 大叶性肺炎
- E. 呼吸衰竭

97. 治疗应选择

- A. 解痉，平喘，高流量吸氧，抗感染
- B. 单纯抗感染治疗
- C. 强心，利尿、抗感染
- D. 解痉，平喘，抗感染，低流量持续吸氧
- E. 镇静，改善脑供血，抗感染

患者，男性，72岁，反复咳嗽、咳痰30年，伴劳力性呼吸困难3年，近3天来咳喘加重，伴双下肢水肿，嗜睡。既往糖尿病史5年、脑血栓病史2年。查体：端坐位，口唇略发绀，双球结膜充血、水肿。双肺呼吸音减低，呼气相延长。HR 118次/分，心脏未闻及杂音。肝肋下2cm可触及肿大，双下肢轻度凹陷性水肿。

98. 最有助于诊断的检查是

- A. 超声心电图
- B. 血气分析
- C. 胸部CT
- D. 冠状动脉造影
- E. 肝肾功能及电解质检测

99. 患者出现意识障碍可能是由于

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 碱中毒
- C. 肺性脑病
- D. 脑卒中
- E. 低血糖昏迷

100. 患者在治疗过程中，呼吸困难突然加重。查体：口唇发绀较前明显，左肺叩浊音，呼吸音明显减弱，最可能出现的情况是

- A. 肺部感染加重
- B. 真菌感染
- C. 左侧胸腔积液
- D. ARDS
- E. 急性左心衰竭



2022 年全科主治医师《专业实践能力》模拟试卷

一、案例分析题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设有3~12个问题。每个问题的备选答案至少6个，最多12个，正确答案及错误答案的个数不定(≥1)。请从备选项中选出正确答案。答案可能包括正确选项、关键选项、无关选项和错误选项，考生每选对1个正确选项给1个得分点，选错1个扣1个得分点，选对1个关键选项给2个得分点，选无关选项不得分也不扣分，直扣至本问题得分为0(即无得负分的情况)。

患者男性，53岁，高血压病7年。3小时前突然出现持续胸痛来诊，心电图：典型广泛前壁急性心肌梗死表现， $V_1 \sim V_6$ ST段抬高与T波融合， $V_1 \sim V_3$ 出现病理性Q波。查体：心音低钝，血压160/75mmHg。

1. 首先考虑诊断为

- A. 急性心包炎
- B. 急性肺栓塞
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性心力衰竭
- E. 急性呼吸衰竭
- F. 急性心肌炎

2. 下列检查中哪些有助于患者的诊断

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 肾功能
- D. 心肌酶谱
- E. 血沉
- F. 心电向量图
- G. 心电图动态观察

3. 下列措施不合适的有

- A. 吸氧

B. 心电监测

C. CCB 降压

D. 他汀口服

E. 阿司匹林口服

F. 氯吡格雷口服

G. 利多卡因静滴预防心律失常发生

H. 急诊冠脉介入治疗

4. 该患者可能出现下列哪些并发症

- A. 心包炎
- B. 感染性心内膜炎
- C. 室间隔穿孔
- D. 乳头肌功能不全
- E. 心室游离壁破裂
- F. 胸膜炎
- G. 乳头肌断裂

5. 若患者出现频发室性期前收缩，下列哪些措施适当且有效

- A. 胺碘酮
- B. 阿托品
- C. 美托洛尔
- D. 补充血容量
- E. 纠正低钾状态



- F. 提高心室率
 G. 尽快改善心肌缺血
 H. 静脉应用利尿剂
6. 下列哪些药物对患者的预后改善有益
- A. 胺碘酮
 B. 美托洛尔
 C. 氨茶碱
 D. 雷米普利
 E. 呋塞米
 F. 辛伐他汀
 G. 地高辛
 H. 阿司匹林

女性，31岁，G₁P₁，因“继发不孕2年”就诊，患者12岁月经初潮，周期28天，否认性传播疾病史，查体：子宫大小形态正常，宫骶韧带触痛结节。基础体温双相型，HSG示输卵管走行、弥散可，宫腔正常，男方34岁，精液分析正常。

7. 该例不孕最可能的原因是
- A. 子宫腺肌病
 B. 子宫内膜异位症
 C. 原因不明性不孕
 D. 多囊卵巢综合征
 E. 高雄激素血症
 F. 全身性疾病
8. 确诊最好的检查方法是
- A. 超声检查
 B. 基础内分泌检查
 C. 男方内分泌检查
 D. 宫腔镜检查
 E. 腹腔镜检查
 F. 男方超声检查
 G. CA125

- H. CEA
 I. AFP
9. 该例患者以下哪项检查可能有异常
- A. FSH
 B. LH
 C. E2
 D. PRL
 E. T0
 F. LH/FSH
 G. CA125
 H. CEA
 I. AFP

10. 该例还可能有以下哪些表现不包括
- A. 痛经
 B. 性交痛
 C. 大便疼痛
 D. 子宫后位、固定
 E. 卵巢囊肿
 F. 肥胖

11. 该例不孕的机制可能是
- A. 子宫、输卵管、卵巢粘连，影响卵子的排出、捡拾以及精子和受精卵的：运行而导致不孕
 B. 黄体功能不全
 C. 卵泡黄素化未破裂综合征
 D. 宫颈黏液性状改变
 E. 细胞或体液免疫功能异常
 F. 卵巢功能下降
 G. 高雄激素血症

12. 以下哪些药物治疗该病有效
- A. 抗生素
 B. 二甲双胍



- C. 孕三烯酮
- D. 达那唑
- E. 戈舍瑞林
- F. 去氧孕烯炔雌醇
- G. 米非司酮
- H. 雌激素
- I. 人工周期

13. 有关该例不孕的治疗, 哪些正确

- A. 腹腔镜检查+治疗有效
- B. 术后尽快妊娠
- C. 病灶未切净, 术后可辅助药物治疗后再妊娠
- D. 术后应避孕半年, 促进刀口愈合
- E. 术后 2 年未孕, 应积极采用辅助生育技术
- F. 术后采用辅助生育技术不能提高妊娠率
- G. 可采用促排卵、AIH 或 IVF-ET
- H. 该例应行 ICSI
- I. 腹腔镜手术治疗意义不大

男性, 38 岁, 1 小时前突然感觉双颞侧剧烈头痛, 面色苍白, 急送入院。途中曾呕吐胃内容物一次, 神志不清、遗尿、全身抽搐约 2 分钟, 入院后约 10 分钟苏醒, 醒后诉头痛及颈痛。既往体健。

14. 该患者可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 脑肿瘤出血
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 脑蛛网膜下腔出血
- E. 脑脓肿
- F. 脑栓塞
- G. 急性化脓性脑膜炎

15. 查体痛苦面容, 神志清楚, 对答切题,

对脑神经检查未见异常, 四肢肌力与肌张力均正常, 深浅感觉正常, 颈强直, 双侧 Kernig's 征(+). 为明确诊断, 应尽快作哪项检查

- A. X 线胸片
- B. 头颅 CT
- C. 心电图
- D. 头颅 MRI 和 MRA
- E. 血常规
- F. 血气分析

16. 头颅 CT 提示为脑蛛网膜下腔大量出血, 还需要进行哪些检查

- A. 脑部 DSA
- B. 出凝血功能
- C. 脑电图
- D. 血常规
- E. X 线胸片
- F. 头颅 MRI
- G. 心电图

17. 脑蛛网膜下腔出血最常见的病因是

- A. 肿瘤
- B. 结缔组织病
- C. 脑血管炎
- D. 脑血管畸形
- E. 血液病
- F. 颅内动脉瘤

患者男, 77 岁。因“反复双下肢凹陷性水肿 20 余年, 发作性呼吸困难、心悸 7 年, 加重伴胸痛 5 天”入院。偶有咳嗽、咳痰, 无吸烟病史, 无高血压病史。查体: T 36.2℃, P 110 次/分, R 22 次/分, BP 135/70mmHg, 口唇发绀, 双肺呼吸音对称, 右下肺闻及湿啰音, 颈静脉充盈, 剑



突下心尖搏动明显，P2亢进，三尖瓣区闻及收缩期杂音与舒张期奔马律，双下肢凹陷性水肿，右下肢为甚。

18. 该患者诊断考虑

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 慢性肺源性心脏病
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管扩张症
- E. 肺栓塞
- F. 气胸

19. 血气分析提示 pH 7.43, PO₂ 46mmHg, PCO₂ 50mmHg, AB 24mol/L。血常规: WBC 2.97×10⁹/L, RBC 4.53×10¹²/L, HGB 150g/L, PLT 178 × 10⁹/L。D-二聚体: 800μg/L。胸片: 肺动脉段突出, 心胸比: 0.6, 双下肺密度增高。右肋膈角模糊。心电图: 窦性心动过速, 肺性 P 波, 右室高电压, V₁~V₅ ST 段压低 0.05~0.1mV。为进一步明确诊断, 需进行的检查

- A. 冠状动脉造影
- B. 支气管激发试验
- C. 胸部 CT 增强
- D. 外周深静脉 B 超
- E. 超声心动图
- F. 核素肺通气/灌注扫描

20. 溶栓治疗的绝对禁忌证

- A. 2 周以内的大手术
- B. 2 个月内缺血性脑卒中
- C. 活动性出血
- D. 近期自发性颅内出血
- E. 10 天内的胃肠道出血
- F. 15 天内的严重创伤

患儿, 男性, 4 岁。因咳嗽、喘息 2 天, 加

重半天就诊。查体: 体温正常, 呼气性呼吸困难, 口唇微绀, 两肺广泛哮鸣音, 心率 160 次/分。既往有喘息发作史 5 次, 有过敏史, 患儿母亲有哮喘病。

21. 应立即采取哪项措施

- A. 吸氧
- B. 多种抗生素联合抗感染
- C. 血气分析
- D. 血电解质检查
- E. 长效 β₂受体激动剂雾化吸入
- F. 吸痰

22. 患儿血电解质正常, 血气分析示轻度低氧血症, 经上述处理后喘息好转, 但在治疗中患儿突然再次出现呼吸困难, 诊断考虑

- A. 气胸
- B. 纵隔气肿
- C. 脓胸
- D. 肺不张
- E. 肺大疱
- F. 肺气肿

23. 若急诊胸部 X 线片提示左侧气胸, 应立即采取哪些措施

- A. 气管插管, 人工机械通气
- B. 胸腔穿刺排气
- C. β₂受体激动剂雾化吸入
- D. 加强抗感染
- E. 闭式引流
- F. 吸痰

患儿, 女, 5 岁, 因“发热、咳嗽、流涕 3 天, 喉鸣 6 小时”入院。查体: T 39℃, 吸气性喘鸣及三凹征, 咽充血, 双肺呼吸音稍粗, 心率 110 次/分, 偶有期前收缩。



24. 为明确诊断, 应首先检查的项目包括

- A. 心电图
- B. 心脏彩超
- C. 血常规
- D. 血细菌培养
- E. 胸部 X 线平片

25. 目前考虑的可能诊断有(提示: 胸片示未见异常。心电图窦性心律不齐, 偶有室性期前收缩, T 波, ST-T 无改变。血常规: HB 120g/L, WBC $17 \times 10^9/L$, N 0.78, L 0.2。)

- A. 上呼吸道感染
- B. 心肌炎
- C. 急性感染性喉炎
- D. 喘息性支气管炎
- E. 支气管哮喘并感染
- F. 支气管肺炎

26. 入院后患儿吸气性喉鸣及呼吸困难进一步加重, 此时应采取的措施包括

- A. 肌内注射异丙嗪
- B. 耳鼻喉科会诊做喉镜检查
- C. 雾化 β_2 受体激动剂
- D. 静脉滴入青霉素
- E. 雾化吸入布地奈德
- F. 耳鼻喉科会诊行气管切开
- G. 静脉滴注果糖二磷酸钠

患者女性, 48 岁, 已婚, 近三天来恶心、呕吐、发热、肌肉疼痛, 阴道无流血、无瘙痒, 近期有不洁性生活史。查体: T 39.6°C , BP 60/40mmHg; HR 110 次/分, 谵妄, 昏睡; 皮肤广泛日晒斑样疹, 腹部轻度按压痛。妇科检查: 脓性阴道分泌物, 宫颈壁光滑, 无充血, 宫体轻度压痛, 右

附件区可触及直径约 7cm 囊性包块, 压痛明显。既往患急性化脓性阑尾炎行阑尾切除术, 患有青光眼。

27. 为明确诊断, 应进行下列哪些辅助检查

- A. 血常规
- B. 血培养
- C. 血 β -hCG 测定
- D. CA125
- E. 衣原体检查及淋球菌检查
- F. 妇科 B 超检查
- G. 上消化道钡餐
- H. 子宫输卵管碘油造影
- I. 子宫内膜活检+诊刮
- J. 肝肾功能, 凝血功能
- K. 宫颈活检

28. B 超提示盆腔少量积液, 右附件区囊性包块, $7.2\text{cm} \times 3.9\text{cm}$, 内回声不均匀。Hct 48%, Hb 142g/L, WBC $16 \times 10^9/L$, 血培养报告检出金黄色葡萄球菌(MRSA), 衣原体抗体阳性, 淋球菌培养阴性。Cr $197\mu\text{mol/L}$, 肝功能、凝血均正常。初步诊断为

- A. 急性盆腔炎
- B. 慢性盆腔炎
- C. 异位妊娠
- D. 肾功能不全
- E. 感染性休克
- F. 失血性休克
- G. 右卵巢良性肿瘤
- H. DIC
- I. 卵巢癌

29. 根据初步诊断, 下一步的治疗措施有

- A. 补充血容量
- B. 输血



- C. 纠正休克，控制感染
 - D. 监测尿量及生命体征
 - E. 首选口服抗生素及中药
 - F. 如血压继续下降，可用多巴胺
 - G. 物理降温
 - H. 行子宫+双附件切除术
 - I. 青霉素过敏可用万古霉素及阿奇霉素
 - J. 应用阿托品
 - K. 外用糖皮质激素治疗皮疹
30. 经积极对症治疗，患者生命体征趋于平稳2天，目前高热未退，食欲差，出汗多，盆腔包块未缩小，位于子宫右上方，下一步治疗措施包括
- A. 地塞米松入壶
 - B. 继续补充血容量
 - C. 静滴抗生素
 - D. 后穹隆穿刺抽液
 - E. 腹腔镜检查术
 - F. 尝试抗结核治疗
 - G. 口服中药(可试)
 - H. 剖腹探查术
31. 剖腹探查发现右侧卵巢输卵管脓肿，粘连情况严重，子宫直肠凹封闭，分离粘连时，从间隙中流出乳白色脓液。应该选择的术式是
- A. 右附件切除+盆腔粘连松解+盆腔引流+活检病理
 - B. 右输卵管卵巢脓肿剥离术+右输卵管造口术
 - C. 脓肿切开+盆腔引流+活检病理
 - D. 盆腔粘连松解+盆腔引流+活检病理
 - E. 活检病理+腹腔冲洗后关腹
 - F. 右附件切除+盆腔引流+活检病理

- G. 子宫双附件切除
- H. 脓肿切开+盆腔粘连松解+盆腔引流+活检病理
- I. 脓肿切开+子宫次全切+活检病理

患儿，男，5岁。咳嗽伴发热3天，胸痛、烦躁1天。查体：体温39.5~40℃，呼吸急促，40~50次/分，呼气呻吟，鼻翼扇动，面色潮红。胸部叩诊浊音，语颤增强，听诊有管状呼吸音及干啰音。血常规检查：白细胞计数 $16 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.85。

32. 根据描述采用治疗错误的是
- A. 吸氧
 - B. 保持呼吸道通畅
 - C. 合理应用抗生素
 - D. 应用抗病毒药物
 - E. 加强对症、支持治疗
 - F. 休息
33. 根据描述最可能的诊断是
- A. 支气管哮喘
 - B. 毛细支气管炎
 - C. 细菌性肺炎
 - D. 支原体肺炎
 - E. 衣原体肺炎
 - F. 肺结核
34. 为明确诊断应首先选择的检查方法是
- A. 胸部X线及血培养
 - B. 胸部X线及气道分泌物培养
 - C. 肺功能检查及气道分泌物培养
 - D. CT扫描及肺功能检查
 - E. 血培养及气道分泌物培养
 - F. 肺功能及超声心动图



2022 年全科主治医师《基础知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1.【正确答案】 E

【答案解析】 ABCD 四项均为患者管理的基本内容。

2.【正确答案】 A

【答案解析】 全科医生又称家庭医生，是全科医疗服务的提供者。在英联邦国家如英国、澳大利亚等国家，多数称为全科医生。而美国、加拿大等国家，则称为家庭医生。

3.【正确答案】 B

【答案解析】 全科医学建立于 20 世纪 60 年代末，同内科、外科和妇产科等学科一样，是临床医学的二级学科。

4.【正确答案】 C

【答案解析】 以健康为中心是全科医学的特征之一，而不是以疾病为中心。

5.【正确答案】 C

【答案解析】 决定医疗效果的因素很多，但最重要的是医患关系，全科医疗的医患模式为共同参与型。

6.【正确答案】 A

【答案解析】 核心家庭是指由已婚夫妇和未婚子女或收养子女两代组成的家庭。核心家庭已成为我国主要的家庭类型。核心家

庭的特点是人数少、结构简单，家庭内只有一个权力和活动中心，家庭成员间容易沟通、相处。

7.【正确答案】 C

【答案解析】 现代社会推崇的家庭权力结构类型是分享权威型。

8.【正确答案】 A

【答案解析】 “人人享有卫生保健”战略目标是在 1977 年 5 月提出的。

9.【正确答案】 D

【答案解析】 我国基本卫生保健以适宜技术和基本药物为手段。

10.【正确答案】 A

【答案解析】 所有疾病并不是都能治愈的。

11.【正确答案】 C

【答案解析】 概率是描述事件发生可能性大小的一个量度，一般用 P 表示。概率的取值范围在 0~1，习惯上把概率 $P \leq 0.05$ 的事件称为小概率事件。

12.【正确答案】 B

【答案解析】 正态分布有以下特征：正态曲线在横轴上方，均数处最高；以均数为中心，左右对称；正态分布有两个参数，即均



数和标准差，均数为其位置参数，标准差为其变异度参数；正态分布曲线下面积有一定分布规律。所以选项中 B 不正确。

13.【正确答案】 C

【答案解析】中位数是指将一组观察值从小到大排序后居于中间位置的那个数值。是用来描述集中趋势的指标。中位数不仅可用于任何分布的定量资料，还可用于开口资料(即无确切最大值或无确切最小值的资料)的集中趋势的描述。四分位数间距是指上、下四分位数的间距，即第 75 百分位数与第 25 百分位数的间距。四分位数间距越大，数据分布的离散程度越大。是用来描述离散程度的指标。

14.【正确答案】 A

【答案解析】五因素传播模式的正确表述是传者—信息—传播途径—受者—效果。

15.【正确答案】 B

【答案解析】健康教育的目的是帮助个体和群体改变不健康行为和建立健康行为，因此，重视行为的改变。

16.【正确答案】 E

【答案解析】健康教育从计划设计到实施、评价是一个完整的工作过程。然而行为的改变是长期的、复杂的过程，要改变行为还必须增进有利于健康的相关因素，例如政策的支持、环境的支持、自我帮助的技能等。

17.【正确答案】 E

【答案解析】开展学校健康教育与健康促进具有如下特征：①最佳目标人群：儿童青

少年由于身心发育的特点，模仿性强，生理可塑性大，容易形成动力定型(习惯的形成)，一旦形成和巩固良好习惯将受益终生。②最理想的教育场所：学校有完整、系统的教育体系，健康教育的课程和活动均可纳入整合其中，与德智体美教育相互渗透甚至融合。③最具社会效益的资源：儿童青少年与家庭和社会有着天然和广泛的联系，将学校、家庭与社会联系起来。

18.【正确答案】 B

【答案解析】行为目标是健康教育计划实施后，计划干预对象特定行为变化的指标。

19.【正确答案】 D

【答案解析】实施健康教育计划的质量控制主要包括对工作进程、活动的内容与开展状况，对目标人群“知-信-行”及有关危险因素、经费的开支等进行监测控制。五个选项中只有社区特定的人群健康是正确的。

20.【正确答案】 A

【答案解析】心理健康的标准有多个方面，但一般不包括身体健康。

21.【正确答案】 D

【答案解析】每日多次按需哺乳可使催乳素在血中维持较高的浓度，并能保证婴儿有较强的吸吮力，吸吮对乳头的刺激可反射性的促进泌乳，乳汁的排空使腺泡的压力降低，也可进一步促进乳汁合成，故保持一定次数的有力吸吮是促进乳汁分泌的重要因素。

22.【正确答案】 A

【答案解析】正常足月儿生后半小时左右即



可抱至母亲处给予吸吮，鼓励母亲按需哺乳。

23.【正确答案】 A

【答案解析】 足月儿：指胎龄 ≥ 37 周至 < 42 周(259~293天)的新生儿。

24.【正确答案】 E

【答案解析】 出生后血液循环途径和动力学发生改变。足月新生儿心率波动较大，约为90~160次/分，早产儿平均为120~140次/分；足月儿血压平均为9.3/6.7kPa，早产儿较低。E错误。

25.【正确答案】 E

【答案解析】 妇女保健专业就是要对妇女一生性器官及性功能进行保健，并对其常见疾病进行防治，其中是以预防为主及群防群治。

26.【正确答案】 E

【答案解析】 婚前医学检查的主要疾病包括：

1. 严重遗传性疾病 指遗传因素先天形成，患者全部或部分丧失自主生活能力，后代再发风险高，医学上认为不宜生育的遗传性疾病。
2. 指定传染病 指《中华人民共和国传染病防治法》中规定的艾滋病、淋病、梅毒、麻风病及医学上认为影响结婚和生育的其他传染病。
3. 有关精神病 指精神分裂症、躁狂抑郁型精神病及其他重型精神病。
4. 影响婚育的其他疾病 如严重的心、肝、肾、肺疾病，生殖系统发育障碍或畸形等。

27.【正确答案】 C

【答案解析】 速效避孕药又称探亲避孕药，是我国根据两地分居夫妇的需要研制的一类口服避孕药，大多为单方孕激素制剂。

作用机制如下：

- (1) 干扰子宫内膜组织的发育和分泌，不利于受精卵着床；
- (2) 改变宫颈黏液的理化性质，使宫颈黏液少而黏稠，阻止精子穿透；
- (3) 在月经周期前半期服药，可抑制卵巢排卵；
- (4) 影响受精卵在输卵管内的运行。

题干问最主要机制，应该选C。

28.【正确答案】 C

【答案解析】 类早孕反应是由于避孕药中的雌激素刺激胃黏膜所致。口服短效避孕药后，有些人经血量减少，这是服药后的正常反应。有的人经血量明显减少，有的甚至出现连续停经两个月，白带增多多由长效口服避孕药引起。因此类药雌激素含量高，过多的雌激素影响宫颈内膜分泌细胞，使其分泌旺盛而引起白带增多。体重增加：可能是雌激素引起水钠潴留，孕激素影响合成代谢(孕激素增高会促进蛋白质同化作用)。

29.【正确答案】 B

【答案解析】 女性青春期最早出现的体征是乳房发育。

30.【正确答案】 D

【答案解析】 孕中期胎儿发育加快，其保健重点是加强营养指导。A为孕早期保健重点，B、C、E是孕晚期保健重点，故选D。孕中期胎位尚可自己变动，故非保健重点。



31.【正确答案】 E

【答案解析】 医疗保密主要包括两种，一是为病人保密，即医生无权泄露由于执行医疗任务而获知的有关患者的疾病、隐私及家庭生活的情况。二是对病人保密，医生不应该告诉患者有关的危重疾病的病情。前一种情况是为尊重病人的人格，后一种情况是为了加强疗效、提高病人康复的信心而采取的一种保护性的医疗措施。

32.【正确答案】 E

【答案解析】 现代生物-心理-社会医学模式对医师的职业道德提出了更高的要求。医务人员要把健康和疾病放在一个更为广阔背景下考察，医务人员不仅要关心病人的躯体、个人，更要关心心理、家庭和社会等人文因素。

33.【正确答案】 C

【答案解析】 动机是指医务人员在职业活动前的主观愿望和支配一系列行为的动因。效果是指医务人员的职业行为所产生的实际结果。在评价医务人员的职业行为时，既要看其行为的动机，也要看其行为的效果，在行为的过程中把动机与效果统一起来考察。只有这样，才能对医务人员的职业行为作出全面的公正的评价。

34.【正确答案】 C

【答案解析】 记忆性知识点，医学道德评价的方式有社会舆论、传统习俗和内心信念。

35.【正确答案】 E

【答案解析】 常用的疾病统计指标有发病率、患病率、罹患率、病死率，不包括出生率。

36.【正确答案】 C

【答案解析】 世界卫生组织(WHO)将青春期的年龄范围规定为10~20岁。

37.【正确答案】 A

【答案解析】 病人管理的基本内容包括安慰或解释、告诫或建议、开处方、转诊，答案选A。

38.【正确答案】 A

【答案解析】 衡量疾病预后最常用的指标是病死率。

39.【正确答案】 D

【答案解析】 佝偻病由维生素D缺乏引起。

40.【正确答案】 E

【答案解析】 产褥期变化最大的器官是子宫，子宫于产后6周恢复到未孕时的大小。

41.【正确答案】 B

【答案解析】 使用避孕套可以阻止精子进入宫腔。

42.【正确答案】 C

【答案解析】 全科医学基于病人的需求，采取以人为本、以健康为中心、以家庭为单位、以社区为基础、以预防为导向的服务模式，注重病人及其健康问题的背景和关系，按照生物-心理-社会医学模式的要求提供全面服务。

43.【正确答案】 A

【答案解析】 鼻出血时，尽量不要让它流入胃部，以免刺激胃黏膜，有休克时应平卧头低位，以保持大脑供血，必要时应予镇



静剂，以免心情过度紧张。

44.【正确答案】 C

【答案解析】 婚前保健服务是对准备结婚的男女双方，在结婚登记前所进行的婚前医学检查、婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务，因此答案选 C。

45.【正确答案】 D

【答案解析】 产后新生儿 30 分钟内即应开始早期吸吮，并实行产后母婴同室，按需喂哺，为母乳喂养的进行打下良好的基础，应坚持纯母乳喂养 4~6 个月。

46.【正确答案】 A

【答案解析】 对 PKU、甲低需采血检测，应在出生后 72 小时进行。

47.【正确答案】 D

【答案解析】 可用可不用的药物尽量不用，暂时可停用的药物应停止使用。

48.【正确答案】 D

【答案解析】 选项均可引起粪便变色，属于铁制剂的是山梨醇。

49.【正确答案】 D

【答案解析】 左枕前位一般无需特殊处理，所以不是必须在分娩开始前入院。

50.【正确答案】 A

【答案解析】 林可霉素属于林可霉素类。

51.【正确答案】 C

【答案解析】 全科医学不是知识和技术的叠加；全科医学不能满足所有患者的要求；

也不能统一各地域的健康问题和服务需求。应根据当地特点实施卫生保健工作。

52.【正确答案】 C

【答案解析】 全科医生应具备的能力是在团队管理和卫生资源协调过程中，具有良好的协调和沟通能力，能够对 85%~90% 的常见病及健康问题，提供以人为中心的健康促进和健康维护，满足患者的合理要求。

53.【正确答案】 D

【答案解析】 尊重患者，但不合理的要求不能满足。

54.【正确答案】 B

【答案解析】 在全科医疗服务中，医生必须视服务对象为重要合作伙伴，熟悉其生活、工作、社会背景和个性类型。

55.【正确答案】 E

【答案解析】 慢性非传染性疾病已成为全球严重威胁国民健康的最主要的问题，加之世界各国越来越受到社会老龄化、卫生费用过快增长、医学模式转变和卫生改革的巨大挑战，暴露出传统的专科服务模式对此情况的无奈、低效与高成本的弊端。

二、A2 型题

56.【正确答案】 E

【答案解析】 满足人的爱与被爱的需要；成员之间维系着用血缘和姻缘关系加固的情感纽带。

57.【正确答案】 D

【答案解析】 患者主要是心理层面上的疾病，无躯体疾病，结合选项，进行常规检



查相对其它选项不恰当。

58.【正确答案】 A

【答案解析】 已接受家庭病床服务了，属于慢病管理的持续性照顾。

59.【正确答案】 B

【答案解析】 首次家访为评估性家访。

60.【正确答案】 D

【答案解析】 属于慢病管理的持续性照顾。

61.【正确答案】 C

【答案解析】 从家庭治疗角度出发，目前主要是管教问题与先生意见不合、不理睬，所以应设法协助患者夫妇协调关系。

62.【正确答案】 D

【答案解析】 腹泻，一般状况可，选送检大便标本明确病因。

63.【正确答案】 A

【答案解析】 第一级预防又称病因预防或初级预防，主要是针对致病因子(或危险因子)采取的措施，也是预防疾病的发生和消灭疾病的根本措施。

64.【正确答案】 C

【答案解析】 (1)双尾检验，也称双侧检验，只强调差异不强调方向性(比如大小，多少)的检验叫双尾检验。如检验样本和总体均值有无差异，或样本数之间有没有差异，采取双侧检验。(2)单尾检验，也称单侧检验，强调某一方向的检验叫单尾检验。如当要检验的是样本所取自的总体参数值大于或小于某个特定值时，采用单侧检验

方法。

65.【正确答案】 B

【答案解析】 发病率=(某时期内新发病例数/同期平均人口数)×K，本题新发病例数为 $1854-(1226-134-16)=778$ 人，平均人口20万，发病率= $778/20$ 万= $389/10$ 万。

66.【正确答案】 C

【答案解析】 μ 的95%置信区间意味着100次随机抽样会有5次不包含 μ 的机会，200次随机抽样会有10次不包含 μ 的机会。

67.【正确答案】 B

【答案解析】 若指标服从正态分布，95%参考值范围的公式是： $\mu \pm 1.96S_x$ 。

68.【正确答案】 D

【答案解析】 结局评价的目的是评价项目的总目标是否实现，通常从居民健康状况的改善程度和成本效益的角度考虑。

69.【正确答案】 C

【答案解析】 成年到老年之前是人生保护阶段，尤其应注意35~60岁的成年人。

70.【正确答案】 A

【答案解析】 健康传播的效果，按可达到的难度层次由低向高依次可分为四个层次：知晓健康信息；健康信念认同；态度向有利于健康转变；采纳健康的行为和生活方式。

71.【正确答案】 B

【答案解析】 应提供必要的个人保健技术、保健设施及场所等，促进健康行为得以实



现，这些属于促成因素。

72.【正确答案】 A

【答案解析】 一级目标人群是希望直接实施某种健康行为的人群。

73.【正确答案】 D

【答案解析】 1986年在首届国际健康促进大会通过的《渥太华宣言》中明确指出，健康促进涉及5个主要活动领域：(1)制定促进健康的公共政策；(2)创造支持性环境；(3)加强社区的行动；(4)发展个人技能；(5)调整卫生服务方向。

74.【正确答案】 B

【答案解析】 求医行为是指个体本着预防疾病、或疾病早期发现和治疗，而采取的寻求医疗帮助行为，如主动求医、提供真实和详细的病史及症状、积极配合医疗护理、保持乐观向上的情绪等。

75.【正确答案】 B

【答案解析】 环境策略：旨在改善有关社会文化环境和物理环境的各种策略手段。如为职工添置体育锻炼器材而属环境策略。

76.【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠期间孕妇体重可较平时增加25%，平均约增加12.5kg。

77.【正确答案】 E

【答案解析】 二价镁离子在体内通过对抗二价钙离子而发挥解痉作用。应用时应注意观察其副作用。由于骨骼肌的运动神经末梢传递是通过钙离子完成的，所以膝反射是观察的首要指标。

78.【正确答案】 B

【答案解析】 短效避孕药漏服后应在12小时内补服。

79.【正确答案】 D

【答案解析】 大阴唇外伤后易形成血肿。

80.【正确答案】 E

【答案解析】 长效避孕药内含激素成分及剂量与短效避孕药有很大不同，停药后6个月妊娠较安全。

81.【正确答案】 A

【答案解析】 每年为老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。辅助检查包括：血常规、尿常规、肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素)、肾功能(血清肌酐和血尿素氮)、空腹血糖、血脂(总胆固醇、甘油三酯及高密低密脂蛋白)和心电图和腹部B超(肝胆胰脾)检查。

82.【正确答案】 A

【答案解析】 每年为老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

83.【正确答案】 A

【答案解析】 肥胖、血脂高为冠心病危险因素，赶公共汽车(运动后)出现胸下部闷紧(心前区不适)，停步后2~3分钟后缓解(休息后自行缓解)，考虑心绞痛。

84.【正确答案】 D

【答案解析】 患者两次空腹血糖高，考虑糖尿病，白内障、皮肤反复感染均可因糖尿



病所致，肢端刺麻也为糖尿病的周围神经病变。

85.【正确答案】 C

【答案解析】 老年人，伴消瘦，隐血阳性，胃癌可能性大。结合胃溃疡病史，近1年疼痛不规律，用药疗效欠佳，考虑已不只是溃疡，可能有胃癌。

三、B型题

86.【正确答案】 E

87.【正确答案】 A

88.【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠合并早期梅毒治疗首选青霉素；妊娠合并早期梅毒治疗对青霉素过敏患者选用红霉素；妊娠合并生殖道生殖器疱疹治疗选用阿昔洛韦。

89.【正确答案】 B

90.【正确答案】 A

91.【正确答案】 C

【答案解析】 医学伦理学的基本原则包括有利原则、不伤害原则、尊重原则和公正原则。医学伦理学基本规范包括：救死扶伤，实行社会主义的人道主义，时时刻刻为病人着想，千方百计为病人解除病痛；尊重病人的人格和权利，对待病人，不分民族、性别、地位、财产状况，都应一视同仁；文明礼貌服务，举止端庄，语言文明，态度和蔼，同情、关心和体贴病人；廉洁奉公，自觉遵纪守法，不以医谋私；为病人保守医密，实行保护性治疗，不泄露病人的隐私和秘密；互尊互学，团结协作，正确处理同行同事间的关系；严谨求实，奋发进取，钻研医术，精益求精，不断更新知识，提高技术水平。医学伦理学的基本

范畴包括权利和义务、情感和良心、审慎和保密。

92.【正确答案】 B

93.【正确答案】 C

94.【正确答案】 B

95.【正确答案】 C

96.【正确答案】 B

97.【正确答案】 D

【答案解析】 第一级预防也称病因预防，主要是针对致病因子(或危险因素)采取的措施，也是预防疾病的发生和消灭疾病的根本措施，其中包括自我保健和健康教育等。第二级预防又称“三早”预防，它是发病期所进行的防止或减缓疾病发展的主要措施。为了保证“三早”的落实，可采用普查、筛检、定期健康检查、高危人群重点项目检查以及设立专科门诊等措施。第三级预防主要为对症治疗，防止病情恶化，减少疾病的不良作用，防止复发转移，预防并发症和伤残；对已丧失劳动力或残疾者，通过康复治疗，促进其身心方面早日康复，使其恢复劳动力，实现病而不残或残而不废。

98.【正确答案】 A

99.【正确答案】 C

100.【正确答案】 B

【答案解析】 现代医学心理学和医学社会学通过对人类疾病相关的各种情况研究，将“Disease”“illness”“Sickness”3个一般都翻译为“疾病”的单词区分，用以描述3种不同的情况。“Disease”指“疾病”，可以判明的生物学上的异常，可以从体格检查、化验或其他检查手段加以确定。“illness”指“病患”，有病的感觉，是一个人自我感觉



和判断，认为自己有病。可能伴有躯体疾病，或仅仅是心理或社会方面的失调。

“Sickness”指“患病”，是一种社会地位，即他人(社会)知道此人现处于不健康状态。



2022 年全科主治医师《相关专业》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 A

【答案解析】 A. 卵巢肿瘤有非实质性肿瘤、实质性肿瘤、良性肿瘤、恶性肿瘤之分。还有赘生性与非赘生囊肿之分。非实质性肿瘤中，卵巢囊肿有时与不孕有关可能是不排卵所致。在实质性肿瘤中，各种能分泌激素的肿瘤，例如分泌雌激素的颗粒细胞瘤、卵泡膜细胞瘤等，以及分泌男性激素的睾丸母细胞瘤、类肾上腺皮质瘤等，与不孕有关，可能是引起内分泌紊乱或引起不排卵所致。非赘生性肿瘤中，如分泌雌激素过多的多发性卵泡囊肿也可能是引起持续性无排卵的病因。

B. 卵巢恶性肿瘤的分期，大多数是在手术中取活检进行冰冻切片来确定的。

C. 伴有腹腔积液的卵巢肿瘤不适合手术（可以手术）。

D. 错在无性细胞瘤好发于青春期及生育期妇女，而不是更年期妇女。

E. 错在无性细胞瘤对放疗敏感性高，而不是粘液性囊腺癌。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 随访内容：清宫后每周测定一次 hCG 水平，直至正常；开始 3 个月内，每周复查一次；以后 3 个月，每半个月一次，持续半年。第 2 年起，每半年一次，共随访 2 年，随访内容：hCG 水平测定；

妇科检测时，应注意有无异常阴道流血，有无转移性结节，动作应轻柔，避免病灶破溃致大量流血；胸部 X 先检查有无肺转移；根据临床需要，可行盆腔 B 超及其他影像学检查。随访内容中没有 A 答案的内容。

3. 【正确答案】 B

【答案解析】 GTT 是妊娠滋养细胞肿瘤的英文缩写。

4. 【正确答案】 B

【答案解析】 黄体不全 (LPD) 的发病机制目前还不完全明确，可能与下列因素有关：由于排卵前 LH 分泌的高峰及其月经不同时期，脉冲节律性释放，调控着卵泡排卵和颗粒细胞黄素化。故任何因此干扰了 LH 的分泌量或影响了 LH 脉冲节律，都将影响黄体对孕酮的合成和分泌，导致 LPD。另外，FSH、E、PRL 及前列腺素 (PG) 都能影响 LH，或间接影响卵泡发育，颗粒细胞黄素化，干扰黄体功能，导致不孕。同时基础体温之测量，亦可证明这一点，黄体功能不全者，基础体温双相曲线均不典型，月经后期呈阶梯形上升，升亦不稳。因黄体产生之黄体酮，是一种致热源，可使体温升高，排卵后期基础体温上升，即源于此。

5. 【正确答案】 E



【答案解析】输卵管通液术治疗性通液：于月经后3~7d开始，6次为一疗程，每月做一疗程。

6.【正确答案】E

【答案解析】典型病例急性起病，主要表现为血尿、水肿、血压高和程度不等的肾功能受累。

7.【正确答案】E

【答案解析】急性腹泻病程<2周，迁徙性腹泻病程是2周~2个月，慢性病程>2月。

8.【正确答案】A

【答案解析】口腔健康教育的最终目的是建立口腔健康行为。

9.【正确答案】D

【答案解析】斑秃皮损区皮肤光溃、无炎症。

10.【正确答案】A

【答案解析】痤疮的主要好发部位为面部，故选A。

11.【正确答案】C

【答案解析】藿香正气水的功能主治是解表化湿，理气和中。

12.【正确答案】C

【答案解析】在细菌性痢疾时，常可见到较多的吞噬细胞。吞噬细胞可作为诊断急性细菌性痢疾的依据，也可见于急性出血性肠炎或偶见于溃疡性结肠炎。

13.【正确答案】A

【答案解析】 α -淀粉酶是反映急性胰腺炎的指标。

14.【正确答案】B

【答案解析】只有乙肝病毒为DNA病毒，其他都为RNA病毒。

15.【正确答案】C

【答案解析】类风湿性疾病时，RF的阳性率70%~90%，故本试验对诊断类风湿关节炎的特异性不高。

16.【正确答案】B

【答案解析】肾小球的滤过功能主要取决于肾血流量及肾小球有效滤过压。

17.【正确答案】D

【答案解析】在人体内，嘌呤核苷酸分解生成嘌呤核苷及嘌呤后，经水解脱氨和氧化，最后生成尿酸。核酸代谢亢进可引起内源性UA生成增加，血清UA上升，见于白血病、多发性骨髓瘤、真性红细胞增多症等。

18.【正确答案】B

【答案解析】某些革兰氏阴性杆菌如伤寒、副伤寒杆菌感染时，如无并发症，中性粒细胞计数均减少，在其他病理性情况如再生障碍性贫血，接触放射线等，中性粒细胞也可减低。

19.【正确答案】C

【答案解析】放疗中白细胞 $4 \times 10^9/L$ 、血小板 $100 \times 10^9/L$ 为警戒数，低于此数时，应考虑减少放射剂量。耳针、维生素B₆、利血生、鲨肝醇、肌苷酸、花生衣糖浆等均有防治作用；白细胞低于 $3 \times 10^9/L$ 时，应



暂停治疗，并用抗生素，辅以输鲜血。

20.【正确答案】 C

【答案解析】 恶性肿瘤异型性主要表现在肿瘤细胞核的多形性。

21.【正确答案】 A

【答案解析】 老年抑郁症与老年性痴呆的主要鉴别点是痴呆。

22.【正确答案】 E

【答案解析】 慢性纤维空洞性肺结核是肺结核的晚期类型，多系浸润肺结核发展恶化的结果。病程长，病情的好转与恶化，空洞的形成与纤维修补交替出现，病灶广泛纤维化。此类病人经常大量排菌，为社会的重要传染源。

23.【正确答案】 B

【答案解析】 胎动减少是胎儿窘迫的重要指标，所以每日监测胎动能预知胎儿安危。胎动消失后，胎心在 24 小时内消失，胎动过频是胎动消失的前驱症状，应予以重视。

24.【正确答案】 B

【答案解析】 循证医学的证据中质量最高的是多个质量可靠的大样本随机对照试验所做的系统评价或 Meta 分析。

25.【正确答案】 B

【答案解析】 脑出血可引起先昏迷后发热。

26.【正确答案】 A

【答案解析】 无排卵型功能失调性子宫出血是由单一雌激素刺激而无孕酮对抗而引起的雌激素撤退性出血或突破出血。

27.【正确答案】 B

【答案解析】 老年期抑郁是老年人常见的精神问题，以情绪低落或抑郁为首发症状，还表现出少言寡语、反应迟钝，躯体不适和自主神经紊乱，其中情绪抑郁、思维障碍是最主要的临床症状。

28.【正确答案】 D

【答案解析】 卵巢卵泡膜细胞瘤是罕见的卵巢肿瘤，多为良性。其他均属于恶性肿瘤。

29.【正确答案】 C

【答案解析】 扁桃体炎属于感染性咽痛的病因，所以答案选 C。

30.【正确答案】 D

【答案解析】 急性化脓性中耳炎可出现星烁征。

31.【正确答案】 B

【答案解析】 腹腔镜检查是目前国际公认的子宫内位异位症诊断的最佳方法。在腹腔镜下见到大体病理所述典型病灶，诊断可基本成立，术中所见亦是临床分期的重要依据。腹腔镜也是治疗子宫内位异位症最常用的方法。

32.【正确答案】 D

【答案解析】 腹腔镜检查是目前国际公认的子宫内位异位症诊断的最佳方法。

33.【正确答案】 D

【答案解析】 疼痛是内异症的主要症状，典型症状为继发性痛经、进行性加重。

34.【正确答案】 C



【答案解析】 盆腔炎药物治疗，病情改善后，也应巩固治疗 10~14 天。

35. **【正确答案】** D

【答案解析】 盆腔炎性疾病的手术治疗指征：①药物治疗 48~72 小时，体温不降、症状加重、包块增大者；②输卵管积脓或输卵管卵巢脓肿；③脓肿破裂。

36. **【正确答案】** A

【答案解析】 盆腔炎性疾病诊断的最低标准是：子宫压痛或附件压痛或宫颈举痛。

37. **【正确答案】** A

【答案解析】 急性盆腔炎手术治疗指征：药物治疗 48~72 小时，体温不降、症状加重、包块增大；输卵管积脓或输卵管卵巢积脓；脓肿破裂。

38. **【正确答案】** E

【答案解析】 目前已明确人乳头瘤病毒感染是子宫颈癌发生的主要原因。

39. **【正确答案】** E

【答案解析】 宫颈癌的病因至今尚未完全了解，其发病与早婚、性生活紊乱、性生活过早、早年分娩、多产、经济状况、种族和地理环境、病毒感染等因素有关。宫颈癌的发病是多种因素综合作用引起的。目前认为人乳头瘤病毒(HPV)是宫颈癌发生的中心环节。

40. **【正确答案】** B

【答案解析】 筛查：宫颈刮片细胞学检查，确诊：宫颈活组织检查。

41. **【正确答案】** B

【答案解析】 牙周脓肿累及患牙存在牙髓活力。

42. **【正确答案】** C

【答案解析】 牙签用以剔除牙缝残留食物的用品，如果使用不当就会造成牙龈炎、牙龈萎缩、牙间隙增大而导致牙周疾病。

43. **【正确答案】** C

【答案解析】 第一恒磨牙于 6~7 岁萌出，该年龄段应重点预防第一恒磨牙龋坏。

44. **【正确答案】** D

【答案解析】 窝沟封闭最佳年龄即乳磨牙一般是 3~4 周岁；然后第一恒磨牙，在 6~7 周岁；双尖牙是在 7~12 周岁；最后第二恒磨牙一般是 12~13 周岁。

45. **【正确答案】** A

【答案解析】 闭经可分为生理性和病理性闭经两大类，而病理性闭经分为原发性闭经和继发性闭经两大类。

二、A2 型题

46. **【正确答案】** B

【答案解析】 此病例是由于精神神经因素引起的闭经，属于下丘脑闭经。

47. **【正确答案】** D

【答案解析】 轻度脱水：失水量为体重的 5% (90~120ml/kg)。由于身体内水分减少，患儿会稍感到口渴，啼哭时眼有泪，有尿排出，检查见患儿一般情况良好，两眼窝稍有陷，捏起腹部或大腿内侧皮肤后回缩尚快。
中度脱水：失水量约为体重的 5%~10%



(120~150ml/kg)。患儿出现烦躁，易激惹；口渴想喝水，婴儿四处找奶头，如果得到奶瓶，会拼命吸吮；啼哭时泪少，尿量及次数也减少；检查见患儿两眼窝下陷，口舌干燥，捏起腹壁及大腿内侧皮肤后回缩慢。

重度脱水：失水量为体重的10%以上(150~180ml/kg)，患儿现为精神极度萎缩、昏睡，甚至昏迷；口渴非常严重，啼哭时无泪流出，尿量及尿次数明显数少。检查见患儿两眼窝明显下陷，口舌非常干燥；捏起腹壁及大腿内侧皮肤后回缩很慢。

48.【正确答案】D

【答案解析】目前常用的分娩镇痛药物包括：①麻醉性镇痛药芬太尼、舒芬太尼和瑞芬太尼；②局麻药利多卡因、布比卡因和罗哌卡因；③吸入麻醉药氧化亚氮。

49.【正确答案】B

【答案解析】前驱期也称发疹前期，一般为3~4天。这一期的主要表现类似上呼吸道感染症状：①发热，见于所有病例，多为中度以上发热；②咳嗽、流涕、流泪、咽部充血等卡他症状，以眼症状突出，结膜发炎、眼睑水肿、眼泪增多、畏光、下眼睑边缘有一条明显充血横线(Stimson线)，对诊断麻疹极有帮助。③Koplik斑，在发疹前24~48小时出现，为直径约1.0mm灰白色小点，外有红色晕圈，开始仅见于对着下臼齿的颊粘膜上，但在一天内很快增多，可累及整个颊粘膜并蔓延至唇部粘膜，粘膜疹在皮疹出现后即逐渐消失可留有暗红色小点；④偶见皮肤荨麻疹，隐约斑疹或猩红热样皮疹，在出现典型皮疹时消失；⑤部分病例可有一些非特异症状，如全身不适、食欲减退、精神不振

等。婴儿可有消化系统症状。幼儿常有呕吐、腹泻，在软腭、硬腭弓出现红色细小内疹。第2~3日可于双侧近臼齿颊粘膜处出现细砂样灰白色小点，绕以红晕，称麻疹粘膜斑，为本病早期特征，也可见于下唇内侧及牙龈粘膜，偶见于上腭，多于出疹后1~2日内消失。

50.【正确答案】C

【答案解析】惊恐发作属于急性焦虑发作，主要为极度的紧张和恐惧，尤其是濒死感和发疯感，伴有自主神经紊乱，多表现为心脏和呼吸症状，因此常被误诊为心脏病发作。发作不超过半小时，躯体检查无可以解释症状的阳性发现。

51.【正确答案】D

【答案解析】关系妄想又称牵连观念或援引观念。患者把环境中实际上与自己不相关的一些现象都认为与自身有关，常与被害妄想同时存在。如患者坚信周围人的言行、广播或报上文章都是针对或影射、暗示自己的。

52.【正确答案】E

【答案解析】本证之头晕，气短，畏风自汗，大便质烂，脱肛是因脾胃气虚，清阳下陷，气虚摄纳不力所致。补中益气汤具有补中益气、升阳举陷的作用，故正确答案是E。

53.【正确答案】E

【答案解析】慢性咳嗽、咳痰10年，气急3年，提示病情逐渐发展，进行性加重，是慢支、肺气肿表现，右上圆形透亮区提示肺大疱。



54.【正确答案】C

【答案解析】黄体功能不全：月经规律，周期缩短，经量正常，患者常伴不孕史或流产史；妇科检查无异常；基础体温呈双相型，但上升缓慢、幅度偏低、高温相维持时间仅9~10天左右；子宫内膜检查呈分泌不良反应。本题最可能的是黄体功能不全。

55.【正确答案】E

【答案解析】①烦躁、嗜睡、眼球上窜、凝视；②球结膜水肿，前凶隆起；③昏睡、昏迷、惊厥；④瞳孔改变：对光反应迟钝或消失；⑤呼吸节律不整，呼吸心跳解离（有心跳，无呼吸）；⑥有脑膜刺激征，脑脊液检查除压力增高外，其他均正常。在肺炎的基础上，除外高热惊厥、低血糖、低血钙及中枢神经系统感染（脑炎、脑膜炎），如有①~②项则提示脑水肿，伴其他一项以上者可确诊，可确诊是中毒性脑病。

56.【正确答案】C

【答案解析】子宫肌瘤常见于40~50岁女性，主要表现为月经量增多，导致贫血，子宫增大。

57.【正确答案】A

【答案解析】根据患者的临床表现，月经紊乱，下腹正中肿物，首先考虑是子宫肌瘤。

58.【正确答案】C

【答案解析】患者子宫后壁有触痛性结节，右附件有囊实性包块，需行腹腔镜探查，取结节及剥除包块活检明确病变性质。

59.【正确答案】C

【答案解析】习惯性流产大多数为早期流

产，少数为晚期流产，复发性流产原因与偶发性流产基本一致，但各种原因所占的比例有所不同，胚胎染色体异常发生率随流产次数增加而下降，晚期复发性流产常见原因为子宫解剖异常、自身免疫异常、血栓前状态等。

60.【正确答案】B

【答案解析】超声检查可明确妊娠囊位置、形态及有无胎心搏动，确定妊娠部位及胚胎是否存活，以指导正确的治疗方法。

61.【正确答案】B

【答案解析】尿妊娠试验阳性，考虑妊娠，诊断性刮宫未见绒毛排除宫内妊娠、葡萄胎，考虑宫外孕。

62.【正确答案】E

【答案解析】异位妊娠三联征即停经、腹痛、阴道流血，输卵管妊娠破裂，输卵管肌层血管丰富，短期内可发生大量腹腔内出血，使患者出现休克。患者下腹压痛及反跳痛，宫颈举痛明显，右侧附件有包块伴压痛，最可能的诊断是右侧输卵管妊娠破裂。

63.【正确答案】C

【答案解析】患者下腹肿物，逐渐长大，如足月妊娠大小，能做轻微家务，怀疑卵巢良性肿瘤，最可能为黏液性囊腺瘤。

64.【正确答案】D

【答案解析】卵巢囊肿蒂扭转典型表现是体位改变后突然发生下腹剧痛，伴恶心、呕吐甚至休克。双合诊检查可扪及压痛的肿块，以蒂部最明显。



65.【正确答案】D

【答案解析】子宫内膜癌患者主要表现为绝经后阴道流血，量一般不多，合并感染者则有脓血性排液，恶臭，早期患者妇科检查可无异常发现，晚期可有子宫增大，合并宫腔积液时有明显压痛。对于绝经后阴道流血应排除子宫内膜癌，诊断性刮宫可同时了解宫腔和宫颈情况，组织病理检查是子宫内膜癌的诊断依据。

66.【正确答案】C

【答案解析】当患儿出现阵发性哭闹不安、呕吐、果酱样血便，腹部检查触到腊肠样包块时，即可确定诊断肠套叠。

67.【正确答案】E

【答案解析】患儿急性起病，水肿、肉眼血尿、血压偏高，有呼吸道感染史，尿常规符合急性肾炎的表现；尿蛋白(++)，不符合肾病综合征大量蛋白尿的表现；既往无血尿史，无反复发作的表现，不符合IgA肾病；目前无发热、腰酸、腰痛，以血尿为主，尿白细胞大于10/HP，不应考虑肾盂肾炎；患儿为男性，无多系统损害表现，不应考虑狼疮性肾炎。

68.【正确答案】D

【答案解析】急性肾炎由于水、钠潴留，血容量增多，导致高血压，当血压骤升，超过脑血管代偿机制可出现脑水肿，出现头痛、呕吐、惊厥等症状；急性肾衰竭主要表现为无尿、高血钾等电解质紊乱症状；心力衰竭主要表现为气急、端坐呼吸、心率加快、咳嗽、吐粉红色泡沫痰；癫痫发作前一般无头痛、呕吐；患儿无发热及各种感染的征象，败血症的诊断无依据。

69.【正确答案】B

【答案解析】急性肾小球肾炎光镜下肾小球是弥漫性毛细血管内增生性肾炎病变。

70.【正确答案】C

【答案解析】为毛细血管内增生性肾小球肾炎。其特征是光镜下内皮、系膜细胞弥漫增生，中性粒细胞浸润；免疫荧光可见IgG及C3呈粗颗粒状沿毛细血管壁、系膜区沉积；电镜可见肾小球上皮细胞下有驼峰状大块电子致密物沉积。

71.【正确答案】E

【答案解析】急性肾小球肾炎尿液检查尿红细胞增多，多为肾小球源性血尿，尿蛋白多为(+~+++)，可见多种管型，在疾病早期可有较多的白细胞和上皮细胞，并非感染所致。

72.【正确答案】A

【答案解析】川崎病大中小动脉均可累及，中等动脉尤以冠状动脉病变最严重，冠状动脉损害多发生于病程第2~4周，但也可发生于疾病恢复期。心肌梗死和冠状动脉瘤破裂可致心源性休克，甚至猝死。

73.【正确答案】B

【答案解析】慢性根尖周肉芽肿的根尖部有圆形的透射影像，边界清晰，周围骨质正常或稍显致密。透影区范围较小，直径一般不超过1cm。

74.【正确答案】C

【答案解析】雪口病，白念菌病，是由真菌传染，在黏膜表面形成白色斑膜的疾病，多见于婴幼儿。本病是白色念珠菌感染所



引起。口腔黏膜出现乳白色，微高起斑膜，周围无炎症反应，形似奶块，无痛，擦去斑膜后，可见下方不出血的红色创面，斑膜面积大小不等，可出现在舌，颊，腭或唇内黏膜上。

75.【正确答案】 C

【答案解析】 逆行性牙髓炎是临床比较常见的。由于牙周袋内的细菌、毒素通过根尖孔或近根尖孔处的根管侧支进入牙髓，先引进近根尖处的牙髓充血和发炎，以后，局限的慢性牙髓炎可急性发作，表现为剧烈的自发痛等典型急性牙髓炎症状。临床检查时可见患牙有深达根尖区的牙周袋或严重的牙龈退缩，牙齿一般松动达Ⅱ度以上。牙髓有明显的激发痛等。

76.【正确答案】 A

【答案解析】 患儿夏季发病，发热，有明显的神经系统症状和体征，考虑乙脑，双侧瞳孔不等大，抽搐，意识不清，出现脑疝，应给予脱水剂。

77.【正确答案】 D

【答案解析】 7月下旬发病，起病急，病程3天后出现明显神经系统症状及病理反射阳性，结合脑脊液改变应考虑为乙脑。由于乙脑早期外周血象白细胞可升高，且以中性粒细胞为主，因此要排除细菌感染。化脓性脑膜炎脑脊液细胞数及蛋白应明显升高，糖、氯化物降低；流行性脑脊髓膜炎发病季节为冬春季，且临床特点为皮肤瘀点、瘀斑，脑脊液化脓性改变；结核性脑膜炎起病缓慢，脑脊液生化改变蛋白升高明显，糖、氯化物降低明显；细胞分类以单核细胞为主；中毒性痢疾起病更急，多

伴有休克表现及消化道症状。

78.【正确答案】 D

【答案解析】 脊髓灰质炎又名小儿麻痹症，是由脊髓灰质炎病毒引起的一种急性传染病。临床表现主要有发热、咽痛和肢体疼痛，部分病人可发生弛缓性麻痹。流行时以隐匿感染和无瘫痪病例为多，儿童发病较成人高，普种疫苗前尤以婴幼儿患病为多，故又称小儿麻痹症。格林-巴利综合征起病前1~6周可有前驱感染史，多为非特异性病毒感染。绝大多数急性起病。主要症状是肌肉无力，常从双下肢开始，2~3天内发展到上肢及躯干，1周左右达高峰。

79.【正确答案】 E

【答案解析】 乙脑为自然疫源性疾病，传染源为感染动物和人，猪的自然感染率最高，是主要传染源。蚊虫是主要传播媒介。

80.【正确答案】 D

【答案解析】 流行性乙型脑炎多为夏秋季发病，蚊子为其传播媒介，临床上以高热、意识障碍、抽搐、病理反射及脑膜刺激征为特征，无瘀点、瘀斑。脑脊液压力增高，外观无色透明或微浑浊，白细胞计数多在 $(50\sim 500)\times 10^6/L$ ，糖正常或偏高，氯化物正常。

81.【正确答案】 B

【答案解析】 夏季、颅内高压症、脑膜刺激征、浅反射消失，考虑乙脑可能性较大，蚊虫是主要传播媒介，所以需要询问居住环境有无蚊虫及乙型脑炎疫苗接触史。

82.【正确答案】 B



【答案解析】 小儿良性癫痫伴中央颞区棘波系特发性部分性癫痫，多于年龄(2~13岁)起病，男多于女。常有家族史，预后良好，多于青春期发作停止，不必终身服用抗癫痫药物。

83. **【正确答案】** D

【答案解析】 前庭大腺囊肿系因前庭大腺管阻塞，分泌物积聚而成，前庭大腺囊肿多为单侧，造口术方法简单，损伤小，术后还能保留腺体功能。

84. **【正确答案】** E

【答案解析】 应诊断为前庭大腺囊肿，首选手术治疗，可行包块切开引流。

85. **【正确答案】** E

【答案解析】 妊娠合并阴道炎可增加不良妊娠结局的风险，应给予积极治疗。本病多选口服用药，甲硝唑 0.2g，每天 3 次，口服 7 天或甲硝唑 2g 单次口服或克林霉素 0.3g，每天 2 次，口服 7 天。

三、B 型题

86. **【正确答案】** B

87. **【正确答案】** C

88. **【正确答案】** A

【答案解析】 滴虫性阴道炎分泌物特点稀薄脓性，泡沫状；老年性阴道炎分泌物特点阴道分泌物稀薄，呈淡黄色，感染严重者呈脓血性；婴幼儿阴道炎主要症状为阴道分泌物增多，呈脓性。

89. **【正确答案】** A

【答案解析】 急性盆腔炎发病时下腹痛伴发热，若病情严重可有寒战、高热、头痛、

食欲不振。考虑为 A。

90. **【正确答案】** E

【答案解析】 患者经量多，经期长(某种原因使得子宫内膜出血增多)，子宫本身没有大小问题，没有包块，没有感染表现。宫底韧带有结节，在所有的选项里考虑 E。

91. **【正确答案】** A

【答案解析】 急性单纯疱疹性角膜炎溃疡期应严禁使用 0.025% 地塞米松。

92. **【正确答案】** E

【答案解析】 急性闭角型青光眼应严禁使用 1% 阿托品。

93. **【正确答案】** C

94. **【正确答案】** A

95. **【正确答案】** B

【答案解析】 外阴阴道假丝酵母菌(念珠菌性阴道炎)是由白色念珠菌感染导致的，治疗方法为局部或全身使用抗真菌药物以局部用药为主，可每晚局部用抗真菌阴道霜剂(咪康唑，克霉唑等)，连用 3~7 天。老年性阴道炎治疗原则为补充雌激素，增加抵抗力，局部应用抗生素抑制细菌生长；治愈滴虫性阴道炎需全身用药，主要药物为硝基咪唑类药物，初次治疗可选择甲硝唑 2g 单次口服。

96. **【正确答案】** A

97. **【正确答案】** E

98. **【正确答案】** C

【答案解析】 陈旧性宫外孕患者病情稳定包块局限可观察；一侧输卵管切除(根治手术)适用于无生育要求的输卵管妊娠、内出



血并发休克的急症患者；化学药物治疗适用于病情稳定的输卵管妊娠患者。

99.【正确答案】 B

100.【正确答案】 A

【答案解析】 输卵管妊娠手术通常在腹腔镜下完成，除非生命体征不稳定，需要快速进腹止血并完成手术。



2022 年全科主治医师《专业知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 C

【答案解析】 先天性巨结肠症确切地讲称为肠管无神经节细胞症，是胃肠道先天性畸形中最常见病之一。临床表现为婴儿往往数天才有一次排便；由于大便无法正常地排出而常常引起肠炎，或表现时好时坏并交替出现便秘、腹泻，伴腹胀和食欲不佳。幼儿时期则以长期逐渐加重的便秘为主要症状。

2. 【正确答案】 E

【答案解析】 细菌性痢疾是志贺菌属(痢疾杆菌)引起的肠道传染病。临床表现主要有发冷、发热、腹痛、腹泻、里急后重、排黏液脓血样大便。

3. 【正确答案】 D

【答案解析】 急性细菌性痢疾起病急，表现为畏寒、发热、腹痛、腹泻，排黏液脓血便伴里急后重。左下腹压痛明显。

4. 【正确答案】 C

【答案解析】 停药综合征如苯巴比妥、甲丙氨酯等可引起抽搐。

5. 【正确答案】 D

【答案解析】 病程长于 1 年为慢性抽动，无意识障碍的抽搐见于破伤风，有意识障碍

的抽搐见于癫痫，癔症性抽搐为功能性抽搐。

6. 【正确答案】 A

【答案解析】 弛张热：又称败血症热、消耗热。体温高峰在 39℃ 以上，24 小时内波动范围超过 2℃，体温最低时仍高于正常。

7. 【正确答案】 C

【答案解析】 多发性肌炎为风湿性疾病，属于非感染性发热，所以答案为 C。

8. 【正确答案】 E

【答案解析】 肥胖的主要病因有遗传因素、环境因素、高胰岛素血症、神经内分泌和代谢因素、药物因素、精神因素。

9. 【正确答案】 C

【答案解析】 单纯性肥胖是以改变生活方式为主要治疗方法。

10. 【正确答案】 A

【答案解析】 漏出液外观为浅黄色。

11. 【正确答案】 C

【答案解析】 降颅压、绝对卧床、止血治疗、止痛镇静均是蛛网膜下腔出血的内科处理，而早期应用血管扩张剂可导致出血加重或再出血，不正确。因此该题选 C。



12.【正确答案】D

【答案解析】蛛网膜下腔出血的病因以先天性脑动脉瘤、脑血管畸形和动脉硬化为多见。少见病因有脑肿瘤、脑动脉炎、血液病、抗凝治疗后等。

13.【正确答案】C

【答案解析】痫性发作是癫痫的特征性临床表现，由于放电起源可累及不同脑区，神经元放电时可表现出与相应脑功能有关的发作形式。痫性发作的神经元异常放电源于大脑的局灶部位，称为局灶性发作。全面性发作放电起源于双侧大脑半球，并在发作时伴有意识障碍。

14.【正确答案】C

【答案解析】癫痫的临床表现，可分痫性发作和癫痫症两方面。有多种发作类型，每一种癫痫患者可以只有一种发作类型，也可以有一种以上发作类型。所以错误的选C。

15.【正确答案】B

【答案解析】其他属于心理量表测评。

16.【正确答案】E

【答案解析】吩噻嗪类药物因为其属中枢多巴胺受体阻断剂，在不良反应之一中由于其能引起药源性帕金森综合征，所以禁止使用。

17.【正确答案】D

【答案解析】瓣膜为最常受累部位，但感染也可发生在间隔缺损部位、腱索或心壁内膜。

18.【正确答案】E

【答案解析】脑血管意外是我国高血压病最常见的并发症，是心肌梗死的4~6倍。美国人最常见的高血压并发症是肾衰竭。

19.【正确答案】D

【答案解析】提示继发性高血压可能的线索血压>180/110mmHg。

20.【正确答案】A

【答案解析】5.20mmol/L(200mg/dl)以下为合适范围。

21.【正确答案】C

【答案解析】PTE就是肺栓塞，因此肺活检没有意义。

22.【正确答案】E

【答案解析】PTE所致病情的严重程度取决于以上机制的综合作用。栓子的大小和数量、多个栓子的递次栓塞间隔时间、是否同时存在其他心肺疾病、个体反应的差异及血栓溶解的快慢，对发病过程和预后具有重要影响。只有E患者肺活量对PTE发病过程和预后没有重要影响。

23.【正确答案】B

【答案解析】PTE溶栓治疗的绝对禁忌证包括：活动性内出血和近2个月内自发性颅内出血、颅内或脊柱创伤、手术。相对禁忌证有：10~14天内的大手术、分娩、器官活检或不能压迫部位的血管穿刺；2个月之内的缺血性中风；10天内的胃肠道出血；15天内的严重创伤；1个月内的神经外科或眼科手术；难以控制的重度高血压(收缩压>180mmHg，舒张压>110mmHg)；近期曾



进行心肺复苏；血小板计数 $<100\times 10^9/L$ ；妊娠；细菌性心内膜炎；严重的肝肾功能不全；糖尿病出血性视网膜病变；出血性疾病等。综上所述不包括B项。

24.【正确答案】A

【答案解析】肺部革兰阴性杆菌感染的共同点在于肺实变或病变融合，组织坏死后容易形成多发性脓肿，常累及双肺下叶，若波及胸膜，可引起胸膜渗液或脓胸。

25.【正确答案】E

【答案解析】HAP是医院获得性肺炎，是指患者入院时不存在、也不处于感染潜伏期，而于入院48小时后在医院（包括老年护理院、康复院等）内发生的肺炎。

26.【正确答案】A

【答案解析】根据咳嗽、咳痰或伴喘息，每年发病持续3个月，连续2年或以上，并排除其他心、肺疾患时，即可作出诊断，因此诊断慢性支气管炎的主要依据是病史和症状，而其余四项均不是诊断的主要依据。

27.【正确答案】B

【答案解析】慢支并肺气肿时，呼吸功能既有通气功能障碍，如第一秒用力呼气量占用力肺活量比值 $<70\%$ ，最大通气量低于预计值的 80% ，尚有残气容积增加，残气容积占肺总量的百分比增加，超过 40% 说明肺过度充气，对诊断阻塞性肺气肿有重要意义。

28.【正确答案】E

【答案解析】急性上呼吸道感染分为五型：普通感冒、咽结膜热、急性咽喉炎、疱疹

性咽峡炎、细菌性咽-扁桃体炎。

29.【正确答案】A

【答案解析】急性上呼吸道感染各种病毒和细菌均可引起，但是以病毒多见，约占 90% 以上。

30.【正确答案】A

【答案解析】风湿热是链球菌上呼吸道感染后引起的免疫炎症性疾病，而不是直接蔓延引起。

31.【正确答案】C

【答案解析】无症状细菌尿是指患者有真性细菌尿，而无尿路感染的症状。

32.【正确答案】C

【答案解析】肾病综合征通常在激素治疗是无需应用抗生素预防感染，否则不但达不到预防的目的，反而可能诱发真菌二重感染。免疫增强剂（如胸腺肽、转移因子及左旋咪唑等）能否预防感染尚不完全肯定。一旦发现感染，应及时选用对致病菌敏感、强效且无肾毒性的抗生素积极治疗，有明显感染灶者应尽快去除。严重感染难控制时应考虑减少或停用激素，但需视患者的病情决定。

33.【正确答案】C

【答案解析】 90% 微小病变型肾病对糖皮质激素敏感。

34.【正确答案】B

【答案解析】肾病综合征的并发症包括感染（主要是呼吸道）、血栓和栓塞并发症、急性肾衰竭、蛋白质及脂肪代谢紊乱。其中



最常见的是呼吸道感染。

35.【正确答案】A

【答案解析】急性肾小球肾炎治疗包括：一般治疗(卧床休息)；感染灶治疗；对症治疗(降压)；透析治疗。

题干血压太高，故应先降压，再对症治疗。

36.【正确答案】C

【答案解析】急性肾小球肾炎最主要的治疗措施是休息与控制病灶感染。本病为自限性疾病，不宜应用糖皮质激素及细胞毒药物。

37.【正确答案】C

【答案解析】血友病(Hemophilia)是一组由于血液中某些凝血因子的缺乏而导致患者产生严重凝血障碍的遗传性出血性疾病，男女均可发病，但绝大部分患者为男性。包括血友病A(甲)、血友病B(乙)和因子XI缺乏症(曾称血友病丙)。前两者为性连锁隐性遗传，后者为常染色体不完全隐性遗传。血友病在先天性出血性疾病中最为常见，出血是该病的主要临床表现。

实验室特点：血友病患者血管壁和血小板功能正常 因此出血时间(BT)正常，患者有正常的纤维蛋白原和因子II、VII、V活性，因此凝血酶原时间(PT)正常，但是有功能的凝血因子VIII活性或IX缺乏，使内源性凝血系的试验异常，诊断必须基于体外凝血活性的筛选试验，部分凝血活酶时间(APTT或KPTT)或凝血活酶生成时间(比格斯氏TGT)。

38.【正确答案】E

【答案解析】贫血临床表现与5个因素有

关：病因、贫血导致血液携氧能力下降的程度、发生贫血的速度和血液、循环和呼吸系统对贫血的代偿和耐受能力。

39.【正确答案】E

【答案解析】溶血性贫血是由于各种原因使红细胞破坏过早、过多，寿命缩短，骨髓造血系统的代偿性增生不足以补偿红细胞的耗损所引起的贫血。

40.【正确答案】D

【答案解析】血管外溶血即由单核-巨噬细胞系统，主要是脾脏破坏红细胞。如果幼红细胞，直接在骨髓内破坏，称为原位溶血或无效性红细胞生成，这也是一种血管外溶血，见于巨幼细胞性贫血、骨髓增生异常综合征等。了解即可。

41.【正确答案】B

【答案解析】A. 病原体被清除：病原体进入人体后，可被处于机体防御第一线的非特异性免疫屏障所清除，如胃液对少量痢疾杆菌。同时，亦可由于事先存在于体内的特异性体液免疫与细胞免疫物质将相应的病原体清除。

B. 隐性感染：指病原体侵入人体后，仅诱导机体产生特异性免疫应答，而不能或只引起轻微的组织损伤，因而在临床上不显示出任何症状、体征，甚至生化改变，只能通过免疫学检查才能发现。是最常见的表现。

C. 显性感染：指病原体侵入人体后，不但诱导机体发生免疫应答，而且，通过病原体本身的作用或机体的变态反应，导致组织损伤，引起病理改变和临床表现。

D. 潜伏性感染：病原体感染人体后寄生于



某些部位，由于机体免疫功能足以将病原体局限化而不引起显性感染，但不足以将病原体清除时，病原体便可长期潜伏起来，待机体免疫功能下降时，则可引起显性感染。

E. 病原携带状态：所有的病原携带都有一个共同的特点，即无明显临床症状而携带病原体。

42.【正确答案】 B

【答案解析】 传染性非典型肺炎的病原体已被认为是一种新的冠状病毒。

43.【正确答案】 C

【答案解析】 肺结核纤维组织增生和收缩牵引，或因支气管结核引起管腔狭窄、阻塞，伴或不伴肺不张均可引起支气管扩张，好发部位位于上叶尖后段或下叶背段。

44.【正确答案】 C

【答案解析】 治疗药物方案至少 4 种药物，必要时可用 6/7 种，以减少耐药产生并得到根治。

45.【正确答案】 C

【答案解析】 结核菌素皮肤试验，当强阳性时表现处于超敏感状态，发病几率高。

46.【正确答案】 E

【答案解析】 不同细菌引起的腹泻症状可以类似，但根本的区别在于它们致病菌是不一样的，所以选 E。

47.【正确答案】 B

【答案解析】 接触麻疹后 5 天内立即肌注免疫血清球蛋白 0.25ml/kg，可预防麻疹；若

5 天后注射者，仅能减轻症状。被动免疫只能维持 3~8 周，以后应采取主动免疫。

48.【正确答案】 D

【答案解析】 人丙种球蛋白(0.25ml/kg)在接触麻疹后 5 天内肌注可预防患病；接触 5 天后注射只能减轻症状。

49.【正确答案】 E

【答案解析】 麻疹患者是唯一的传染源，患儿从接触麻疹前 5 天至出疹后 5 天均有传染性，要是合并肺炎等并发症，则传染性可延至出疹后 10 天。病毒存在于眼结膜、鼻、口、咽和气管等分泌物中，通过喷嚏、咳嗽和说话等由飞沫传播。

50.【正确答案】 B

【答案解析】 少尿期，肾功能障碍，予高蛋白饮食会加重氮质血症，故本题选 B。

二、A2 型题

51.【正确答案】 C

【答案解析】 嵌顿疝最重要的是要判断有无绞窄疝存在，因为嵌顿疝与绞窄疝的处理及治疗上有很大区别。

52.【正确答案】 D

【答案解析】 患者 1 年前发现左上肢“红线”，伴肿硬，压痛，是血栓性浅静脉炎的表现，而目前出现间歇性跛行及静息痛，右下肢发绀，皮温凉，是明显的下肢缺血表现。右股动脉弹性好，足背胫后动脉搏动未触及，表明动脉闭塞位于肢体远侧，且患者男性，除吸烟外，无其他动脉硬化好发因素，诊断为血栓闭塞性脉管炎。



53.【正确答案】 A

【答案解析】 心电图示左束支传导阻滞，是扩张型心肌病的表现，心界向两侧扩大也是扩张型心肌病的表现。

54.【正确答案】 E

【答案解析】 遗传性毛细血管扩张症是血管壁异常导致的出血性疾病。典型病变为皮肤和黏膜出现鲜红色或紫红色的毛细血管或小血管扩张，直径1~3mm，病变呈针尖状、小结节状、团块状或血管瘤形状，加压后颜色消失，病变常发生于手、足、颜面、唇、口腔、鼻腔及消化道等部位。

55.【正确答案】 D

【答案解析】 有关蚕豆病的检验试验有高铁血红蛋白还原试验、G-6-PD 荧光斑点法、硝基四氮唑蓝试验和 Heinz 小体生成试验。

56.【正确答案】 A

【答案解析】 胃癌早期仅有上腹痛、消化不良，病情进展也有体重下降，如疼痛规律改变，可考虑胃癌。

57.【正确答案】 B

【答案解析】 慢性浅表性胃炎在胃镜下的表现主要有：①胃粘膜充血、水肿，充血区和水肿区可交叉存在，形成红白相间，并以充血的红色为主；②胃粘膜表面附着粘稠的灰白色或淡黄色粘液斑；③胃粘膜有出血点；④有时粘膜上可看到小的糜烂。

58.【正确答案】 A

【答案解析】 慢性支气管炎和肺气肿是引起气胸常见的原因，肺泡内压增高，剧咳后肺泡连同脏层胸膜破裂，空气进入胸膜腔，

突感胸疼，气体压缩肺组织，肺功能明显减低，即出现呼吸困难加重。

59.【正确答案】 E

【答案解析】 对高龄，慢性支气管炎、肺气肿患者，肺功能减低，易在受凉后症状加重，除对症处理、及时吸氧外，对突发症状，应进一步检查，如拍胸片排除“气胸”等。

60.【正确答案】 C

【答案解析】 题目中症状与体征为回盲部肿瘤的典型表现。

61.【正确答案】 E

【答案解析】 女性，尿频、尿急、尿痛伴终末血尿，不伴有发热，应诊断为急性膀胱炎，而不是急性肾盂肾炎。

62.【正确答案】 E

【答案解析】 重症胰腺炎患者，尿量减少至无尿，水肿、高血压、血肌酐增高，可诊断为急性肾衰竭。本例血肌酐 $>442\mu\text{mol/L}$ 、血钾 $>6.5\text{mmol/L}$ ，属于肾透析的指征。

63.【正确答案】 A

【答案解析】 患者诊断肾病综合征，目前高度水肿，尿量少，大量蛋白尿并有低蛋白血症，肾脏清除率异常，治疗应使用免疫抑制剂，抑制免疫炎症反应，抑制醛固酮和抗利尿激素分泌，改善肾小球基底膜通透性等而发挥利尿、清除尿蛋白的疗效。

64.【正确答案】 D

【答案解析】 超声提示双肾已经缩小，结合血肌酐明显升高、高血压、贫血、少尿、



水肿的表现，以慢性肾衰竭可能性最大。慢性肾衰竭可以引起凝血系统改变及血小板异常而出现出血表现。

65.【正确答案】 E

【答案解析】 淡水淹溺者，血钾升高，血尿中出现游离血红蛋白。海水淹溺者可有高钠血症或高氯血症。淹溺患者致命的主要原因是肺水肿和心跳骤停。

66.【正确答案】 E

【答案解析】 患者口服安眠药是属于苯二氮草类镇静催眠药物，有特效解毒剂是氟马西尼。

67.【正确答案】 B

【答案解析】 患者克罗恩病史，现出现呕吐胃内容物，3天未排大便，考虑为并发肠梗阻。

68.【正确答案】 E

【答案解析】 根据题中患者的病史、临床表现与实验室检查(反复腹泻2年，有脓血便，粪培养阴性，多种抗生素治疗无效)，考虑溃疡性结肠炎的诊断可能性大。结肠镜检是本病诊断与鉴别诊断的最重要的手段之一。

69.【正确答案】 D

【答案解析】 患者腹痛腹泻、脓血便多年，抗生素治疗无效。结肠镜检示病变局限于直肠和乙状结肠，黏膜充血水肿、颗粒样改变，应诊断为溃疡性结肠炎。病理检查可见固有膜全层弥漫性炎症、隐窝脓肿、隐窝结构明显异常、杯状细胞减少。

70.【正确答案】 B

【答案解析】 慢性浅表性胃炎的胃酸分泌正常或增高，A型胃炎胃酸分泌显著降低或无酸，内因子分泌减少，血清抗壁细胞抗体阳性。B型胃炎主要是局限于胃窦部的多灶性炎症，炎症细胞为浆细胞和粒细胞，与A型胃炎不同的是，B型胃炎胃酸正常或轻度降低。在本题中患者间断上腹不适疼痛4年，餐后加重，嗝气，胃液分析BAO为0，MAO为5mmol/h，胃pH4.5说明低酸。考虑为B型胃炎。

三、A3/A4型题

71.【正确答案】 C

【答案解析】 对突然发生较重而持久的胸闷或胸痛者，应考虑心肌梗死，首选心电图检查，可发现特征性改变。

72.【正确答案】 E

【答案解析】 对心肌梗死患者，强调及早发现，及早住院，并加强住院前的就地处理。

73.【正确答案】 D

【答案解析】 根据临床表现，该患者发生了心源性休克，这也是血压下降的原因。

74.【正确答案】 C

【答案解析】 对指导该患者心肌梗死治疗最有帮助的辅助检查是漂流导管血流动力学监测。

75.【正确答案】 E

【答案解析】 急性广泛前壁心肌梗死合并心源性休克时，常规药物治疗平均死亡率高达70%。患者发病4小时来院，必须最有效实现真正的完全再灌注，只有直接PTCA



才能有效实现完全再灌注，病人的心源性休克才能得到纠正，从而大大降低病死率。

76.【正确答案】C

【答案解析】肺心病患者感染诱发呼吸衰竭、肺性脑病时，首要检查手段是血气分析以了解患者的氧合情况，呼吸衰竭的程度和酸碱平衡情况，从而为有效治疗提供手段。

77.【正确答案】C

【答案解析】肺心病患者 PaCO_2 升高考虑呼吸性酸中毒，通过体内代偿，碳酸氢根离子可代偿升高，根据单纯性酸碱失衡的预计代偿公式计算，当 PaCO_2 从 5.3kPa 升至 9.3kPa 时，碳酸氢根离子应在 29 ~ 40mmol/L，而患者碳酸氢根离子为 48mmol/L，故患者合并有代谢性碱中毒存在。

78.【正确答案】B

【答案解析】因该患者首要的矛盾是碱中毒，因此治疗首先要抢救碱中毒，否则缺氧难以纠正。

79.【正确答案】B

【答案解析】根据患者症状及心脏听诊体征，分析其为二尖瓣狭窄合并急性肺水肿。

80.【正确答案】A

【答案解析】正性肌力药可减慢心室率，缓解患者心悸不适症状。

81.【正确答案】E

【答案解析】山莨菪碱等抗胆碱能药可延缓胃排空，适用于十二指肠溃疡，但能加重

胃潴留，禁用于幽门梗阻时。

82.【正确答案】D

【答案解析】患者可在胃内容物充分引流后行胃镜检查，可明确病因和病变范围。因能加重梗阻，不可用钡剂造影检查。

83.【正确答案】E

【答案解析】幽门梗阻主要是消化性溃疡的主要并发症之一，表现为呕吐大量发酵宿食，特征性体征有：空腹时上腹部饱胀、逆蠕动的胃型及上腹部振水声。患者符合上述表现。

84.【正确答案】D

【答案解析】此病人最可能的诊断是非酮症高渗性糖尿病昏迷。因为此病人有糖尿病家族史，局限性右上肢抽搐，随即昏迷，尿酮体仅(+)，二氧化碳结合力无明显酸中毒。脑血栓形成和脑出血也是糖尿病的并发症，但一般无局限性抽搐，而以偏瘫最为常见。低血糖可有抽搐，但为全身性，尿糖(+++)、尿酮体(+)也不符合低血糖。

85.【正确答案】C

【答案解析】为最快得到确诊，可抽血用渗透压计测血浆渗透压，只几分钟即有结果。其他结果都没有这样快，且不能确诊。

86.【正确答案】A

【答案解析】此病人确诊为非酮症高渗性糖尿病昏迷，应首选胰岛素、大量补液、补钾和对症治疗。因为 CO_2CP 为 19mmol/L，故不必补碱。

87.【正确答案】D



【答案解析】对于有咳嗽、咳痰、发热呼吸道症状，肺部有异常体征者，应首选 X 线胸片筛查。

88.【正确答案】 C

【答案解析】根据患者发热、盗汗、咳嗽、咳痰及肺部体征，考虑肺结核诊断，而确诊依据需痰中找到抗酸杆菌。

89.【正确答案】 E

【答案解析】干酪性肺炎是肺结核的类型之一，多发生在机体免疫力和体质衰弱，又受到大量结核杆菌感染的患者，发病急，病情较重。

90.【正确答案】 C

【答案解析】肺炎支原体肺炎通常起病缓慢，症状较轻，胸部体格检查与肺部病变程度常不相称，可无明显体征。X 线显示肺部多种形态的浸润影。

91.【正确答案】 C

【答案解析】怀疑乳腺脓肿，穿刺抽到脓液后即可确诊。

92.【正确答案】 C

【答案解析】脓肿形成后，最重要的治疗是切开引流脓液。

93.【正确答案】 B

【答案解析】对激素治疗无效或依赖的患者可考虑行脾切除。

94.【正确答案】 D

【答案解析】ITP 患者由于存在血小板抗体，血小板破坏增多，导致血小板生存时间明显缩短。

95.【正确答案】 C

【答案解析】ITP 患者由于存在血小板抗体，血小板破坏增多，导致血小板生存时间明显缩短。

96.【正确答案】 B

【答案解析】根据患者病因、病史、临床表现及体征可诊断为 B。

97.【正确答案】 D

【答案解析】治疗应选择解痉，平喘，抗感染，低流量持续吸氧等治疗。

98.【正确答案】 B

【答案解析】患者诊断考虑为肺源性心脏病，血气分析可判断呼吸衰竭类型、缺氧及二氧化碳潴留。

99.【正确答案】 C

【答案解析】肺性脑病是在呼吸衰竭发生显著的缺氧及二氧化碳潴留的情况下引起神志障碍、神经精神症状。

100.【正确答案】 D

【答案解析】呼吸衰竭后突然发生病情变化，呼吸频数和呼吸窘迫，临床排除左心衰竭，可确诊 ARDS。



2022 年全科主治医师《专业实践能力》 模拟试卷答案解析

一、案例分析题

1.【正确答案】 C

【答案解析】 ST 段抬高性心肌梗死的特征性的心电图改变：在面向透壁心肌坏死区的导联上出现以下特征性的改变：①宽而深的病理性 Q 波（少部分患者可没有出现）；②ST 段抬高呈弓背向上型；③T 波倒置，宽而深，两支对称。

2.【正确答案】 DFG

3.【正确答案】 CG

【答案解析】 急性心肌梗死患者出现心律失常及时再灌注改善心肌缺血是治疗的根本，CAST 试验观察英卡因、氟卡因对 2000 多例梗死后患者 ≥ 6 个/小时的室性期前收缩， ≤ 15 个/小时无症状的室速，左室 EF $\leq 40\%$ ，观察 6 个月后被停止，因为用药后患者心律失常致死或心源性停搏的病死率较安慰剂组高出 3 倍。对急性心肌梗死没有合并易发生恶性室性心律失常的患者，不主张预防应用 I 类抗心律失常药物。目前认为非 ST 段抬高心肌梗死发病早期服用地尔硫草对预防早期再梗死和心绞痛有效，除此以外，钙拮抗剂不作为急性心肌梗死的常规用药。

4.【正确答案】 ACDEFG

【答案解析】 心肌梗死并发症：①乳头肌功

能不全或乳头肌断裂；②心脏破裂（室间隔穿孔、心室游离壁破裂）；③室壁瘤形成；④栓塞（左室壁血栓脱落可引起脑、肾、脾或四肢动脉栓塞；由于下肢静脉血栓形成部分脱落，可导致肺动脉栓塞）；⑤心肌梗死后综合征（表现为心包炎、胸膜炎或肺炎，可单独出现或同时出现。有发热、胸痛等症状。可能为机体对坏死物质的过敏反应。）

5.【正确答案】 ACEG

【答案解析】 急性心肌缺血时出现频发室早 > 5 次/分、多源室早、成对室早、连续室早（短阵室速）、RonT 室早可能出现致命性心律失常，改善心肌缺血是治疗的根本，抗心律失常药物首选可降低病死率的 β 受体阻滞剂，如果效果不理想可选择胺碘酮，同时纠正其他可导致心律失常的情况如低血钾等。

6.【正确答案】 BDFH

【答案解析】 可以改善冠心病预后的药物：2007 年中国慢性稳定性心绞痛诊治指南提出可以改善冠心病预后的药物：①阿司匹林：通过抑制环氧化酶和血栓烷(TXA₂)的合成达到抗血小板聚集的作用，所有患者只要没有用药禁忌证都应该服用。不能耐受阿司匹林的患者，可改用氯吡格雷作为替代治疗；②氯吡格雷：通过选择性的不



可逆的抑制血小板 ADP 受体而阻断 ADP 依赖激活的 GP II b/III a 复合物, 有效地减少 ADP 介导的血小板激活和聚集; ③β受体阻滞剂: 最近公布的多种 β受体阻滞剂对死亡率影响的荟萃分析显示, 心肌梗死后患者长期接受 β受体阻滞剂二级预防治疗, 可降低相对死亡率 24%。推荐使用无内在拟交感活性的 β受体阻滞剂。β受体阻滞剂的使用剂量应个体化, 从较小剂量开始, 逐级增加剂量, 以能缓解症状, 心率不低于 50 次/分为宜; ④调脂治疗: 多个随机双盲的一级或二级预防临床试验表明, 他汀类药物能有效降低 TC 和 LDL-C, 并因此降低心血管事件。他汀类药物治疗还有延缓斑块进展, 使斑块稳定和抗炎等有益作用。冠心病患者 LDL-C 的目标值应 <2.60mmol/L(100mg/dl), 对于极高危患者(确诊冠心病合并糖尿病或急性冠状动脉综合征), 治疗目标为 LDL-C <2.07mmol/L(80mg/dl)也是合理的; ⑤血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI): HOPE 研究结果显示, 雷米普利能使无心力衰竭的高危血管疾病患者的主要终点事件(心血管死亡、心肌梗死和卒中)相对危险性降低 22%。EUROPA 研究结果显示, 培哚普利能使无心力衰竭的稳定性心绞痛患者的主要终点事件(心血管死亡、非致死性心肌梗死及成功复苏的心搏骤停的联合发生率)的相对危险性降低 20%。所有冠心病患者均能从 ACEI 治疗中获益, 在稳定性心绞痛患者中, 合并糖尿病、心力衰竭或左心室收缩功能不全的高危患者使用 ACEI 获益可能更大。

7.【正确答案】B

【答案解析】患者继发不孕, 子宫大小、形态正常, 宫骶韧带触痛性结节, 基础体

温双相, 说明有排卵。该患者不孕最可能的原因是子宫内膜异位症。

8.【正确答案】E

【答案解析】腹腔镜是目前国际公认的子宫内膜异位症诊断的最佳方法。

9.【正确答案】C

【答案解析】中、重度子宫内膜异位症的患者血清 CA125 值可能会升高, 但一般均为轻度升高, 多低于 200IU/ml。但 CA125 的特异性均局限, 且与多种疾病有交叉阳性反应, 因此不能单独用作诊断或鉴别诊断。

10.【正确答案】F

【答案解析】子宫内膜异位症的临床表现包括: 痛经、慢性盆腔痛、性交痛、月经异常和不孕。较大的卵巢子宫内膜异位症囊肿在腹部可扪及囊性包块。盆腔检查可发现子宫多后倾固定, 直肠子宫陷凹、宫骶韧带或子宫后壁下段等部位扪及触痛性结节。

11.【正确答案】BCE

【答案解析】子宫内膜异位症导致不孕的因素有: 盆腔解剖结构异常; 盆腹腔内微环境的改变; 免疫功能异常; 卵巢功能异常; 未破裂卵泡黄素化综合征。该患者基础体温双相型, 月经史正常, 证明卵巢功能正常, 并没有出现功能异常。因为题干描述: HSG 示输卵管走行、弥散可, 所以目前还没有导致选项 A 这种情况, 所以不选。

12.【正确答案】CDEFG

【答案解析】子宫内膜异位症的药物治疗包括: 假孕治疗(避孕药、孕激素类药物)、



假绝经治疗(GnRHa、达那唑)其他治疗(孕三烯酮、米非司酮)。

13.【正确答案】 ABCEG

【答案解析】对希望妊娠者，术后不宜应用药物巩固治疗而应行促排卵等治疗，争取尽早妊娠。手术后2年内不能妊娠者，再妊娠的机会甚微。已有报道表明，对子宫内膜异位症导致不孕的患者，经保留生育功能手术后即采用辅助生殖技术，可明显提高妊娠率。

14.【正确答案】 CDF

【答案解析】脑出血：常见于50~60岁，有偏瘫偏身感觉障碍及失语等神经功能缺失；脑肿瘤引起的头痛多缓慢发生，呈进行性加重；脑脓肿：多数病人有近期感染或慢性中耳炎急性发作史，伴发脑膜炎者可有畏寒，发热、头痛、呕吐，意识障碍(嗜睡，谵妄或昏迷)、脑膜刺激征等；急性化脓性脑膜炎常见于儿童，临床上以急性发热、惊厥、意识障碍、颅内压增高和脑膜刺激征阳性以及脑脊液脓性改变为特征。

15.【正确答案】 B

【答案解析】患者神志清楚，脑神经检查正常，考虑急性蛛网膜下腔出血，做头部CT准确率较高。

16.【正确答案】 ABDC

【答案解析】DSA(数字减影技术)可确定动脉瘤位置，为蛛网膜下腔出血病因诊断提供可靠的证据，对确定手术方案有重要价值。凝血、血常规、心电图为常规项目。

17.【正确答案】 F

【答案解析】蛛网膜下腔出血最常见的病因为先天性脑底动脉瘤，其次是脑血管畸形和动脉硬化。少见的病因有脑基底异常血管网膜病，动脉炎、肿瘤破坏血管、血液病等。

18.【正确答案】 BE

【答案解析】患者反复下肢凹陷性水肿，发作性呼吸困难。心悸，剑突下搏动增强，考虑慢性肺源性心脏病。另外患者取下肢凹陷性水肿，右下肢明显，此次出现病情加重。伴胸痛，P₂亢进，需注意下肢静脉血栓脱落导致肺栓塞的可能。

19.【正确答案】 CDEF

【答案解析】为进一步明确肺栓塞的诊断，可行胸部CT增强、核素肺通气/灌注扫描。心脏彩超了解心功能及有无附壁血栓，外周深静脉彩超了解有无深静脉血栓，均可以进一步明确诊断。

20.【正确答案】 CD

【答案解析】活动性出血或近期颅内出血为绝对禁忌证，近期手术、外伤为相对禁忌证。

21.【正确答案】 ACDF

【答案解析】本例考虑哮喘发作，应吸氧、开放液路、吸痰对症处理，应选用β₂受体激动剂雾化吸入缓解症状，查血气分析和电解质明确有无呼吸衰竭及电解质紊乱。

22.【正确答案】 ABD

【答案解析】突发再次呼吸困难，考虑出现气胸或纵膈气肿。也可能因为哮喘发作时气道内的黏稠分泌液形成黏液栓阻塞支气



管而引起狭窄致肺不张。

23.【正确答案】BE

【答案解析】气胸需要立即的处理为穿刺排气或闭式引流排气。

24.【正确答案】ACE

【答案解析】患儿发热、咳嗽、喉鸣、呼吸困难、咽充血入院，考虑是有喉炎合并上感，吸气性喘鸣及三凹征，呼吸音稍粗，所以需要查血常规，做X线排除一下时候有肺炎。有期前收缩，心律失常，需要做心电图。

25.【正确答案】AC

【答案解析】急性感染性喉炎为喉部黏膜急性弥漫性炎症。冬春季节发病较多。常见于婴幼儿。大都为上呼吸道感染的一部分。急性感染性喉炎是指咽部黏膜急性弥漫性炎症。以犬吠样咳嗽、声嘶、喉鸣，吸气性呼吸困难为临床特征。

26.【正确答案】ADEF

【答案解析】保持呼吸道通畅。控制感染，使用肾上腺皮质激素，对症治疗，掌握气管切开术的时机。

1. 保持呼吸道通畅

糖皮质激素超声雾化吸入，促进黏膜水肿消退。

2. 控制感染

及时静脉输入组两抗生素，一般给予青霉素、大环内酯类或头孢菌素类等，严重者予以两种以上抗生素。

3. 糖皮质激素

有抗炎和抑制变态反应等作用，能及时减轻喉头水肿，缓解喉梗阻，可口服泼尼松，

静点地塞米松或氢化可的松。

4. 对症治疗

缺氧者予以吸氧，烦躁不安者可用丙嗪、除镇静外还有减轻喉头水肿的作用，痰多者可止咳去痰，必要时直接喉镜吸痰，不因使用氯丙嗪。

5. 器官切开

经上述处理仍有严重缺氧征或有Ⅲ度以上喉梗阻者，应及时行气管切开术。

27.【正确答案】ABCDEFGJ

【答案解析】患者有不洁性生活史，目前临床表现为高热、休克，阴道分泌物，附件包块，子宫输卵管碘油造影是了解子宫及输卵管腔道内情况，没有意义。宫颈壁光滑，无充血，子宫内膜活检+诊刮和宫颈活检没有意义。

28.【正确答案】ADE

【答案解析】患者B超提示盆腔少量积液，脓性阴道分泌物，血培养报告检出金黄色葡萄球菌(MRSA)，衣原体抗体阳性，淋球菌培养阴性提示急性盆腔炎。肌酐升高提示肾功能不全。

29.【正确答案】ACDFGI

30.【正确答案】BCEGH

31.【正确答案】ACH

【答案解析】右附件粘连严重，需要切除。乳白色脓液需要脓肿切开引流。

32.【正确答案】D

33.【正确答案】C

34.【正确答案】B

【答案解析】小儿细菌性肺炎发热常见，多为持续高热，咳嗽、咳痰甚多，早期为干



咳，渐有咳痰，痰量多少不一。体检患儿呈急性病容，呼吸浅速，部分有鼻翼扇动。常有不同程度的发绀和心动过速。血白细

胞计数和中性粒细胞多有升高。治疗应合理应用抗生素。辅助检查首选胸部 X 线和痰培养。