



- C. 胆生成胆汁
D. 胆主决断
E. 胆为中正之官
9. 肝病常表现为肝气升动太过的病理变化, 包括
A. 肝气上逆
B. 肝火上炎
C. 肝阳上亢
D. 肝风内动
E. 以上均是
10. 构成人体和维持人体生命活动的最基本的物质是
A. 精
B. 气
C. 神
D. 血
E. 津液
11. 与津液的输布关系密切的脏腑为
A. 脾、肺、肾、肝、三焦
B. 心、肺、肾、肝、三焦
C. 脾、心、肾、肝、三焦
D. 脾、肺、肾、小肠、三焦
E. 大肠、肺、肾、小肠、三焦
12. 具有“结、聚、散、络”作用的经脉为
A. 经筋
B. 皮部
C. 十二经别
D. 别络
E. 冲脉
13. 下列哪项不是六淫共同的致病特点
A. 外感性
B. 相兼性
C. 转化性
D. 季节性
E. 传染性
14. 疾病发生的内在因素是
A. 邪气亢盛
B. 正气旺盛
C. 正气不足
D. 邪气损正
E. 正气抗邪
15. 大出血的病人常表现为语音低微, 呼吸无力, 体现了
A. 气血两虚
B. 气随血脱
C. 气不摄血
D. 气虚血瘀
E. 气滞血瘀
16. 与血液的生成和运行密切联系的脏腑是
A. 心与脾
B. 心与肺
C. 心与肝
D. 肝与脾
E. 脾与肺
17. 《素问·阴阳应象大论》中“求于本”的“本”是指
A. 病因
B. 病机
C. 病性
D. 阴阳
E. 寒热
18. 《灵枢·邪客》有关宗气、营气、卫气的



循行及作用的论述不正确的是

- A. 宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸
- B. 营气泌其津液，注之于脉，化以为血，以荣四末
- C. 卫气出其悍气之慄疾，而先行于四末分肉皮肤之间
- D. 卫气常从足太阴之分间，行于五脏六腑
- E. 卫气昼日行于阳，夜行于阴

19.《素问·热论》“其未过三日者”说明邪仍在三阳之表，采用

- A. 汗法
- B. 和法
- C. 消法
- D. 下法
- E. 补法

20. 下列不属于逆治法的是

- A. 热者寒之
- B. 坚者削之
- C. 燥者濡之
- D. 逸者行之
- E. 塞因塞用

21. 太阳中风表虚证，其发热的特点是

- A. 潮热
- B. 翕翕发热
- C. 燥热
- D. 身大热
- E. 蒸蒸发热

22. “伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者”，宜选用的方剂是

- A. 小承气汤
- B. 调胃承气汤

C. 白虎加人参汤

- D. 桂枝汤
- E. 小建中汤

23.《伤寒论》中体现“治未病”预防治疗学思想的证治是

- A. 真武汤证
- B. 四逆散证
- C. 四逆汤证
- D. 小柴胡汤证
- E. 桂枝汤证

24. 炙甘草汤治疗

- A. 心阳虚证
- B. 心阴虚证
- C. 心血虚证
- D. 心气虚证
- E. 心阴阳两虚证

25. 瓜蒌桂枝汤中瓜蒌根的用意为

- A. 疏散风邪
- B. 调和营卫
- C. 宣肺利气
- D. 酸甘柔筋，缓急止痛
- E. 生津滋液，柔润筋脉

26. 下列关于酸枣仁汤的病机叙述正确的是

- A. 肺肾阴虚
- B. 脾胃不和
- C. 心肾不交，水火不济
- D. 脾虚生痰，痰浊内扰
- E. 肝阴不足，心血亏虚

27. 下列属于茵陈五苓散证候表现的是

- A. 全身发黄
- B. 食少脘痞



- C. 身重便溏
D. 小便不利
E. 以上都是
28. 下列各项中，治疗妇人冲任虚寒夹有瘀血所致崩漏的代表方剂是
A. 温经汤
B. 生化汤
C. 桂枝茯苓丸
D. 当归补血汤
E. 当归芍药散
29. 下列属于湿温病湿热酿痰、蒙蔽心包表现特点的是
A. 清醒时也表情淡漠
B. 神识似清似昧
C. 严重时谵语胡言
D. 反应迟钝
E. 以上都是
30. 证见身热汗出口渴，面赤耳聋，眩晕，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红，苔黄滑，脉滑数，为
A. 湿热中阻
B. 湿热蕴毒
C. 暑湿郁阻少阳
D. 暑湿弥漫三焦
E. 湿热酿痰，蒙蔽心包
31. 温毒类温病的多发季节是
A. 春夏
B. 春秋
C. 夏秋
D. 冬春
E. 冬夏
32. 下列除哪项外均是道地药材
A. 甘肃的当归
B. 青海的大黄
C. 浙江的枸杞
D. 云南的三七
E. 四川的黄连
33. 炮制的目的为
A. 纯净药材，保证质量，分拣药物，区分等级
B. 干燥药材，利于贮藏
C. 降低毒副作用，保证安全用药
D. 改变药物性能，扩大应用范围
E. 以上都是
34. 在“十八反”中，除哪味药物外均与乌头相反
A. 玄参
B. 白及
C. 贝母
D. 瓜蒌
E. 半夏
35. 影响用药剂量的因素包括
A. 剂型
B. 配伍
C. 体质
D. 季节
E. 以上都是
36. 下列药物中可用于治疗巅顶头痛的是
A. 藁本
B. 防风
C. 细辛
D. 辛夷
E. 荆芥



37. 既能够治疗痢疾，又可截疟的药物是
- A. 青蒿
B. 白头翁
C. 鸦胆子
D. 马齿苋
E. 黄连
38. 功效清热解毒，可以治疗痈肿疮毒，咽喉肿痛，虫蛇咬伤和各种癌症的是
- A. 白花蛇舌草
B. 山慈菇
C. 败酱草
D. 半枝莲
E. 鸦胆子
39. 下列除哪味药外，均能利咽消肿
- A. 马勃
B. 山豆根
C. 板蓝根
D. 射干
E. 苦参
40. 治疗肠痛的要药为
- A. 鱼腥草
B. 金荞麦
C. 大血藤
D. 败酱草
E. 苦参
41. 下列各项中，不属于大黄功效的是
- A. 泻下攻积
B. 清热泻火
C. 凉血解毒
D. 逐瘀通经
E. 软坚散结
42. 既可以祛风止痛，又可以治疗跌打损伤、牙痛的药物是
- A. 防己
B. 寻骨风
C. 蚕砂
D. 乌梢蛇
E. 松节
43. 治疗风湿痹痛，兼有肝肾不足的最佳选药是
- A. 羌活
B. 独活
C. 桑寄生
D. 威灵仙
E. 秦艽
44. 性微温而善于芳香化湿的药物是
- A. 香薷
B. 佩兰
C. 砂仁
D. 豆蔻
E. 藿香
45. 车前子入汤剂时，其用法是
- A. 先煎
B. 后下
C. 另煎
D. 烱化
E. 包煎
46. 吴茱萸的功效是
- A. 散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻
B. 祛风止痛，温肺化饮，助阳止泻
C. 回阳救逆，温肾助阳，降逆止呕
D. 温中止痛，祛风杀虫，降逆止呕
E. 温中降逆，理气和胃，助阳止泻



47. 既能行气止痛，又能杀虫疗癣的药物是

- A. 川楝子
- B. 木香
- C. 佛手
- D. 沉香
- E. 香附

48. 既能消食化积，又能行气散瘀的药物是

- A. 神曲
- B. 山楂
- C. 木香
- D. 鸡内金
- E. 枳实

49. 槟榔的功效为

- A. 杀虫消积，行气，止咳化痰
- B. 杀虫消积，止咳，利水，截疟
- C. 杀虫消积，行气，利水，截疟
- D. 杀虫，疗癣
- E. 杀虫消积

50. 具有止血不留瘀，化瘀不伤正特点的药物是

- A. 茜草
- B. 大蓟
- C. 蒲黄
- D. 三七
- E. 白及

51. 既能活血调经，祛瘀止痛，又能凉血消痈，除烦安神的药物是

- A. 丹参
- B. 郁金
- C. 五灵脂
- D. 红花
- E. 桃仁

52. 与乌头相反的药物是

- A. 贝母
- B. 海藻
- C. 天南星
- D. 礞石
- E. 昆布

53. 具有养心益肝，安神，敛汗功效的药物是

- A. 酸枣仁
- B. 莲子
- C. 远志
- D. 合欢皮
- E. 首乌藤

54. 具有开窍醒神，活血通经，消肿止痛作用的药物是

- A. 苏合香
- B. 麝香
- C. 牛黄
- D. 远志
- E. 皂荚

55. 人参入汤剂的用法是

- A. 先煎
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 另煎
- E. 泡服

56. 具有补气养阴，清热生津作用的药物是

- A. 玄参
- B. 苦参
- C. 丹参
- D. 太子参
- E. 西洋参



57. 具有补中益气，养血安神的补气药是
- A. 甘草
 - B. 大枣
 - C. 白术
 - D. 饴糖
 - E. 蜂蜜
58. 麻黄根和浮小麦共同的功效是
- A. 止汗
 - B. 止泻
 - C. 止痛
 - D. 止血
 - E. 止遗
59. 外用杀虫止痒，内服壮阳通便的药物是
- A. 雄黄
 - B. 硫黄
 - C. 杜仲
 - D. 巴戟天
 - E. 蛇床子
60. 外用清热解毒，内服具有清肺化痰功效的药物是
- A. 炉甘石
 - B. 升药
 - C. 硼砂
 - D. 砒石
 - E. 蜂房
61. 下列病证中不宜使用下法治疗的是
- A. 宿食
 - B. 结痰
 - C. 虫积
 - D. 瘀血
 - E. 痞块
62. 加减葳蕤汤的功用是
- A. 发汗解表
 - B. 滋阴解表
 - C. 清热解表
 - D. 助阳解表
 - E. 益气解表
63. 功用为攻下热结、补气养血的方剂是
- A. 麻子仁丸
 - B. 温脾汤
 - C. 济川煎
 - D. 黄龙汤
 - E. 十枣汤
64. 温脾汤中大黄配附子意在
- A. 温阳祛寒，攻下冷积
 - B. 攻润相合，下不伤正
 - C. 益气养血，下不伤正
 - D. 泻结泄热，温中散寒
 - E. 泻热逐瘀，下不伤正
65. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方组成中均含有的药物是
- A. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
 - B. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣
 - C. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
 - D. 柴胡、人参、黄芩、生姜、甘草
 - E. 半夏、黄芩、人参、炙甘草、大枣
66. 症见“壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力”，治疗宜用的方剂是
- A. 竹叶石膏汤
 - B. 白虎汤
 - C. 黄连解毒汤
 - D. 清瘟败毒饮
 - E. 清营汤



67. 香薷散的功用是
- A. 祛湿化浊，理气宽中
 - B. 散寒解表，化湿和中
 - C. 解表散寒，理气和中
 - D. 祛暑解表，化湿和中
 - E. 祛暑解表，清热化湿
68. 四逆汤与四逆散二方组成中均含有的药物是
- A. 柴胡
 - B. 芍药
 - C. 炙甘草
 - D. 枳实
 - E. 干姜
69. 从组成药物来看，小建中汤即桂枝汤
- A. 倍甘草加饴糖
 - B. 去芍药加饴糖
 - C. 倍甘草与芍药
 - D. 去芍药倍甘草
 - E. 倍芍药加饴糖
70. 参苓白术散的功用是
- A. 健脾益气，升阳举陷
 - B. 健脾养胃，理气化痰
 - C. 健脾益气，和中养胃
 - D. 健脾益气，渗湿止泻
 - E. 健脾助运，养胃渗湿
71. 六味地黄丸和大补阴丸两方组成中均不含有的药物是
- A. 泽泻、茯苓
 - B. 知母、黄柏
 - C. 生地黄、怀牛膝
 - D. 牡丹皮、山茱萸
 - E. 炙龟板、熟地黄
72. 固冲汤的功用是
- A. 益气健脾，固冲摄血
 - B. 益气滋阴，化瘀止血
 - C. 滋阴清热，止血固经
 - D. 温补肝肾，固冲止血
 - E. 降火坚阴，止血固经
73. 酸枣仁汤的组成药物中含有
- A. 远志
 - B. 知母
 - C. 茯神
 - D. 柏子仁
 - E. 龙眼肉
74. 苏合香丸主治
- A. 温热病
 - B. 痰热内闭心包证
 - C. 邪热内陷心包证
 - D. 热闭证
 - E. 寒闭证
75. 定喘汤的组成药物中不包括
- A. 杏仁、法半夏
 - B. 苏子、款冬花
 - C. 桑叶、桔梗
 - D. 黄芩、桑白皮
 - E. 甘草、白果
76. 补阳还五汤黄芪的配伍意义是
- A. 补气升阳
 - B. 补气生血
 - C. 补气利水
 - D. 补气固表
 - E. 补气行血
77. 防己黄芪汤中黄芪的主要作用是



- A. 益气利水
- B. 固表止汗
- C. 祛风行水
- D. 实卫御风
- E. 健脾升阳

78. 清气化痰丸的君药为

- A. 杏仁
- B. 半夏
- C. 胆南星
- D. 陈皮
- E. 瓜蒌仁

79. 健脾丸主治

- A. 寒湿食积证
- B. 湿热食积证
- C. 脾虚食积证
- D. 肝郁食积证
- E. 以上都不对

80. 乌梅丸的组成药物中含有

- A. 黄芪、黄连
- B. 黄芩、黄连
- C. 黄芪、黄柏
- D. 黄连、黄柏
- E. 黄芩、黄柏

81. 下列各项中，不属于独活寄生汤组成药

物的是

- A. 杜仲、牛膝、肉桂
- B. 白术、羌活、苍术
- C. 细辛、防风、秦艽
- D. 川芎、当归、干地黄
- E. 人参、芍药、甘草

82. 猪苓汤与五苓散二方的组成药物中均含有

- A. 白术、茯苓
- B. 泽泻、猪苓
- C. 滑石、甘草
- D. 茯苓、桂枝
- E. 滑石、阿胶

83. 羌活胜湿汤的组成药物中不包括

- A. 川芎
- B. 防风
- C. 白芷
- D. 藁本
- E. 蔓荆子

84. 消风散的佐药是

- A. 荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子
- B. 当归、胡麻仁、生地黄
- C. 石膏、知母、苍术
- D. 苦参、苍术、木通
- E. 荆芥、防风、苦参、苍术

二、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

(85~86题共用备选答案)

- A. 阴偏衰
- B. 阳偏衰

- C. 阴偏盛
- D. 阳偏盛
- E. 阴阳两虚



85. “阴病治阳”的病理基础是
86. “阳病治阴”的病理基础是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 泻白散
B. 凉膈散
C. 芍药汤
D. 清胃散
E. 龙胆泻肝汤
87. 组成药物中含有生地、当归、丹皮、黄连、升麻的方剂是
88. 组成药物中含有栀子、泽泻、黄芩、生地、当归的方剂是

(89~90 题共用备选答案)

- A. 血虚寒厥证
B. 心肾阳衰之寒厥证
C. 真阳衰微证
D. 心肾阴衰之寒厥证
E. 阳郁厥逆证
89. 四逆汤主治
90. 回阳救急汤主治

(91~92 题共用备选答案)

- A. 人参
B. 黄芪
C. 当归
D. 麦冬
E. 防风
91. 生脉散的君药是
92. 玉屏风散的君药是

(93~94 题共用备选答案)

- A. 固冲汤

- B. 四物汤
C. 固经丸
D. 当归补血汤
E. 补中益气汤
93. 治疗脾肾亏虚，冲脉不固之崩漏的方剂是
94. 治疗阴虚血热之崩漏的方剂是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 滋阴养血，补心安神
B. 补肾宁心，益智安神
C. 镇心安神，清热养血
D. 养心安神，和中缓急
E. 养血安神，清热除烦
95. 朱砂安神丸的功用是
96. 酸枣仁汤的功用是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 丹参饮
B. 温经汤
C. 生化汤
D. 失笑散
E. 桂枝茯苓丸
97. 具有养血祛瘀，温经止痛功用的方剂是
98. 具有活血祛瘀，散结止痛功用的方剂是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 宣畅气机，清利湿热
B. 清热化湿，理气和中
C. 清热泻火，利水通淋
D. 利湿化浊，清热解毒
E. 利水渗湿，温阳化气
99. 八正散的功用为
100. 三仁汤的功用为



2022 年中医内科主治医师《相关专业》 模拟试卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 白昼视力正常，每至黄昏视物不清的症状称之为
A. 目昏
B. 雀盲
C. 歧视
D. 目眩
E. 目痛
2. 长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症状表现的发热属于
A. 气虚发热
B. 血虚发热
C. 阴虚发热
D. 气郁发热
E. 小儿夏季热
3. 病人自觉怕冷，多加衣被或近火取暖而能缓解者称为
A. 恶风
B. 恶寒
C. 畏寒
D. 畏风
E. 恶热
4. 满面通红者多属于
A. 阴虚火旺
B. 虚阳上越
C. 外感发热
D. 真寒假热
E. 阳气暴脱
5. 痰白滑而量多，易咯出者属于
A. 寒痰
B. 燥痰
C. 湿痰
D. 热痰
E. 肺痈
6. 循衣摸床，撮空理线是指
A. 手足筋肉挛急不舒，屈伸不利
B. 双手或下肢颤抖，或振摇不定，不能自主
C. 手足时时掣动，动作弛缓无力，如虫之蠕行
D. 热病中，神志不清，昏迷，手足躁动不宁
E. 重病神志不清，病人不自主地伸手抚摸衣被、床沿，或伸手向空，手指时分时合
7. 舌诊的临床意义是
A. 判断邪正盛衰
B. 区别病邪性质



- C. 辨别病位浅深
D. 推断病势进退
E. 以上都是
8. 舌红而点刺色鲜红者多为
A. 气分热盛
B. 热入营血
C. 血热内盛
D. 心火亢盛
E. 肝胆火盛
9. 舌紫红而干枯少津多为
A. 热盛伤津
B. 寒凝血瘀
C. 肝郁血瘀
D. 阴虚火旺
E. 温病热入营血
10. 症状表现为神识不清，语无伦次，声高有力属于
A. 错语
B. 狂言
C. 郑声
D. 谵语
E. 独语
11. 病室中有尸臭气味多为
A. 患者失血
B. 瘟疫发作
C. 脏腑衰败
D. 肾衰
E. 消渴病重
12. 主痰湿常见的脉象是
A. 牢脉
B. 革脉
C. 弦脉
D. 滑脉
E. 代脉
13. 寸口分候脏腑中，左关候
A. 心
B. 肺
C. 肾
D. 肝胆
E. 脾胃
14. 脉在皮肤，头定而尾摇，似有似无，如鱼在水中游动称为
A. 釜沸脉
B. 虾游脉
C. 鱼翔脉
D. 雀啄脉
E. 屋漏脉
15. 按腧穴中，诊断心病常用的腧穴是
A. 日月、胆俞
B. 期门、肝俞、太冲
C. 巨阙、膻中、大陵
D. 章门、太白、脾俞
E. 中府、肺俞、太渊
16. 虚里按之，其动微弱者多属于
A. 宗气内虚
B. 心阳不足
C. 心肺气绝
D. 宗气不守
E. 外感热邪
17. 阴证的临床表现为
A. 肌肤灼热
B. 烦躁不安



- C. 呼吸气粗
D. 身重踈卧
E. 口干渴饮
18. 真寒假热证产生的机理是
A. 阴盛格阳
B. 阳盛格阴
C. 阴不敛阳
D. 阳不敛阴
E. 表热里寒
19. 症见气短声低，少气懒言，精神疲惫，体倦乏力，舌质淡嫩，脉虚，此属于
A. 气虚证
B. 气陷证
C. 气脱证
D. 阳虚证
E. 气滞证
20. 以身热口渴、斑疹吐衄、烦躁谵语、舌绛、脉数为主要表现的证候是
A. 血热证
B. 血瘀证
C. 血寒证
D. 血虚证
E. 血脱证
21. 以下哪项不是湿淫证的证候表现
A. 头重如裹
B. 气短神疲
C. 胸脘痞闷
D. 纳呆恶心
E. 口腻不渴
22. 肝火炽盛与肝阳上亢证的共同点中应除外下列哪项
A. 头晕胀痛
B. 面红目赤
C. 急躁易怒
D. 失眠耳鸣
E. 脉弦细数
23. 脾气虚、脾虚气陷、脾不统血证的共同症状是
A. 纳差乏力
B. 久泻不止
C. 畏寒肢冷
D. 头晕目眩
E. 月经过多
24. 痰阻心脉的疼痛特点表现为
A. 刺痛
B. 闷痛
C. 胀痛
D. 冷痛
E. 空痛
25. 太阳中风证的辨证要点为
A. 恶风、汗出、脉浮缓
B. 恶寒、无汗、头身痛、脉浮紧
C. 少腹急结、小便自利、大便色黑
D. 大热、大汗、大渴、脉洪大
E. 畏寒肢厥、下利清谷、脉微细
26. 下列哪项不属于上焦病证
A. 汗出
B. 咳嗽
C. 口渴
D. 耳聋
E. 头痛
27. 以下属于抽搐的病史及发病年龄的问诊



内容的是

- A. 出生史
- B. 发育史
- C. 颅脑疾病史
- D. 长期服药史
- E. 以上都是

28. 肺性发绀常见于

- A. 肺炎
- B. 肺气肿
- C. 胸腔积液
- D. 气管阻塞
- E. 以上都是

29. 关于腹痛部位, 下列叙述正确的是

- A. 胃、十二指肠溃疡疼痛多在脐周
- B. 急性阑尾炎疼痛在右下腹麦氏点
- C. 小肠疾病疼痛多在右上腹
- D. 胆囊炎疼痛多在左上腹
- E. 肝脓肿疼痛多在中下腹

30. 下列关于癔症性呼吸困难的说法错误的是

- A. 呼吸缓慢
- B. 呼吸表浅
- C. 过度换气
- D. 可发生呼吸性碱中毒
- E. 经暗示治疗可缓解

31. 下列不属于既往史的是

- A. 冶游史
- B. 手术史
- C. 预防接种史
- D. 传染病史
- E. 过敏史

32. 关于语颤的描述, 下列不正确的是

- A. 发音强、音调低、胸壁薄者语颤强
- B. 左胸上部较右胸上部强
- C. 前胸上部较下部强
- D. 后胸下部较上部强
- E. 男性较女性强

33. 肝脏进行性肿大, 质地坚硬如前额, 多见于

- A. 肝炎
- B. 肝脓肿
- C. 肝癌
- D. 脂肪肝
- E. 血吸虫病

34. 上腔静脉阻塞时, 腹壁静脉曲张的血流方向为

- A. 脐上脐下均向上
- B. 脐上脐下均向下
- C. 脐上向上、脐下向下
- D. 脐上向下、脐下向上
- E. 以上均非

35. 脊柱后凸多发生于

- A. 颈段脊柱
- B. 胸段脊柱
- C. 腰段脊柱
- D. 骶段脊柱
- E. 腰段及骶段脊柱

36. 可以使气管移向健侧的疾病为

- A. 一侧肺不张
- B. 一侧肺硬化
- C. 胸膜粘连
- D. 胸腔积液
- E. 肺气肿



37. 关于扁桃体肿大,叙述正确的是
- A. I度肿大为刚超过咽腭弓
 - B. II度肿大为达到中线
 - C. 超过咽腭弓而未达到中线是III度肿大
 - D. 扁桃体肿大共分IV度
 - E. 达到并超过中线为扁桃体III度肿大
38. 可使二尖瓣狭窄的杂音更为清晰的情况是
- A. 坐位稍向前倾
 - B. 左侧卧位
 - C. 右侧卧位
 - D. 用力按压听诊器时
 - E. 屏住呼吸后
39. 高钾血症见于
- A. 肺心病
 - B. 呼吸性酸中毒
 - C. 代谢性酸中毒
 - D. 代谢性碱中毒
 - E. 以上均不是
40. 关于尿胆红素测定,下列叙述正确的是
- A. 正常可出现阳性反应
 - B. 肝细胞性黄疸时,尿胆红素为阳性
 - C. 阻塞性黄疸时,尿胆红素阴性
 - D. 溶血性黄疸时,尿胆红素明显增加
 - E. 严重肾损伤时,尿胆红素明显增加
41. 正常成人的腹腔液
- A. <10ml
 - B. <20ml
 - C. <30ml
 - D. <40ml
 - E. <50ml
42. 可用于鉴别原发性与转移性肝癌的是
- A. 抗核抗体测定
 - B. 肥达反应检测
 - C. 癌胚抗原检测
 - D. C反应蛋白测定
 - E. 循环免疫复合物测定
43. 房性期前收缩的心电图表现为
- A. QRS时限常 $\geq 0.12s$
 - B. 发作时S-T段下移
 - C. P波在I、II、aVF、 $V_3 \sim V_6$ 导联直立
 - D. P'-R间期 $\geq 0.12s$
 - E. 出现逆行P'波
44. 关于左室肥大,以下正确的是
- A. $R_{V_5} + S_{V_1} > 3.5mV$ (女)或 $> 4.0mV$ (男)
 - B. $R_{V_5} + S_{V_1} = 3.5mV$
 - C. $R_{V_5} + S_{V_1} > 5.0mV$
 - D. $R_{V_5} + S_{V_1} > 5.5mV$
 - E. $R_{V_5} > 1.5mV$
45. 四种基础肺容量不包括
- A. 肺活量
 - B. 肺总量
 - C. 深吸气量
 - D. 深呼气量
 - E. 功能残气量
46. 属于下消化道内镜检查适应证的是
- A. 原因不明的腹泻
 - B. 肠道炎性疾病的诊断
 - C. 结肠癌肿的术前诊断
 - D. 需做结肠息肉摘除术者
 - E. 以上都是
47. 超声诊断可用来帮助判断以下何脏器的



病变

- A. 肝
- B. 肾
- C. 脾
- D. 胰腺
- E. 以上都是

48. 地方性缺碘性甲状腺肿可见

- A. 吸¹³¹碘率增高, 吸¹³¹碘高峰前移
- B. 吸¹³¹碘率增高, 吸¹³¹碘高峰后移
- C. 吸¹³¹碘率增高, 吸¹³¹碘高峰不变
- D. 吸¹³¹碘率降低, 吸¹³¹碘高峰后移
- E. 吸¹³¹碘率降低, 吸¹³¹碘高峰前移

49. 包裹性胸腔积液 X 线表现为

- A. 胸腔顶部和外侧高度透亮
- B. 胸壁可见密度增高或条状阴影
- C. 气管纵隔移向健侧
- D. 圆形或半圆形密度均匀影, 边缘清晰
- E. 肋膈角变钝或消失

50. 高血压性心脏病的心脏形状是

- A. 二尖瓣型
- B. 靴形
- C. 梨形
- D. 普大形
- E. 以上都不是

51. 保护易感人群的主要措施为

- A. 及早报告
- B. 切断传播途径
- C. 提高人体免疫力
- D. 隔离患者
- E. 管理病原体携带者

52. 细菌性痢疾的病原体属于

- A. 志贺菌属
- B. 沙门菌属
- C. 弧菌属
- D. 弯曲菌属
- E. 螺旋菌属

53. 肾综合征出血热的三痛是

- A. 头痛、关节痛和腰痛
- B. 头痛、腓肠肌痛和腰痛
- C. 头痛、胸痛和腰痛
- D. 头痛、腰痛和眼眶痛
- E. 头痛、腹痛和腰痛

54. 伤寒的传染源是

- A. 患者
- B. 蚊虫
- C. 猪
- D. 狗
- E. 鼠

55. 隔离的种类不包括

- A. 呼吸道隔离
- B. 消化道隔离
- C. 水源隔离
- D. 接触隔离
- E. 严密隔离

56. 病人角色的特点不包括

- A. 有寻求医疗帮助的责任
- B. 有恢复健康的责任
- C. 有接受帮助的义务
- D. 减免平日“正常”的社会责任
- E. 提供诊疗信息

57. 职业群体实现心理健康的途径不包括

- A. 提高职业满意度



- B. 优化工作环境
C. 促进人际关系和谐
D. 劳动组织合理化
E. 遵守职业道德
58. 人格障碍的分型不包括
A. 偏执型人格障碍
B. 强迫型人格障碍
C. 冲动型人格障碍
D. 表演型人格障碍
E. 抑郁型人格障碍
59. 下列不属于中国医德道德规范的是
A. 平等待人，一视同仁
B. 治学态度，至精至微
C. 服务态度，一心赴救
D. 医疗作风，端正淳良
E. 对待同道，谦和谨慎
60. 患者有权获悉与自己疾病诊治相关的一切信息，并根据自己的利益做出选择体现的是患者道德权利中的哪一项
A. 自主权
B. 平等医疗权
C. 知情同意权
D. 保密和隐私权
E. 以上都不是
61. 下列关于心身疾病的表述，最恰当的是
A. 主要由心理社会因素引起的器官系统的器质性改变
B. 主要由心理社会因素引起的精神疾病
C. 主要由心理社会因素引起的躯体疾病
D. 主要由心理社会因素引起的功能性改变
E. 主要由心理社会因素引起的生理反应
62. 心理障碍的判断标准不包括
A. 社会适应的标准
B. 统计学标准
C. 医学标准
D. 行为标准
E. 内省的经验标准
63. 心理健康是指
A. 积极的、有效的心理活动
B. 良好的适应能力
C. 平稳的、正常的心理状态
D. 健全的人格
E. 以上都是
64. 人们在长期社会生活中形成的稳定的、习以为常的行为倾向和行为规范属于哪种医德评价方式
A. 社会舆论
B. 内心信念
C. 传统习俗
D. 科学观点
E. 客观舆论
65. 下列关于医德修养的含义叙述错误的是
A. 医德认识的提高
B. 医德感情的丰富
C. 医德意志的形成
D. 医德思想的创新
E. 医德行为和习惯的养成
66. 下列属于行政处罚的是
A. 记过
B. 降级
C. 撤职
D. 留用察看
E. 吊销许可证



67. 下列各项中属于二级医疗事故的是
- A. 造成患者死亡、重度残疾
 - B. 造成患者明显人身损害的其他后果
 - C. 造成患者重度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍
 - D. 造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍
 - E. 造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致

一般功能障碍

68. 下列关于违反卫生法有关罪名正确的是
- A. 医疗事故罪
 - B. 非法行医罪
 - C. 生产、销售假药、劣药罪
 - D. 生产、销售不符合卫生标准食品的犯罪
 - E. 以上都是

二、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

(69~70 题共用备选答案)

- A. 气虚发热
 - B. 血虚发热
 - C. 阴虚发热
 - D. 气郁发热
 - E. 小儿夏季热
69. 时有低热，兼见面白、头晕、舌淡脉细等表现特点的发热属于
70. 由于气阴不足，不能适应夏令炎热气候所导致的发热属于

- C. 肾、脾
- D. 肝、胆
- E. 膀胱、小肠

73. 舌中多反映的是何脏腑的病变
74. 舌两侧多反映的是何脏腑的病变

(75~76 题共用备选答案)

- A. 短气
 - B. 夺气
 - C. 少气
 - D. 喘
 - E. 哮
75. 呼吸急迫困难，张口抬肩，难以平卧的是
76. 呼吸急促困难，喉中痰鸣的是

(71~72 题共用备选答案)

- A. 青色、赤色
 - B. 青色、黑色
 - C. 黄色、黑色
 - D. 赤色、黑色
 - E. 赤色、白色
71. 主瘀血症的面色为
72. 主水湿内停证的面色为

(77~78 题共用备选答案)

- A. 脉细如线，应指显然
 - B. 脉浮细而软，轻取即得
 - C. 脉极沉细而软，重按乃得
 - D. 脉极细极软，似有若无
 - E. 脉律不齐，浮散无根
77. 微脉的脉象特征是
78. 弱脉的脉象特征是

(73~74 题共用备选答案)

- A. 心、肺
- B. 脾、胃



(79~80 题共用备选答案)

- A. 真热假寒证
 - B. 真寒假热证
 - C. 表热里寒证
 - D. 表热证
 - E. 里热证
79. 身热，初按热甚，久按热反轻者是
80. 身灼热而肢厥者是

(81~82 题共用备选答案)

- A. 咳嗽痰稀色白
 - B. 咳嗽痰黄黏稠
 - C. 咳嗽痰少黏稠
 - D. 咳嗽痰中带血
 - E. 咳嗽咯脓血腥臭痰
81. 寒痰阻肺证可见
82. 燥邪犯肺证可见

(83~84 题共用备选答案)

- A. 狂犬病
 - B. 颅内高压
 - C. 癫痫大发作
 - D. 高血压脑病
 - E. 各种脑膜炎
83. 抽搐伴脑膜刺激征见于
84. 抽搐不伴意识丧失见于

(85~86 题共用备选答案)

- A. 卧位
 - B. 立位
 - C. 前倾位
 - D. 俯卧位
 - E. 左侧卧位
85. 可以使反流性食管炎的腹痛减轻的体位是
86. 可以使胰腺癌患者疼痛明显的体位是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 呼吸过缓
 - B. 呼吸过速
 - C. Kussmaul 呼吸
 - D. 呼气延长
 - E. 潮式呼吸
87. 甲状腺功能亢进症为
88. 吗啡中毒为

(89~90 题共用备选答案)

- A. 脐上脐下均向上
 - B. 脐上脐下均向下
 - C. 脐上脐下纵横交错
 - D. 脐上向下、脐下向上
 - E. 以脐为中心向四周放射
89. 门静脉高压时，腹壁静脉曲张的血流方向为
90. 下腔静脉阻塞时，腹壁静脉曲张的血流方向为

(91~92 题共用备选答案)

- A. 肺癌
 - B. 多发性骨髓瘤
 - C. 急性肾衰竭
 - D. 大量应用维生素 D
 - E. 大量饮用高钙牛奶
91. 由于排出减少引起的高钙血症是
92. 由于摄入过多导致的高钙血症是

(93~94 题共用备选答案)

- A. 正极接左上肢，负极接右上肢
 - B. 正极接左下肢，负极接右上肢
 - C. 正极接左下肢，负极接左上肢
 - D. 正极接左上肢，负极接右下肢
 - E. 正极接左下肢，负极接右下肢
93. I 导联是指



94. II 导联是指

(95~96 题共用备选答案)

- A. 不规则斑点状或片状高密度出血灶影
- B. 呈三角形或扇形，边界不清
- C. 呈圆形、椭圆形或不规则形均匀密度增高影
- D. 有不同程度的脑萎缩
- E. 典型者可见小片状密度减低影，边缘模糊

95. 腔隙性脑梗死 CT 可见

96. 出血性脑梗死 CT 可见

(97~98 题共用备选答案)

- A. 银翘散
- B. 桑杏汤

C. 白虎汤

D. 葛根芩连汤

E. 麻杏石甘汤

97. 治疗肺热壅盛型流感首选

98. 治疗热灼肺胃型流感首选

(99~100 题共用备选答案)

A. 环境性应激源

B. 躯体性应激源

C. 社会性应激源

D. 心理性应激源

E. 生活性应激源

99. 生活事件、日常困扰属于

100. 生物学刺激物属于



2022 年中医内科主治医师《专业知识》模拟试卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 在一个时期引起广泛流行，证候多相类
似的感冒，称为
A. 时行感冒
B. 重伤风
C. 伤风
D. 冒风
E. 冒寒
2. 下列选项中，不属外感与内伤咳嗽鉴别
要点的是
A. 属实属虚的不同
B. 咳痰的多少
C. 感邪的不同
D. 起病的缓急
E. 病程的长短
3. 哮喘的治疗原则是
A. 补肾化痰，平喘止咳
B. 化痰平喘，平喘止咳
C. 祛邪化痰，平喘止咳
D. 扶正固本，平喘止咳
E. 发时治标，平时治本
4. 下列各项，不属肺痈成痈期主症的是
A. 咳吐脓血腥臭痰
B. 舌苔黄腻脉滑数
C. 胸部疼痛
D. 寒战壮热
E. 咳嗽气急
5. 下列各项，不属肺胀特点的是
A. 传染性
B. 病久累及多脏器
C. 病程长
D. 时轻时重
E. 反复性
6. 首次提出“惊悸”病名的医家是
A. 朱丹溪
B. 孙思邈
C. 张仲景
D. 巢元方
E. 张景岳
7. 关于血府逐瘀汤治疗胸痹的记载，出于
A. 《伤寒论》
B. 《金匱要略》
C. 《景岳全书》
D. 《医林改错》
E. 《证治准绳》
8. 下列各项，不属痴呆病因的是
A. 饮食不节
B. 外感时邪



- C. 年迈体虚
D. 情志所伤
E. 久病耗损
9. 下列各项, 不属血厥实证的特点的是
A. 面赤唇紫
B. 目陷口张
C. 舌质黯红
D. 突然昏仆
E. 脉弦有力
10. 目前认为哪种细菌是慢性胃炎的一个重要原因
A. 大肠杆菌
B. 链球菌
C. 绿脓杆菌
D. 金黄色葡萄球菌
E. 幽门螺杆菌
11. 下列除哪项外, 均是胃火上逆型呃逆的主症
A. 呃逆连声, 胸胁胀闷
B. 呃声洪亮, 冲逆而出
C. 口臭烦渴, 多喜冷饮
D. 小便短赤, 大便秘结
E. 舌苔黄燥, 脉滑数
12. 大腹痛者, 多属
A. 厥阴肝经病证
B. 膀胱病证
C. 脾胃病证
D. 虫病
E. 肠痈
13. 治疗久泻, 不宜过用
A. 分利
B. 健脾
C. 补肾
D. 升提
E. 固涩
14. 下列哪项不是痢疾与泄泻的鉴别要点
A. 里急后重
B. 大便纯为白冻
C. 排便次数增多
D. 脓血便
E. 腹痛肠鸣
15. 下列哪一项不是肝胆湿热胁痛的特点
A. 胁肋灼热胀痛
B. 口苦口黏
C. 小便黄赤
D. 舌红少苔
E. 脉弦滑数
16. 下列哪些不是血鼓的特征
A. 脘腹坚满
B. 青筋显露
C. 痛如针刺
D. 面颈部赤丝血缕
E. 腹膨大如蛙腹
17. 外感头痛的致病因素以何为主
A. 风邪
B. 寒邪
C. 湿邪
D. 热邪
E. 燥邪
18. 下列各项, 属于中风与痉证鉴别要点的是
A. 发作时有无四肢厥冷



- B. 发作时有无口吐白沫
C. 发作时有无神志昏迷
D. 发作时有无四肢抽搐
E. 神昏与抽搐出现的前后
19. 不属甲亢主要临床表现的是
A. 眼征
B. 甲状腺危象
C. 高代谢症候群
D. 弥漫性甲状腺肿
E. 胫前黏液性水肿
20. 关于水肿说法正确的是
A. 体内水液潴留
B. 泛滥肌肤
C. 头面浮肿
D. 眼睑浮肿
E. 以上都是
21. 膏淋者，其最佳选方是
A. 八正散
B. 知柏地黄丸
C. 程氏萆薢分清饮
D. 导赤散
E. 苍术难名丹
22. 小便闭塞，点滴不通，病势较急者应诊断为
A. 水肿
B. 淋证
C. 癃
D. 闭
E. 关格
23. 关于慢性肾衰竭代谢性酸中毒的表现叙述错误的是
A. 乏力
B. 反应迟钝
C. 呼吸浅促
D. 可出现昏迷
E. 可加重高钾血症
24. 治疗心脾两虚型郁证的首选方为
A. 归脾汤
B. 甘麦大枣汤
C. 天王补心丹
D. 六味地黄丸
E. 当归补血汤
25. 治疗胃热壅盛所致的吐血，宜选用
A. 茜根散
B. 加味清胃散
C. 泻白散合黛蛤散
D. 百合固金汤
E. 泻心汤合十灰散
26. 治疗悬饮之络气不和证，首选的方剂是
A. 香附旋覆花汤
B. 柴枳半夏汤
C. 椒目瓜蒌汤合十枣汤
D. 沙参麦冬汤合泻白散
E. 苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤
27. 治疗中消胃热炽盛证的最佳选方为
A. 玉女煎
B. 消渴方
C. 一贯煎
D. 六味地黄丸
E. 七味白术散
28. 治疗盗汗之阴虚火旺证，方剂首选的是
A. 玉屏风散



- B. 桂枝加黄芪汤
C. 当归六黄汤
D. 龙胆泻肝汤
E. 六味地黄丸
29. 下列内伤发热各证中，治法为燥湿化痰，清热和中的是
A. 血虚发热证
B. 气郁发热证
C. 痰湿郁热证
D. 气虚发热证
E. 阳虚发热证
30. 治疗虚劳之肺阴虚证，方剂宜选用
A. 补肺汤
B. 养心汤
C. 七福饮
D. 沙参麦冬汤
E. 加味四君子汤
31. 肺癌之气阴两虚证，治疗首选方为
A. 沙参麦冬汤
B. 青蒿鳖甲汤
C. 补中益气汤
D. 人参养荣汤
E. 生脉散合百合固金汤
32. 治疗脑瘤之痰瘀阻窍证，方剂首选的是
A. 血府逐瘀汤
B. 膈下逐瘀汤
C. 通窍活血汤
D. 天麻钩藤饮
E. 黄连解毒汤
33. 治疗行痹，应首选
A. 乌头汤
B. 薏苡仁汤
C. 防风汤
D. 宣痹汤
E. 白虎加桂枝汤
34. 指出“方书皆谓感受风湿而致，多用风药，予细详之，恐仍未备，当作气血内虚，外物干之所致”的医家为
A. 吴鞠通
B. 朱丹溪
C. 华岫云
D. 张景岳
E. 巢元方
35. 痿证与痹证的主要鉴别点为
A. 是否肌肉瘦削枯萎
B. 有无关节肿大变形
C. 有无肢体关节疼痛
D. 肢体能够随意运动
E. 是否关节屈伸不利
36. 颤证气血亏虚证的代表方剂为
A. 补气运脾汤
B. 补髓丹
C. 四君子汤送服天王补心丹
D. 八珍汤
E. 人参养荣汤
37. 湿热腰痛的主方是
A. 四妙丸
B. 妙香散
C. 石韦散
D. 肾着汤
E. 五皮散
38. 脱证阴脱的代表方为



- A. 独参汤
- B. 安宫牛黄丸
- C. 至宝丹
- D. 生脉散
- E. 紫雪

39. 下列哪项不属于中医文献中论述神昏的范畴

- A. 昏愤
- B. 昏蒙
- C. 昏冒
- D. 昏迷
- E. 昏睡

40. 猝死阴虚证的代表方剂为

- A. 生脉散
- B. 通脉四逆汤
- C. 紫雪
- D. 大补阴丸
- E. 炙甘草汤

41. 有机磷杀虫药中毒呼吸气味为

- A. 大蒜味
- B. 烂苹果味
- C. 氨味
- D. 腥臭味
- E. 以上均不正确

42. 急性酒精中毒实证，毒盛者可加

- A. 麦冬、砂仁
- B. 绿豆、鸡蛋清
- C. 泽泻、侧柏叶
- D. 大黄、黄连
- E. 茯苓、丹皮

43. 郁证肝气郁结证的最佳选方是

- A. 四逆散
- B. 柴胡疏肝散
- C. 越鞠丸
- D. 逍遥散
- E. 小柴胡汤

44. 下列血证各证型中，可用黄土汤治疗的是

- A. 便血之脾胃虚寒证
- B. 便血之气虚不摄证
- C. 尿血之下焦湿热证
- D. 尿血之肾虚火旺证
- E. 尿血之脾不统血证

45. 胸肋饱满，咳唾引痛，喘促不能平卧者属于

- A. 支饮
- B. 痰饮
- C. 悬饮
- D. 水饮
- E. 溢饮

46. 导致消渴的病因不包括的是

- A. 禀赋不足
- B. 情志失调
- C. 劳欲过度
- D. 久病体虚
- E. 饮食失节

47. 自汗、盗汗的中医分型不包括

- A. 肺卫不固证
- B. 心血不足证
- C. 阴阳两虚证
- D. 阴虚火旺证
- E. 邪热郁蒸证



48. 补中益气汤可用于治疗的内伤发热证型为
- A. 阳虚发热证
 - B. 气虚发热证
 - C. 气郁发热证
 - D. 阴虚发热证
 - E. 血虚发热证
49. 七福饮可用于治疗虚劳何证
- A. 脾气虚证
 - B. 肾气虚证
 - C. 心血虚证
 - D. 心气虚证
 - E. 肺气虚证
50. 心神失养型郁证的代表方剂是
- A. 归脾汤
 - B. 补中益气汤
 - C. 当归补血汤
 - D. 甘麦大枣汤
 - E. 天王补心丹
51. 六味地黄丸合茜根散加减可用于治疗下列何证
- A. 齿衄之胃火炽盛证
 - B. 齿衄之阴虚火旺证
 - C. 咳血之燥热伤肺证
 - D. 鼻衄之气血亏虚证
 - E. 鼻衄之肝火上炎证
52. 血府逐瘀汤可用于治疗下列何证
- A. 肺癌之瘀阻肺络证
 - B. 肺癌之痰湿蕴肺证
 - C. 肺癌之阴虚毒热证
 - D. 脑瘤之痰瘀阻窍证
 - E. 脑瘤之阴虚风动证
53. 类风湿关节炎的特点是
- A. 累及少数或单一关节
 - B. 多呈游走性大关节肿胀，极少畸形
 - C. 关节疼痛以腕关节、掌指关节和近端指间关节最常见，可见晨僵，肿胀
 - D. 大小关节均可受累，呈对称性，很少出现畸形
 - E. 全身关节酸痛伴明显胸骨下端压痛
54. 郁证之肝气郁结证的证候表现不包括
- A. 胁肋胀痛
 - B. 不思饮食
 - C. 痛无定处
 - D. 情绪不宁
 - E. 面色不华
55. 治法为甘润缓急，养心安神的是
- A. 郁证之心脾两虚证
 - B. 郁证之心肾阴虚证
 - C. 郁证之心神失养证
 - D. 郁证之痰气郁结证
 - E. 郁证之肝气郁结证
56. 治疗鼻衄之胃热炽盛证，代表方剂是
- A. 清胃散
 - B. 泻心汤
 - C. 玉女煎
 - D. 桑杏汤
 - E. 龙胆泻肝汤
57. 治疗阴虚肺热型咳血，首选的方剂是
- A. 茜根散
 - B. 加味清胃散
 - C. 泻白散合黛蛤散
 - D. 百合固金汤
 - E. 泻心汤合十灰散



58. 下列哪项不是风湿热痹的特点

- A. 局部灼热红肿
- B. 痛不可触
- C. 得冷则舒
- D. 肌肤麻木不仁
- E. 游走性关节疼痛

59. 下列属于失代偿性休克表现的是

- A. 神志清醒
- B. 烦躁不安
- C. 恶心呕吐
- D. 反应迟钝
- E. 脉搏加快

60. 神昏邪毒内闭证的治法为

- A. 镇心安神，清热除烦
- B. 清热化痰，开闭醒神
- C. 清热燥湿，开窍醒神
- D. 化浊开窍，清热解毒
- E. 开窍通闭，回阳固脱

61. 以腹痛的部位辨证，胁痛、少腹疼痛者，多属

- A. 肝胆病
- B. 虫证
- C. 肠痈
- D. 胃痛
- E. 膀胱病

62. 胰腺疼痛性体位是指

- A. 坐位
- B. 前倾位
- C. 蜷曲卧位
- D. 平卧位或直立
- E. 侧卧位

63. 喘证辨证，应首辨

- A. 肺肾
- B. 阴阳
- C. 寒热
- D. 表里
- E. 虚实

64. 下列选项中，不属实喘的特征是

- A. 脉象微弱
- B. 起病急，病程短
- C. 呼吸深长有余，呼出为快
- D. 气粗声高
- E. 痰鸣咳嗽

65. 肺癆的病变部位是

- A. 心、肝、肾
- B. 肝、肺、肾
- C. 肺、脾、肾
- D. 肝、脾、肾
- E. 心、肺、肾

66. 对继发型肺结核描述正确的是

- A. 多发生于成人，病程长，易反复
- B. 多发生于老年人，病程长，易反复
- C. 多发生于儿童，病程长，易反复
- D. 多发生于成人，病程短，易反复
- E. 多发生于老年人，病程短，易反复

67. 黄疸最具特征的表现是

- A. 面黄
- B. 目黄
- C. 小便黄
- D. 恶心纳呆
- E. 腹胀呕吐

68. 下列可以确诊胆囊结石的检查是



- A. X线检查
B. 血液检查
C. B超检查
D. 粪便检查
E. 肝功能检查
69. 痢下白多赤少，一般多重用
A. 温药
B. 寒药
C. 气药
D. 血药
E. 补药
70. 下列属于溃疡性结肠炎的主要临床表现的是
A. 腹痛、腹泻、腹胀
B. 腹痛、腹泻、恶心
C. 腹痛、腹泻、黏液脓血便
D. 腹痛、腹胀、黏液脓血便
E. 噎气、早饱、呕血
71. 痞满的基本病位在
A. 肝脾
B. 脾胃
C. 胃
D. 脾
E. 肝胆
72. 痞满痰湿中阻证的主方是
A. 二陈平胃汤加减
B. 保和丸加减
C. 泻心汤合连朴饮加减
D. 越鞠丸合枳术丸加减
E. 枳实消痞丸加减
73. 痢病的主要病理因素是
A. 痰
B. 瘀
C. 风
D. 寒
E. 火
74. 痢病发作时间的久暂、间歇期的长短，与下列各项程度有密切关系的是
A. 痰瘀阻窍和风痰闭阻
B. 气机顺逆和痰浊内聚
C. 痰聚气逆和闭阻清窍
D. 痰瘀内阻和蒙蔽清窍
E. 体质的强弱和正气的盛衰
75. 癫狂的病理因素以何者为先
A. 血瘀
B. 痰气郁结
C. 痰凝
D. 气郁
E. 火郁
76. 真心痛寒凝心脉证的主治方剂是
A. 保元汤合血府逐瘀汤
B. 四逆加人参汤
C. 当归四逆汤
D. 通窍活血汤
E. 当归六黄汤
77. 急性心肌梗死最早出现和最突出的症状是
A. 疼痛
B. 汗出
C. 恐惧
D. 心律失常
E. 休克



78. 不寐的总病机为
- A. 脾虚气弱，气血生化乏源
 - B. 肝郁化火，邪火扰动心神
 - C. 痰热上扰，胃气失和
 - D. 阴阳亏虚
 - E. 阳盛阴衰，阴阳失交

79. 一氧化碳中毒虚证(脱证)的代表方剂为
- A. 陶氏回阳急救汤
 - B. 桃仁承气汤

- C. 补中益气汤
- D. 生脉散
- E. 参附汤

80. 现场抢救一氧化碳中毒时，应首选的治疗措施是
- A. 迅速离开中毒现场
 - B. 人工呼吸
 - C. 按压合谷
 - D. 甘露醇
 - E. 立即给氧

二、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

(81~82题共用备选答案)

- A. 痉证
 - B. 中风
 - C. 癲证
 - D. 狂证
 - E. 痛证
81. 患者喧扰不宁，躁妄打骂，动而多怒。其诊断是
82. 患者沉默痴呆，语无伦次，静而多喜。其诊断是

(83~84题共用备选答案)

- A. 归脾汤
 - B. 丹栀逍遥散
 - C. 柴胡疏肝散
 - D. 半夏厚朴汤
 - E. 天王补心丹
83. 治疗郁证之气郁化火证的代表方剂是
84. 治疗郁证之痰气郁结证的代表方剂是

(85~86题共用备选答案)

- A. 发热，小便赤热，尿时灼痛
 - B. 排出砂石，排尿中断，腰酸绞痛
 - C. 小腹胀满，尿涩疼痛，余沥不尽
 - D. 小便混浊，白如泔浆，尿道不痛
 - E. 小便混浊，滑如脂膏，尿热涩痛
85. 尿浊的临床特点是
86. 膏淋的临床特点是

(87~88题共用备选答案)

- A. 心脾两虚证
 - B. 心肾阴虚证
 - C. 肝气郁结证
 - D. 心神失养证
 - E. 痰气郁结证
87. 郁证的各证型中，治法为滋养心肾的是
88. 郁证的各证型中，治法为健脾养心，补益气血的是



(89~90 题共用备选答案)

- A. 养心汤
- B. 四物汤
- C. 归脾汤
- D. 七福饮
- E. 加味四君子汤

89. 治疗虚劳之心血虚证, 方剂首选的是

90. 治疗虚劳之肝血虚证, 方剂首选的是

(91~92 题共用备选答案)

- A. 归脾汤
- B. 地榆散
- C. 茜根散
- D. 黄土汤
- E. 知柏地黄丸

91. 便血之气虚不摄证, 治疗宜选用的方剂是

92. 吐血之气虚血溢证, 治疗宜选用的方剂是

(93~94 题共用备选答案)

- A. 养阴和胃
- B. 滋补肾阴
- C. 养阴润肺
- D. 养血安神
- E. 补益肺气

93. 治疗虚劳之脾胃阴虚证的治法宜选用

94. 治疗虚劳之肾阴虚证的治法宜选用

(95~96 题共用备选答案)

- A. 归脾汤
- B. 大补元煎
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 知柏地黄丸

95. 治疗脾肾双亏型大肠癌, 最佳的选方是

96. 治疗肝肾阴虚型大肠癌, 最佳的选方是

(97~98 题共用备选答案)

- A. >2500ml/24h
- B. >2000ml/24h
- C. <800ml/24h
- D. <400ml/24h
- E. <100ml/24h

97. 慢性肾衰竭出现多尿时, 尿量

98. 慢性肾衰竭出现少尿时, 尿量

(99~100 题共用备选答案)

- A. 益气固表
- B. 养血补心
- C. 滋阴降火
- D. 清热泻火
- E. 养肝补血

99. 治疗自汗之肺卫不固证, 治法宜选用

100. 治疗盗汗之阴虚火旺证, 治法宜选用



2022 年中医内科主治医师《专业实践能力》 模拟试卷

一、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 某患者，大便干，小便清长，面色(白光)白，四肢不温，腹中冷痛，舌淡苔白，脉沉迟。此属
A. 气秘
B. 冷秘
C. 气虚秘
D. 血虚秘
E. 阳虚秘
2. 头痛患者，疼痛日久，其痛如锥刺，固定不移，舌质紫，脉细涩。其证候是
A. 肝阳
B. 痰浊
C. 血虚
D. 肾虚
E. 瘀血
3. 患者，男，37 岁。因皮肤疮痍破溃而引发水肿，肿势自颜面渐及全身，小便不利，恶风发热，咽红，舌红苔薄黄，脉滑数。治疗应首选
A. 越婢加术汤合桑白皮汤
B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
C. 麻黄连翘赤小豆汤合五皮散
D. 麻黄连翘赤小豆汤合猪苓汤
E. 实脾饮合五味消毒饮
4. 患者，男，33 岁，一周前出现眼睑浮肿，就诊于当地医院，尿蛋白阳性，24 小时蛋白定量 5.1g，血浆白蛋白 28g/L，胆固醇 6.4mmol/L，甘油三酯 3.8mmol/L，应考虑的诊断是
A. 慢性肾炎
B. 肾病综合征
C. 急性肾炎
D. IgA 肾病
E. 慢性肾衰
5. 患者，女性，48 岁。症见：多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，大便干燥，舌苔黄，脉滑实有力。中医诊断为消渴。其中医证型为
A. 肺热津伤证
B. 胃热炽盛证
C. 气阴亏虚证
D. 肾阴亏虚证
E. 阴阳两虚证
6. 患者，男性，53 岁。有慢性咳嗽病史十余年，平素易汗出，劳动后尤甚，易外感，体倦乏力，恶风，舌苔薄白，脉细弱。该患者治疗首选
A. 归脾汤



- B. 当归六黄汤
C. 麻杏石甘汤
D. 桂枝加黄芪汤
E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
7. 患者，男，56岁。西医诊断为原发性支气管肺癌。症见：咳嗽不畅，胸闷气憋，胸痛有定处，如锥如刺，口唇紫暗，舌质暗，苔薄，脉细涩。其治法宜选用
- A. 活血化瘀，理气散结
B. 活血化瘀，清热解毒
C. 养阴清热，解毒散结
D. 行气活血，散瘀消结
E. 健脾燥湿，行气祛痰
8. 患者孙某，32岁。呕吐吞酸，嗳气频

作，胸胁满痛，脉弦。此属何型呕吐

- A. 胃阴不足
B. 热邪犯胃
C. 肝郁化火
D. 肝气犯胃
E. 以上均不是

9. 患者小便热涩疼痛，尿色深红，或夹有血块。应首先考虑的是

- A. 热淋
B. 石淋
C. 气淋
D. 血淋
E. 劳淋

二、A3/A4型题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

(10~13题共用题干)

患者恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咽隐痛，咳嗽，痰稀白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。

10. 此患者应诊断为
- A. 感冒之气虚证
B. 感冒之阴虚证
C. 感冒之风寒束表证
D. 感冒之暑湿伤表证
E. 咳嗽之风寒袭肺证
11. 治疗应采用何种治法
- A. 宣肺止咳
B. 滋阴解表
C. 辛温解表

- D. 益气解表
E. 辛凉解表

12. 宜选用的主治方剂是

- A. 止嗽散
B. 参苏饮
C. 三拗汤
D. 银翘散
E. 荆防达表汤

13. 若见恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，当选用

- A. 玉屏风散
B. 加减葶苈汤
C. 九味羌活汤
D. 加减泻白散



E. 再造散

(14~16 题共用题干)

患者白某，男性，38 岁。上气咳逆阵作，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，咳时引痛，症状可随情绪波动而增减，舌红，舌苔薄黄少津，脉弦数。

14. 其诊断为

- A. 痰热郁肺之咳嗽
- B. 痰湿蕴肺之咳嗽
- C. 肝火犯肺之喘证
- D. 肝火犯肺之咳嗽
- E. 风热犯肺之咳嗽

15. 其治法是

- A. 健脾燥湿，化痰止咳
- B. 解郁化痰，宣肺止咳
- C. 清肺泻肝，顺气降火
- D. 清热肃肺，豁痰止咳
- E. 疏风清热，肃肺止咳

16. 其首选方剂是

- A. 黛蛤散合泻白散
- B. 沙参麦冬汤
- C. 桑白皮汤
- D. 桑杏汤
- E. 逍遥散

(17~19 题共用题干)

患者林某，女性，78 岁。久喘不愈，平素短气息促，动则为甚，吸气不利，心慌，脑转耳鸣，腰酸膝软，劳累后哮喘易发。

17. 其诊断为哮喘

- A. 寒包热哮证
- B. 风痰哮证

C. 肺脾气虚证

D. 肺肾两虚证

E. 脾肾两虚证

18. 其治法是

- A. 补肺益肾
- B. 补益精血
- C. 温补肾阳
- D. 健脾益肾
- E. 滋阴益肾

19. 其治疗应首选的方剂是

- A. 七味都气丸合金水六君煎
- B. 生脉地黄汤合金水六君煎
- C. 金匮肾气丸合补肺汤
- D. 六味地黄丸合补肺汤
- E. 左归丸合生脉散

(20~22 题共用题干)

患者杨某，男性，30 岁。农民，患者发热恶寒，咳嗽，咳白黏痰，痰量由少渐多，胸痛剧烈，呼吸不利，苔薄黄，脉浮滑数。

20. 此病诊断为

- A. 肺痈初期
- B. 肺痈恢复期
- C. 风热咳嗽
- D. 痰热咳嗽
- E. 肺痈成痈期

21. 其治法是

- A. 养阴补肺
- B. 清热解毒
- C. 清肺解表
- D. 清肺化痰
- E. 排脓解毒



22. 其治疗应首选的方剂是

- A. 如金解毒散
- B. 加味桔梗汤
- C. 桑菊饮
- D. 银翘散
- E. 千金苇茎汤

(23~25 题共用题干)

患者于某, 男性, 60 岁。患肺癆 5 年, 症见咳嗽无力, 声低懒言, 痰中带血, 血色淡红, 午后低热, 面白颧红, 舌嫩红有齿痕, 苔薄白, 脉细弱数。

23. 应辨证为

- A. 肺肾阴虚
- B. 脾肾不足
- C. 气阴耗伤
- D. 肺阴亏损
- E. 阴虚火旺

24. 其治则为

- A. 滋阴补阳
- B. 益气温阳
- C. 滋阴润肺
- D. 滋阴降火
- E. 益气养阴

25. 其治疗应首选的方剂是

- A. 养阴清肺丸
- B. 保真汤
- C. 百合固金丸
- D. 月华丸
- E. 十灰散

(26~28 题共用题干)

患者于某, 男性, 45 岁。心悸眩晕, 胸闷痞满, 渴不欲饮, 小便短少, 下肢浮肿,

形寒肢冷, 伴恶心欲吐, 流涎, 舌淡胖, 苔白滑, 脉沉细而滑。

26. 该患者发病病机是

- A. 脾肾阳虚, 水饮内停, 上凌于心
- B. 心脉瘀阻, 心失所养
- C. 痰火扰心, 心神不安
- D. 心阳虚衰, 无以温养心神
- E. 心虚胆怯, 心神不安

27. 其治法为

- A. 清热化痰, 宁心安神
- B. 活血化瘀, 理气通络
- C. 振奋心阳, 化气行水
- D. 温补心阳, 安神定悸
- E. 补血养心, 益气安神

28. 其首选治疗方剂是

- A. 苓桂术甘汤
- B. 桃仁红花煎
- C. 黄连温胆汤
- D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- E. 安神定志丸

(29~31 题共用题干)

患者孙某, 男性, 70 岁, 左胸闷痛 3 年, 近来伴气短喘促, 咳嗽, 痰多黏腻色白, 苔白腻, 脉滑。

29. 该患者辨证为胸痹

- A. 痰浊闭阻证
- B. 寒凝心脉证
- C. 心肾阳虚证
- D. 心血瘀阻证
- E. 心肾阴虚证

30. 其治法是

- A. 辛温散寒, 宣痹通阳



- B. 疏调气机，和血舒脉
- C. 通阳泻浊，豁痰宣痹
- D. 活血化瘀，通脉止痛
- E. 温振心阳，回阳救逆

31. 其治疗应首选的方剂是

- A. 乌头赤石脂丸
- B. 血府逐瘀汤
- C. 冠心苏合丸
- D. 瓜蒌薤白半夏汤
- E. 天王补心丹

(32~34 题共用题干)

患者张某，男性，20岁。两小时前突然尖叫一声，昏倒不省人事，四肢抽搐，口吐白沫，两眼上吊，二便失禁，20分钟后清醒，一如常人，对发病过程不知。诊见舌淡，苔白腻，脉滑。

32. 其辨证分型是

- A. 心脾两虚证
- B. 心肾亏虚证
- C. 风痰闭阻证
- D. 痰火扰神证
- E. 瘀阻脑络证

33. 其治法是

- A. 涤痰息风，开窍定痫
- B. 补益心肾，潜阳安神
- C. 补益气血，健脾宁心
- D. 清热泻火，化痰开窍
- E. 活血化瘀，息风通络

34. 其治疗应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
- B. 定痫丸
- C. 六君子汤合归脾汤

- D. 左归丸合天王补心丹
- E. 通窍活血汤

(35~39 题共用题干)

患者于某，女性，58岁。两年前曾患“中风”，经治已愈，之后逐渐出现善忘呆滞，言语模糊不清，行为古怪孤僻，时哭时笑，症见两目黯晦，舌黯，脉细涩。

35. 其诊断是

- A. 中风恢复期
- B. 中风后遗症
- C. 郁证
- D. 健忘
- E. 痴呆

36. 其辨证分型是

- A. 髓海不足证
- B. 瘀血内阻证
- C. 风痰瘀阻证
- D. 气虚络瘀证
- E. 痰浊蒙窍证

37. 其治法是

- A. 活血化瘀，开窍醒脑
- B. 豁痰开窍，健脾化浊
- C. 祛风化痰，通络化瘀
- D. 益气养血，化瘀通络
- E. 搜风化痰，行瘀通络

38. 其治疗应首选的方剂是

- A. 七福饮加减
- B. 天麻钩藤饮加减
- C. 涤痰汤加减
- D. 通窍活血汤加减
- E. 还少丹加减



39. 若病人日久兼气血不足应
- A. 加熟地、党参、黄芪等
 - B. 加熟地、当归、白芍等
 - C. 改用归脾汤
 - D. 改用八珍汤
 - E. 改用补中益气汤

(40~42 题共用题干)

患者赵某，女性，56岁。由于暴怒，突然晕倒，不省人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌红，脉沉弦。

40. 其辨证为

- A. 气厥实证
- B. 气厥虚证
- C. 血厥实证
- D. 血厥虚证
- E. 痰厥

41. 其治法是

- A. 补气回阳
- B. 顺气开郁
- C. 理气化痰
- D. 补养气血
- E. 行气豁痰

42. 其首选治疗方剂是

- A. 五磨饮子
- B. 通瘀煎
- C. 四味回阳饮
- D. 人参养荣汤
- E. 导痰汤

(43~47 题共用题干)

患者孙某，男，35岁。胃痛暴作，恶寒喜暖，得温则痛减，遇寒则痛增，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。

43. 中医辨病为

- A. 呕吐
- B. 胃痛
- C. 呃逆
- D. 噎膈
- E. 以上均非

44. 该病的中医分型为

- A. 饮食伤胃证
- B. 肝气犯胃证
- C. 寒邪客胃证
- D. 湿热中阻证
- E. 瘀血停胃证

45. 中医治法宜采用

- A. 温胃散寒，行气止痛
- B. 消食导滞，和胃止痛
- C. 疏肝解郁，理气止痛
- D. 清化湿热，理气和胃
- E. 化瘀通络，理气和胃

46. 治疗首选方剂是

- A. 保和丸
- B. 柴胡疏肝散
- C. 清中汤
- D. 香苏散合良附丸
- E. 失笑散合丹参饮

47. 若兼见恶寒、头痛等风寒表证者，可加

- A. 枳实、神曲
- B. 苏叶、藿香
- C. 半夏、生姜
- D. 砂仁、槟榔
- E. 银花、连翘



(48~51 题共用题干)

患者王某，吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

48. 中医辨证为

- A. 噎膈之瘀血内结证
- B. 噎膈之痰气交阻证
- C. 噎膈之津亏热结证
- D. 噎膈之气虚阳微证
- E. 呃逆之痰气交阻证

49. 中医治法宜采用

- A. 开郁化痰，润燥降气
- B. 滋阴养血，破血行瘀
- C. 滋阴养血，润燥生津
- D. 温补脾肾
- E. 以上均非

50. 治疗首选方剂是

- A. 通幽汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 补气运脾汤
- D. 启膈散
- E. 参苓白术散

51. 若暖气呕吐明显者，酌加

- A. 大黄、莱菔子
- B. 山豆根、栀子
- C. 旋覆花、代赭石
- D. 三棱、莪术
- E. 沙参、麦冬

(52~55 题共用题干)

某患者，腹痛胀闷，痛无定处，痛引少腹，或兼痛窜两胁，时作时止，得暖气或矢气

则舒，遇忧思恼怒则剧，舌质红，苔薄白，脉弦。

52. 此患者应诊断为

- A. 腹痛之寒邪内阻证
- B. 腹痛之肝郁气滞证
- C. 腹痛之湿热壅滞证
- D. 腹痛之饮食积滞证
- E. 腹痛之瘀血内停证

53. 治疗应采用何种治法

- A. 散寒温里，理气止痛
- B. 泄热通腑，行气导滞
- C. 疏肝解郁，理气止痛
- D. 消食导滞，理气止痛
- E. 活血化瘀，和络止痛

54. 宜选用的主治方剂是

- A. 良附丸合正气天香散
- B. 大承气汤
- C. 枳实导滞丸
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 柴胡疏肝散

55. 若气滞较重，胸胁胀痛者，加

- A. 橘核、荔枝核
- B. 川楝子、郁金
- C. 丹皮、山栀子
- D. 当归、川芎
- E. 桂枝、生姜

(56~59 题共用题干)

某患者，大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，或有身热，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。

56. 此患者应诊断为

- A. 气秘



- B. 冷秘
- C. 热秘
- D. 气虚秘
- E. 血虚秘

57. 治疗应采用何种治法

- A. 顺气导滞
- B. 泻热导滞，润肠通便
- C. 温里散寒，通便止痛
- D. 益气润肠
- E. 养血润燥

58. 宜选用的主治方剂是

- A. 六磨汤
- B. 温脾汤
- C. 黄芪汤
- D. 麻子仁丸
- E. 润肠丸

59. 若津液已伤，可加

- A. 生地、玄参
- B. 槐花、地榆
- C. 白芍、柴胡
- D. 枳实、厚朴
- E. 白术、党参

(60~64 题共用题干)

患者钱某，女性，症见腹中气聚，攻窜胀痛时聚时散，脘闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓。

60. 此患者可诊断为积聚，其辨证分型为

- A. 肝气郁结
- B. 寒湿中阻
- C. 食滞痰阻
- D. 气滞血阻
- E. 正虚郁结

61. 治法宜用

- A. 疏肝解郁，行气散结
- B. 导滞通便，理气化痰
- C. 温中散寒，行气化湿
- D. 理气活血，通络消积
- E. 补益气血，活血化瘀

62. 最佳治疗方剂是

- A. 八珍汤合化积丸
- B. 六磨汤
- C. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- D. 逍遥散、木香顺气散
- E. 柴胡疏肝散合失笑散

63. 如胀痛甚者，应加

- A. 苍术、厚朴、陈皮、砂仁
- B. 肉桂、吴茱萸、当归
- C. 半夏、苍术、白芥子
- D. 川楝子、延胡索、木香
- E. 牡丹皮、山栀子、赤芍、黄芩

64. 如寒湿中阻，腹胀，苔白腻者，应加

- A. 苍术、厚朴、陈皮、砂仁
- B. 肉桂、吴茱萸、当归
- C. 半夏、苍术、白芥子
- D. 川楝子、延胡索、木香
- E. 牡丹皮、山栀子、赤芍、黄芩

(65~68 题共用题干)

患者白某，腹胀按之不坚，胁下胀满，饮食减少，食后胀甚，得暖气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。

65. 该患者首先考虑的疾病是

- A. 鼓胀之水湿困脾证
- B. 鼓胀之水热蕴结证
- C. 鼓胀之瘀结水留证



- D. 鼓胀之气滞湿阻证
- E. 鼓胀之阳虚水盛证

66. 首选中医治法为

- A. 疏肝理气，运脾利湿
- B. 温中健脾，行气利水
- C. 清热利湿，攻下逐水
- D. 活血化瘀，行气利水
- E. 温补脾肾，化气利水

67. 主治方剂宜选用

- A. 实脾饮
- B. 中满分消丸合茵陈蒿汤
- C. 调营饮
- D. 附子理苓汤
- E. 柴胡疏肝散合胃苓汤

68. 若胸脘痞闷，腹胀，噫气为快，气滞偏甚者，可酌加

- A. 泽泻、车前子
- B. 沉香、木香
- C. 附片、干姜
- D. 郁金、香附
- E. 附子、干姜

(69~71 题共用题干)

患者孙某，男性，60岁。症见忽然昏倒，不省人事，口噤拳握，气粗口臭，大小便闭，肢体强痉，面赤身热，躁扰不宁，苔黄腻，脉沉滑。

69. 此患者应诊断为

- A. 中风(中脏腑，闭证，痰火瘀闭)
- B. 中风(中脏腑，闭证，痰热腑实)
- C. 中风(中脏腑，闭证，痰浊瘀闭)
- D. 中风(恢复期，风痰瘀阻)
- E. 中风(中经络，风阳上扰)

70. 治疗此患者应用下列治法中的

- A. 化痰息风，宣郁开窍
- B. 通腑泄热，息风化痰
- C. 息风清火，豁痰开窍
- D. 祛风化痰通络
- E. 益气养血，化瘀通络

71. 治疗此患者应首选的处方是

- A. 羚角钩藤汤
- B. 桃仁承气汤
- C. 真方白丸子
- D. 天麻钩藤饮
- E. 涤痰汤

(72~74 题共用题干)

患者，女，32岁，郁怒之后，出现小便涩滞，淋漓不宣，少腹胀满疼痛，苔薄白，脉弦。

72. 其中医诊断为

- A. 热淋
- B. 石淋
- C. 血淋
- D. 气淋
- E. 膏淋

73. 其中医治法为

- A. 清热利湿通淋
- B. 清热利湿，排石通淋
- C. 清热通淋，凉血止血
- D. 理气疏导，通淋利尿
- E. 清热利湿，分清泄浊

74. 若少腹胀满，上及于胁者，加

- A. 川楝子、小茴香、广郁金
- B. 红花、赤芍、益母草
- C. 台乌药、青皮



- D. 小蓟、藕节、白茅根
- E. 生地、麦冬、知母

(75~77 题共用题干)

患者，男，52 岁。诊断为癃闭。现证见小便不通，排出无力，面色(白光)白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝冷而酸软无力，舌淡胖，苔薄白，脉沉细或弱。

75. 其证型为

- A. 肺热壅盛证
- B. 肝郁气滞证
- C. 浊瘀阻塞证
- D. 脾气不升证
- E. 肾阳衰惫证

76. 其治法选用

- A. 清泄肺热，通利水道
- B. 疏利气机，通利小便
- C. 行瘀散结，通利水道
- D. 升清降浊，化气行水
- E. 温补肾阳，化气利水

77. 若形神委顿，腰脊酸痛，治宜选用

- A. 沉香散
- B. 香茸丸
- C. 知柏地黄丸
- D. 参苓白术散
- E. 济生肾气丸

(78~80 题共用题干)

患者，男，50 岁，久嗜辛辣之品，大便下血，色鲜红，便下不爽，伴有腹痛，口苦，舌质红，苔黄腻，脉濡数。

78. 其中医辨证为

- A. 肠道湿热证
- B. 胃热壅盛证

- C. 脾胃虚寒证
- D. 脾胃湿热证
- E. 胃肠积热证

79. 其中医治法宜选用

- A. 清肝泻火，凉血止血
- B. 清胃泻火，化瘀止血
- C. 健脾温中，养血止血
- D. 清热利湿，凉血止血
- E. 清化湿热，凉血止血

80. 治疗方剂首选的是

- A. 黄土汤
- B. 小蓟饮子
- C. 知柏地黄丸
- D. 无比山药丸
- E. 地榆散合槐角丸

(81~83 题共用题干)

患者，男，60 岁，患痰饮病，症见喘促，动则尤甚，气短，咳而痰多，食少胸闷，怯寒肢冷，神疲，少腹拘急不仁，小便不利，足跗浮肿，舌体胖大，质淡，苔白润，脉沉细而滑。

81. 其中医诊断分型为

- A. 支饮，寒饮伏肺证
- B. 溢饮，表寒里饮证
- C. 痰饮，脾阳虚弱证
- D. 支饮，脾肾阳虚证
- E. 悬饮，饮停胸胁证

82. 其中医治法宜选用

- A. 发表化饮
- B. 和解宣利
- C. 攻下逐饮
- D. 温脾化饮



E. 温脾补肾，以化水饮

83. 其中医治疗方剂首选的是

- A. 小青龙汤
- B. 金匱肾气丸
- C. 柴枳半夏汤
- D. 香附旋覆花汤
- E. 椒目瓜蒌汤合十枣汤

(84~86 题共用题干)

顾某，男，42 岁。近日来出现夜寐盗汗，伴见五心烦热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。

84. 其中医辨证为

- A. 肺卫不固证
- B. 气阴两虚证
- C. 心血不足证
- D. 阴虚火旺证
- E. 邪热郁蒸证

85. 其中医治法宜选用

- A. 益气固表
- B. 养血补心
- C. 滋阴降火
- D. 清肝泻肝
- E. 清热泻火

86. 其治疗方剂首选的是

- A. 丹栀逍遥散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 六味地黄丸
- D. 当归六黄汤
- E. 金匱肾气丸

(87~89 题共用题干)

某患者，男，54 岁。最近肢体关节疼痛较

剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增，关节不可屈伸，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。

87. 治疗方剂宜首选

- A. 防风汤
- B. 双合汤
- C. 薏苡仁汤
- D. 乌头汤
- E. 宣痹汤

88. 根据患者症状采用的治法为

- A. 清热通络，祛风除湿
- B. 温经散寒，祛风除湿
- C. 祛风通络，散寒除湿
- D. 除湿通络，祛风散寒
- E. 培补肝肾，舒筋止痛

89. 关节发凉，疼痛剧烈，遇冷更甚，可加的药物为

- A. 草薢、木通
- B. 半夏、南星
- C. 杜仲、桑寄生、淫羊藿
- D. 茯苓、泽泻、车前子
- E. 桂枝、干姜、全当归

(90~93 题共用题干)

患者，女性，21 岁，双下肢软弱无力，逐渐加重 4 年余，神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言，纳呆便溏，面色无华，舌淡苔薄白，脉细弱。

90. 根据患者的症状本病当诊断为

- A. 痹证
- B. 痿证
- C. 偏枯
- D. 中风
- E. 痲证



91. 治则为

- A. 健脾和胃，舒筋活络
- B. 补益脾气，祛邪通络
- C. 补中益气，健脾升清
- D. 健脾益气，利水渗湿
- E. 补益气血，濡养筋脉

92. 代表方为

- A. 参苓白术散合补中益气汤
- B. 健脾丸
- C. 归脾汤
- D. 四君子汤
- E. 八珍汤

93. 假如患者较胖而痰多、脾虚，应选用的方剂为

- A. 茯苓白术散
- B. 四君子汤
- C. 四物汤
- D. 六君子汤
- E. 归脾汤

(94~96 题共用题干)

患者男性，56 岁，肢体颤动粗大，程度较重，不能自制，眩晕耳鸣，面赤烦躁，易激动，心情紧张时颤动加重，伴有肢体麻木，口苦而干，语言迟缓不清，流涎，尿赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦。

94. 该病诊断为

- A. 颤证
- B. 痹证
- C. 痿证
- D. 痢证
- E. 癩证

95. 该病治法为

- A. 平肝潜阳，息风活络
- B. 舒筋止颤，镇肝息风
- C. 填精补髓，育阴息风
- D. 益气养血，濡养筋脉
- E. 清热化痰，平肝息风

96. 该病代表方剂是

- A. 导痰汤合羚角钩藤汤
- B. 人参养荣汤
- C. 龟鹿二仙膏
- D. 天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减
- E. 地黄饮子

(97~100 题共用题干)

患者，女，35 岁，现症见神志昏迷，皮肤干皱，口唇干燥无华，面色苍白，目陷睛迷，自汗肤冷，气息低微，舌绛，少苔，脉芤。

97. 根据患者症状，可辨证为

- A. 亡阳证
- B. 亡阴证
- C. 邪毒内闭证
- D. 内闭外脱证
- E. 疫毒炽盛证

98. 采用的治法为

- A. 救阴敛阳，固脱醒神
- B. 清热解毒，回阳固脱
- C. 清热化痰，开闭醒神
- D. 开窍通闭，回阳固脱
- E. 清热解毒，凉血开窍

99. 代表方剂为

- A. 菖蒲郁金汤
- B. 冯氏全真一气汤
- C. 陶氏回阳急救汤



D. 《千金》犀角散

E. 至宝丹

100. 若患者出现口干少津，可加

A. 沙参、黄精、石斛

B. 麦冬、陈皮

C. 天花粉、淡竹叶、芒硝

D. 麦冬、天冬、石斛

E. 淡竹叶、石膏、前胡



2022 年中医内科主治医师《基础知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1.【正确答案】 E

【答案解析】 阴阳学说在中医学中的应用包括：说明人体的组织结构；说明人体的生理功能；说明人体的病理变化；用于疾病的诊断和治疗。

2.【正确答案】 A

【答案解析】 六淫之中，风邪、暑邪、火（热）邪属阳；寒邪、湿邪属阴。

3.【正确答案】 B

【答案解析】 五行相生关系：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。水可生木，水为木之母，木为水之子。所以选 B。

4.【正确答案】 D

【答案解析】 五行属性，春属木，夏属火，长夏属土，秋属金，冬属水。

5.【正确答案】 A

【答案解析】 阳虚则生内寒，出现虚寒证，系阳虚无以制阴而致阴盛，须用“益火（目的或者根本）之源，以消阴翳（临床上虚寒证属阴的范畴）”，补阳以制阴，《内经》称之为“阴病治阳”。

6.【正确答案】 A

【答案解析】 女子胞与心、肝、脾、肾等脏

的关系密切；月经的来潮以及孕育胎儿，均离不开肾精的充盛、气血的充盈和血液的调节。其中肾藏精主生殖，与天癸产生有关，心主血、肝藏血、脾统血，女子以血为用。因此，女子胞的功能与心、肝、脾、肾等脏的生理功能有关。

7.【正确答案】 A

【答案解析】 藏象学说的主要特点是以五脏为中心的整体观，主要体现在以五脏为中心的人体自身的整体性及五脏与自然环境的统一性两个方面。

8.【正确答案】 C

【答案解析】 胆贮藏和排泄胆汁，胆汁为肝之余气所化生，汇集于胆。胆为中正之官，决断出焉。

9.【正确答案】 E

【答案解析】 肝病常表现为肝气升动太过的病理变化，如肝气上逆、肝火上炎、肝阳上亢和肝风内动等。

10.【正确答案】 A

【答案解析】 精，是构成人体和维持人体生命活动的最基本物质。中医学精的本始含义，是指具有繁衍后代作用的生殖之精，此称为狭义之精。从精华、精微之意的角度发出，人体之内的血、津液、髓以及水



谷精微等一切精微物质，均属于精的广义范畴。

11.【正确答案】A

【答案解析】津液的输布主要依靠脾气的输布散精、肺气的通调水道、肾气的主水液而蒸腾气化，以及肝气疏泄，促进津液输布。此外，三焦水道的通利则保证津液的输布和畅通。

12.【正确答案】A

【答案解析】经筋，是十二经脉之气“结、聚、散、络”于筋肉、关节的体系。具有连缀百骸，维络周身，主司关节活动的作用。

13.【正确答案】E

【答案解析】六淫致病一般具有以下共同特点：(1)季节性、地域性。(2)外感性。(3)相兼性。(4)转化性。

14.【正确答案】C

【答案解析】正气不足是疾病发生的内在因素，中医发病学重视人体的正气，认为正气旺盛，气血充盈，卫外固密，病邪难于侵入，疾病无从发生，《素问·刺法论》说：“正气存内，邪不可干。”

15.【正确答案】B

【答案解析】气随血脱指在大量出血的同时，气随血液的突然流失而急剧脱散，从而形成气血并脱的危重病理状态。

16.【正确答案】A

【答案解析】心与脾的关系，主要表现在血液的生成和运行方面的密切联系。脾气健运，气血充盈，则心有所主。脾气健旺，

脾的统血功能正常，则血行脉中，而不逸出于脉外。在病理上，若脾气虚弱，运化失职，气血生化无源，或脾不统血，导致血液妄行，均可引起血虚而心无所主。

17.【正确答案】D

【答案解析】“治病必求于本”之“本”指阴阳。中医学以调节阴阳为治疗总纲，为基本原则，故《素问·至真要大论》云：“谨察其阴阳所在而调之，以平为期。”

18.【正确答案】D

【答案解析】卫气常从足少阴之分间，行于五脏六腑，其余选项均正确。

19.【正确答案】A

【答案解析】《素问·热论》“其未三日者”说明邪仍在三阳之表，采用汗法，以疏通在表被郁之阳，祛其表邪。

20.【正确答案】E

【答案解析】逆治法称为正治法，从治法称为反治法。在临床治疗中，正治法应用较广，如原文列举的寒者热之，热者寒之，坚者削之，燥者濡之，逸者行之，上之下之，开之发之等。选项E属于反治法。

21.【正确答案】B

【答案解析】太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。

22.【正确答案】C

【答案解析】伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。



23.【正确答案】C

【答案解析】四逆汤证论述了少阴病脉沉，治宜急温。条文以脉代证，提示少阴病施治宜早，切勿拖延。一旦延误施治，则吐利厥逆诸症接踵而至，治亦晚矣。本条体现了中医“治未病”的预防治疗学思想，值得重视。

24.【正确答案】E

【答案解析】炙甘草汤证论述了心阴阳两虚的证治。治宜炙甘草汤补阴阳，调气血以复脉。

25.【正确答案】E

【答案解析】瓜蒌桂枝汤中瓜蒌根即天花粉，甘凉生津滋液，柔润筋脉，合桂枝汤疏散风邪，调和营卫。

26.【正确答案】E

【答案解析】酸枣仁汤的病因病机：本证由于肝之阴血亏虚，血不养心，心血不足，阴虚内热，心神不安而致失眠。

27.【正确答案】E

【答案解析】茵陈五苓散证候：全身发黄，黄色不甚鲜明，食少脘痞，身重便溏，小便不利，苔腻淡黄等症。

28.【正确答案】A

【答案解析】温经汤论述了妇人冲任虚寒夹有瘀血而致崩漏的证治。

29.【正确答案】E

【答案解析】湿温病中，气分湿热日久不解，酿蒸痰浊，蒙蔽心包，而出现了神志的异常。表现的特点是：神识似清似昧，

或时清时昧，即使清醒时也表情淡漠，反应迟钝，严重时谵语胡言，亦是温病的危重症。

30.【正确答案】D

【答案解析】暑湿弥漫三焦病机：气分暑湿郁蒸，弥漫于上中下三焦。证候表现：身热汗出口渴，面赤耳聋，眩晕，胸闷喘咳，痰中带血，脘痞腹胀，下利稀水，小便短赤，舌红，苔黄滑，脉滑数。

31.【正确答案】D

【答案解析】温毒类温病是温病的一种特殊类型，由温毒病邪引起，包括大头瘟、烂喉痧等疾病，多发生于冬春两季。

32.【正确答案】C

【答案解析】道地药材包括：甘肃的当归，宁夏的枸杞，青海的大黄，内蒙的黄芪，东北的人参、细辛、五味子，山西的党参，河南的地黄、牛膝、山药、菊花，云南的三七、茯苓，四川的黄连、川芎、贝母、乌头，山东的阿胶，浙江的贝母，江苏的薄荷，广东的陈皮、砂仁等。

33.【正确答案】E

【答案解析】炮制的目的大致可以归纳为以下八个方面：

- (1) 纯净药材，保证质量，分拣药物，区分等级。
- (2) 切制饮片，便于调剂制剂。
- (3) 干燥药材，利于贮藏。
- (4) 矫味、矫臭，便于服用。
- (5) 降低毒副作用，保证安全用药。
- (6) 增强药物功能，提高临床疗效。
- (7) 改变药物性能，扩大应用范围。



(8)引药入经，便于定向用药。

34.【正确答案】A

【答案解析】十八反包括：乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白及、白蔹；甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；藜芦反人参、丹参、玄参、沙参、细辛、芍药。

35.【正确答案】E

【答案解析】与药物用量有关的是：药物性质、剂型、配伍、年龄、体质、病情、季节变化。

36.【正确答案】A

【答案解析】藁本

功效：祛风散寒，除湿止痛。

应用：(1)风寒感冒，巅顶疼痛。

(2)风寒湿痹。此处要重点掌握藁本能用于治疗巅顶头痛的作用。

37.【正确答案】C

【答案解析】鸦胆子功效：清热解毒，止痢，截疟，腐蚀赘疣。

青蒿功效：清透虚热，凉血除蒸，解暑，截疟。

白头翁功效：清热解毒，凉血止痢。

马齿苋功效：清热解毒，凉血止血，止痢。

黄连功效：清热燥湿，泻火解毒。为治泻痢要药。

38.【正确答案】A

【答案解析】白花蛇舌草

功效：清热解毒，利湿通淋。

应用：(1)痈肿疮毒，咽喉肿痛，毒蛇咬伤，各种癌症。(2)热淋涩痛。(3)湿热黄疸。

39.【正确答案】E

【答案解析】苦参功效：清热燥湿，杀虫，利尿。

马勃功效：清热解毒，利咽，止血。

山豆根功效：清热解毒，利咽消肿。

板蓝根功效：清热解毒，凉血，利咽。

射干功效：清热解毒，消痰，利咽。

根据题干要求，E 其为最佳的选项。

40.【正确答案】C

【答案解析】大血藤功效清热解毒，活血，祛风，止痛。为治肠痈要药。

41.【正确答案】E

【答案解析】大黄功效：泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经，清利湿热。

42.【正确答案】B

【答案解析】寻骨风

性能：辛、苦，平。归肝经。

功效：祛风湿，通络止痛。

应用：(1)风湿痹证。(2)跌打损伤。

此外，本品又可用于胃痛、牙痛、痈肿。

43.【正确答案】C

【答案解析】桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

44.【正确答案】E

【答案解析】藿香

性能：辛，微温。归脾、胃、肺经。

功效：化湿，止呕，解暑。为芳香化湿浊要药。

45.【正确答案】E

【答案解析】车前子用法：煎服，宜包煎。



46.【正确答案】A

【答案解析】吴茱萸功效：散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

47.【正确答案】A

【答案解析】川楝子

性能：苦，寒。有小毒。归肝、胃、小肠、膀胱经。

功效：行气止痛，杀虫。

应用：(1)肝郁化火所致诸痛证。(2)虫积腹痛。(3)头癣、秃疮。

48.【正确答案】B

【答案解析】山楂功效：消食化积，行气散瘀。

49.【正确答案】C

【答案解析】槟榔功效：杀虫消积，行气，利水，截疟。

50.【正确答案】D

【答案解析】三七治疗出血证。有止血而不留瘀、化瘀而不伤正之特点。故最佳选项是D。

51.【正确答案】A

【答案解析】丹参功效：活血调经，祛瘀止痛，凉血消痈，除烦安神。

52.【正确答案】A

【答案解析】此处是对十八反内容的考查。甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白芍、白及；藜芦反人参、沙参、丹参、元参、细辛、芍药。

53.【正确答案】A

【答案解析】酸枣仁功效：养心益肝，安神，敛汗，生津止渴。

莲子功效：益肾固精，补脾止泻止带，养心安神。

远志功效：安神益智，祛痰开窍，消散痈肿。

合欢皮功效：解郁安神，活血消肿。

首乌藤功效：养血安神，祛风通络。

54.【正确答案】B

【答案解析】麝香功效：开窍醒神，活血通经，消肿止痛。

55.【正确答案】D

【答案解析】人参用法用量：煎服，3~9g；挽救虚脱可用15~30g。宜文火另煎分次口服。野山参研末吞服，每次2g，日服2次。

56.【正确答案】E

【答案解析】西洋参功效：补气养阴，清热生津。

57.【正确答案】B

【答案解析】大枣功效：补中益气，养血安神。

甘草功效：补脾益气，祛痰止咳，缓急止痛，清热解毒，调和诸药。

饴糖功效：补益中气，缓急止痛，润肺止咳。

白术功效：健脾益气，燥湿利尿，止汗，安胎。

蜂蜜功效：补中，润燥，止痛，解毒。

58.【正确答案】A

【答案解析】麻黄根和浮小麦共同的功效是止汗。



59.【正确答案】B

【答案解析】硫黄功效：外用解毒杀虫止痒，内服补火助阳通便。

60.【正确答案】C

【答案解析】硼砂功效：外用清热解毒，内服清肺化痰。

61.【正确答案】E

【答案解析】痞块用消法。消法与下法均可消除有形之邪，但两者作用不同。下法适用于燥屎内结、冷积不化、瘀血内停、宿食不消、结痰停饮以及虫积等证；消法适用于饮食停滞、气滞血瘀、癥瘕积聚、水湿内停、痰饮不化、疝积虫积以及疮疡脓肿等病证。下法是猛攻急下，消法是渐消缓散，方法不同，用药也各异。

62.【正确答案】B

【答案解析】加减葳蕤汤功用：滋阴解表。主治素体阴虚，外感风热证。

63.【正确答案】D

【答案解析】黄龙汤的功用为攻下热结、补气养血。

64.【正确答案】A

【答案解析】温脾汤方中附子温壮脾阳，温散寒凝；大黄泻下攻积，与大热之附子相伍，则寒性去而泻下之功犹存，共为君药，共奏温阳祛寒，攻下冷积之用。

65.【正确答案】E

【答案解析】趣记：小柴胡汤——（生芹菜炒大虾仁）柴胡、黄芩、半夏、生姜、人参、炙甘草、大枣。

方歌：小柴胡汤和解功，半夏人参甘草从；更加黄芩生姜枣，少阳为病此方宗。

趣记：半夏泻心汤——（半夏泻心，三人练琴）半夏、干姜、黄芩、黄连、人参、炙甘草、大枣。

方歌：半夏泻心黄连芩，干姜草枣人参行；辛开苦降消痞满，治在调阳与和阴。

二方共有的药物包括半夏、黄芩、人参、大枣和炙甘草。故选E。

66.【正确答案】B

【答案解析】白虎汤主治阳明、气分热盛证。症见：壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。

67.【正确答案】D

【答案解析】香薷散的功用是祛暑解表，化湿和中。

68.【正确答案】C

【答案解析】四逆汤的组成是炙甘草、干姜、生附子。

方歌：四逆汤中附草姜，四肢厥逆急煎尝；脉微吐利阴寒盛，救逆回阳赖此方。

趣记：四逆散【四逆只烧干柴】枳实、柴胡、芍药、炙甘草。

方歌：四逆散里用柴胡，芍药枳实甘草须；此是阳郁成厥逆，疏和抑郁厥自除。

69.【正确答案】E

【答案解析】小建中汤【桂枝汤+饴糖】桂枝三两、甘草(炙)二两、大枣十二枚、芍药六两、生姜三两、胶饴一升。

桂枝汤：【组成】桂枝三两、芍药三两、甘草(炙)二两、生姜三两、大枣十二枚。因此小建中汤有桂枝汤倍芍药加饴糖而成。



70.【正确答案】D

【答案解析】参苓白术散的功用是益气健脾、渗湿止泻，主治脾虚湿盛证。

71.【正确答案】C

【答案解析】趣记：六味地黄丸【地八山山四，丹泽茯苓三】熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、茯苓、丹皮。

方歌：六味地黄益肾肝，山药丹泽萸萸参；更加知柏成八味，阴虚火旺可煎餐；养阴明目加杞菊，滋阴都气五味研；肺肾两调金水生，麦冬加入长寿丸；再入磁柴可潜阳，耳鸣耳聋俱可安。

趣记：大补阴丸【百只地龟补阴】熟地黄、龟板、黄柏、知母。

方歌：大补阴丸知柏黄，龟板脊髓蜜成方；咳嗽咯血骨蒸热，阴虚火旺制亢阳。

72.【正确答案】A

【答案解析】固冲汤的功用为固冲摄血、益气健脾。

73.【正确答案】B

【答案解析】趣记：酸枣仁汤【令母熊找草】

酸枣仁、知母、茯苓、川芎、甘草

方歌：酸枣仁汤治失眠，川芎知草茯苓煎；养血除烦清内热，安然入睡梦乡甜。

74.【正确答案】E

【答案解析】苏合香丸具有芳香开窍、行气止痛的作用，主治寒闭证。

75.【正确答案】C

【答案解析】趣记：定喘汤【秦老用果子麻花拌杏仁霜】白果、麻黄、苏子、款冬花、杏仁、法制半夏、甘草、桑白皮、黄芩。

方歌：定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑；苏杏黄芩兼甘草，风寒痰热喘哮尝。

76.【正确答案】E

【答案解析】补阳还五汤中重用生黄芪四两，补益元气，意在气旺则血行，瘀去而络通，为君药。

77.【正确答案】A

【答案解析】防己黄芪汤中，黄芪配防己共为君药，防己祛风行水，黄芪益气固表，兼可利水，两者相合，祛风除湿而不伤正，益气固表而不恋邪，使风湿俱去，表虚得固。

78.【正确答案】C

【答案解析】清气化痰丸中胆南星清热豁痰，为君药。瓜蒌仁清热化痰，黄芩清泻肺火，半夏化痰散结，降逆止呕，同为臣药。枳实行气消痞，陈皮理气化痰，茯苓健脾渗湿，杏仁降气止咳，为佐药。以生姜汁为丸，以制半夏之毒，并增祛痰降逆之效。

79.【正确答案】C

【答案解析】健脾丸的功用是健脾和胃，消食止泻。主治脾虚食积证。

80.【正确答案】D

【答案解析】趣记：乌梅丸--(鬼脸蜀败将，细眉贵妇人)当归、黄连、蜀椒、黄柏、干姜、细辛、乌梅、桂枝、附子、人参。

方歌：乌梅丸用细辛桂，黄连黄柏及当归；人参椒姜及附子，温中寓清在安蛔。



81.【正确答案】B

【答案解析】趣记：独活寄生汤【新房毒酒妻中计，八珍去术用桂心】独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄。
方歌：独活寄生艽防辛，芎归地芍桂苓均；杜仲牛膝人参草，风湿顽痹屈能伸。

82.【正确答案】B

【答案解析】猪苓汤的组成是猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石。
方歌：猪苓汤内二苓全，泽泻阿胶滑石添；利水育阴兼泻热，溺秘心烦呕渴痊。
五苓散的组成是猪苓、泽泻、白术、茯苓、桂枝。
方歌：五苓散治太阳腑，白术泽泻猪茯苓；桂枝温通助气化，利便解表烦渴清。

83.【正确答案】C

【答案解析】趣记：羌活胜湿汤【高峰二活熊蛮干(生事)】羌活、独活、藁本、防风、炙甘草、川芎、蔓荆子。
方歌：羌活胜湿独防风，蔓荆藁本草川芎；祛风胜湿止痛良，善治周身风湿痛。

84.【正确答案】B

【答案解析】消风散主治风疹、湿疹。荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕疏风止痒，共为君药。苍术散风祛湿，苦参清热燥湿，木通渗利湿热，石膏、知母清热泻火，均为臣药。当归、生地、胡麻养血活血，滋阴润燥，寓“治风先治血，血行风自灭”之意，是为佐药。生甘草清热解暑，调和诸药，是为使药。

二、B型题

(85~86 题共用备选答案)

85.【正确答案】B

【答案解析】凡阳虚不能制阴而致阴盛(阳消阴长)的虚寒证，宜用补阳治之。这种治疗原则，称之为“阴病治阳”；又称作“益火之源，以消阴翳”。这是针对单纯阳虚证的治疗原则。

86.【正确答案】A

【答案解析】凡阴虚不能制阳而致阳亢(阴消阳长)的虚热证，宜用补阴治之。这种治疗原则，称之为“阳病治阴”；又称作“壮水之主，以制阳光”。这是针对单纯阴虚证的治疗原则。

(87~88 题共用备选答案)

87.【正确答案】D

【答案解析】趣记：清胃散——(生母当黄妈)生地黄、黄连、当归身、牡丹皮、升麻。
方歌：清胃散用升麻连，当归生地牡丹全；或加石膏清胃热，口疮吐衄与牙宣。

88.【正确答案】E

【答案解析】龙胆泻肝汤——(黄子龙推木车，当地卸柴草)龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、车前子、当归、生地黄、柴胡、生甘草。
方歌：龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕；木通甘草当归合，肝经湿热力能排。

(89~90 题共用备选答案)

89.【正确答案】B

【答案解析】四逆汤主治心肾阳衰之寒厥证。四肢厥逆，神衰欲寐，面色苍白，恶



寒踡卧，腹痛下利，呕吐不渴，甚则冷汗淋漓，舌淡苔白滑，脉微欲绝，以及误汗亡阳者。

90.【正确答案】 C

【答案解析】 回阳救急汤主治寒邪直中三阴，真阳衰微证。四肢厥冷，神衰欲寐，恶寒踡卧，吐泻腹痛，或身寒战栗，或指甲口唇青紫，或吐涎沫，舌淡苔白，脉沉微，甚或无脉。

(91~92 题共用备选答案)

91.【正确答案】 A

【答案解析】 生脉散以人参为君，大补元气，并能止渴生津。

92.【正确答案】 B

【答案解析】 玉屏风散以黄芪为君，内可大补脾肺之气，外可固表止汗。

(93~94 题共用备选答案)

93.【正确答案】 A

【答案解析】 固冲汤主治脾肾亏虚，冲脉不固之崩漏。血崩或月经过多，或漏下不止，色淡质稀，头晕肢冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱。

94.【正确答案】 C

【答案解析】 固经丸主治阴虚血热之崩漏。月经过多，或崩中漏下，血色深红或紫黑

稠黏，手足心热，腰膝酸软，舌红，脉弦数。

(95~96 题共用备选答案)

95.【正确答案】 C

【答案解析】 朱砂安神丸的功用是镇心安神，清热养血。

96.【正确答案】 E

【答案解析】 酸枣仁汤的功用是养血安神、清热除烦。

(97~98 题共用备选答案)

97.【正确答案】 C

【答案解析】 生化汤养血祛瘀，温经止痛。主治血虚寒凝，瘀血阻滞证。

98.【正确答案】 D

【答案解析】 失笑散活血祛瘀，散结止痛。主治瘀血停滞证。

(99~100 题共用备选答案)

99.【正确答案】 C

【答案解析】 八正散擅长清热泻火，利水通淋。主治湿热淋证。

100.【正确答案】 A

【答案解析】 三仁汤擅长宣畅气机，清利湿热。主治湿温初起及暑温夹湿之湿重于热证。



2022 年中医内科主治医师《相关专业》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1.【正确答案】 B

【答案解析】 雀盲是指白昼视力正常，每至黄昏视物不清，如雀之盲的症状。目眩是指病人自觉视物旋转动荡，如在舟车之上，或眼前如有蚊蝇飞动的症状。目昏是指视物昏暗不明、模糊不清的症状。目痛指病人自觉单目或双目疼痛的症状。歧视是指视一物成二物而不清的症状。

2.【正确答案】 A

【答案解析】 气虚发热：长期微热，烦劳则甚，兼见有少气自汗、倦怠乏力等症。

气郁发热：每因情志不舒而时有微热，兼胸闷、急躁易怒等症。

血虚发热：时有低热，兼面白、头晕、舌淡脉细等症。

阴虚发热：长期低热，兼颧红、五心烦热等症。

小儿夏季热：小儿在夏季气候炎热时长期发热不已，兼见烦躁、口渴、无汗、多尿等症，至秋凉时不治自愈，是由于小儿气阴不足，不能适应夏令炎热气候所致。

3.【正确答案】 C

【答案解析】 病人遇风觉冷，避之可缓者，谓之恶风；病人自觉怕冷，多加衣被或近火取暖而不能缓解者，谓之恶寒；病人自觉怕冷，多加衣被或近火取暖而能够缓解

者，谓之畏寒。

4.【正确答案】 C

【答案解析】 满面通红者，多属外感发热，或脏腑火热炽盛的实热证。故根据题干所问，正确的选项是 C。

5.【正确答案】 C

【答案解析】 痰白滑而量多，易咯出者，属湿痰。因脾虚不运，水湿不化，聚而成痰之故。

6.【正确答案】 E

【答案解析】 循衣摸床，撮空理线：指重病神志不清，病人不自主地伸手抚摸衣被、床沿，或伸手向空，手指时分时合，为病重失神之象。

7.【正确答案】 E

【答案解析】 舌诊的临床意义有五个方面：(1)判断邪正盛衰；(2)区别病邪性质；(3)辨别病位浅深；(4)推断病势进退；(5)估计病情预后。

8.【正确答案】 C

【答案解析】 舌红而点刺色鲜红：多为血热内盛，或阴虚火旺。

9.【正确答案】 A



【答案解析】舌紫红或绛紫而干枯少津：为热盛伤津，气血壅滞。

10.【正确答案】D

【答案解析】谵语指神志不清，语无伦次，声高有力的症状。多属邪热内扰神明所致，属实证，故《伤寒论》谓“实则谵语”。见于外感热病，温邪内入心包或阳明实热证、痰热扰乱心神等。

11.【正确答案】C

【答案解析】病室有尸臭气味者多为脏腑衰败，病属危重。

12.【正确答案】D

【答案解析】滑脉：多见于痰湿、食积和实热等病证。亦是青壮年的常脉，或妇女的孕脉。

13.【正确答案】D

【答案解析】寸口分候脏腑：左寸候心，右寸候肺，并统括胸以上及头部的疾病；左关候肝胆，右关候脾胃，统括膈以下、脐以上部位的疾病；两尺候肾，并包括脐以下至足部的疾病。

14.【正确答案】C

【答案解析】脉在皮肤，头定而尾摇，似有似无，如鱼在水中游动，称鱼翔脉。

15.【正确答案】C

【答案解析】心病的常用腧穴：巨阙、膻中、大陵。

16.【正确答案】A

【答案解析】按虚里的病理表现与临床意义

(1)虚里按之，其动微弱者为不及，是宗气内虚之征，或为饮停心包之支饮。

(2)搏动迟弱，或久病体虚而动数者，多为心阳不足。

(3)按之弹手，洪大而搏，或绝而不应者，是心肺气绝，属于危候。

(4)孕妇胎前产后，虚里动高者为恶候。

(5)虚损劳瘵之病，虚里日渐动高者为病进。

(6)虚里搏动数急而时有一止，为宗气不守。

(7)胸高而喘，虚里搏动散漫而数者，为心肺气绝之兆。

(8)虚里动高，聚而不散者，为热甚，多见于外感热邪、小儿食滞或痘疹将发之时。

(9)因惊恐、大怒或剧烈运动后，虚里动高，片刻之后即能平复如常不属病态；肥胖之人因胸壁较厚，虚里搏动不明显，亦属生理现象。

17.【正确答案】D

【答案解析】阴证的特征性表现有：面色苍白或暗淡，精神萎靡，身重蹇卧，畏冷肢凉，倦怠无力，语声低怯，纳差，口淡不渴，小便清长或短少，大便溏泻气腥，舌淡胖嫩，脉沉迟、微弱、细。除了选项D以外，其余各项均为阳证的临床表现，故根据题干所问，正确的选项为D。

18.【正确答案】A

【答案解析】真寒假热的实际是阳虚阴盛而阳气浮越，故又称虚阳浮越证，古代亦有称阴盛格阳证、戴阳证者。故正确答案是A。

19.【正确答案】A



【答案解析】气虚证的临床表现为气短声低，少气懒言，精神疲惫，体倦乏力，舌质淡嫩，脉虚，或有头晕目眩，自汗，动则诸症加重。

故正确答案为A。

20. **【正确答案】** A

【答案解析】血热证指火热内炽，侵迫血分，以身热口渴、斑疹吐衄、烦躁谵语、舌绛、脉数等为主要表现的实热证候，即血分的热证。

21. **【正确答案】** B

【答案解析】湿淫证临床表现为头昏沉如裹，嗜睡，身体困重，胸闷脘痞，口腻不渴，纳呆，恶心，肢体关节、肌肉酸痛，大便稀，小便浑浊。或为局部渗漏湿液，或皮肤出现湿疹、瘙痒，妇女可见带下量多。面色晦垢，舌苔滑腻，脉濡缓或细等。选项B是暑淫证的表现。

22. **【正确答案】** E

【答案解析】肝火炽盛证与肝阳上亢证的鉴别：

两证的共同表现：头晕胀痛，面红目赤，口苦口干，急躁易怒，耳鸣，失眠。但前者属火热过盛的实证，以目赤头痛、胁肋灼痛、口苦口渴、便秘、尿黄等火热证候为主，阴虚证候不突出，病程较短，病势较急；后者属上实下虚，虚实夹杂，系肝肾阴虚阳亢所致，以眩晕、头目胀痛、头重脚轻等上亢症状为主，且见腰膝酸软、耳鸣等下虚症状，阴虚证候明显，病程较长。

23. **【正确答案】** A

【答案解析】脾气虚证、脾虚气陷证、脾不统血证均有食少乏力的表现。

24. **【正确答案】** B

【答案解析】痰阻心脉以闷痛为特点，多伴体胖痰多，身重困倦，苔白腻，脉沉滑或沉涩等痰浊内盛的症状。

25. **【正确答案】** A

【答案解析】太阳中风证的辨证要点：本证以恶风、汗出、脉浮缓为辨证依据。

26. **【正确答案】** D

【答案解析】耳聋主要是见于下焦病证。故在此正确的选项是D。

27. **【正确答案】** E

【答案解析】抽搐的病史、发病年龄的问诊内容包括出生史、发育史、颅脑疾病史、长期服药史，有无心、肺、肝、肾及内分泌疾病史，既往有无抽搐史等。

28. **【正确答案】** E

【答案解析】肺性发绀：见于呼吸道(喉、气管、支气管)阻塞、肺部疾病(肺炎、肺气肿、肺淤血等)和胸膜疾病(胸腔积液、气胸等)。

29. **【正确答案】** B

【答案解析】腹痛部位：右上腹痛多为肝胆疾患；右下腹痛多见于阑尾炎；脐周疼痛多为小肠病变；左下腹痛多为降结肠、乙状结肠病变；中上腹痛多为胃、十二指肠或胰腺病变；全腹痛见于弥漫性腹膜炎。

30. **【正确答案】** A



【答案解析】 癔症性呼吸困难特点是呼吸非常频速(可达 60~100 次/分钟)和表浅, 并常因换气过度而发生呼吸性碱中毒, 经暗示疗法, 分散其注意力, 或在睡眠中, 可使呼吸困难减轻或消失。

31. **【正确答案】** A

【答案解析】 既往史包括患者既往的健康状况和过去曾经患过的疾病(包括各种传染病)外伤手术、预防接种、过敏史等, 尤其是与现病有密切关系的疾病的历史。

32. **【正确答案】** B

【答案解析】 触觉语颤: 正常情况下, 前胸上部的语颤较下部强; 后胸下部较上部强; 右上胸较左上胸强。

33. **【正确答案】** C

【答案解析】 肝脏质地分级: 分为质软、质韧(中等硬度)和质硬三级。正常肝脏质地柔软, 如触口唇; 急性肝炎及脂肪肝时质地稍韧; 慢性肝炎质韧, 如触鼻尖; 肝硬化质硬, 肝癌质地最硬, 如触前额。

34. **【正确答案】** B

【答案解析】 腹壁静脉

正常时腹壁静脉一般不显露。当门静脉高压或上、下腔静脉回流受阻导致侧支循环形成时, 腹壁静脉呈现扩张、迂曲状态, 称为腹壁静脉曲张。

(1) 门脉高压时, 腹壁曲张的静脉以脐为中心向周围伸展, 肚脐以上腹壁静脉血流方向从下向上, 肚脐以下腹壁静脉血流方向自上向下。

(2) 上腔静脉梗阻时, 胸腹壁静脉血流方向自上向下, 流入下腔静脉。

(3) 下腔静脉梗阻时, 腹壁浅静脉血流方向向上, 进入上腔静脉。

35. **【正确答案】** B

【答案解析】 脊柱后凸多发生于胸段, 见于佝偻病、脊柱结核、强直性脊柱炎、脊柱退行性变等。

36. **【正确答案】** D

【答案解析】 气管检查: 正常人的气管位于颈前正中中部。大量胸腔积液、气胸或纵隔肿瘤及单侧甲状腺肿大, 可将气管推向健侧; 肺不张、肺硬化、胸膜粘连时, 气管被牵拉向患侧。

37. **【正确答案】** E

【答案解析】 扁桃体肿大分三度: 不超过咽腭弓者为 I 度; 超过咽腭弓者为 II 度; 达到或超过咽后壁中线者为 III 度。

38. **【正确答案】** B

【答案解析】 杂音与体位的关系: 体位改变可使某些杂音减弱或增强, 而有助于病变部位的诊断。例如, 左侧卧位可使二尖瓣狭窄的舒张中晚期隆隆样杂音更明显; 前倾坐位可使主动脉瓣关闭不全的舒张期杂音更易于听到; 仰卧位则使肺动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣关闭不全的杂音更明显。

39. **【正确答案】** C

【答案解析】 高钾血症见于:

(1) 排出减少: 如急性或慢性肾衰竭少尿期、肾上腺皮质功能减退症。

(2) 摄入过多: 如高钾饮食、静脉输注大量钾盐、输入大量库存血液。

(3) 细胞内钾外移增多: 如严重溶血、大面



积烧伤、挤压综合征、组织缺氧和代谢性酸中毒等。

40.【正确答案】 B

【答案解析】 尿胆红素定性试验：

- (1)参考值：正常定性为阴性。
- (2)临床意义：尿胆红素定性试验阳性提示血液中 CB 增高。肝细胞性黄疸为阳性；阻塞性黄疸为强阳性；溶血性黄疸为阴性。

41.【正确答案】 E

【答案解析】 正常成人的腹腔液<50ml。

42.【正确答案】 C

【答案解析】 癌胚抗原(CEA)检测可用于鉴别原发性和转移性肝癌：原发性肝癌 CEA 增高者不超过 9%，而转移性肝癌 CEA 阳性率高达 90%。

43.【正确答案】 D

【答案解析】 房性期前收缩的心电图表现：

- (1)提早出现的房性 P'，形态与窦性 P 波不同。
- (2)P'-R 间期 $\geq 0.12s$ 。
- (3)房性 P'波后有正常形态的 QRS 波群。
- (4)代偿间歇不完全。

44.【正确答案】 A

【答案解析】 左室肥大的心电图表现

- (1)QRS 波群电压增高： $R_{V5} > 2.5mV$ ， $R_{V5} + S_{VI} > 4.0mV$ (男)或 $> 3.5mV$ (女)。
- (2)心电轴左偏。
- (3)QRS 波群时间延长到 0.10~0.11s。
- (4)ST-T 改变，以 R 波为主的导联中，T 波低平、双向或倒置。

45.【正确答案】 D

【答案解析】 4 种基础肺容量包括：深吸气量、肺活量、功能残气量和肺总量。

46.【正确答案】 E

【答案解析】 下消化道内镜检查适应证：

- (1)有腹泻、便血、下腹部疼痛、贫血、腹部包块等症状、体征原因不明者。
- (2)X 线钡剂灌肠或乙状结肠镜检查有异常者，如狭窄、溃疡、息肉、癌肿、憩室等。
- (3)肠道炎性疾病的诊断与随访观察。
- (4)结肠癌肿的术前诊断与术后随访、癌前病变的监视、息肉摘除术后的随访等。
- (5)需做止血及结肠息肉摘除术等治疗者。

47.【正确答案】 E

【答案解析】 超声诊断可用于检测实质性脏器(如肝、肾、脾、胰腺、子宫及卵巢等)的大小、形态、边界及脏器内部回声等，帮助判断有无病变或病变情况。

48.【正确答案】 C

【答案解析】 地方性缺碘性甲状腺肿：虽然吸¹³¹碘率增高，但无高峰前移。

49.【正确答案】 D

【答案解析】 包裹性胸腔积液：X 线表现为圆形或半圆形密度均匀影，边缘清晰。包裹性积液局限在叶间裂时称为叶间积液。

50.【正确答案】 B

【答案解析】 高血压心脏病：X 线表现为左心室扩大，主动脉增宽、延长、迂曲，心脏呈靴形。

51.【正确答案】 C



【答案解析】 传染病预防, 需要管理传染源、切断传播途径及保护易感人群三个环节相结合, 根据各个传染病的特点采取起主导作用的措施。传染病报告制度是早发现传染病的重要措施。对于消化道、虫媒类传染病以及寄生虫病, 切断传播途径在预防中可以起到主导作用。保护易感人群, 主要措施是提高人体免疫力。

52. **【正确答案】** A

【答案解析】 细菌性痢疾简称菌痢, 是由志贺菌(又称痢疾杆菌)引起的肠道传染病。

53. **【正确答案】** D

【答案解析】 肾综合征出血热可表现为乏力、倦怠、头痛、腰痛、眼眶痛、皮肤和黏膜出血点, 其中头痛、眼眶痛和腰痛称为三痛。

54. **【正确答案】** A

【答案解析】 带菌者或患者是伤寒唯一传染源。

55. **【正确答案】** C

【答案解析】 隔离种类: 严密隔离、呼吸道隔离、消化道隔离、接触隔离、昆虫隔离等。

56. **【正确答案】** E

【答案解析】 病人角色有以下特点: 减免平日“正常”的社会责任; 有接受帮助的义务; 有恢复健康的责任; 有寻求医疗帮助的责任。

57. **【正确答案】** E

【答案解析】 职业群体的心理健康主要是通

过提高职业满意度、促进人际关系和谐、实现工作环境优化及劳动组织合理化来达到的。

58. **【正确答案】** E

【答案解析】 人格障碍分为以下 6 种类型: (1) 偏执型人格障碍。(2) 分裂型人格障碍。(3) 反社会型人格障碍。(4) 冲动型人格障碍。(5) 表演型人格障碍。(6) 强迫型人格障碍。

59. **【正确答案】** A

【答案解析】 中国医学道德规范:

- (1) 对待患者——至亲之想;
- (2) 治学态度——至精至微;
- (3) 服务态度——一心赴救;
- (4) 医疗作风——端正淳良;
- (5) 对待同道——谦和谨慎。

选项 A 属于外国医学道德规范的内容。故根据题干要求, 正确的选项为 A。

60. **【正确答案】** C

【答案解析】 患者道德权利中的知情同意权: 患者有权获悉与自己疾病诊治相关的一切信息, 并根据自己的利益做出选择。不经患者或者其家属知情同意而实施的诊治是不道德的, 甚至是违法的。

61. **【正确答案】** C

【答案解析】 心身疾病又称心理生理疾患, 是一类在发病、发展、转归和防治等方面都与心理-社会因素密切相关的躯体疾病。

62. **【正确答案】** D

【答案解析】 心理障碍的判断标准包括: 内省的经验标准、社会适应的标准、医学标



准、统计学标准。

63.【正确答案】 E

【答案解析】 一般认为，心理健康就是以积极的、有效的心理活动，平稳的、正常的心理状态，对当前和发展着的社会、自然环境以及自我变化有良好的适应能力；并由此不断地发展健全的人格，提高生活质量，保持旺盛的精力和愉快的情绪。

64.【正确答案】 C

【答案解析】 传统习俗是人们在长期社会生活中形成的稳定的、习以为常的行为倾向和行为规范。

65.【正确答案】 D

【答案解析】 医德修养的含义：

- (1) 医德认识的提高；
- (2) 医德感情的丰富；
- (3) 医德意志的形成；
- (4) 医德行为和习惯的养成。

66.【正确答案】 E

【答案解析】 行政处罚是指卫生行政机关或者法律法规授权组织在职权范围内对违反卫生行政管理秩序而尚未构成犯罪的公民、法人和其他组织实施的一种卫生行政制裁。行政处罚的种类主要有警告，罚款，没收违法所得、没收非法财物，责令停产停业，暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等。

67.【正确答案】 D

【答案解析】 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：

一级医疗事故：造成患者死亡、重度残

疾的；

二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；

三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；

四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

68.【正确答案】 E

【答案解析】 我国《刑法》规定了十余个与违反卫生法有关的罪名。

- (1) 生产、销售假药、劣药罪；
- (2) 生产、销售不符合卫生标准食品的犯罪；
- (3) 生产、销售不符合卫生标准的医疗器械、医用卫生材料罪；
- (4) 非法行医情节严重的犯罪；
- (5) 违反《传染病防治法》的规定，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的犯罪；
- (6) 非法采集、供应血液罪或者制作、供应血液制品罪；
- (7) 违反国境卫生检疫罪；
- (8) 违反规定造成病菌种、毒种扩散罪；
- (9) 医疗事故罪。

另外，法律还规定了玩忽职守的犯罪、危害环境的犯罪等。

二、B型题

(69~70 题共用备选答案)

69.【正确答案】 B

【答案解析】 血虚发热：时有低热，兼面白、头晕、舌淡脉细等症。

70.【正确答案】 E

【答案解析】 小儿夏季热：小儿在夏季气候炎热时长期发热不已，兼见烦躁、口渴、



无汗、多尿等症，至秋凉时不治自愈，是由于小儿气阴不足，不能适应夏令炎热气候所致。

(71~72 题共用备选答案)

71.【正确答案】 B

【答案解析】 黑色主肾虚、寒证、水饮、瘀血、剧痛。青色主血瘀、肝病、寒证、痛证、惊风。

72.【正确答案】 C

【答案解析】 黑色主肾虚、寒证、水饮、瘀血、剧痛。黄色主脾虚、湿证。

(73~74 题共用备选答案)

73.【正确答案】 B

【答案解析】 舌中多反映中焦脾胃的病变。

74.【正确答案】 D

【答案解析】 舌两侧多反映肝胆的病变。

(75~76 题共用备选答案)

75.【正确答案】 D

【答案解析】 喘即气喘，指呼吸困难、急迫，张口抬肩，甚至鼻翼煽动，难以平卧。常由肺、心病变及白喉、急喉风等导致，而辨证还与脾、肾有关。喘有虚实之分。

76.【正确答案】 E

【答案解析】 哮是指呼吸急促似喘，喉间有哮鸣音的症状。多因痰饮内伏，复感外邪所诱发，或因久居寒湿之地，或过食酸咸生冷所诱发。

(77~78 题共用备选答案)

77.【正确答案】 D

【答案解析】 微脉：脉极细极软，似有若无。

78.【正确答案】 C

【答案解析】 弱脉：脉极沉细而软，重按乃得。

(79~80 题共用备选答案)

79.【正确答案】 D

【答案解析】 身热初按热甚，久按热反轻者为热在表。

80.【正确答案】 A

【答案解析】 身灼热而肢厥为阳热内盛，格阴于外所致，属真热假寒证。

(81~82 题共用备选答案)

81.【正确答案】 A

【答案解析】 寒痰阻肺证的临床表现：咳嗽，痰多、色白、质稠或清稀、易咯，胸闷，气喘，或喉间有哮鸣声，恶寒，肢冷，舌质淡，苔白腻或白滑，脉弦或滑。

82.【正确答案】 C

【答案解析】 燥邪犯肺证的临床表现：干咳无痰，或痰少而黏、不易咯出，甚则胸痛，痰中带血，或见鼻衄，口、唇、鼻、咽、皮肤干燥，尿少，大便干结，舌苔薄而干燥少津，或微有发热恶风寒，无汗或少汗，脉浮数或浮紧。

(83~84 题共用备选答案)

83.【正确答案】 E

【答案解析】 抽搐伴脑膜刺激征：见于各种脑膜炎及蛛网膜下腔出血。



84.【正确答案】 A

【答案解析】抽搐不伴意识丧失：见于破伤风、狂犬病、低钙抽搐、癔症性抽搐。

(85~86 题共用备选答案)

85.【正确答案】 B

【答案解析】反流性食管炎腹痛在立位时减轻。

86.【正确答案】 A

【答案解析】胰腺癌者卧位时疼痛明显，前倾位或俯卧位疼痛减轻。

(87~88 题共用备选答案)

87.【正确答案】 B

【答案解析】成人呼吸频率为 12~20 次/分钟。成人呼吸频率超过 20 次/分钟，称为呼吸过速，见于剧烈体力活动、发热、疼痛、贫血、甲状腺功能亢进症、心力衰竭等。

88.【正确答案】 A

【答案解析】成人呼吸频率低于 12 次/分钟，称为呼吸频率过缓，见于深睡、颅内高压、黏液性水肿、吗啡及巴比妥中毒等。

(89~90 题共用备选答案)

89.【正确答案】 E

【答案解析】腹壁静脉：

正常时腹壁静脉一般不显露。当门静脉高压或上、下腔静脉回流受阻导致侧支循环形成时，腹壁静脉呈现扩张、迂曲状态，称为腹壁静脉曲张。

(1)门脉高压时，腹壁曲张的静脉以脐为中心向周围伸展，肚脐以上腹壁静脉血流方向从下向上，肚脐以下腹壁静脉血流方向

自上向下。

(2)上腔静脉梗阻时，胸腹壁静脉血流方向自上向下，流入下腔静脉。

(3)下腔静脉梗阻时，腹壁浅静脉血流方向向上，进入上腔静脉。

90.【正确答案】 A

【答案解析】腹壁静脉：

正常时腹壁静脉一般不显露。当门静脉高压或上、下腔静脉回流受阻导致侧支循环形成时，腹壁静脉呈现扩张、迂曲状态，称为腹壁静脉曲张。

(1)门脉高压时，腹壁曲张的静脉以脐为中心向周围伸展，肚脐以上腹壁静脉血流方向从下向上，肚脐以下腹壁静脉血流方向自上向下。

(2)上腔静脉梗阻时，胸腹壁静脉血流方向自上向下，流入下腔静脉。

(3)下腔静脉梗阻时，腹壁浅静脉血流方向向上，进入上腔静脉。

(91~92 题共用备选答案)

91.【正确答案】 C

【答案解析】高钙血症（血清钙 > 2.58mmol/L）

(1)溶骨作用增强：如甲状旁腺功能亢进症、多发性骨髓瘤、肺癌等。

(2)吸收增加：如大量应用维生素 D。

(3)排出减少：如急性肾衰竭等。

(4)摄入过多：大量饮用高钙牛奶或静脉输入过多。

92.【正确答案】 E

【答案解析】高钙血症（血清钙 > 2.58mmol/L）

(1)溶骨作用增强：如甲状旁腺功能亢进



症、多发性骨髓瘤、肺癌等。

(2)吸收增加：如大量应用维生素 D。

(3)排出减少：如急性肾衰竭等。

(4)摄入过多：大量饮用高钙牛奶或静脉输入过多。

(93~94 题共用备选答案)

93.【正确答案】 A

【答案解析】 I 导联：正极接左上肢，负极接右上肢。

94.【正确答案】 B

【答案解析】 II 导联：正极接左下肢，负极接右上肢。

(95~96 题共用备选答案)

95.【正确答案】 E

【答案解析】 腔隙性脑梗死：发病 12~24 小时之内，CT 无异常所见；典型者可见小片状密度减低影，边缘模糊；无占位效应。

96.【正确答案】 A

【答案解析】 出血性脑梗死：在密度减低的脑梗死灶内，见到不规则斑点状或片状高密度出血灶影；由于占位，脑室轻度受压，

中线轻度移位；2~3 周后，病变处密度逐渐变低。

(97~98 题共用备选答案)

97.【正确答案】 E

【答案解析】 流感肺热壅盛型，方药用麻杏石甘汤加减。

98.【正确答案】 C

【答案解析】 流感热灼肺胃型，方药用白虎汤加减。

(99~100 题共用备选答案)

99.【正确答案】 C

【答案解析】 社会性应激源的范围很广，生活中的很多事件都可能成为应激源。生活事件也称生活变化，主要是指可以造成个人的生活风格和行为方式改变，并要求个体去适应或应对的社会生活情境和事件。

100.【正确答案】 B

【答案解析】 躯体性应激源是指引起生理反应的直接作用于人体的各种物理、化学和生物学刺激，如冷、热、噪音、病毒、损伤等，这些刺激会导致心理反应。过度的疲劳也属于躯体性应激源。



2022 年中医内科主治医师《专业知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 A

【答案解析】 时行感冒的特征为多呈流行性，在同一时期发病人数剧增，且病证相似，多突然起病，恶寒、发热（多为高热）、周身酸痛、疲乏无力，病情一般较普通感冒为重。

2. 【正确答案】 B

【答案解析】 外感咳嗽，多为新病，起病急，病程短，常伴恶寒、发热、头痛等肺卫表证。内伤咳嗽，多为久病，常反复发作，病程长，可伴它脏见症。

外感咳嗽以风寒风热、风燥为主，一般均属邪实，而内伤咳嗽多为虚实夹杂、本虚标实，其中痰湿、痰热、肝火多为邪实正虚；肺阴方耗则属正虚或虚中夹实。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】 哮喘病的治疗当宗朱丹溪“未发以扶正气为主，既发以攻邪气为急”之说，以“发时治标，平时治本”为基本原则。

4. 【正确答案】 A

【答案解析】 肺痈成痈期表现：身热转甚，时时振寒，继则壮热，汗出烦躁，咳嗽气急，胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。

5. 【正确答案】 A

【答案解析】 肺胀是多种慢性肺系疾患反复发作，迁延不愈，导致肺气胀满，不能敛降的一种病证。其病程缠绵，时轻时重，经久难愈，严重者可出现神昏、痉厥、出血、喘脱等危重证候。

6. 【正确答案】 C

【答案解析】 心悸之病名，首见于汉代张仲景的《金匱要略》和《伤寒论》，称之为“心动悸”、“心下悸”、“心中悸”及“惊悸”等。

7. 【正确答案】 D

【答案解析】 《医林改错》以血府逐瘀汤治胸痹心痛，为治疗胸痹开辟了广阔的途径。

8. 【正确答案】 B

【答案解析】 痴呆的病因：1. 年迈体虚；2. 情志所伤；3. 久病耗损；4. 饮食不节。

9. 【正确答案】 B

【答案解析】 血厥实证多因急躁恼怒而发，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫色，舌黯红，脉弦而有力。

10. 【正确答案】 E

【答案解析】 幽门螺杆菌（HP）感染是慢性胃炎的最主要病因。



11.【正确答案】A

【答案解析】呃逆之胃火上逆证

证候：呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，脘腹满闷，大便秘结，小便短赤，苔黄燥，脉滑数。

12.【正确答案】C

【答案解析】大腹指腹的上部，位于胸部与脐之间的部分，脾胃病证所主。

13.【正确答案】A

【答案解析】久泻不可分利太过，以防劫其阴液。

14.【正确答案】C

【答案解析】痢疾与泄泻：两者均多发于夏秋季节，病变部位在胃肠，病因亦有相同之处，症状都有腹痛、大便次数增多。但痢疾大便次数虽多而量少，排赤白脓血便，腹痛伴里急后重感明显。而泄泻也可见大便次数增多，大便溏薄，粪便清稀，或如水样，或完谷不化，而无赤白脓血便，腹痛多伴肠鸣，少有里急后重感。

15.【正确答案】D

【答案解析】胁痛之肝胆湿热证

证候主症：胁肋重着或灼热疼痛，痛有定处，触痛明显。口苦口黏，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，大便不爽，或兼有身热恶寒，身目发黄，舌红苔黄腻，脉弦滑数。

16.【正确答案】E

【答案解析】E. 腹膨大如蛙腹是水鼓的特征，因此本题答案选E。

17.【正确答案】A

【答案解析】风为百病之长，外感病证，一般以风邪为先导。

18.【正确答案】E

【答案解析】痉证之神昏多出现在抽搐之后，而中风患者多在起病时即有神昏，而后可以出现抽搐。

19.【正确答案】B

【答案解析】甲亢主要临床表现有：高代谢症候群、弥漫性甲状腺肿、眼征和胫前黏液性水肿。甲状腺危象为甲亢的特殊临床表现。

20.【正确答案】E

【答案解析】水肿是体内水液潴留，泛滥肌肤，表现以头面、眼睑、四肢、腹背，甚至全身浮肿为特征的一类病证。

21.【正确答案】C

【答案解析】膏淋：小便浑浊，乳白或如米泔水，上有浮油，置之沉淀，或伴有絮状凝块物，或混有血液、血块，尿道热涩疼痛，尿时阻塞不畅，口干，舌质红，舌苔黄腻，脉濡数。

治法：清热利湿，分清泄浊。

代表方：程氏萆薢分清饮加减。

22.【正确答案】D

【答案解析】小便不畅，点滴而短少，病势较缓者称为癃；小便闭塞，点滴不通，病势较急者称为闭。

23.【正确答案】C

【答案解析】慢性肾衰竭代谢性酸中毒：常



表现为乏力，反应迟钝，呼吸深大，甚至昏迷。酸中毒可加重高钾血症。

24.【正确答案】 A

【答案解析】 郁证之心脾两虚证。

证候：多思善疑，头晕神疲，心悸胆怯，失眠健忘，纳差，面色不华，舌质淡，苔薄白，脉细。

治法：健脾养心，补益气血。

代表方：归脾汤加减。

25.【正确答案】 E

【答案解析】 吐血之胃热壅盛证。

证候：脘腹胀闷，嘈杂不适，甚则作痛，吐血色红或紫黯，常夹有食物残渣，口臭，便秘，大便色黑，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清胃泻火，化瘀止血。

代表方：泻心汤合十灰散加减。

26.【正确答案】 A

【答案解析】 悬饮之络气不和证。

证候：胸胁疼痛，如灼如刺，胸闷不舒，呼吸不畅，或有闷咳，甚则迁延，经久不已，阴雨更甚，可见病侧胸廓变形，舌苔薄，质黯，脉弦。

治法：理气和络。

代表方：香附旋覆花汤加减。

27.【正确答案】 A

【答案解析】 中消之胃热炽盛证。

证候：多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，大便干燥，舌苔黄，脉滑实有力。

治法：清胃泻火，养阴增液。

代表方：玉女煎加减。

28.【正确答案】 C

【答案解析】 盗汗之阴虚火旺证。

证候：夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴降火。

代表方：当归六黄汤加减。

29.【正确答案】 C

【答案解析】 痰湿郁热证证候：低热，午后热甚，心内烦热，胸脘痞闷，不思饮食，呕恶，大便稀溏或黏滞不爽，舌苔白腻或黄腻，脉濡数。

治法：燥湿化痰，清热和中。

代表方：黄连温胆汤合中和汤加减。

30.【正确答案】 D

【答案解析】 虚劳肺阴虚证证候：干咳，咽燥，咯血，甚或失音，潮热，盗汗，面色潮红，舌红少津，脉细数。

治法：养阴润肺。

代表方：沙参麦冬汤加减。

31.【正确答案】 E

【答案解析】 肺癌之气阴两虚证。

证候：咳嗽痰少，或痰稀，咳声低弱，气短喘促，神疲乏力，面色(白光)白，形瘦恶风，自汗或盗汗，口干少饮，舌质红或淡，脉细弱。

治法：益气养阴。

代表方：生脉散合百合固金汤加减。

32.【正确答案】 C

【答案解析】 脑瘤之痰瘀阻窍证。

证候：头晕头痛，项强，目眩，视物不清，呕吐，失眠健忘，肢体麻木，面唇暗红或



紫暗，舌质紫暗或瘀点或有瘀斑，脉涩。

治法：息风化痰，祛瘀通窍。

代表方：通窍活血汤加减。

33.【正确答案】C

【答案解析】行痹

证候：肢体关节、肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，疼痛呈游走性，初起可见有恶风、发热等表证，舌苔薄白，脉浮或浮缓。

治法：祛风通络，散寒除湿。

代表方：防风汤加减。

34.【正确答案】B

【答案解析】朱丹溪《医学明理·痲门论》指出：“方书皆谓感受风湿而致，多用风药，予细详之，恐仍未备，当作气血内虚，外物干之所致。”

35.【正确答案】C

【答案解析】痿证与痹证鉴别：

痹证后期，由于肢体关节疼痛，不能运动，肢体长期废用，亦有类似痿证之瘦削枯萎者。但痿证肢体关节一般不痛，痹证则均有疼痛，其病因病机、治法也不相同，应予鉴别。

36.【正确答案】E

【答案解析】颤证气血亏虚证的代表方剂为人参养荣汤。

37.【正确答案】A

【答案解析】湿热腰痛

证候：腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气症状加重，活动后或可减轻，身体困重，小便短赤，舌苔黄腻，脉濡数或弦数。

治法：清热利湿，舒筋止痛。

代表方：四妙丸加减。

38.【正确答案】D

【答案解析】阴脱

证候：神情恍惚或烦躁不安，面色潮红，心烦潮热，口干欲饮，便秘少尿，皮肤干燥而皱，舌红而干，脉微细数。

治法：救阴固脱。

代表方：生脉散。

39.【正确答案】E

【答案解析】中医文献中论述的“昏愤”、“昏蒙”、“昏冒”、“昏迷”等均属神昏范畴。

40.【正确答案】A

【答案解析】猝死阴虚证的代表方剂为生脉散。

41.【正确答案】A

【答案解析】有机磷杀虫药中毒呼气、呕吐物、体表有大蒜样臭味。

42.【正确答案】B

【答案解析】急性酒精中毒实证

证候：恶心呕吐，呼出气有酒味，腹痛腹泻，甚则呕血，便血，昏睡，神昏谵语，狂躁，舌质深红，苔黄腻，脉弦数。

治法：和中解毒。

代表方：甘草泻心汤加减。

常用药：生甘草、黄芩、黄连、干姜、半夏、大枣、生晒参等。

加减法：毒盛者，加绿豆、鸡蛋清；纳呆不适者，加麦冬、砂仁；便秘者，加酒军、郁李仁；腹泻者，加黄连、炮姜。



43.【正确答案】B

【答案解析】郁证之肝气郁结证。

证候：精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，脘闷暖气，不思饮食，大便不调，舌苔薄腻，脉弦。

治法：疏肝解郁，理气畅中。

代表方：柴胡疏肝散加减。

44.【正确答案】A

【答案解析】便血之脾胃虚寒证。

证候：便血紫黯，甚则黑色，腹部隐痛，喜热饮，面色不华，神倦懒言，便溏，舌质淡，脉细。

治法：健脾温中，养血止血。

代表方：黄土汤加减。

45.【正确答案】C

【答案解析】悬饮：胸胁饱满，咳唾引痛，喘促不能平卧，或有肺癆病史，属饮流胸下。

46.【正确答案】D

【答案解析】消渴的病因：禀赋不足；饮食失节；情志失调；劳欲过度。

47.【正确答案】C

【答案解析】自汗、盗汗中医分型有四型：肺卫不固证；心血不足证；阴虚火旺证；邪热郁蒸证。

48.【正确答案】B

【答案解析】气虚发热证证候：发热常在劳累后发生或加剧，热势或高或低，头晕乏力，气短懒言，自汗，易于感冒，食少便溏，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：益气健脾，甘温除热。

代表方：补中益气汤加减。

49.【正确答案】D

【答案解析】虚劳心气虚证证候：心悸、气短、劳则尤甚，神疲体倦，自汗，舌淡，苔白，脉弱。

治法：益气养心。

代表方：七福饮加减。

50.【正确答案】D

【答案解析】郁证之心神失养证。

证候：精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善哭，喜怒无常，或时时欠伸，或手舞足蹈，骂詈喊叫等，舌质淡，脉弦。此种证候多见于女性，常因精神刺激而诱发。临床表现多种多样，但同一患者每次发作多为同样几种症状的重复。《金匱要略·妇人杂病脉证并治》将此种证候称为“脏躁”。

治法：甘润缓急，养心安神。

代表方：甘麦大枣汤加减。

51.【正确答案】B

【答案解析】齿衄之阴虚火旺证。

证候：齿衄，血色淡红，起病较缓，常因受热及烦劳而诱发，齿摇不坚，舌质红，苔少，脉细数。

治法：滋阴降火，凉血止血。

代表方：六味地黄丸合茜根散加减。

52.【正确答案】A

【答案解析】肺癌之瘀阻肺络证。

证候：咳嗽不畅，胸闷气憋，胸痛有定处，如锥如刺，或痰血暗红，口唇紫暗，舌质暗或有瘀点、瘀斑，苔薄，脉细弦或细涩。

治法：行气活血，散瘀消结。

代表方：血府逐瘀汤加减。



53.【正确答案】C

【答案解析】类风湿关节炎关节疼痛以腕关节、掌指关节和近端指间关节最常见，可见晨僵，肿胀。①晨僵持续至少1小时(≥6周)；②3个或3个以上关节肿(≥6周)；③腕关节或掌指关节或近端指间关节肿(≥6周)；④对称性关节肿(≥6周)。关节畸形多见于较晚期患者，常见的有手指关节的尺侧偏斜、鹅颈样畸形；跖趾关节爪样畸形，足外翻畸形等。

54.【正确答案】E

【答案解析】郁证之肝气郁结证：证候表现为精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，脘闷噎气，不思饮食，大便不调，舌苔薄腻，脉弦。选项E为郁证之心脾两虚证的表现。

55.【正确答案】C

【答案解析】郁证之心神失养证。
证候：精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善哭，喜怒无常，或时时欠伸，或手舞足蹈，骂詈喊叫等，舌质淡，脉弦。此种证候多见于女性，常因精神刺激而诱发。临床表现多种多样，但同一患者每次发作为同样几种症状的重复。《金匱要略·妇人杂病脉证并治》将此种证候称为“脏躁”。
治法：甘润缓急，养心安神。
代表方：甘麦大枣汤加减。

56.【正确答案】C

【答案解析】鼻衄之胃热炽盛证。
证候：鼻衄，或兼齿衄，血色鲜红，口渴欲饮，鼻干，口干臭秽，烦躁，便秘，舌红，苔黄，脉数。
治法：清胃泻火，凉血止血。

代表方：玉女煎加减。

57.【正确答案】D

【答案解析】咳血之阴虚肺热证。
证候：咳嗽痰少，痰中带血，或反复咳血，血色鲜红，口干咽燥，颧红，潮热盗汗，舌质红，脉细数。
治法：滋阴润肺，宁络止血。
代表方：百合固金汤加减。

58.【正确答案】D

【答案解析】风湿热痹
证候：关节疼痛，局部灼热红肿，得冷稍舒，痛不可触，可病及一个或多个关节，多兼有发热、恶风、口渴、烦闷不安等全身症状，舌苔黄燥，脉滑数。
“肌肤麻木不仁”属于着痹的特点。

59.【正确答案】D

【答案解析】神志清醒、烦躁不安、恶心呕吐、脉搏加快为代偿性休克的表现。反应迟钝为失代偿性休克的表现。

60.【正确答案】B

【答案解析】神昏邪毒内闭证
证候：神昏，高热或身热不扬，烦躁，或见谵语，二便秘结，舌红或绛，苔厚或腻或黄或白，脉沉实有力。
治法：清热化痰，开闭醒神。
代表方：菖蒲郁金汤加减。

61.【正确答案】A

【答案解析】胁腹、两侧少腹痛多属肝经病证，为足厥阴、足少阳经脉所主；大腹疼痛，多为脾胃病证，为足太阴、足阳明经脉所主；脐腹疼痛多为大小肠病证，为手



阳明、手太阳经脉所主；脐以下小腹痛多属肾、膀胱、胞宫病证，为足少阴、足太阳经脉及冲、任、带脉所主。

62.【正确答案】D

【答案解析】慢性胰腺炎疼痛严重患者喜蜷曲卧位、坐位或前倾位，平卧位或直立时腹痛加重（称为胰腺疼痛性体位）。

63.【正确答案】E

【答案解析】喘证的辨证首当分清虚实。实喘者呼吸深长有余，呼出为快，气粗声高，伴有痰鸣咳嗽，脉数有力，病势多急；虚喘者呼吸短促难续，深吸为快，气怯声低，少有痰鸣咳嗽，脉象微弱或浮大中空，病势徐缓，时轻时重，遇劳则甚。

64.【正确答案】A

【答案解析】实喘者呼吸深长有余，呼出为快，气粗声高，伴有痰鸣咳嗽，脉数有力，病势多急；虚喘者呼吸短促难续，深吸为快，气怯声低，少有痰鸣咳嗽，脉象微弱或浮大中空，病势徐缓，时轻时重，遇劳则甚。

65.【正确答案】C

【答案解析】肺痿的主要病变部位在肺，以肺阴虚为主。久则损及脾、肾两脏，肺损及脾，以气阴两伤为主，肺肾两伤，元阴受损，则表现为阴虚火旺之象。甚则由气虚而致阳虚，发展为阴阳两虚之证候。

66.【正确答案】A

【答案解析】继发型肺结核多发生于成人，病程长，易反复。

67.【正确答案】B

【答案解析】黄疸的证候特征是目黄、身黄、小便黄，以目睛发黄最为突出。

68.【正确答案】C

【答案解析】胆囊结石首选B超检查，发现胆囊内有强回声团、随体位改变而移动、其后有声影即可确诊为胆囊结石。

69.【正确答案】C

【答案解析】刘河间提出：“调气则后重自除，行血则便脓自愈。”“痢赤属血”，以血分病变为主，痢下赤多者重用血药；“白属气”，以气分病变为主，痢下白多者重用气药。

70.【正确答案】C

【答案解析】溃疡性结肠炎是一种直肠和结肠慢性非特异性炎症性疾病，病变主要累及大肠黏膜和黏膜下层。主要表现为腹泻、腹痛和黏液脓血便。

71.【正确答案】C

【答案解析】痞满的基本病位在胃，与肝、脾的关系密切。

72.【正确答案】A

【答案解析】痞满之痰湿中阻证
证候：脘腹痞塞不舒，胸膈满闷，头晕目眩，身重困倦，呕恶纳呆，口淡不渴，小便不利，舌苔白厚腻，脉沉滑。
治法：除湿化痰，理气和中。
代表方：二陈平胃汤加减。

73.【正确答案】A

【答案解析】痢之为病，病理因素总以痰为



主，每由风、火触动，痰瘀内阻，蒙蔽清窍，气机逆乱，元神失控而发病。

74.【正确答案】 B

【答案解析】 痰聚气逆，闭阻清窍，则痫证发作；痰降气顺，则发作休止；若风阳痰火逆而不降，则见痫证大发作。至于发作时间的久暂、间歇期的长短，则与气机顺逆和痰浊内聚程度有密切关系。

75.【正确答案】 D

【答案解析】 癫狂病理因素以气、痰、火、瘀为主，四者有因果兼夹的关系，且多以气郁为先。

76.【正确答案】 C

【答案解析】 真心痛之寒凝心脉证

证候：胸痛彻背，胸闷气短，心悸不宁，神疲乏力，形寒肢冷，舌质淡黯，舌苔白腻，脉沉无力，迟缓或结代。

治法：温补心阳，散寒通脉。

代表方：当归四逆汤加味。

77.【正确答案】 A

【答案解析】 疼痛为急性心肌梗死最早出现和最突出的症状，部位、性质与心绞痛相似，程度更剧烈，持续时间更长，可达数小时或数天，多无诱因，休息和含服硝酸甘油多不能缓解。

78.【正确答案】 E

【答案解析】 不寐的病机总属阳盛阴衰，阴阳失交。一为阴虚不能纳阳，一为阳盛不得入于阴。

79.【正确答案】 A

【答案解析】 一氧化碳中毒虚证(脱证)

证候：不省人事，汗出淋漓，呼吸急促，面色苍白，口唇青紫，四肢逆冷，二便失禁，舌卷而颤，脉微欲绝。

治法：回阳固脱。

代表方：陶氏回阳急救汤加减。

80.【正确答案】 A

【答案解析】 现场抢救一氧化碳中毒时，迅速将病人转移到空气新鲜的地方。

二、B型题

(81~82题共用备选答案)

81.【正确答案】 D

【答案解析】 癫狂为精神失常疾病，癫证以精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，语无伦次，静而多喜为特征。狂证以精神亢奋，狂躁不安，喧扰不宁，骂詈毁物，动而多怒为特征。

82.【正确答案】 C

【答案解析】 癫狂为精神失常疾病，癫证以精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，语无伦次，静而多喜为特征。狂证以精神亢奋，狂躁不安，喧扰不宁，骂詈毁物，动而多怒为特征。

(83~84题共用备选答案)

83.【正确答案】 B

【答案解析】 郁证之气郁化火证。

证候：性情急躁易怒，胸胁胀满，口苦而干，或头痛，目赤，耳鸣，或嘈杂吞酸，大便秘结，舌质红，苔黄，脉弦数。

治法：疏肝解郁，清肝泻火。

代表方：丹栀逍遥散加减。



84.【正确答案】D

【答案解析】郁证之痰气郁结证。

证候：精神抑郁，胸部闷塞，胁肋胀满，咽中如有物梗塞，吞之不下，咯之不出，舌苔白腻，脉弦滑。本证亦即《金匱要略·妇人杂病脉证并治》所说“妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之”之症。《医宗金鉴·诸气治法》将本证称为“梅核气”。

治法：行气开郁，化痰散结。

代表方：半夏厚朴汤加减。

(85~86题共用备选答案)

85.【正确答案】D

【答案解析】尿浊是指小便混浊，白如泔浆的症状。其在小便浑浊症状上与膏淋相似，但是排尿时无疼痛滞涩感。

膏淋与尿浊：膏淋与尿浊在小便浑浊症状上相似，但后者在排尿时无疼痛滞涩感，可资鉴别。

膏淋证见小便浑浊如米泔水或滑腻如膏脂。

86.【正确答案】E

【答案解析】尿浊是指小便混浊，白如泔浆的症状。其在小便浑浊症状上与膏淋相似，但是排尿时无疼痛滞涩感。

膏淋与尿浊：膏淋与尿浊在小便浑浊症状上相似，但后者在排尿时无疼痛滞涩感，可资鉴别。

膏淋证见小便浑浊如米泔水或滑腻如膏脂。

(87~88题共用备选答案)

87.【正确答案】B

【答案解析】郁证之心肾阴虚证。

证候：情绪不宁，心悸，健忘，失眠，多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

治法：滋养心肾。

代表方：天王补心丹合六味地黄丸加减。

88.【正确答案】A

【答案解析】郁证之心脾两虚证。

证候：多思善疑，头晕神疲，心悸胆怯，失眠健忘，纳差，面色不华，舌质淡，苔薄白，脉细。

治法：健脾养心，补益气血。

代表方：归脾汤加减。

(89~90题共用备选答案)

89.【正确答案】A

【答案解析】虚劳心血虚证证候：心悸怔忡，健忘，失眠，多梦，面色不华，舌质淡，脉细或结代。

治法：养血安神。

代表方：养心汤加减。

90.【正确答案】B

【答案解析】虚劳肝血虚证证候：头晕，目眩，胁痛，肢体麻木，筋脉拘急，或惊惕肉瞤，妇女月经不调甚则经闭，面色不华，舌质淡，脉弦细或细涩。

治法：补血养肝。

代表方：四物汤加减。

(91~92题共用备选答案)

91.【正确答案】A

【答案解析】便血之气虚不摄证。

证候：便血色红或紫黯，食少，体倦，面色萎黄，心悸，少寐，舌质淡，脉细。

治法：益气摄血。

代表方：归脾汤加减。

92.【正确答案】A



【答案解析】吐血之气虚血溢证。

证候：吐血缠绵不止，时轻时重，血色暗淡，神疲乏力，心悸气短，面色苍白，舌质淡，脉细弱。

治法：健脾益气摄血。

代表方：归脾汤加减。

(93~94 题共用备选答案)

93.【正确答案】A

【答案解析】虚劳脾胃阴虚证证候：口干唇燥，不思饮食，大便燥结，甚则干呕，呃逆，面色潮红，舌干，苔少或无苔，脉细数。

治法：养阴和胃。

代表方：益胃汤加减。

94.【正确答案】B

【答案解析】虚劳肾阴虚证证候：腰酸，遗精，两足痿弱，眩晕耳鸣，甚则耳聋，口干，咽痛，颧红，舌红少津，脉沉细。

治法：滋补肾阴。

代表方：左归丸加减。

(95~96 题共用备选答案)

95.【正确答案】B

【答案解析】大肠癌之脾肾双亏证。

证候：腹痛喜温喜按，或腹内结块，下利清谷或五更泄泻，或见大便带血，面色苍白，少气无力，畏寒肢冷，腰酸膝冷，舌质淡胖，有齿痕，苔薄白，脉沉细弱。

治法：温阳益精。

代表方：大补元煎加减。

96.【正确答案】E

【答案解析】大肠癌之肝肾阴虚证。

证候：腹痛隐隐，或腹内结块，便秘，大便带血，腰膝酸软，头晕耳鸣，视物昏花，五心烦热，口咽干燥，盗汗，遗精，月经不调，形瘦纳差，舌红少苔，脉弦细数。

治法：滋肾养肝。

代表方：知柏地黄丸加减。

(97~98 题共用备选答案)

97.【正确答案】A

【答案解析】慢性肾衰竭出现多尿时，尿量 >2500ml/24h。

98.【正确答案】D

【答案解析】慢性肾衰竭出现少尿时，尿量 <400ml/24h。

(99~100 题共用备选答案)

99.【正确答案】A

【答案解析】自汗之肺卫不固证

证候：汗出恶风，稍劳汗出尤甚，或表现半身、某一局部出汗，易于感冒，体倦乏力，周身酸楚，面色(白光)白少华，舌苔薄白，脉细弱。

治法：益气固表。

代表方：桂枝加黄芪汤或玉屏风散加减。

100.【正确答案】C

【答案解析】盗汗之阴虚火旺证

证候：夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴降火。

代表方：当归六黄汤加减。



2022 年中医内科主治医师《专业实践能力》 模拟试卷答案解析

一、A2 型题

1.【正确答案】 E

【答案解析】 阳虚秘

证候：大便干或不干，排出困难，小便清长，面色(白光)白，四肢不温，腹中冷痛，或腰膝酸冷，舌淡苔白，脉沉迟。

2.【正确答案】 E

【答案解析】 “痛如锥刺，固定不移，舌质紫，脉细涩”都是瘀血的典型表现。

3.【正确答案】 B

【答案解析】 湿毒浸淫，损伤肺脾三焦气化不利，水液内停出现水肿，肿势自颜面渐及全身，小便不利，辨证属于湿毒浸淫证，其治法为宣肺解毒，利湿消肿，方用麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮加减。

4.【正确答案】 B

【答案解析】 肾病综合征的实验室及其他检查：尿常规及肾功能检查：大量蛋白尿，尿蛋白定量 $>3.5\text{g}/24\text{h}$ ，尿中可出现红细胞及管型。肾功能可正常或肾小球滤过功能下降。低白蛋白血症：血浆白蛋白 $<30\text{g}/\text{L}$ 。高脂血症：以高胆固醇和高甘油三酯为主，在严重时低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白都增加。因此应考虑的诊断是肾病综合征。

5.【正确答案】 B

【答案解析】 根据题干中患者的表现，可以辨证为中消之胃热炽盛证。

证候：多食易饥，口渴，尿多，形体消瘦，大便干燥，舌苔黄，脉滑实有力。

治法：清胃泻火，养阴增液。

代表方：玉女煎加减。

6.【正确答案】 D

【答案解析】 自汗之肺卫不固证。

证候：汗出恶风，稍劳汗出尤甚，或表现半身、某一局部出汗，易于感冒，体倦乏力，周身酸楚，面色(白光)白少华，舌苔薄白，脉细弱。

治法：益气固表。

代表方：桂枝加黄芪汤或玉屏风散加减。

7.【正确答案】 D

【答案解析】 肺癌之瘀阻肺络证。

证候：咳嗽不畅，胸闷气憋，胸痛有定处，如锥如刺，或痰血暗红，口唇紫暗，舌质暗或有瘀点、瘀斑，苔薄，脉细弦或细涩。

治法：行气活血，散瘀消结。

代表方：血府逐瘀汤加减。

8.【正确答案】 D

【答案解析】 呕吐之肝气犯胃证

证候：呕吐吞酸，暖气频繁，胸胁胀痛，舌淡红，苔薄，脉弦。



9.【正确答案】D

【答案解析】六种淋证均有小便频涩，滴沥刺痛，小腹拘急，引痛腰腹，患者主症表现有尿色深红，或夹有血块，则辨证为淋证之血淋。

二、A3/A4型题

(10~13题共用题干)

10.【正确答案】A

【答案解析】气虚感冒

恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咽隐痛，咳嗽，痰稀白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。

治法：益气解表。

代表方：参苏饮加减。

常用药：党参、甘草、茯苓、苏叶、葛根、前胡、半夏、陈皮、枳壳、桔梗等。

加减：若表虚自汗，易伤风邪者，可常服玉屏风散益气固表，以防感冒。若见恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，为阳虚外感，当助阳解表，用再造散加减，药用党参、黄芪、桂枝、附子、炙甘草、细辛、防风、羌活等。

11.【正确答案】D

【答案解析】气虚感冒

恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咽隐痛，咳嗽，痰稀白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。

治法：益气解表。

代表方：参苏饮加减。

常用药：党参、甘草、茯苓、苏叶、葛根、前胡、半夏、陈皮、枳壳、桔梗等。

加减：若表虚自汗，易伤风邪者，可常服

玉屏风散益气固表，以防感冒。若见恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，为阳虚外感，当助阳解表，用再造散加减，药用党参、黄芪、桂枝、附子、炙甘草、细辛、防风、羌活等。

12.【正确答案】B

【答案解析】气虚感冒

恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咽隐痛，咳嗽，痰稀白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。

治法：益气解表。

代表方：参苏饮加减。

常用药：党参、甘草、茯苓、苏叶、葛根、前胡、半夏、陈皮、枳壳、桔梗等。

加减：若表虚自汗，易伤风邪者，可常服玉屏风散益气固表，以防感冒。若见恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，为阳虚外感，当助阳解表，用再造散加减，药用党参、黄芪、桂枝、附子、炙甘草、细辛、防风、羌活等。

13.【正确答案】E

【答案解析】气虚感冒

恶寒较甚，发热，无汗，头痛身楚，咽隐痛，咳嗽，痰稀白，咳痰无力，平素神疲体弱，气短懒言，反复易感，舌淡苔白，脉浮而无力。

治法：益气解表。

代表方：参苏饮加减。

常用药：党参、甘草、茯苓、苏叶、葛根、前胡、半夏、陈皮、枳壳、桔梗等。

加减：若表虚自汗，易伤风邪者，可常服



玉屏风散益气固表，以防感冒。若见恶寒重，发热轻，四肢欠温，语音低微，舌质淡胖，脉沉细无力，为阳虚外感，当助阳解表，用再造散加减，药用党参、黄芪、桂枝、附子、炙甘草、细辛、防风、羌活等。

(14~16 题共用题干)

14.【正确答案】D

【答案解析】咳嗽之肝火犯肺证

上气咳逆阵作，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，或如絮条，胸胁胀痛，咳时引痛，症状可随情绪波动而增减，舌红或舌边红，舌苔薄黄少津，脉弦数。

15.【正确答案】C

【答案解析】咳嗽之肝火犯肺证

上气咳逆阵作，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，或如絮条，胸胁胀痛，咳时引痛，症状可随情绪波动而增减，舌红或舌边红，舌苔薄黄少津，脉弦数。

治法：清肺泻肝，顺气降火。

16.【正确答案】A

【答案解析】咳嗽之肝火犯肺证

上气咳逆阵作，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，或如絮条，胸胁胀痛，咳时引痛，症状可随情绪波动而增减，舌红或舌边红，舌苔薄黄少津，脉弦数。

治法：清肺泻肝，顺气降火。

代表方：黛蛤散合泻白散加减。

(17~19 题共用题干)

17.【正确答案】D

【答案解析】哮病之肺肾两虚证

短气息促，动则为甚，吸气不利，咳痰质黏起沫，脑转耳鸣，腰酸腿软，心慌，不耐劳累。或五心烦热，颧红，口干，舌质红少苔，脉细数；或畏寒肢冷，面色苍白，舌苔淡白，质胖，脉沉细。

治法：补肺益肾。

代表方：生脉地黄汤合金水六君煎加减。两者都可用于久哮肺肾两虚，但前者以益气养阴为主，适用于肺肾气阴两伤，后者以补肾化痰为主，适用于肾虚阴伤痰多。

18.【正确答案】A

【答案解析】哮病之肺肾两虚证

短气息促，动则为甚，吸气不利，咳痰质黏起沫，脑转耳鸣，腰酸腿软，心慌，不耐劳累。或五心烦热，颧红，口干，舌质红少苔，脉细数；或畏寒肢冷，面色苍白，舌苔淡白，质胖，脉沉细。

治法：补肺益肾。

代表方：生脉地黄汤合金水六君煎加减。两者都可用于久哮肺肾两虚，但前者以益气养阴为主，适用于肺肾气阴两伤，后者以补肾化痰为主，适用于肾虚阴伤痰多。

19.【正确答案】B

【答案解析】哮病之肺肾两虚证

短气息促，动则为甚，吸气不利，咳痰质黏起沫，脑转耳鸣，腰酸腿软，心慌，不耐劳累。或五心烦热，颧红，口干，舌质红少苔，脉细数；或畏寒肢冷，面色苍白，舌苔淡白，质胖，脉沉细。

治法：补肺益肾。

代表方：生脉地黄汤合金水六君煎加减。两者都可用于久哮肺肾两虚，但前者以益



气养阴为主，适用于肺肾气阴两伤，后者以补肾化痰为主，适用于肾虚阴伤痰多。

(20~22 题共用题干)

20.【正确答案】 A

【答案解析】 肺痈初期

恶寒发热，咳嗽，咯白色黏沫痰，痰量由少渐多，胸痛，咳时尤甚，呼吸不利，口干鼻燥，舌苔薄黄或薄白，脉浮数而滑。

治法：清肺解表。

代表方：银翘散加减。

21.【正确答案】 C

【答案解析】 肺痈初期

恶寒发热，咳嗽，咯白色黏沫痰，痰量由少渐多，胸痛，咳时尤甚，呼吸不利，口干鼻燥，舌苔薄黄或薄白，脉浮数而滑。

治法：清肺解表。

代表方：银翘散加减。

22.【正确答案】 D

【答案解析】 肺痈初期

恶寒发热，咳嗽，咯白色黏沫痰，痰量由少渐多，胸痛，咳时尤甚，呼吸不利，口干鼻燥，舌苔薄黄或薄白，脉浮数而滑。

治法：清肺解表。

代表方：银翘散加减。

(23~25 题共用题干)

23.【正确答案】 C

【答案解析】 肺痿之气阴耗伤证

咳嗽无力，气短声低，咳痰清稀色白，量较多，偶或夹血，或咯血，血色淡红，午后潮热，伴有畏风，怕冷，自汗与盗汗可并见，纳少神疲，便溏，面色(白光)白，颧红，舌质光淡，边有齿印，苔薄，脉细

弱而数。

治法：益气养阴。

代表方：保真汤或参苓白术散加减。

24.【正确答案】 E

【答案解析】 肺痿之气阴耗伤证

咳嗽无力，气短声低，咳痰清稀色白，量较多，偶或夹血，或咯血，血色淡红，午后潮热，伴有畏风，怕冷，自汗与盗汗可并见，纳少神疲，便溏，面色(白光)白，颧红，舌质光淡，边有齿印，苔薄，脉细弱而数。

治法：益气养阴。

代表方：保真汤或参苓白术散加减。

25.【正确答案】 B

【答案解析】 肺痿之气阴耗伤证

咳嗽无力，气短声低，咳痰清稀色白，量较多，偶或夹血，或咯血，血色淡红，午后潮热，伴有畏风，怕冷，自汗与盗汗可并见，纳少神疲，便溏，面色(白光)白，颧红，舌质光淡，边有齿印，苔薄，脉细弱而数。

治法：益气养阴。

代表方：保真汤或参苓白术散加减。

(26~28 题共用题干)

26.【正确答案】 A

【答案解析】 根据题干描述症状，诊断为心悸之水饮凌心证。

其病机为：脾肾阳虚，水饮内停，上凌于心。

治法：振奋心阳，化气行水，宁心安神。

代表方：苓桂术甘汤加减。

27.【正确答案】 C



【答案解析】根据题干描述症状，诊断为心悸之水饮凌心证。

治法：振奋心阳，化气行水，宁心安神。

代表方：苓桂术甘汤加减。

28.【正确答案】A

【答案解析】根据题干描述症状，诊断为心悸之水饮凌心证。

治法：振奋心阳，化气行水，宁心安神。

代表方：苓桂术甘汤加减。

(29~31 题共用题干)

29.【正确答案】A

【答案解析】根据题干症状辨证为胸痹之痰浊闭阻证

治法：通阳泄浊，豁痰宣痹。

代表方：栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减。

30.【正确答案】C

【答案解析】根据题干症状辨证为胸痹之痰浊闭阻证

治法：通阳泄浊，豁痰宣痹。

代表方：栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减。

31.【正确答案】D

【答案解析】根据题干症状辨证为胸痹之痰浊闭阻证

治法：通阳泄浊，豁痰宣痹。

代表方：栝蒌薤白半夏汤合涤痰汤加减。

(32~34 题共用题干)

32.【正确答案】C

【答案解析】根据症状其辨证分型为痲病之风痰闭阻证，治以涤痰息风、开窍定痲之法，代表方为定痲丸。

33.【正确答案】A

【答案解析】根据症状其辨证分型为痲病之风痰闭阻证，治以涤痰息风、开窍定痲之法，代表方为定痲丸。

34.【正确答案】B

【答案解析】根据症状其辨证分型为痲病之风痰闭阻证，治以涤痰息风、开窍定痲之法，代表方为定痲丸。

(35~39 题共用题干)

35.【正确答案】E

【答案解析】根据症状其辨证分型为痲呆之瘀血内阻证，治以活血化瘀、开窍醒神之法，代表方为通窍活血汤加减。若病人日久兼气血不足应加熟地、党参、黄芪等。补阳还五汤为治疗气虚血瘀代表方，血府逐瘀汤为治疗气滞血瘀代表方。

36.【正确答案】B

【答案解析】根据症状其辨证分型为痲呆之瘀血内阻证，治以活血化瘀、开窍醒神之法，代表方为通窍活血汤加减。若病人日久兼气血不足应加熟地、党参、黄芪等。补阳还五汤为治疗气虚血瘀代表方，血府逐瘀汤为治疗气滞血瘀代表方。

37.【正确答案】A

【答案解析】根据症状其辨证分型为痲呆之瘀血内阻证，治以活血化瘀、开窍醒神之法，代表方为通窍活血汤加减。若病人日久兼气血不足应加熟地、党参、黄芪等。补阳还五汤为治疗气虚血瘀代表方，血府逐瘀汤为治疗气滞血瘀代表方。

38.【正确答案】D



【答案解析】 根据症状其辨证分型为痴呆之瘀血内阻证，治以活血化瘀、开窍醒神之法，代表方为通窍活血汤加减。若病人日久兼气血不足应加熟地、党参、黄芪等。补阳还五汤为治疗气虚血瘀代表方，血府逐瘀汤为治疗气滞血瘀代表方。

39. **【正确答案】** A

【答案解析】 根据症状其辨证分型为痴呆之瘀血内阻证，治以活血化瘀、开窍醒神之法，代表方为通窍活血汤加减。若病人日久兼气血不足应加熟地、党参、黄芪等。补阳还五汤为治疗气虚血瘀代表方，血府逐瘀汤为治疗气滞血瘀代表方。

(40~42 题共用题干)

40. **【正确答案】** C

【答案解析】 血厥实证

多因急躁恼怒而发，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。
治法：平肝潜阳，理气化痰。
代表方：羚角钩藤汤合通瘀煎加减。

41. **【正确答案】** C

【答案解析】 血厥实证

多因急躁恼怒而发，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。
治法：平肝潜阳，理气化痰。
代表方：羚角钩藤汤合通瘀煎加减。

42. **【正确答案】** B

【答案解析】 血厥实证

多因急躁恼怒而发，突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤唇紫，舌黯红，脉弦有力。
治法：平肝潜阳，理气化痰。
代表方：羚角钩藤汤合通瘀煎加减。

(43~47 题共用题干)

43. **【正确答案】** B

【答案解析】 胃痛之寒邪客胃证

胃痛暴作，恶寒喜暖，得温则痛减，遇寒则痛增，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。

治法：温胃散寒，行气止痛。

代表方：香苏散合良附丸加减。

常用药：高良姜、吴茱萸、香附、乌药、陈皮、木香等。

加减：如兼见恶寒、头痛等风寒表证者，可加苏叶、藿香等以疏散风寒；若兼见胸脘痞闷，胃纳呆滞，暖气或呕吐者，是为寒夹食滞，可加枳实、神曲、鸡内金、制半夏、生姜等以消食导滞，降逆止呕。若寒邪郁久化热，寒热错杂，可用半夏泻心汤辛开苦降，寒热并调。

44. **【正确答案】** C

【答案解析】 胃痛之寒邪客胃证

胃痛暴作，恶寒喜暖，得温则痛减，遇寒则痛增，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。

治法：温胃散寒，行气止痛。

代表方：香苏散合良附丸加减。

常用药：高良姜、吴茱萸、香附、乌药、陈皮、木香等。

加减：如兼见恶寒、头痛等风寒表证者，可加苏叶、藿香等以疏散风寒；若兼见胸脘痞闷，胃纳呆滞，暖气或呕吐者，是为寒夹食滞，可加枳实、神曲、鸡内金、制半夏、生姜等以消食导滞，降逆止呕。若寒邪郁久化热，寒热错杂，可用半夏泻心汤辛开苦降，寒热并调。

45. **【正确答案】** A

**【答案解析】**胃痛之寒邪客胃证

胃痛暴作，恶寒喜暖，得温则痛减，遇寒则痛增，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。

治法：温胃散寒，行气止痛。

代表方：香苏散合良附丸加减。

常用药：高良姜、吴茱萸、香附、乌药、陈皮、木香等。

加减：如兼见恶寒、头痛等风寒表证者，可加苏叶、藿香等以疏散风寒；若兼见胸脘痞闷，胃纳呆滞，暖气或呕吐者，是为寒夹食滞，可加枳实、神曲、鸡内金、制半夏、生姜等以消食导滞，降逆止呕。若寒邪郁久化热，寒热错杂，可用半夏泻心汤辛开苦降，寒热并调。

46.【正确答案】D**【答案解析】**胃痛之寒邪客胃证

胃痛暴作，恶寒喜暖，得温则痛减，遇寒则痛增，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。

治法：温胃散寒，行气止痛。

代表方：香苏散合良附丸加减。

常用药：高良姜、吴茱萸、香附、乌药、陈皮、木香等。

加减：如兼见恶寒、头痛等风寒表证者，可加苏叶、藿香等以疏散风寒；若兼见胸脘痞闷，胃纳呆滞，暖气或呕吐者，是为寒夹食滞，可加枳实、神曲、鸡内金、制半夏、生姜等以消食导滞，降逆止呕。若寒邪郁久化热，寒热错杂，可用半夏泻心汤辛开苦降，寒热并调。

47.【正确答案】B**【答案解析】**胃痛之寒邪客胃证

胃痛暴作，恶寒喜暖，得温则痛减，遇寒

则痛增，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。

治法：温胃散寒，行气止痛。

代表方：香苏散合良附丸加减。

常用药：高良姜、吴茱萸、香附、乌药、陈皮、木香等。

加减：如兼见恶寒、头痛等风寒表证者，可加苏叶、藿香等以疏散风寒；若兼见胸脘痞闷，胃纳呆滞，暖气或呕吐者，是为寒夹食滞，可加枳实、神曲、鸡内金、制半夏、生姜等以消食导滞，降逆止呕。若寒邪郁久化热，寒热错杂，可用半夏泻心汤辛开苦降，寒热并调。

(48~51 题共用题干)

48.【正确答案】B**【答案解析】**噎膈之痰气交阻证

吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

治法：开郁化痰，润燥降气。

代表方：启膈散加减。

常用药：郁金、砂仁、丹参、沙参、贝母、茯苓、杵头糠、荷叶蒂等。

加减：若暖气呕吐明显者，酌加旋覆花、代赭石，以增降逆和胃之力；大便不通，加生大黄、莱菔子，便通即止，防止伤阴；若心烦口干，气郁化火者，加山豆根、栀子、金果榄以增清热解毒之功效。

49.【正确答案】A**【答案解析】**噎膈之痰气交阻证

吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，



舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

治法：开郁化痰，润燥降气。

代表方：启膈散加减。

常用药：郁金、砂仁、丹参、沙参、贝母、茯苓、杵头糠、荷叶蒂等。

加减：若暖气呕吐明显者，酌加旋覆花、代赭石，以增降逆和胃之力；大便不通，加生大黄、莱菔子，便通即止，防止伤阴；若心烦口干，气郁化火者，加山豆根、梔子、金果榄以增清热解毒之功效。

50.【正确答案】D

【答案解析】噎膈之痰气交阻证

吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

治法：开郁化痰，润燥降气。

代表方：启膈散加减。

常用药：郁金、砂仁、丹参、沙参、贝母、茯苓、杵头糠、荷叶蒂等。

加减：若暖气呕吐明显者，酌加旋覆花、代赭石，以增降逆和胃之力；大便不通，加生大黄、莱菔子，便通即止，防止伤阴；若心烦口干，气郁化火者，加山豆根、梔子、金果榄以增清热解毒之功效。

51.【正确答案】C

【答案解析】噎膈之痰气交阻证

吞咽梗阻，胸膈痞满，甚则疼痛，情志舒畅时稍可减轻，情志抑郁时则加重，暖气呃逆，呕吐痰涎，口干咽燥，大便艰涩，舌质红，苔薄腻，脉弦滑。

治法：开郁化痰，润燥降气。

代表方：启膈散加减。

常用药：郁金、砂仁、丹参、沙参、贝母、

茯苓、杵头糠、荷叶蒂等。

加减：若暖气呕吐明显者，酌加旋覆花、代赭石，以增降逆和胃之力；大便不通，加生大黄、莱菔子，便通即止，防止伤阴；若心烦口干，气郁化火者，加山豆根、梔子、金果榄以增清热解毒之功效。

(52~55 题共用题干)

52.【正确答案】B

【答案解析】腹痛之肝郁气滞证

腹痛胀闷，痛无定处，痛引少腹，或兼痛窜两胁，时作时止，得暖气或矢气则舒，遇忧思恼怒则剧，舌质红，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝解郁，理气止痛。

代表方：柴胡疏肝散加减。

常用药：柴胡、枳壳、香附、陈皮、芍药、甘草、川芎等。

加减：若气滞较重，胸肋胀痛者，加川楝子、郁金；若痛引少腹、睾丸者，加橘核、荔枝核；若腹痛肠鸣，气滞腹泻者，可用痛泻要方；若少腹绞痛，阴囊寒疝者，可用天台乌药散；肝郁日久化热者，加丹皮、山梔子清肝泄热。

53.【正确答案】C

【答案解析】腹痛之肝郁气滞证

腹痛胀闷，痛无定处，痛引少腹，或兼痛窜两胁，时作时止，得暖气或矢气则舒，遇忧思恼怒则剧，舌质红，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝解郁，理气止痛。

代表方：柴胡疏肝散加减。

常用药：柴胡、枳壳、香附、陈皮、芍药、甘草、川芎等。

加减：若气滞较重，胸肋胀痛者，加川楝子、郁金；若痛引少腹、睾丸者，加橘核、荔枝核；若腹痛肠鸣，气滞腹泻者，可用



痛泻要方；若少腹绞痛，阴囊寒疝者，可用天台乌药散；肝郁日久化热者，加丹皮、山栀子清肝泄热。

54.【正确答案】E

【答案解析】腹痛之肝郁气滞证

腹痛胀闷，痛无定处，痛引少腹，或兼痛窜两胁，时作时止，得暖气或矢气则舒，遇忧思恼怒则剧，舌质红，苔薄白，脉弦。治法：疏肝解郁，理气止痛。

代表方：柴胡疏肝散加减。

常用药：柴胡、枳壳、香附、陈皮、芍药、甘草、川芎等。

加减：若气滞较重，胸肋胀痛者，加川楝子、郁金；若痛引少腹、睾丸者，加橘核、荔枝核；若腹痛肠鸣，气滞腹泻者，可用痛泻要方；若少腹绞痛，阴囊寒疝者，可用天台乌药散；肝郁日久化热者，加丹皮、山栀子清肝泄热。

55.【正确答案】B

【答案解析】腹痛之肝郁气滞证

腹痛胀闷，痛无定处，痛引少腹，或兼痛窜两胁，时作时止，得暖气或矢气则舒，遇忧思恼怒则剧，舌质红，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝解郁，理气止痛。

代表方：柴胡疏肝散加减。

常用药：柴胡、枳壳、香附、陈皮、芍药、甘草、川芎等。

加减：若气滞较重，胸肋胀痛者，加川楝子、郁金；若痛引少腹、睾丸者，加橘核、荔枝核；若腹痛肠鸣，气滞腹泻者，可用痛泻要方；若少腹绞痛，阴囊寒疝者，可用天台乌药散；肝郁日久化热者，加丹皮、山栀子清肝泄热。

(56~59 题共用题干)

56.【正确答案】C

【答案解析】热秘

大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，或有身热，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。

治法：泻热导滞，润肠通便。

代表方：麻子仁丸加减。

常用药：大黄、枳实、厚朴、麻子仁、杏仁、白蜜、芍药等。

加减：若津液已伤，可加生地、玄参、麦冬以滋阴生津；若肺热气逆，咳喘便秘者，可加瓜蒌仁、苏子、黄芩清肺降气以通便；若兼郁怒伤肝，易怒目赤者，加服更衣丸以清肝通便；若燥热不甚，或药后大便不爽者，可用青麟丸以通腑缓下，以免再秘；若兼痔疮、便血，可加槐花、地榆以清肠止血；若热势较盛，痞满燥实坚者，可用大承气汤急下存阴。

57.【正确答案】B

【答案解析】热秘

大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，或有身热，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。

治法：泻热导滞，润肠通便。

代表方：麻子仁丸加减。

常用药：大黄、枳实、厚朴、麻子仁、杏仁、白蜜、芍药等。

加减：若津液已伤，可加生地、玄参、麦冬以滋阴生津；若肺热气逆，咳喘便秘者，可加瓜蒌仁、苏子、黄芩清肺降气以通便；若兼郁怒伤肝，易怒目赤者，加服更衣丸以清肝通便；若燥热不甚，或药后大便不爽者，可用青麟丸以通腑缓下，以免再秘；若兼痔疮、便血，可加槐花、地榆以清肠



止血；若热势较盛，痞满燥实坚者，可用大承气汤急下存阴。

58.【正确答案】D

【答案解析】热秘

大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，或有身热，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。

治法：泻热导滞，润肠通便。

代表方：麻子仁丸加减。

常用药：大黄、枳实、厚朴、麻子仁、杏仁、白蜜、芍药等。

加减：若津液已伤，可加生地、玄参、麦冬以滋阴生津；若肺热气逆，咳喘便秘者，可加瓜蒌仁、苏子、黄芩清肺降气以通便；若兼郁怒伤肝，易怒目赤者，加服更衣丸以清肝通便；若燥热不甚，或药后大便不爽者，可用青麟丸以通腑缓下，以免再秘；若兼痔疮、便血，可加槐花、地榆以清肠止血；若热势较盛，痞满燥实坚者，可用大承气汤急下存阴。

59.【正确答案】A

【答案解析】热秘

大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，或有身热，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。

治法：泻热导滞，润肠通便。

代表方：麻子仁丸加减。

常用药：大黄、枳实、厚朴、麻子仁、杏仁、白蜜、芍药等。

加减：若津液已伤，可加生地、玄参、麦冬以滋阴生津；若肺热气逆，咳喘便秘者，可加瓜蒌仁、苏子、黄芩清肺降气以通便；若兼郁怒伤肝，易怒目赤者，加服更衣丸以清肝通便；若燥热不甚，或药后大便不

爽者，可用青麟丸以通腑缓下，以免再秘；若兼痔疮、便血，可加槐花、地榆以清肠止血；若热势较盛，痞满燥实坚者，可用大承气汤急下存阴。

(60~64 题共用题干)

60.【正确答案】A

【答案解析】患者症见腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，脘闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓，是为肝气不畅，气血涩滞，壅塞不通而致，当辨为肝气郁结型积聚，治以疏肝解郁，行气散结，方用逍遥散、木香顺气散，如胀痛甚者，应用川楝子、延胡索、木香行气止痛，如寒湿中阻，腹胀，苔白腻者，应用苍术、厚朴、陈皮、砂仁温化湿邪。

61.【正确答案】A

【答案解析】患者症见腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，脘闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓，是为肝气不畅，气血涩滞，壅塞不通而致，当辨为肝气郁结型积聚，治以疏肝解郁，行气散结，方用逍遥散、木香顺气散，如胀痛甚者，应用川楝子、延胡索、木香行气止痛，如寒湿中阻，腹胀，苔白腻者，应用苍术、厚朴、陈皮、砂仁温化湿邪。

62.【正确答案】D

【答案解析】患者症见腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，脘闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓，是为肝气不畅，气血涩滞，壅塞不通而致，当辨为肝气郁结型积聚，治以疏肝解郁，行气散结，方用逍遥散、木香顺气散，如胀痛甚者，应用川楝子、延胡索、木香行气止痛，如寒湿中阻，腹胀，



苔白腻者，应用苍术、厚朴、陈皮、砂仁温化湿邪。

63.【正确答案】D

【答案解析】患者症见腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，脘闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓，是为肝气不畅，气血涩滞，壅塞不通而致，当辨为肝气郁结型积聚，治以疏肝解郁，行气散结，方用逍遥散、木香顺气散，如胀痛甚者，应用川楝子、延胡索、木香行气止痛，如寒湿中阻，腹胀，苔白腻者，应用苍术、厚朴、陈皮、砂仁温化湿邪。

64.【正确答案】A

【答案解析】患者症见腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，脘闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓，是为肝气不畅，气血涩滞，壅塞不通而致，当辨为肝气郁结型积聚，治以疏肝解郁，行气散结，方用逍遥散、木香顺气散，如胀痛甚者，应用川楝子、延胡索、木香行气止痛，如寒湿中阻，腹胀，苔白腻者，应用苍术、厚朴、陈皮、砂仁温化湿邪。

(65~68 题共用题干)

65.【正确答案】D

【答案解析】鼓胀之气滞湿阻证

腹胀按之不坚，胁下胀满或疼痛，饮食减少，食后胀甚，得暖气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。

治法：疏肝理气，运脾利湿。

代表方：柴胡疏肝散合胃苓汤加减。

常用药：柴胡、香附、郁金、青皮、川芎、白芍、苍术、厚朴、陈皮、茯苓、猪苓等。

加减：若胸脘痞闷，腹胀，噫气为快，气

滞偏甚者，可酌加佛手、沉香、木香调畅气机；如尿少，腹胀，舌苔腻者，加砂仁、大腹皮、泽泻、车前子以加强运脾利湿作用；若神倦，便溏，舌质淡者，宜酌加党参、附片、干姜、川椒以温阳益气，健脾化湿。

66.【正确答案】A

【答案解析】鼓胀之气滞湿阻证

腹胀按之不坚，胁下胀满或疼痛，饮食减少，食后胀甚，得暖气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。

治法：疏肝理气，运脾利湿。

代表方：柴胡疏肝散合胃苓汤加减。

常用药：柴胡、香附、郁金、青皮、川芎、白芍、苍术、厚朴、陈皮、茯苓、猪苓等。

加减：若胸脘痞闷，腹胀，噫气为快，气滞偏甚者，可酌加佛手、沉香、木香调畅气机；如尿少，腹胀，舌苔腻者，加砂仁、大腹皮、泽泻、车前子以加强运脾利湿作用；若神倦，便溏，舌质淡者，宜酌加党参、附片、干姜、川椒以温阳益气，健脾化湿。

67.【正确答案】E

【答案解析】鼓胀之气滞湿阻证

腹胀按之不坚，胁下胀满或疼痛，饮食减少，食后胀甚，得暖气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。

治法：疏肝理气，运脾利湿。

代表方：柴胡疏肝散合胃苓汤加减。

常用药：柴胡、香附、郁金、青皮、川芎、白芍、苍术、厚朴、陈皮、茯苓、猪苓等。

加减：若胸脘痞闷，腹胀，噫气为快，气滞偏甚者，可酌加佛手、沉香、木香调畅气机；如尿少，腹胀，舌苔腻者，加砂仁、



大腹皮、泽泻、车前子以加强运脾利湿作用；若神倦，便溏，舌质淡者，宜酌加党参、附片、干姜、川椒以温阳益气，健脾化湿。

68.【正确答案】B

【答案解析】鼓胀之气滞湿阻证

腹胀按之不坚，胁下胀满或疼痛，饮食减少，食后胀甚，得嗝气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。

治法：疏肝理气，运脾利湿。

代表方：柴胡疏肝散合胃苓汤加减。

常用药：柴胡、香附、郁金、青皮、川芎、白芍、苍术、厚朴、陈皮、茯苓、猪苓等。

加减：若胸脘痞闷，腹胀，噫气为快，气滞偏甚者，可酌加佛手、沉香、木香调畅气机；如尿少，腹胀，舌苔腻者，加砂仁、大腹皮、泽泻、车前子以加强运脾利湿作用；若神倦，便溏，舌质淡者，宜酌加党参、附片、干姜、川椒以温阳益气，健脾化湿。

(69~71 题共用题干)

69.【正确答案】A

【答案解析】中风闭证主要症状就是忽然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手紧握，大小便闭，肢体强痉，气粗口臭，面赤身热，躁扰不宁等症，可辨为中风(中脏腑，闭证，痰火瘀闭)，治以息风清火，豁痰开窍，方用羚角钩藤汤。

70.【正确答案】C

【答案解析】中风闭证主要症状就是忽然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手紧握，大小便闭，肢体强痉，气粗口臭，面赤身热，躁扰不宁等症，可辨为中风(中

脏腑，闭证，痰火瘀闭)，治以息风清火，豁痰开窍，方用羚角钩藤汤。

71.【正确答案】A

【答案解析】中风闭证主要症状就是忽然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，两手紧握，大小便闭，肢体强痉，气粗口臭，面赤身热，躁扰不宁等症，可辨为中风(中脏腑，闭证，痰火瘀闭)，治以息风清火，豁痰开窍，方用羚角钩藤汤。

(72~74 题共用题干)

72.【正确答案】D

【答案解析】气淋：郁怒之后，小便涩滞，淋漓不宣，少腹胀满疼痛，苔薄白，脉弦。

73.【正确答案】D

【答案解析】气淋治法为理气疏导，通淋利尿。

74.【正确答案】A

【答案解析】气淋若少腹胀满，上及于胁者，加川楝子、小茴香、广郁金以疏肝理气。

(75~77 题共用题干)

75.【正确答案】E

【答案解析】癃闭肾阳衰惫证：小便不通或点滴不爽，排出无力，面色(白光)白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝冷而酸软无力，舌淡胖，苔薄白，脉沉细或弱。

76.【正确答案】E

【答案解析】癃闭肾阳衰惫证治法：温补肾阳，化气利水。



77.【正确答案】B

【答案解析】癃闭肾阳衰惫证若形神委顿，腰酸酸痛，为精血俱亏，病及督脉，多见于老人，治宜香茸丸补养精血，助阳通窍。

(78~80 题共用题干)

78.【正确答案】A

【答案解析】便血之肠道湿热证。

证候：便血色红，大便不畅或稀溏，或有腹痛，口苦，舌质红，苔黄腻，脉濡数。

治法：清化湿热，凉血止血。

代表方：地榆散合槐角丸加减。

79.【正确答案】E

【答案解析】便血之肠道湿热证。

证候：便血色红，大便不畅或稀溏，或有腹痛，口苦，舌质红，苔黄腻，脉濡数。

治法：清化湿热，凉血止血。

代表方：地榆散合槐角丸加减。

80.【正确答案】E

【答案解析】便血之肠道湿热证。

证候：便血色红，大便不畅或稀溏，或有腹痛，口苦，舌质红，苔黄腻，脉濡数。

治法：清化湿热，凉血止血。

代表方：地榆散合槐角丸加减。

(81~83 题共用题干)

81.【正确答案】D

【答案解析】支饮之脾肾阳虚证。

证候：喘促动则为甚，心悸，气短，或咳而气怯，痰多，食少，胸闷，怯寒肢冷，神疲，少腹拘急不仁，脐下动悸，小便不利，足跗浮肿，或吐涎沫而头目昏眩，舌体胖大，质淡，苔白润或腻，脉沉细而滑。

82.【正确答案】E

【答案解析】支饮之脾肾阳虚证。

证候：喘促动则为甚，心悸，气短，或咳而气怯，痰多，食少，胸闷，怯寒肢冷，神疲，少腹拘急不仁，脐下动悸，小便不利，足跗浮肿，或吐涎沫而头目昏眩，舌体胖大，质淡，苔白润或腻，脉沉细而滑。

治法：温脾补肾，以化水饮。

代表方：金匮肾气丸合苓桂术甘汤加减。

83.【正确答案】B

【答案解析】支饮之脾肾阳虚证。

证候：喘促动则为甚，心悸，气短，或咳而气怯，痰多，食少，胸闷，怯寒肢冷，神疲，少腹拘急不仁，脐下动悸，小便不利，足跗浮肿，或吐涎沫而头目昏眩，舌体胖大，质淡，苔白润或腻，脉沉细而滑。

治法：温脾补肾，以化水饮。

代表方：金匮肾气丸合苓桂术甘汤加减。

(84~86 题共用题干)

84.【正确答案】D

【答案解析】根据患者的表现，诊断为盗汗之阴虚火旺证。

证候：夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。

85.【正确答案】C

【答案解析】阴虚火旺证证候：夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴降火。

代表方：当归六黄汤加减。

86.【正确答案】D



【答案解析】 阴虚火旺证证候：夜寐盗汗，或有自汗，五心烦热，或兼午后潮热，两颧色红，口渴，舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴降火。

代表方：当归六黄汤加减。

(87~89 题共用题干)

87. **【正确答案】** D

【答案解析】 痛痹

肢体关节疼痛较剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增，关节不可屈伸，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。

治法：温经散寒，祛风除湿。

方药：乌头汤加减。

常用药：制川乌、麻黄、芍药、甘草、蜂蜜、黄芪等。

加减：若寒湿甚者，制川乌可改成生川乌或生草乌；关节发凉，疼痛剧烈，遇冷更甚，可加附子、细辛、桂枝、干姜、全当归温经散寒，通脉之痛。

88. **【正确答案】** B

【答案解析】 痛痹

肢体关节疼痛较剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增，关节不可屈伸，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。

治法：温经散寒，祛风除湿。

方药：乌头汤加减。

常用药：制川乌、麻黄、芍药、甘草、蜂蜜、黄芪等。

加减：若寒湿甚者，制川乌可改成生川乌或生草乌；关节发凉，疼痛剧烈，遇冷更甚，可加附子、细辛、桂枝、干姜、全当归温经散寒，通脉之痛。

89. **【正确答案】** E

【答案解析】 痛痹

肢体关节疼痛较剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增，关节不可屈伸，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。

治法：温经散寒，祛风除湿。

方药：乌头汤加减。

常用药：制川乌、麻黄、芍药、甘草、蜂蜜、黄芪等。

加减：若寒湿甚者，制川乌可改成生川乌或生草乌；关节发凉，疼痛剧烈，遇冷更甚，可加附子、细辛、桂枝、干姜、全当归温经散寒，通脉之痛。

(90~93 题共用题干)

90. **【正确答案】** B

【答案解析】 痿证之脾胃虚弱证

起病缓慢，肢体软弱无力逐渐加重，神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言，纳呆便溏，面色(白光)白或萎黄无华，舌淡苔薄白，脉细弱。

治法：补中益气，健脾升清。

代表方：参苓白术散合补中益气汤加减。

加减：若脾胃虚者，易兼夹食积不运，当健脾助运，导其食滞，酌佐谷麦芽、山楂、神曲；气血虚甚者，重用黄芪、党参、当归，加阿胶；肥人痰多或脾虚湿盛，可用六君子汤加减。

91. **【正确答案】** C

【答案解析】 痿证之脾胃虚弱证

起病缓慢，肢体软弱无力逐渐加重，神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言，纳呆便溏，面色(白光)白或萎黄无华，舌淡苔薄白，脉细弱。

治法：补中益气，健脾升清。

代表方：参苓白术散合补中益气汤加减。



加减：若脾胃虚者，易兼夹食积不运，当健脾助运，导其食滞，酌佐谷麦芽、山楂、神曲；气血虚甚者，重用黄芪、党参、当归，加阿胶；肥人痰多或脾虚湿盛，可用六君子汤加减。

92.【正确答案】A

【答案解析】痿证之脾胃虚弱证

起病缓慢，肢体软弱无力逐渐加重，神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言，纳呆便溏，面色(白光)白或萎黄无华，舌淡苔薄白，脉细弱。

治法：补中益气，健脾升清。

代表方：参苓白术散合补中益气汤加减。

加减：若脾胃虚者，易兼夹食积不运，当健脾助运，导其食滞，酌佐谷麦芽、山楂、神曲；气血虚甚者，重用黄芪、党参、当归，加阿胶；肥人痰多或脾虚湿盛，可用六君子汤加减。

93.【正确答案】D

【答案解析】痿证之脾胃虚弱证

起病缓慢，肢体软弱无力逐渐加重，神疲肢倦，肌肉萎缩，少气懒言，纳呆便溏，面色(白光)白或萎黄无华，舌淡苔薄白，脉细弱。

治法：补中益气，健脾升清。

代表方：参苓白术散合补中益气汤加减。

加减：若脾胃虚者，易兼夹食积不运，当健脾助运，导其食滞，酌佐谷麦芽、山楂、神曲；气血虚甚者，重用黄芪、党参、当归，加阿胶；肥人痰多或脾虚湿盛，可用六君子汤加减。

(94~96 题共用题干)

94.【正确答案】A

【答案解析】颤证风阳内动证

肢体颤动粗大，程度较重，不能自制，眩晕耳鸣，面赤烦躁，易激动，心情紧张时颤动加重，伴有肢体麻木，口苦而干，语言迟缓不清，流涎，尿赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦。

治法：镇肝息风，舒筋止颤。

代表方：天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

95.【正确答案】B

【答案解析】颤证风阳内动证

肢体颤动粗大，程度较重，不能自制，眩晕耳鸣，面赤烦躁，易激动，心情紧张时颤动加重，伴有肢体麻木，口苦而干，语言迟缓不清，流涎，尿赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦。

治法：镇肝息风，舒筋止颤。

代表方：天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

96.【正确答案】D

【答案解析】颤证风阳内动证

肢体颤动粗大，程度较重，不能自制，眩晕耳鸣，面赤烦躁，易激动，心情紧张时颤动加重，伴有肢体麻木，口苦而干，语言迟缓不清，流涎，尿赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦。

治法：镇肝息风，舒筋止颤。

代表方：天麻钩藤饮合镇肝息风汤加减。

(97~100 题共用题干)

97.【正确答案】B

【答案解析】神昏亡阴证

神志昏迷，皮肤干皱，口唇干燥无华，面色苍白，或面红身热，目陷睛迷，自汗肤冷，气息低微，舌淡或绛，少苔，脉芤或细数或结代。



治法：救阴敛阳，固脱醒神。

代表方：冯氏全真一气汤加减。

常用药：人参、麦冬、五味子、熟地、白术、附子、牛膝等。

加减：若口干少津，则去附子、白术，加沙参、黄精、石斛等养胃生津。可静脉点滴生脉注射液等药。

98.【正确答案】A

【答案解析】神昏亡阳证

神志昏迷，皮肤干皱，口唇干燥无华，面色苍白，或面红身热，目陷睛迷，自汗肤冷，气息低微，舌淡或绛，少苔，脉芤或细数或结代。

治法：救阴敛阳，固脱醒神。

代表方：冯氏全真一气汤加减。

常用药：人参、麦冬、五味子、熟地、白术、附子、牛膝等。

加减：若口干少津，则去附子、白术，加沙参、黄精、石斛等养胃生津。可静脉点滴生脉注射液等药。

99.【正确答案】B

【答案解析】神昏亡阳证

神志昏迷，皮肤干皱，口唇干燥无华，面色苍白，或面红身热，目陷睛迷，自汗肤冷，气息低微，舌淡或绛，少苔，脉芤或细数或结代。

治法：救阴敛阳，固脱醒神。

代表方：冯氏全真一气汤加减。

常用药：人参、麦冬、五味子、熟地、白术、附子、牛膝等。

加减：若口干少津，则去附子、白术，加沙参、黄精、石斛等养胃生津。可静脉点滴生脉注射液等药。

100.【正确答案】A

【答案解析】神昏亡阳证

神志昏迷，皮肤干皱，口唇干燥无华，面色苍白，或面红身热，目陷睛迷，自汗肤冷，气息低微，舌淡或绛，少苔，脉芤或细数或结代。

治法：救阴敛阳，固脱醒神。

代表方：冯氏全真一气汤加减。

常用药：人参、麦冬、五味子、熟地、白术、附子、牛膝等。

加减：若口干少津，则去附子、白术，加沙参、黄精、石斛等养胃生津。可静脉点滴生脉注射液等药。