



一、A1型题

答题说明：以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 中医诊治疾病的主要依据是
A. 疾病
B. 症状
C. 体征
D. 证候
E. 病因
2. 昼夜分阴阳，属于“阴中之阴”的时间是
A. 上午
B. 中午
C. 下午
D. 前半夜
E. 后半夜
3. “益火之源，以消阴翳”指的是
A. 阴病治阳
B. 阳病治阴
C. 热者寒之
D. 寒者热之
E. 阳中求阴
4. 按照五行生克乘侮规律，“心病传肾”的发生机制是
A. 相生
B. 相克
C. 相乘
D. 相侮
E. 母病及子
5. 心为“五脏六腑之大主”的理论基础是
A. 心主血脉
B. 心主藏神
C. 心开窍于舌
D. 心在志为喜
E. 心其华为面
6. 有“华盖”之称的是
A. 脾
B. 肝
C. 肺
D. 心
E. 头
7. 肝的疏泄功能主要表现在
A. 调畅气机
B. 促进脾胃的运化功能和胆汁的分泌排泄
C. 调畅情志
D. 女子的排卵和月经来潮、男子的排精
E. 以上都是
8. 肾脏所藏之精气包括
A. 先天之精
B. 后天之精
C. 水谷之精



- D. 先天之精和后天之精
E. 以上均非
9. 血液在脉中正常运行，不逸出脉外体现了气的
- A. 推动与调控作用
B. 温煦与凉润作用
C. 防御作用
D. 固摄作用
E. 中介作用
10. 下列哪项体现出风邪致病具有发病急、变化快的特点
- A. 风为阳邪
B. 风性轻扬
C. 风性善行
D. 风性数变
E. 风性主动
11. 下列哪些情志异常可以引起二便失禁
- A. 过度愤怒
B. 过度悲伤
C. 过度恐惧
D. 过度忧思
E. 突然受惊
12. 虚则补之属于
- A. 逆治法
B. 治标法
C. 从治法
D. 反治法
E. 治本法
13. 疝气和六淫最主要的鉴别要点是
- A. 多与季节气候有关
B. 多与地理环境有关
C. 体外入侵
D. 具有强烈传染性
E. 多从皮毛口鼻而入
14. 火邪的性质和致病特点为
- A. 为阳邪，其性升发向上
B. 为阳邪，其性轻扬开泄
C. 为阳邪，其性炎上
D. 为阳邪，多夹湿邪
E. 为阳邪，其性炎热
15. 生气之源指的是
- A. 肝
B. 心
C. 脾胃
D. 肺
E. 肾
16. 中医学中与水液代谢和呼吸运动关系密切的脏腑为
- A. 肺与肾
B. 肺与脾
C. 心与肺
D. 肾与膀胱
E. 肺与肝
17. “人之记忆，皆在脑中”的说法出自
- A. 《本草纲目》
B. 《灵枢》
C. 《素问》
D. 《内经》
E. 《本草备要》
18. 下列哪项不属于肾的生理功能
- A. 肾主生殖
B. 调畅情志



- C. 肾主生长发育
- D. 肾主水
- E. 肾主纳气

19. 在中医学中，被称作“孤府”的是

- A. 脑
- B. 三焦
- C. 膀胱
- D. 胆
- E. 女子胞

20. 主管生长发育体现了气的

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

21. 气虚引起血虚的理论依据为

- A. 气能生血
- B. 气能行血
- C. 血能生气
- D. 血能载气
- E. 气能摄血

22. 瘀血致病脉象多为

- A. 沉弦
- B. 沉迟
- C. 弦数
- D. 濡滑
- E. 洪数

23. 偏食辛温燥热，则可导致

- A. 肝经湿热
- B. 心肝火旺
- C. 肠胃积热

- D. 肺胃热盛
- E. 肺胃津伤

24. 疾病发生的重要条件

- A. 邪气亢盛
- B. 正气受损
- C. 正气不足
- D. 邪气损正
- E. 正气抗邪

25. 内生“五邪”包括

- A. 内风、内暑、内湿、内燥、内火
- B. 内风、内寒、内暑、内燥、内火
- C. 内风、内寒、内湿、内燥、内火
- D. 内风、内寒、内湿、内暑、内火
- E. 内风、内寒、内湿、内燥、内暑

26. 气的升发太过或下降不及，称之为

- A. 气闭
- B. 气滞
- C. 气逆
- D. 气陷
- E. 气脱

27. 脾虚运化无力引起的腹部胀满，治疗应选用的法则是

- A. 通因通用
- B. 塞因塞用
- C. 寒因寒用
- D. 虚则补之
- E. 实则泻之

28. 《素问·六节藏象论》对五脏之本的论述不正确的是

- A. 肺者，气之本
- B. 心者，生之本



- C. 胆者，仓廩之本
D. 肾者，封藏之本
E. 肝者，罢极之本
29. “阴阳者，天地之道也”中的“道”指的是
A. 道理
B. 道路
C. 道德
D. 本源
E. 规律
30. 《素问·举痛论》中说：悲则气
A. 上
B. 下
C. 缓
D. 消
E. 收
31. 《素问·阴阳应象大论》中，其高者
A. 因而越之
B. 引而竭之
C. 汗而发之
D. 按而收之
E. 散而泻之
32. “故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是则僻邪不至，长生久视。”，这段话出自
A. 《灵枢·本神》
B. 《素问·上古天真论》
C. 《素问·四气调神大论》
D. 《素问·至真要大论》
E. 《素问·阴阳应象大论》
33. 太阳中风表虚证，其发热的特点是
A. 潮热
B. 翕翕发热
C. 燥热
D. 身大热
E. 蒸蒸发热
34. “伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者”，宜选用的方剂是
A. 小承气汤
B. 调胃承气汤
C. 白虎加人参汤
D. 桂枝汤
E. 小建中汤
35. 小柴胡汤证的病机为
A. 胆热内郁
B. 枢机不利
C. 三焦失畅
D. 脾胃失和
E. 以上都是
36. 患者腹满时痛，食不下，呕吐，下利，宜选用
A. 小柴胡汤
B. 理中汤
C. 桂枝汤
D. 桂枝加附子汤
E. 桂枝加芍药汤
37. 《伤寒论》中体现“治未病”预防治疗学思想的证治是
A. 真武汤证
B. 四逆散证
C. 四逆汤证
D. 小柴胡汤证
E. 桂枝汤证



38. 辨证为风湿兼气虚证，治宜选用方为
- A. 瓜蒌桂枝汤
 - B. 防己黄芪汤
 - C. 黄芪桂枝五物汤
 - D. 桂枝芍药知母汤
 - E. 麻黄杏仁薏苡甘草汤
39. 《金匮要略》中黄芪桂枝五物汤证的治则为
- A. 温阳行痹
 - B. 通经行痹
 - C. 通络止痛
 - D. 除湿止痛
 - E. 散寒止痛
40. 《金匮要略》中，下列不属于薏苡附子散证脉象特点的是
- A. 脉涩
 - B. 脉沉伏
 - C. 脉滑数
 - D. 脉紧细而急
 - E. 脉微细而迟
41. 原文“妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月衃也。所以血不止者，其癥不去故也，当下其癥”，治宜选用
- A. 温经汤
 - B. 生化汤
 - C. 桂枝茯苓丸
 - D. 当归芍药散
 - E. 茵陈五苓散
42. 《金匮要略》中，瓜蒌瞿麦丸中配伍瞿麦的作用是
- A. 润燥生津
 - B. 健脾渗湿
 - C. 渗湿利尿
 - D. 温肾化气
 - E. 益气生津
43. 温热类温病热盛动风的病机是
- A. 热灼营阴，扰神窜络
 - B. 热入心包，炼液成痰，痰热闭窍
 - C. 邪热亢盛，深入厥阴，引动肝风
 - D. 血分热毒炽盛，动血耗血，瘀热内阻
 - E. 温病日久，真阴耗伤，邪少虚多
44. 下列属于湿温病湿热酿痰、蒙蔽心包表现特点的是
- A. 清醒时也表情淡漠
 - B. 神识似清似昧
 - C. 严重时谵语胡言
 - D. 反应迟钝
 - E. 以上都是
45. 温毒类温病的多发季节是
- A. 春夏
 - B. 春秋
 - C. 夏秋
 - D. 冬春
 - E. 冬夏
46. 湿温病常发生的季节是
- A. 春夏
 - B. 春秋
 - C. 夏秋
 - D. 冬春
 - E. 冬夏
47. 温热类温病的基本治法是



- A. 清泄邪热
B. 辛凉解表
C. 养阴清热
D. 化湿清热
E. 养阴润燥
48. 下列哪项不属于寒凉药的功效
- A. 凉血解毒
B. 滋阴除蒸
C. 引火归原
D. 清心开窍
E. 凉肝息风
49. 在“十八反”中，除哪味药物外均与乌头相反
- A. 玄参
B. 白及
C. 贝母
D. 瓜蒌
E. 半夏
50. 影响用药剂量的因素包括
- A. 剂型
B. 配伍
C. 体质
D. 季节
E. 以上都是
51. 有“呕家圣药”之称的药物是
- A. 香薷
B. 麻黄
C. 生姜
D. 紫苏
E. 桂枝
52. 痰火凝结之瘰疬、瘰疬选用的最佳药物是
- A. 栀子
B. 黄芩
C. 夏枯草
D. 黄连
E. 石膏
53. 既能够治疗痢疾，又可截疟的药物是
- A. 青蒿
B. 白头翁
C. 鸦胆子
D. 马齿苋
E. 黄连
54. 下列各项中，不属于大黄功效的是
- A. 泻下攻积
B. 清热泻火
C. 凉血解毒
D. 逐瘀通经
E. 软坚散结
55. 既能祛风湿，止痹痛，又可解表的药物是
- A. 威灵仙
B. 秦艽
C. 五加皮
D. 桂枝
E. 独活
56. 性微温而善于芳香化湿的药物是
- A. 香薷
B. 佩兰
C. 砂仁
D. 豆蔻
E. 藿香



57. 茯苓与薏苡仁的共同功效是

- A. 利水渗湿，安神
- B. 利水渗湿，除痹
- C. 利水渗湿，通乳
- D. 利水渗湿，解毒
- E. 利水渗湿，健脾

58. 吴茱萸的功效是

- A. 散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻
- B. 祛风止痛，温肺化饮，助阳止泻
- C. 回阳救逆，温肾助阳，降逆止呕
- D. 温中止痛，祛风杀虫，降逆止呕
- E. 温中降逆，理气和胃，助阳止泻

59. 既能行气止痛，又能杀虫疗癣的药物是

- A. 川楝子
- B. 木香
- C. 佛手
- D. 沉香
- E. 香附

60. 既能消食化积，又能行气散瘀的药物是

- A. 神曲
- B. 山楂
- C. 木香
- D. 鸡内金
- E. 枳实

61. 槟榔的功效为

- A. 杀虫消积，行气，止咳化痰
- B. 杀虫消积，止咳，利水，截疟
- C. 杀虫消积，行气，利水，截疟
- D. 杀虫，疗癣
- E. 杀虫消积

62. 有凉血止血散瘀之功，尤宜用于尿血的

药物是

- A. 白茅根
- B. 小蓟
- C. 血余炭
- D. 地榆
- E. 茜草

63. 下列药物中，哪一味是收敛止血药

- A. 仙鹤草
- B. 三七
- C. 小蓟
- D. 地榆
- E. 白茅根

64. 入汤剂宜包煎的药物是

- A. 自然铜
- B. 苏木
- C. 血竭
- D. 虎杖
- E. 五灵脂

65. 鸡血藤的功效是

- A. 行气活血，补血调经
- B. 活血止痛，舒筋活络
- C. 行血补血，调经，舒筋活络
- D. 活血调经，祛风通络
- E. 行气活血，祛风止痛

66. 半夏与天南星均可治疗的病证是

- A. 热痰
- B. 风痰
- C. 瘦瘤
- D. 阴疽
- E. 湿痰

67. 桑白皮与葶苈子既能泻肺平喘，又能



- A. 利水渗湿
B. 利水通淋
C. 利水消肿
D. 利水止泻
E. 利水退黄
68. 具有镇心安神，聪耳明目作用的药物是
A. 珍珠
B. 磁石
C. 牡蛎
D. 石决明
E. 蝉衣
69. 石决明、决明子的共同作用是
A. 润肠通便
B. 清肝明目
C. 息风止痉
D. 止咳平喘
E. 降气化痰
70. 具有开窍醒神，活血通经，消肿止痛作用的药物是
A. 苏合香
B. 麝香
C. 牛黄
D. 远志
E. 皂荚
71. 人参入汤剂的用法是
A. 先煎
B. 后下
C. 包煎
D. 另煎
E. 泡服
72. 用于治疗肾阳不足，肠燥津枯便秘的药物是
A. 巴戟天
B. 肉苁蓉
C. 仙茅
D. 淫羊藿
E. 葫芦巴
73. 具有补血养阴，填精益髓之功效的药物是
A. 当归
B. 熟地黄
C. 何首乌
D. 白芍
E. 阿胶
74. 麻黄根和浮小麦共同的功效是
A. 止汗
B. 止泻
C. 止痛
D. 止血
E. 止遗
75. 治疗疟疾的要药是
A. 常山
B. 瓜蒂
C. 柴胡
D. 雄黄
E. 铅丹
76. 大黄牡丹汤中大黄的配伍意义是
A. 清热泻火，导热下行
B. 清泻瘀热，分利二便
C. 荡涤肠胃，清热泻火
D. 泻热逐瘀，通肠除湿
E. 通肠泄热，以泻代清



77. 下列各项中,除哪项外均属于小柴胡汤主治病证
- A. 伤寒少阳证
 - B. 黄疸
 - C. 热入血室证
 - D. 肝脾不和证
 - E. 疟疾
78. 症见“壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力”,治疗宜用的方剂是
- A. 竹叶石膏汤
 - B. 白虎汤
 - C. 黄连解毒汤
 - D. 清瘟败毒饮
 - E. 清营汤
79. 香薷散的功用是
- A. 祛湿化浊,理气宽中
 - B. 散寒解表,化湿和中
 - C. 解表散寒,理气和中
 - D. 祛暑解表,化湿和中
 - E. 祛暑解表,清热化湿
80. 理中丸的组成药物中不含有
- A. 人参
 - B. 干姜
 - C. 甘草
 - D. 白术
 - E. 附子
81. 参苓白术散的功用是
- A. 健脾益气,升阳举陷
 - B. 健脾养胃,理气化痰
 - C. 健脾益气,和中养胃
 - D. 健脾益气,渗湿止泻
 - E. 健脾助运,养胃渗湿
82. 地黄饮子的组成药物中不含
- A. 巴戟天、山茱萸
 - B. 五味子、白茯苓
 - C. 石斛、官桂
 - D. 菖蒲、远志
 - E. 生地黄、牡丹皮
83. 关于牡蛎散和玉屏风散的叙述,错误的是
- A. 均具固表止汗之功
 - B. 牡蛎散固表敛汗之力较强
 - C. 玉屏风散健脾益气之力较大
 - D. 牡蛎散属标本兼治之法
 - E. 玉屏风散属治标之法
84. 酸枣仁汤的组成药物中含有
- A. 远志
 - B. 知母
 - C. 茯神
 - D. 柏子仁
 - E. 龙眼肉
85. 苏合香丸主治
- A. 温热病
 - B. 痰热内闭心包证
 - C. 邪热内陷心包证
 - D. 热闭证
 - E. 寒闭证
86. 下列不属于越鞠丸组成药物的是
- A. 香附
 - B. 厚朴
 - C. 栀子
 - D. 苍术
 - E. 神曲



87. 补阳还五汤黄芪的配伍意义是

- A. 补气升阳
- B. 补气生血
- C. 补气利水
- D. 补气固表
- E. 补气行血

88. 消风散中配伍蝉蜕的用意是

- A. 疏风止痒
- B. 明目退翳
- C. 宣散透疹
- D. 息风止痉
- E. 疏风清热

二、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

(91~92题共用备选答案)

- A. 丹皮、芍药
- B. 石膏、麦冬
- C. 元参、丹参
- D. 黄芩、黄柏
- E. 石膏、知母

91. 清营汤的组成药物中含有

92. 犀角地黄汤的组成药物中含有

(93~94题共用备选答案)

- A. 泻白散
- B. 凉膈散
- C. 芍药汤
- D. 清胃散
- E. 龙胆泻肝汤

93. 组成药物中含有生地、当归、丹皮、黄连、升麻的方剂是

94. 组成药物中含有栀子、泽泻、黄芩、生

89. 平胃散的功用是

- A. 燥湿运脾，和中益气
- B. 燥湿运脾，行气和胃
- C. 行气化湿，和胃止呕
- D. 化湿和胃，理气健脾
- E. 疏肝和胃，益气健脾

90. 二陈汤主治

- A. 燥痰咳嗽
- B. 湿痰证
- C. 寒饮咳嗽
- D. 热痰咳嗽
- E. 实热老痰证

地、当归的方剂是

(95~96题共用备选答案)

- A. 四逆汤
- B. 四逆散
- C. 吴茱萸汤
- D. 理中丸
- E. 当归四逆汤

95. 方中温、补、降并施的方剂是

96. 方中温、补、通并用的方剂是

(97~98题共用备选答案)

- A. 镇肝息风，滋阴潜阳
- B. 祛风化痰，通络止痉
- C. 凉肝息风，增液舒筋
- D. 镇肝息风，滋阴安神
- E. 祛风除湿，化痰通络，活血止痛

97. 牵正散的功用是



98. 小活络丹的功用是

(99~100 题共用备选答案)

A. 解表化湿，理气和中

B. 宣畅气机，清利湿热

C. 清热泻火，利水通淋

D. 利湿消肿，理气健脾

E. 清热化湿，理气和中

99. 藿香正气散的功用是

100. 连朴饮的功用是



2022 年中西医内科主治医师《相关专业知识》 模拟试卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

- 五色主病中，不属于青色主病的是
A. 寒证
B. 气滞
C. 血瘀
D. 惊风
E. 湿证
- 口唇赤肿而干多为
A. 热盛
B. 热极
C. 瘀血
D. 寒盛
E. 痛极
- 下列哪种目色为黄疸的主要标志特点
A. 目赤肿痛
B. 白睛发黄
C. 目眦淡白
D. 目胞色黑晦暗
E. 目睛灰白混浊
- 以下哪项不是实喘的特征
A. 发作急骤
B. 呼吸深长
C. 息粗声高
D. 呼多吸少
E. 张口抬肩
- 浮而无根，至数不齐，脉力不匀的脉象是
A. 伏脉
B. 浮脉
C. 芤脉
D. 散脉
E. 革脉
- 寸口分候脏腑中，左关候
A. 心
B. 肺
C. 肾
D. 肝胆
E. 脾胃
- 脉有神的表现特点为
A. 徐和从容
B. 从容软滑
C. 节律整齐
D. 尺脉有力
E. 沉取不绝
- 阴证的临床表现为
A. 肌肤灼热



- B. 烦躁不安
C. 呼吸气粗
D. 身重踈卧
E. 口干渴饮
9. 临床上常见的阳虚证不包括
- A. 脾阳虚证
B. 胃阳虚证
C. 肾阳虚证
D. 肝阳虚证
E. 心阳虚证
10. 血热证的表现特点为
- A. 身热夜甚
B. 心烦失眠
C. 燥扰不宁
D. 口渴面赤
E. 以上都是
11. 悬饮的饮停部位为
- A. 胃肠
B. 胸胁
C. 心包
D. 四肢
E. 肝胆
12. 寒滞胃肠证与胃肠气滞证共同的症状为
- A. 脘腹痞胀
B. 恶寒肢冷
C. 噎气呃逆
D. 渴喜热饮
E. 大便秘结
13. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证的共同症状是
- A. 身热不扬
B. 脘腹痞闷
C. 面黄不泽
D. 面白无华
E. 白带量多
14. 以口舌生疮、赤烂疼痛为主者称为
- A. 心火上炎证
B. 心火下移证
C. 热扰心神证
D. 热闭心神证
E. 心火迫血妄行证
15. 以潮热汗出、腹满痛、便秘、脉沉实为辨证要点的是
- A. 阳明经证
B. 阳明腑证
C. 少阴病证
D. 少阳病证
E. 太阳病证
16. 太阳中风证的辨证要点为
- A. 恶风、汗出、脉浮缓
B. 恶寒、无汗、头身痛、脉浮紧
C. 少腹急结、小便自利、大便色黑
D. 大热、大汗、大渴、脉洪大
E. 畏寒肢厥、下利清谷、脉微细
17. 以下均可由肝肾亏虚、精血不足、目失充养所致的目部病变是
- A. 目痛、目痒
B. 目眩、目痒
C. 目痛、目眩、目痒
D. 目昏、雀盲、歧视
E. 目眩、目痒、雀盲
18. 发热特点表现为午后和夜间有低热的是
- A. 壮热



- B. 湿温潮热
C. 骨蒸潮热
D. 日晡潮热
E. 气郁发热
19. 下列各项中，可因阴经郁热熏蒸，或脾虚运化失常所致的是
A. 盗汗
B. 自汗
C. 热汗
D. 半身汗
E. 手足心汗
20. 头目胀痛，多见于
A. 气机阻滞
B. 湿邪困阻
C. 风邪偏盛
D. 瘀血阻滞
E. 肝火上炎
21. 疼痛伴有沉重感的症状，多因湿邪困阻气机所致的是
A. 胀痛
B. 刺痛
C. 空痛
D. 重痛
E. 热痛
22. 下列何种情况可导致胃脘突然剧痛暴作，出现压痛及反跳痛
A. 胃炎
B. 胃癌
C. 食积
D. 胃溃疡
E. 胃脘穿孔
23. 下列因痰湿内阻所致的头晕特点为
A. 头晕而胀，烦躁易怒
B. 头晕胀痛，头重脚轻
C. 头晕且重，如物裹缠
D. 头晕耳鸣，腰酸遗精
E. 头晕面白，神疲乏力
24. 面色淡黄而虚浮称为
A. 黄胖
B. 萎黄
C. 阴黄
D. 阳黄
E. 黄疸
25. 常见于因伤食所致的呕吐物表现为
A. 呕吐物清稀无臭
B. 呕吐物秽浊酸臭
C. 呕吐黄绿苦水
D. 呕吐物酸腐，夹杂不化食物
E. 以上都不是
26. 神乱的临床表现不包括
A. 焦虑恐惧
B. 淡漠痴呆
C. 猝然昏倒
D. 狂躁不安
E. 言语不休
27. 咽部溃烂成片或凹陷者多为
A. 肺胃热轻
B. 脾胃湿热
C. 肺胃热毒壅盛
D. 阴虚火旺
E. 以上都不是
28. 龈肉萎缩，牙根暴露，牙齿松动，属于



- A. 胃阴不足
B. 胃火亢盛
C. 肾火伤络
D. 气滞血瘀
E. 胃肾热盛
29. 苔薄白而干者多见于
A. 外感风热
B. 外感寒湿
C. 水湿内停
D. 脾肾阳虚
E. 湿浊内停
30. 瘦薄舌多主
A. 水湿内停
B. 血行不畅
C. 里热亢盛
D. 心火亢盛
E. 气血阴液不足
31. 抽搐的病因中, 属于全身感染性疾病的是
A. 缺氧
B. 中毒
C. 败血症
D. 代谢性疾病
E. 癔症性抽搐
32. 腹部外伤后突发腹痛有休克者应考虑
A. 肝破裂
B. 胆石症
C. 急性胰腺炎
D. 急性胃扩张
E. 十二指肠溃疡
33. 下列可引起咳嗽的疾病是
A. 胸膜疾病
B. 呼吸道疾病
C. 心血管疾病
D. 中枢神经因素
E. 以上都是
34. 下列最容易引起大量咯血的疾病是
A. 肺炎
B. 空洞型肺结核
C. 二尖瓣狭窄
D. 肺肿瘤
E. 肺梗死
35. 下列不属于个人史的是
A. 出生地区
B. 习惯与嗜好
C. 冶游史
D. 职业和工作条件
E. 生育史
36. 板状腹可见于
A. 急性阑尾炎
B. 急性胆囊炎
C. 肠结核
D. 急性胃肠穿孔
E. 大量腹水
37. 用于检查腹腔深部的包块和脏器的是
A. 深压触诊法
B. 浅部滑行触诊法
C. 深部滑行触诊法
D. 双手触诊法
E. 冲击触诊法
38. 脊柱前凸多发生于
A. 颈段



- B. 胸段
C. 颈胸段
D. 腰段
E. 骶椎
39. 脊柱压痛、叩击痛不常见于
A. 脊椎结核
B. 脊椎骨折
C. 脊椎肿瘤
D. 脊柱畸形
E. 椎间盘脱出
40. 双上眼睑下垂见于
A. 脑炎
B. 脑脓肿
C. 蛛网膜下腔出血
D. 脑出血
E. 重症肌无力
41. 正常成人心尖搏动位于左锁骨中线内侧
A. 0.5~1.0cm 处
B. 1.0~1.5cm 处
C. 1.5~2.0cm 处
D. 2.0~2.5cm 处
E. 2.5~3.0cm 处
42. 心尖区触及舒张期震颤，提示
A. 主动脉瓣狭窄
B. 肺动脉瓣狭窄
C. 室间隔缺损
D. 二尖瓣狭窄
E. 二尖瓣关闭不全
43. 下列选项中，与皮肤弹性有关的是
A. 年龄
B. 营养状态
C. 皮下脂肪所含液量
D. 组织间隙所含液量
E. 以上都是
44. 胃癌发生淋巴结转移时常出现在
A. 右锁骨上窝
B. 左锁骨上窝
C. 颈部
D. 腋窝
E. 滑车上
45. 长期服用肾上腺糖皮质激素的病人会出现
A. 二尖瓣面容
B. 满月面容
C. 急性病容
D. 无欲貌
E. 贫血面容
46. 粪便隐血试验呈持续阳性提示
A. 钩虫病
B. 消化道炎症
C. 出血性疾病
D. 消化道癌症
E. 细菌性痢疾
47. 急性胰腺炎血清淀粉酶达高峰是在
A. 发病后 4~8 小时
B. 发病后 4~12 小时
C. 发病后 6~12 小时
D. 发病后 12~24 小时
E. 发病后 12~72 小时
48. 某患者尿蛋白定性试验阳性，诊断应考虑为
A. 糖尿病



- B. 蛋白尿
C. 类固醇性糖尿病
D. 尿酮体
E. 应激性糖尿
49. 毛细血管脆性增加可见于
A. 尿毒症
B. 过敏性紫癜
C. 血小板无力症
D. 血管性血友病
E. 以上都是
50. 属于 DIC 检查项目的是
A. 血浆凝血酶原时间测定
B. 血浆纤维蛋白原测定
C. D-二聚体测定
D. 血小板计数
E. 以上都是
51. 下列各项，不属室性早搏心电图特点的是
A. 其 T 波方向与 QRS 主波方向相反
B. 代偿间期不完全
C. 提前出现宽大畸形的 QRS-T 波群波
D. 宽大 QRS 波前无异位 P 波
E. QRS 波时间 $>0.12s$
52. 组成肺容量的肺容积至少有
A. 1 个
B. 2 个
C. 3 个
D. 4 个
E. 5 个
53. 属于下消化道内镜检查禁忌证的是
A. 原因不明的腹泻
B. 肠道炎性疾病的诊断
C. 结肠癌肿的术前诊断
D. 急性弥漫性腹膜炎
E. 需做结肠息肉摘除术者
54. 甲状腺吸¹³¹碘率较高的人群是
A. 青少年女性
B. 青少年男性
C. 成年女性
D. 成年男性
E. 儿童
55. 周围型肺癌 HRCT 可见
A. 分叶征
B. 毛刺征
C. 空泡征
D. 胸膜凹陷征
E. 以上都是
56. 食管癌 X 线钡剂造影可见
A. 黏膜皱襞呈圆形
B. 管腔狭窄
C. 腔内无充盈缺损
D. 龛影较规则
E. 以上都不是
57. 下列关于苯妥英钠的叙述，不正确的是
A. 对某些心律失常有效
B. 会引起牙龈增生
C. 可用于三叉神经痛
D. 对癫痫强直阵挛性发作有效
E. 口服吸收规则，半衰期个体差异小
58. 药物作用的两重性是指
A. 兴奋与抑制作用
B. 治疗作用与不良反应



- C. 直接作用与间接作用
D. 向上调节与向下调节
E. 局部作用与全身作用
59. 作用于受体的药物的基本作用是
A. 防治作用和不良反应
B. 副作用与变态反应
C. 原发作用与继发作用
D. 兴奋作用和抑制作用
E. 治疗作用与副作用
60. 药物在适当剂量时只对少数器官或组织产生明显作用，这种特性称为
A. 安全性
B. 选择性
C. 敏感性
D. 有效性
E. 耐受性
61. 有机磷农药中毒的解救宜选用
A. 阿托品
B. 胆碱酯酶复活药
C. 阿托品+新斯的明
D. 足量阿托品+胆碱酯酶复活药
E. 毛果芸香碱+新斯的明
62. 解热镇痛抗炎药物的共同作用机制是
A. 抑制细胞间黏附因子的合成
B. 抑制肿瘤坏死因子的合成
C. 抑制前列腺素的合成
D. 抑制白细胞介素的合成
E. 抑制血栓素的合成
63. 下列关于阿司匹林的不良反应，不正确的是
A. 胃肠道反应
B. “阿司匹林哮喘”
C. 水杨酸反应
D. 瑞夷综合征
E. 红斑性狼疮样综合征
64. 关于利多卡因不正确的叙述是
A. 口服首过消除明显
B. 轻度阻滞钠通道
C. 缩短浦肯野纤维及心室肌的 APD 和 ERP
D. 主要在肝脏代谢
E. 适用于室上性心律失常
65. 由交感神经兴奋引起的心律失常宜选用
A. 普鲁卡因胺
B. 利多卡因
C. 苯妥英钠
D. 普萘洛尔
E. 胺碘酮
66. 下列关于甲状腺激素的描述错误的是
A. 促进中枢神经系统和长骨的发育
B. 正常量促进蛋白质合成增加，大剂量反而促进蛋白质分解
C. 影响心脏功能
D. 可用于治疗黏液性水肿
E. 缺少甲状腺素的呆小病人身材矮小、肢体粗短、智力正常
67. 传染病的预防包括
A. 管理传染源、切断传播途径、保护易感人群
B. 管理食物、水源、粪便、消灭蚊蝇
C. 切断社会因素和自然因素
D. 环境卫生管理、水源食物管理、灭蝇
E. 管理水源、管理饮食、卫生管理、灭蝇



68. 传染病常见的症状和体征不包括

- A. 发热
- B. 贫血
- C. 发疹
- D. 毒血症
- E. 单核-巨噬细胞系统反应

69. HIV 主要侵犯的细胞是

- A. CD4⁺淋巴细胞
- B. B 淋巴细胞
- C. 单核细胞
- D. 神经胶质细胞
- E. 直肠黏膜上皮细胞

70. 乙型肝炎的传染源为

- A. 急性患者和隐性感染者
- B. 慢性患者和隐性感染者
- C. 急性患者和病毒携带者
- D. 慢性患者和病毒携带者
- E. 急、慢性患者和病毒携带者

71. 治疗外感风热型流感首选

- A. 银翘散
- B. 桑杏汤
- C. 荆防败毒散
- D. 藿香正气散
- E. 麻杏石甘汤

72. 肾综合征出血热的皮肤三红征是

- A. 颜面、软腭、胸背潮红
- B. 颜面、手背、前胸红
- C. 颜面、颈、胸背潮红
- D. 腹部、颈、胸背潮红
- E. 上肢、颈、胸背潮红

73. 治疗伤寒湿热中阻型首选

- A. 藿朴夏苓汤
- B. 王氏连朴饮
- C. 菖蒲郁金汤
- D. 犀角地黄汤
- E. 白虎加苍术汤

74. 当感知过的事物重新出现在眼前时，能够识别出来，此属于

- A. 识记
- B. 遗忘
- C. 再认
- D. 回忆
- E. 保持

75. 下列关于心理应激源的分类，不正确的是

- A. 躯体性应激源
- B. 语言性应激源
- C. 社会性应激源
- D. 文化性应激源
- E. 心理性应激源

76. 下列疾病中属于心身疾病的是

- A. 抑郁症
- B. 消化性溃疡
- C. 精神分裂症
- D. 大叶性肺炎
- E. 精神发育迟滞

77. 老年人的心理问题不包括

- A. 对死亡的恐惧
- B. 不适应退休生活
- C. 主观健康评价差
- D. 反应速度与记忆能力下降
- E. 性生活问题

78. 职业群体实现心理健康的途径不包括



- A. 提高职业满意度
B. 优化工作环境
C. 促进人际关系和谐
D. 劳动组织合理化
E. 遵守职业道德
79. 下列哪种情形不属于医疗事故
- A. 因不可抗力造成的不良后果
B. 无过错输血感染造成的不良后果
C. 在医疗活动中由于患者病情异常或者患者体质特殊而发生医疗意外
D. 在现有医学科学技术条件下，发生无法预料或者不能防范的不良后果
E. 以上均是
80. 儿科处方的保存期限为
- A. 半年
B. 1年
C. 2年
D. 3年
E. 5年
81. 医疗单位供应和调配毒性药品，凭医师签名的正式处方每次处方剂量不得超过
- A. 1日极量
B. 2日极量
C. 3日极量
D. 4日极量
E. 5日极量
82. 下列关于违反卫生法有关罪名正确的是
- A. 医疗事故罪
B. 非法行医罪
C. 生产、销售假药、劣药罪
D. 生产、销售不符合卫生标准的食品罪
E. 以上都是
83. 下列关于构成损害赔偿的民事责任，需同时具备的条件叙述正确的是
- A. 损害的事实存在
B. 行为的违法性
C. 行为人有过错
D. 损害事实与行为人的过错有直接的因果关系
E. 以上都是
84. 儒家的养生思想强调了
- A. 仁者寿
B. 智者寿
C. 欲而不贪
D. 天行健，君子以自强不息
E. 以上都是
85. 不属于药物治疗道德要求的是
- A. 尊重患者
B. 合理配伍
C. 节约费用
D. 严守法规
E. 对症用药，剂量适宜
86. 下列关于人体试验的道德准则叙述不正确的是
- A. 维护受试者利益
B. 严谨的科学态度
C. 受试者知情同意
D. 有利于医学和社会发展
E. 妥善处理对受试者的意外伤害
87. 下列关于医德修养的含义叙述错误的是
- A. 医德认识的提高
B. 医德感情的丰富
C. 医德意志的形成
D. 医德思想的创新



E. 医德行为和习惯的养成

88. 医疗行为是否有利于患者疾病的缓解和根除体现的医德评价标准是

A. 疗效标准

B. 科学标准

C. 社会标准

D. 统一标准

E. 以上都不是

二、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

(89~90题共用备选答案)

A. 气虚发热

B. 血虚发热

C. 阴虚发热

D. 气郁发热

E. 小儿夏季热

89. 时有低热，兼见面白、头晕、舌淡脉细等表现特点的发热属于

90. 由于气阴不足，不能适应夏令炎热气候所导致的发热属于

(91~92题共用备选答案)

A. 短气

B. 夺气

C. 少气

D. 喘

E. 哮

91. 呼吸急迫困难，张口抬肩，难以平卧的是

92. 呼吸急促困难，喉中痰鸣的是

(93~94题共用备选答案)

A. 真热假寒证

B. 真寒假热证

C. 真实假虚证

D. 真虚假实证

E. 表里同病证

93. 古代有阳盛格阴证之称的是

94. 古代有阴盛格阳证之称的是

(95~96题共用备选答案)

A. 主试验无凝集反应

B. 副试验无凝集反应

C. 主试验有凝集反应

D. 主、副试验均无凝集反应

E. 主试验无凝集，副试验有凝集反应

95. 可输血的最佳情况是

96. 绝对不可输血的情况是

(97~98题共用备选答案)

A. 白血病

B. 急性喉炎

C. 疟疾

D. 败血症

E. 伤寒

97. 弛张热可见于

98. 稽留热可见于

(99~100题共用备选答案)

A. 心绞痛

B. 心肌梗死的胸痛

C. 心脏神经症的胸痛



- D. 自发性气胸的胸痛
- E. 食管疾病的胸骨后疼痛

- 99. 在体力活动后反而减轻的疼痛是
- 100. 因深呼吸与咳嗽而加剧的疼痛是



2022 年中西医内科主治医师《专业知识》模拟试卷

一、A1 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 慢性支气管炎早期肺部 X 线表现是

- A. 无特殊征象
- B. 双肺纹理增粗、紊乱
- C. 肺野透光度增高
- D. 膈肌下降
- E. 胸廓扩张，肋间隙增宽

2. 慢性支气管炎最主要的致病菌是

- A. 奈瑟球菌
- B. 肺炎链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 甲型链球菌
- E. 大肠杆菌

3. 下列各项，关于喘息性慢性支气管炎与支气管哮喘的鉴别诊断叙述错误的是

- A. 喘息性慢性支气管炎咳嗽、咳痰症状突出
- B. 支气管哮喘常有个人或家族过敏史
- C. 喘息性慢性支气管炎使用解痉药有效
- D. 支气管哮喘使用解痉药有效
- E. 两者可相兼为患

4. 下列各项关于慢性肺源性心脏病发病机制和病理改变的叙述，错误的是

- A. 心力衰竭
- B. 肺动脉高压

C. 心脏病变

D. 脑、肝、肾等重要器官损害

E. 免疫-炎症反应

5. 下列各项，不属于慢性肺源性心脏病并发病的是

- A. 肺性脑病
- B. 上消化道出血
- C. 酸碱平衡失调
- D. 休克
- E. 肺梗死

6. 下列各项，关于支气管哮喘发病的症状，错误的是

- A. 发作性伴有哮鸣音
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 偶见顽固性咳嗽
- D. 夜间、凌晨加重
- E. 无“三凹征”

7. 下列各项，关于支气管哮喘急性发作期疾病严重程度为中度的临床表现，错误的说法是

- A. 说话常有中断
- B. 可出现奇脉
- C. SaO_2 91%~95%
- D. FEV_1 占预计值 60%~80%



- E. PEF 预计值 60%~80%
8. 根据哮喘病情控制分级, 下列各项不属于第 4 级治疗方案的是
- A. 教育、环境控制
 - B. 使用短效 β_2 受体激动剂
 - C. 选用 1 种或以上控制性药物
 - D. 白三烯调节剂
 - E. 低剂量 ICS 加 LABA
9. 对支气管扩张症最有确诊价值的检查是
- A. 胸透
 - B. 胸正、侧位片
 - C. 肺动脉造影术
 - D. 支气管镜
 - E. 胸部高分辨率 CT 检查
10. 下列各项, 不属于慢性呼吸衰竭发病机制的是
- A. 通气不足
 - B. 弥散障碍
 - C. 通气/血流比例失调
 - D. 氧耗量增加
 - E. 肺结节病
11. 失代偿性呼吸性酸中毒表现是
- A. PaCO_2 升高, $\text{pH}<7.35$
 - B. PaCO_2 升高, $\text{pH}>7.35$
 - C. PaO_2 降低, $\text{pH}<7.35$
 - D. PaO_2 降低, $\text{pH}>7.35$
 - E. PaCO_2 降低, $\text{pH}<7.35$
12. 下列关于急性呼吸窘迫综合征的说法, 不正确的是
- A. 多因感受温热邪毒、外伤、产褥或厥脱重症所致
 - B. 呼吸浅慢、费力
 - C. 病变初期以实证为主
 - D. 血气分析 PaO_2 降低
 - E. 以对症和支持治疗为主
13. 下列各项, 不属于肺炎典型表现的是
- A. 寒战
 - B. 头晕
 - C. 咳嗽
 - D. 咳痰
 - E. 胸痛
14. 治疗支原体肺炎的首选药物是
- A. 氨基糖苷类
 - B. 头孢菌素
 - C. 青霉素 G
 - D. 氟喹诺酮类
 - E. 大环内酯类
15. 肺结核最常见的全身性中毒症状是
- A. 长期低热
 - B. 咳嗽、咳痰
 - C. 咯血
 - D. 胸痛
 - E. 呼吸困难
16. 下列各项, 关于中央型肺癌的叙述, 错误的是
- A. 发生在段支气管至主支气管
 - B. 发生在段支气管以下
 - C. 约占肺癌的 3/4
 - D. 以鳞状上皮细胞癌较多见
 - E. 小细胞未分化癌多见
17. 属于 II 型呼吸衰竭的血气分析变化是
- A. $\text{PaO}_2 40\text{mmHg}$



- B. PaO₂45mmHg
C. PaO₂50mmHg
D. PaO₂55mmHg
E. PaO₂30mmHg
18. 肺心病慢性呼吸衰竭患者，血气分析动脉血氧分压为 48mmHg，动脉血二氧化碳分压为 84mmHg，宜采用的治疗是
- A. 持续高浓度氧疗
B. 呼吸中枢兴奋剂
C. 持续低浓度氧疗
D. 先高浓度，后持续低浓度氧疗
E. 持续低浓度氧疗加呼吸中枢兴奋剂
19. 治疗慢性呼吸衰竭肺肾气虚证，应首选的方剂是
- A. 补肺汤合参蛤散
B. 生脉饮合补肺汤
C. 参附汤合生脉饮
D. 补肺汤合参附汤
E. 参附汤合参蛤散
20. 慢性呼吸衰竭合并急性左心衰者，应首选的治疗是
- A. 地西洋肌注
B. 利尿剂使用
C. 碱性药物
D. 大量输血
E. 快速升压
21. 缺氧最典型的临床表现是
- A. 发绀
B. 兴奋
C. 嗜睡
D. 淡漠
E. 昏迷
22. 导致肺炎的非典型病原体是
- A. 肺炎链球菌
B. 军团菌
C. 葡萄球菌
D. 肺炎克雷伯杆菌
E. 铜绿假单胞菌
23. 下列各项为非感染性肺炎的是
- A. 放射性肺炎
B. 病毒性肺炎
C. 肺炎支原体肺炎
D. 真菌性肺炎
E. 肺炎衣原体肺炎
24. 下列各项，对诊断急性心衰最特异的是
- A. 气促发绀，烦躁不安
B. 肺动脉瓣区第二心音亢进
C. 咳粉红色泡沫痰
D. 心尖区可闻及奔马律
E. 局部哮鸣音
25. 左室功能不全的患者，听诊改变最有意义的是
- A. 主动脉瓣第二心音减弱
B. 心尖区舒张期奔马律
C. 第一心音减弱
D. 心率明显加快
E. 肺动脉瓣第二心音增强
26. 下列各项，不是主动性异位心律的是
- A. 房扑
B. 房颤
C. 阵发性室上速
D. 逸搏
E. 房速



27. 下列各项, 不支持室性心动过速的诊断是
- A. ST-T 改变
 - B. QRS 时限大于 0.12s
 - C. 房室分离
 - D. 心室夺获
 - E. 心前区导联 QRS 波群方向呈同向性
28. 下列各项, 不符合干扰性房室脱节特点的是
- A. 心室率较心房率略快
 - B. P 波出现在紧靠 QRS 波群前后
 - C. P 与 QRS 波群无固定关系
 - D. QRS 形态多正常
 - E. 可出现心室夺获
29. 导致心脏骤停最常见的心律失常是
- A. 心房扑动
 - B. 房颤
 - C. 阵发性室上速
 - D. 阿-斯综合征
 - E. 心室颤动
30. 符合二度 I 型房室传导阻滞的心电图特点的是
- A. P-R 间期进行性缩短
 - B. R-R 间期进行性延长
 - C. 无 QRS 波脱漏
 - D. P-R 间期恒定
 - E. 部分 P 波后 QRS 波脱漏
31. 下列关于噻嗪类利尿剂的说法, 正确的是
- A. 高血钾时禁用
 - B. 高尿酸血症宜用
 - C. 痛风时禁用
 - D. 肾功能不全时宜用
 - E. 不需监测血钾
32. 不稳定型心绞痛与非 ST 段抬高的心肌梗死的主要区别是
- A. 疼痛持续时间 ≤ 20 分钟
 - B. 血中心肌梗死标志物的升高与否
 - C. 48 小时内是否有多次心绞痛发作
 - D. 是否在安静状态下疼痛
 - E. ST 段抬高程度
33. 导致急性心肌梗死患者早期 (24 小时内) 死亡的主要原因是
- A. 心力衰竭
 - B. 心源性休克
 - C. 心律失常
 - D. 心脏破裂
 - E. 肺栓塞
34. 慢性主动脉瓣关闭不全最常见的病因是
- A. 风湿性
 - B. 先天性
 - C. 感染性心内膜炎
 - D. 退行性心脏瓣膜病
 - E. 结缔组织病
35. 治疗心脏瓣膜病中气阴两虚证, 应首选的方剂是
- A. 独参汤合桃仁红花煎
 - B. 炙甘草汤
 - C. 参附汤合五苓散
 - D. 真武汤合葶苈大枣泻肺汤
 - E. 参附汤合生脉散
36. 感染性心内膜炎的诊断中, 下列最为重要的是



- A. 血培养阳性
B. 超声心动图
C. 发热
D. 结膜出血点
E. 脾大
37. 扩张型心肌病的主要体征是
A. 心音减弱
B. 心脏扩大
C. 下肢水肿
D. 心尖部收缩期杂音
E. 端坐呼吸
38. 治疗原发性心肌病中的邪毒犯心证，应首选的治法是
A. 清热解毒，宁心安神
B. 补益心气，活血化瘀
C. 益气养阴，养心安神
D. 温阳利水
E. 回阳固脱
39. 急性病毒性心肌炎最重要的治疗是
A. 休息
B. 用抗生素预防感染
C. 用能量合剂如 ATP
D. 静点极化液
E. 抗病毒治疗
40. 左房室瓣狭窄患者最常见的早期症状是
A. 阵发性夜间呼吸困难
B. 端坐呼吸
C. 咯血
D. 劳力性呼吸困难
E. 声音嘶哑
41. 中医治疗感染性心内膜炎中的阴虚火旺证，其治法应首选
A. 疏风清热，辛凉解表
B. 清热生津，泻火解毒
C. 清营凉血，凉血活血
D. 滋阴清热，凉血活血
E. 益气养阴，活血祛瘀
42. 导致肥厚型心肌病最常见的原因是
A. 遗传
B. 中毒
C. 代谢异常
D. 药物作用
E. 病毒性心肌炎
43. 在慢性胃炎中，慢性胃体炎的主要病因是
A. 幽门螺杆菌感染
B. 免疫因素
C. 理化因素
D. 十二指肠液反流
E. 慢性右心衰竭
44. 在慢性胃炎时，属于癌前病变的是
A. 浅表胃炎伴肠上皮化生
B. 浅表胃炎伴脐状突起
C. 萎缩胃炎伴肠上皮化生
D. 萎缩胃炎伴重度不典型增生
E. 萎缩胃炎伴幽门腺化生
45. 判断幽门螺杆菌是否根除首选的方法是
A. 活组织幽门螺杆菌培养
B. 组织学检查找幽门螺杆菌
C. ¹³C 尿素呼气试验
D. 快速尿素酶试验
E. 血清抗幽门螺杆菌抗体检测



46. 治疗胃溃疡肝胃不和证应首选
- A. 化肝煎合左金丸加减
 - B. 一贯煎合芍药甘草汤加减
 - C. 黄芪建中汤加减
 - D. 柴胡疏肝散合五磨饮子加减
 - E. 活络效灵丹合丹参饮加减
47. 治疗上消化道出血脾不统血证，应首选方剂是
- A. 归脾汤
 - B. 独参汤
 - C. 泻心汤
 - D. 十灰散
 - E. 四味回阳饮
48. 糖尿病的中医病机是
- A. 阴津亏损、湿热偏胜
 - B. 阴津亏损、燥热偏胜
 - C. 气阴两亏
 - D. 气滞血瘀
 - E. 肝肾阴亏
49. 甲状腺功能亢进症中最为常见的是
- A. 多结节性毒性甲状腺肿
 - B. 甲状腺自主高功能腺瘤
 - C. Graves 病
 - D. 滤泡状甲状腺癌
 - E. 碘致甲状腺功能亢进症
50. 治疗妊娠期甲状腺功能亢进，应首选的药物是
- A. 甲硫氧嘧啶
 - B. 甲巯咪唑
 - C. 卡比马唑
 - D. 丙硫氧嘧啶
 - E. 普萘洛尔
51. 上消化道大出血最常见的病因是
- A. 胃十二指肠溃疡
 - B. 门静脉高压
 - C. 应激性溃疡
 - D. 胆道出血
 - E. 胃癌
52. 治疗轻型溃疡性结肠炎，首选药物是
- A. 抗生素
 - B. 免疫抑制剂
 - C. 柳氮磺胺吡啶
 - D. 泼尼松
 - E. 促肾上腺皮质激素
53. 治疗高甘油三酯血症，应首选的药物是
- A. 非诺贝特
 - B. 洛伐他汀
 - C. 烟酸
 - D. 辛伐他汀
 - E. 考来烯胺
54. 早期胃癌的特点是
- A. 仅累及黏膜层
 - B. 病变直径<1cm
 - C. 无淋巴结转移
 - D. 黏膜层平坦型病变
 - E. 仅累及黏膜及黏膜下层
55. 成年男性体液总量大约占体重的比值是
- A. 50%
 - B. 55%
 - C. 60%
 - D. 65%
 - E. 70%
56. 人体 Na^+ 总量占体重的比例是



- A. 1%
B. 0.8%
C. 0.5%
D. 0.3%
E. 0.15%
57. 普查原发性肝癌最简单有效的方法是
A. AFP
B. B超
C. 腹部CT
D. 肝MRI
E. 同位素肝扫描
58. 治疗原发性肝癌肝肾阴虚证, 应首选方剂是
A. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸
B. 保和丸
C. 逍遥散合桃红四物汤
D. 滋水清肝饮合鳖甲煎丸
E. 大柴胡汤
59. 下列各项, 与原发性肝癌的发生有一定联系的是
A. 肝硬化
B. 肝囊肿
C. 肝脓肿
D. 肺结核
E. 肝血管瘤
60. 确诊代偿期肝硬化的检查方法是
A. 腹腔积液
B. 脾大
C. 肝掌及蜘蛛痣
D. 白蛋白与球蛋白比值倒置
E. 肝穿刺活检见有假小叶形成
61. 血浆渗透压的正常范围是
A. 210~230mOsm/(kg·H₂O)
B. 230~250mOsm/(kg·H₂O)
C. 250~280mOsm/(kg·H₂O)
D. 280~310mOsm/(kg·H₂O)
E. 310~330mOsm/(kg·H₂O)
62. 关于急性胰腺炎, 下列说法正确的是
A. 只有血、尿淀粉酶增高才能诊断急性胰腺炎
B. 血清淀粉酶在8小时达峰值
C. 血清淀粉酶超正常2倍可确诊急性胰腺炎
D. 淀粉酶的高低并不一定反映病情的严重程度
E. 尿淀粉酶增高可持续2~4周
63. 急性胰腺炎肝郁气滞证治则是
A. 疏肝利胆, 行气止痛
B. 清利肝胆湿热
C. 通腑泻热, 行气止痛
D. 疏肝理气, 健脾利湿
E. 疏肝理气, 行气止痛
64. 我国急性胰腺炎的主要病因是
A. 慢性酒精中毒
B. 胆道系统疾病
C. 内分泌与代谢障碍
D. 胰管阻塞
E. 手术与创伤
65. 下列选项, 易导致等渗性失水的病因是
A. 呕吐
B. 高温
C. 高热
D. 过量使用噻嗪类利尿剂



- E. 脱水剂治疗
66. 水过多和水中毒归属的病理表现是
- A. 缺钠性低钠血症
 - B. 稀释性低钙血症
 - C. 稀释性低钾血症
 - D. 稀释性低钠血症
 - E. 低氯血症
67. 低钠血症是指血清钠的浓度低于
- A. 125mmol/L
 - B. 130mmol/L
 - C. 135mmol/L
 - D. 140mmol/L
 - E. 145mmol/L
68. 总体钠正常，细胞内液钠增多，血清钠减少的是
- A. 缺钠性低钠血症
 - B. 稀释性低钠血症
 - C. 转移性低钠血症
 - D. 特发性低钠血症
 - E. 失水
69. 潴钠性高钠血症的主要临床表现是
- A. 肌肉骨骼症状
 - B. 消化道症状
 - C. 神经精神症状
 - D. 泌尿系统症状
 - E. 呼吸系统症状
70. 低钾血症是指血清钾浓度低于
- A. 3.0mmol/L
 - B. 3.5mmol/L
 - C. 4.0mmol/L
 - D. 4.5mmol/L
 - E. 5.0mmol/L
71. 代谢性酸中毒是指
- A. 细胞外液的 H^+ 相对过多
 - B. 细胞外液的 H^+ 绝对过多
 - C. 细胞内液的 H^+ 相对过多
 - D. 细胞内液的 H^+ 绝对过多
 - E. 细胞内液的 HCO_3^- 丧失过多
72. 下列选项，关于酸碱度的描述，错误的是
- A. 正常值为 7.35~7.45
 - B. pH 增高 (>7.45) 提示碱血症
 - C. pH 减低 (<7.35) 则为酸血症
 - D. pH7.4 说明血液中的酸度在正常范围内
 - E. pH7.4 表示无酸碱平衡失调
73. 治疗痛风急性发作的首选药物是
- A. 吲哚美辛
 - B. 布洛芬
 - C. 秋水仙碱
 - D. 泼尼松
 - E. 保泰松
74. 短暂性脑缺血发作的主要中医病机是
- A. 肝肾阴虚，风阳上扰
 - B. 痰瘀互结，阻滞脉络
 - C. 心脾两虚，气血虚衰
 - D. 心阳虚衰，脉络阻塞
 - E. 气虚血瘀，脉络瘀阻
75. TIA 最常见的临床表现是
- A. 运动障碍
 - B. 麻木
 - C. 头晕
 - D. 眼花



- E. 恶心呕吐
76. 脑栓塞最多见的直接原因是
- A. 高血压病史
B. 风湿性心脏病
C. 慢性心房颤动
D. 肺部感染
E. 肾病综合征高凝状态
77. 下列各项, 不属于腔隙性梗死的病理表现的是
- A. 梗死灶呈不规则的圆形、卵圆形
B. 直径多在 2~3mm
C. 病灶多分布在基底节区
D. 大标本可见腔隙为含液体的腔洞样小软化灶
E. 病变血管可见透明变性
78. 腔隙性梗死主要分布的部位是
- A. 放射冠
B. 丘脑
C. 脑干
D. 基底节区
E. 小脑
79. 脑出血最常见的病因是
- A. 继发于脑梗死的出血
B. 脑动脉粥样硬化
C. 血液病
D. 高血压合并小动脉硬化
E. 抗凝或溶血栓治疗
80. 临床上脑出血疑诊病例的首选检查是
- A. 数字减影脑血管造影(DSA)
B. 脑脊液检查
C. CT 检查
- D. 出血量的估算
E. 磁共振检查
81. 下列各项, 与癫痫的发生无关的是
- A. 产伤
B. 颅内肿瘤
C. 脑炎
D. 脑囊虫病
E. 感冒
82. 治疗阿尔茨海默病心肝火旺证应首选的方剂是
- A. 洗心汤合紫雪丹
B. 还少丹合安宫牛黄丸
C. 七福饮合至宝丹
D. 通窍活血汤合紫雪丹
E. 天麻钩藤饮合安宫牛黄丸
83. 类风湿关节炎的关节外表现的基本病理改变是
- A. 血管炎
B. T 淋巴细胞大量增殖
C. 炎症细胞浸润
D. 免疫复合物沉积
E. 关节骨性增大
84. 下列对有机磷农药中毒的防治及护理中, 错误的是
- A. 皮肤被农药污染者立即洗澡, 更换被污染衣服
B. 洒药后, 饭前可以不用洗手
C. 对患者应严密观察病情变化, 防止褥疮和肺炎的发生
D. 喷洒时应严禁饮食和吸烟
E. 喷洒过农药的果蔬 1 个月内不得食用



85. 急性肾小球肾炎最常见的临床表现是

- A. 浮肿
- B. 血尿
- C. 蛋白尿
- D. 少尿
- E. 头痛

86. 尿路感染的中医病机是

- A. 湿热蕴结下焦，开阖失司
- B. 正气亏虚，外邪侵袭
- C. 湿热蕴结下焦，肾与膀胱气化不利
- D. 脾肾亏虚，气化不利
- E. 湿热下注，脾肾亏虚

87. 再生障碍性贫血最主要的诊断依据是

- A. 全血细胞减少，有出血或感染表现
- B. 网织红细胞减少
- C. 骨髓增生不良
- D. 肝脾淋巴结不肿大
- E. 铁剂、叶酸治疗无效

88. 白血病细胞浸润部位中最难控制的是

- A. 肝脏
- B. 脾脏
- C. 骨骼
- D. 淋巴结
- E. 脑膜及脑组织

89. 再生障碍性贫血热毒壅盛证的首选治疗方剂是

- A. 泻白散合黛蛤散
- B. 清营汤
- D. 茜根散
- C. 清瘟败毒饮
- E. 犀角地黄汤

90. 血小板减少的患者，皮肤黏膜常自发性出现出血点和紫癜，主要是由于

- A. 不易形成止血栓
- B. 血管不易收缩
- C. 不能维持血管内皮的完整性
- D. 血凝块回缩障碍
- E. 血液凝固障碍

二、B型题

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案。每个备选答案可以被选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

(91~92题共用备选答案)

- A. 利尿排毒
 - B. 血液净化
 - C. 血液透析
 - D. 血液灌流
 - E. 血浆置换
91. 用于清除血液中分子量较小和非脂溶性的毒物的措施是
92. 用于治疗血液中中毒物浓度明显增高、中

毒严重的措施是

(93~94题共用备选答案)

- A. 溶血性贫血
 - B. 出血
 - C. 白细胞减少
 - D. 再生障碍性贫血
 - E. 血液凝固障碍
93. 阿司匹林药物中毒的表现是



94. 水杨酸类药物中毒的表现是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 100%
- B. 90%~70%
- C. 70%~50%
- D. 50%~30%
- E. 30%以下

95. 中度急性有机磷杀虫药中毒时胆碱酯酶活性是

96. 重度急性有机磷杀虫药中毒时胆碱酯酶活性是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 生脉散合参附汤
- B. 半夏白术天麻汤
- C. 补阳还五汤

D. 涤痰汤

E. 天麻钩藤饮

97. 急性一氧化碳中毒痰浊滞留证, 其治疗首选方剂是

98. 急性一氧化碳中毒肝风痰浊证, 其治疗首选方剂是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 氢氯噻嗪
- B. 苯那普利
- C. 阿替洛尔
- D. 氨氯地平
- E. 硝酸甘油

99. 治疗钠水潴留容量依赖性高血压患者, 应首选的药物是

100. 治疗肾素依赖性高血压患者, 应首选的药物是



2022 年中西医内科主治医师《专业实践能力》 模拟试卷

一、A2 型题

答题说明：以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 患者，男，43 岁。无明显诱因出现眼睑及下肢浮肿，气喘，乏力。血压 142/94mmHg。现症见浮肿，按之凹陷不易恢复，腹胀纳少，面色萎黄，神疲乏力，尿少色清，大便溏，舌质淡苔白腻，脉沉弱。尿蛋白阳性，24 小时尿蛋白定量 4.8g；血浆总蛋白 48g/L，白蛋白 23g/L，血清胆固醇 6.7mmol/L，甘油三酯 5.9mmol/L。最可能的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 慢性肾炎
- D. 慢性肾衰竭
- E. 尿路感染

2. 王某，男性，70 岁。其患高血压病 30 余年，未系统诊治，近几日患者心悸，气短，倦怠乏力，面色苍白，动辄汗出，头晕，面颧暗红，夜寐不安，口干，舌质红苔薄白，脉细数无力。

其最可能的诊断是

- A. 急性心力衰竭
- B. 慢性心力衰竭
- C. 肺心病
- D. 扩张型心肌病
- E. 急性前壁心肌梗死

3. 患者，女性，26 岁，孕 2 月。近 1 个月来，其出现心悸、恶热、多汗等症，焦躁易怒，疲乏无力，多食善饥，体重下降，两眼炯炯有神、瞬目减少。查示甲状腺 II 度肿大，质软、无压痛，未闻及血管杂音，心率 105 次/分，肺、腹无异常。如病人要求手术治疗，应用的方案是

- A. 先用 PTU 控制病情至症状控制，心率 < 80 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 4~6 月手术
- B. 先用 PTU 控制病情至症状控制，心率 < 100 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 3~6 月手术
- C. 先用 MTU 控制病情至症状控制，心率 < 100 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 4~8 月手术
- D. 先用他巴唑控制病情至症状控制，心率 < 100 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 2~6 月手术
- E. 先用他巴唑控制病情至症状控制，心率 < 100 次/分，FT3、FT4 正常，于妊娠 4~8 月手术

4. 张某，泄泻 20 余年，诊为溃疡性结肠炎。其稍进油腻或生冷之品则大便次数增多，水谷不化，脘腹胀闷不舒，面色萎黄，



肢倦乏力，纳食减少，舌淡苔白，脉细弱。其中医证型是

- A. 湿热内蕴证
- B. 脾胃虚弱证
- C. 脾肾阳虚证
- D. 肝郁脾虚证
- E. 阴血亏虚证

5. 患者确诊支气管肺癌1个月。现症见咳嗽无力，少痰，痰中带血，神疲乏力，时有心悸，汗出气短，口干，午后潮热，手足心热，纳呆脘胀，舌红苔薄，脉细数无力。其中医辨证是

- A. 气滞血瘀证
- B. 痰湿毒蕴证
- C. 阴虚毒热证
- D. 气阴两虚证
- E. 痰瘀互结证

6. 张某，男，35岁，工人。痔疮便血2年。血红蛋白67g/L，红细胞平均体积68fL，平均红细胞血红蛋白量20pg，总铁结合力70μmol/L，血清铁6μmol/L，转铁蛋白饱和度9.5%，现症见面色苍白，唇甲色淡，头晕，疲乏，形寒肢冷，腰膝酸软，大便不成形，舌淡，脉沉细弱。其西医诊断是

- A. 巨幼红细胞贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 溶血性贫血
- E. 自身免疫性溶血性贫血

7. 系统性红斑狼疮患者，症见手足瘀点累累，斑疹斑块暗红，两手白紫相继，两腿青斑如网，脱发，口糜，月经愆期，烦躁多怒，舌光红剥苔薄，脉涩数。中医治

法为

- A. 疏肝清热，凉血活血
- B. 理气消积，凉血活血
- C. 化痰除痞，理气消积
- D. 清热凉血，活血散瘀
- E. 疏肝理气，健脾燥湿

8. 患者，男，65岁。其患慢性肺源性心脏病20年。现症见呼吸浅短难续，声低气怯，倚息不能平卧，咳嗽，痰白清稀如沫，胸闷，心慌形寒，汗出，舌淡，脉沉细微无力。其中医治法是

- A. 健脾益肺，化痰降气
- B. 清肺化痰，降逆平喘
- C. 补肺纳肾，降气平喘
- D. 益气活血，止咳化痰
- E. 宣肺化痰，降逆止咳

9. 患者，女，58岁。诊断为脑出血。现症见：半身不遂，舌强，言语不利，口眼喎斜，偏身麻木，口黏痰多，腹胀便秘，头晕目眩，舌红苔黄腻，脉弦滑。其中医治疗首选方剂是

- A. 天麻钩藤饮
- B. 真方白丸子
- C. 星萎承气汤
- D. 镇肝熄风汤
- E. 血府逐瘀汤

10. 类风湿关节炎缓解期患者，伴见脉管炎，皮肤灼热，口渴欲饮，舌质红苔薄黄，脉滑数。为加强清热解毒作用，应辨证使用身痛逐瘀汤加用下列方剂中的

- A. 四妙勇安汤
- B. 白虎汤
- C. 桂枝芍药知母汤



- D. 四妙散
- E. 三仁汤

11. 患者，女，78岁。诊断为帕金森病。现症见肢体震颤，程度较重，颈项僵直，气短乏力，头晕眼花，自汗，口角流涎，舌胖，有齿痕，舌质暗淡，苔薄白，脉细无力。其中医辨证是

- A. 气血两虚证
- B. 肝肾阴虚证
- C. 风痰阻络证
- D. 血瘀动风证
- E. 阴阳两虚证

12. 患者，女性，44岁。近3月来，其觉头晕，心慌，气短，伴疲乏无力，逐日加重，无偏食。1年前，其因溃疡病行胃次全切除术。今查血红蛋白50g/L，红细胞 $3.0 \times 10^9/L$ ，网织红细胞0.005。诊断为缺铁性贫血。其最有可能的病因是

- A. 铁摄入不足
- B. 铁需要量增加
- C. 慢性失血
- D. 铁吸收不良
- E. 铁利用障碍

13. 患者，女性，50岁。身高154cm，体重62kg。主因外阴瘙痒就诊，查血糖13mmol/L，尿糖(++)，血象未见异常。该患者治疗宜

- A. 控制饮食
- B. 控制饮食，加服格列齐特
- C. 控制饮食，加服格列喹酮
- D. 控制饮食，加服二甲双胍
- E. 控制饮食，加服胰岛素

14. 张某，女，69岁。诊断为脑血栓形成，现症见突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，四肢欠温，舌淡苔白腻，脉沉。其中医治法是

- A. 通腑泄热，化痰理气
- B. 清热化痰，醒神开窍
- C. 辛温开窍，豁痰息风
- D. 清热泻火，通络化痰
- E. 活血通络，化痰开窍

15. 患者，女，60岁。主因咳嗽伴咳大量铁锈色痰入院，入院后经抗感染、止咳化痰等治疗症状无明显好转。近日病情突然加重。现症见喘促气急，张口抬肩，不能平卧，高热烦渴，面唇发绀，舌红绛苔薄白，脉洪数。其中医证型是

- A. 痰热阻肺证
- B. 气阴两虚证
- C. 心肾阳虚证
- D. 热毒袭肺证
- E. 外感风热证

16. 患者，男，30岁。其发热，咳嗽2周，现已热退，但见胸闷心悸、口干心烦、失眠多梦、手足心热等症。查体：心率110次/分，律不齐，舌红少苔，脉细数。心电图：低电压，T波低平，频发室性早搏。其治疗首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 葛根芩连汤
- C. 天王补心丹
- D. 炙甘草汤合生脉散
- E. 参附养荣汤

17. 女性患者，72岁。1天前上午发现口角右偏，左手不能持物，左下肢不能行走，



说话吐字不清。下午检查发现左侧鼻唇沟浅，伸舌稍向左偏，左侧上下肢肌力4级。今晨醒来说话正常，鼻唇沟对称，伸舌居中，四肢运动灵活有力。最可能的诊断是

- A. 右侧大脑中动脉血栓形成
- B. 椎-基底动脉血栓形成
- C. 短暂性脑缺血发作
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下腔出血

18. 患者，男，45岁，高血压十余年，左侧面部和上下肢无力，MRI可清晰显示脑干病灶，其余未见明显异常，可考虑患者为

- A. 脑出血
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 腔隙性梗死
- E. 蛛网膜下腔出血

19. 患者，男性，54岁。2月前，其发现左肩胛骨及左上肢内侧疼痛，逐渐加重，伴有低热，2年前胸部X线检查正常。查体：左眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷。X线显示左前第2肋以上至肺尖部有高密度阴影。现症见：咳嗽不畅，咳痰不爽，胸胁胀痛，面青唇暗，大便秘结，舌质暗紫、有瘀斑，脉弦。其病证结合诊断是

- A. 肺门淋巴结结核，气滞血瘀型
- B. 急性粟粒型肺结核，气滞血瘀型
- C. 支原体肺炎，气滞血瘀型
- D. 支气管肺癌，气滞血瘀型
- E. 慢性纤维空洞型肺结核，气滞血瘀型

20. 患者，女性，80岁。既往有心衰病史。突发意识丧失，现症见神志恍惚，面色苍

白，四肢厥冷，大汗淋漓，舌质淡，脉微欲绝。其中医证型为

- A. 元阳暴脱证
- B. 心阳不振证
- C. 心肾阳虚证
- D. 气阴两脱证
- E. 痰蒙神窍证

21. 患者，男，30岁。近1周其连续饮酒赴宴，今日晚餐后2小时突起持续性上腹痛，拒按，恶心，呕吐，口干苦。检查：体温38℃，脉搏105次/分，血压110/70mmHg，腹部出现压痛及反跳痛，舌淡红苔白，脉弦细。血淀粉酶700U/L(苏氏法)。其病证结合诊断是

- A. 急性胰腺炎，肝胆湿热证
- B. 急性胰腺炎，肠胃热结证
- C. 急性胰腺炎，肝郁气滞证
- D. 急性胆囊炎，热毒炽盛证
- E. 急性胆囊炎，肝肾阴虚证

22. 患者张某，女性，20岁，甲状腺肿大半年，有时心悸，多汗，食欲亢进，大便次数增多每天2~3次，查甲状腺Ⅱ度肿大，无触痛，可闻及血管杂音，¹³¹I摄取率3小时25%，24小时75%，T3抑制试验抑制率<50%。治疗首选

- A. 立即手术治疗
- B. 普萘洛尔
- C. 他巴唑
- D. 复方碘液
- E. 放射性核素治疗

23. 患者王某，男，45岁，体重60kg，患贲门癌进食困难2个月，现口渴严重，疲乏，尿量减少。查体：血压100/70mmHg，



心率 90 次/分，体温正常，眼窝凹陷，皮肤弹性差，唇舌干燥。依据失水程度计算，该患者需补液量为

- A. 1000ml
- B. 1500ml
- C. 3000ml
- D. 4000ml
- E. 5000ml

24. 某女，35 岁，两手指间和掌指关节强直不舒 2 年，近 2 周病情加重，关节疼痛，肿大变形，伴活动受限。查血沉 45mm/h，类风湿因子(++)。当诊断为

- A. 痛风
- B. 风湿性关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 骨性关节炎

25. 李某，女，28 岁，两手指关节肿胀变形 3 年，伴疼痛，屈伸受限，痛处不移，皮肤失去弹性，稍硬，面色黧黑，手臂麻木，舌质暗红，有瘀点，苔薄白，脉弦涩。查类风湿因子(+)，X 光片：关节间隙变窄。当诊断的证型是

- A. 湿热痹阻证
- B. 阴虚内热证
- C. 寒热错杂证
- D. 痰瘀互结，经脉痹阻证
- E. 肝肾亏损，邪痹筋骨证

26. 朱某，女，高热 5 天，不恶寒，满面红赤，皮肤红斑鲜红，咽干，口渴，喜冷饮，尿赤而少，关节疼痛，舌红绛，苔黄，脉滑数。查抗双链 DNA(dsDNA)抗体、抗 Sm 抗体(+)。证属

- A. 气营热盛证
- B. 阴虚内热证
- C. 热郁积饮证
- D. 瘀热痹阻证
- E. 气分热盛证

27. 患者刘某，男性，34 岁。因身体不适就诊，全身浮肿，面色苍白，畏寒肢冷，腰脊冷痛，神疲，纳少，便溏，舌嫩淡胖，有齿痕，脉沉。尿常规检查见蛋白尿，血压 160/90mmHg。应诊为慢性肾炎哪一型

- A. 肺肾气虚证
- B. 脾肾阳虚证
- C. 脾肾气虚证
- D. 肝肾阴虚证
- E. 气阴两虚证

28. 患者，男，62 岁，小便淋漓不已，时作时止，每于劳累后发作或加重，尿热，时有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治疗宜选用

- A. 八正散加减
- B. 丹栀逍遥散加减
- C. 无比山药丸加减
- D. 知柏地黄丸加减
- E. 补中益气汤加减

29. 王某，男，6 岁。1 月前出现眼睑浮肿，尿常规检查为蛋白尿，24 小时定量为 4.5g，血浆总蛋白为 25g/L，B 超提示腹水。临床上最可能诊断为

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 肝硬化腹水



E. 以上均不是

30. 患者，男，29岁，因胸骨疼痛、发热就诊，血液检查见到幼稚细胞增多，骨髓检查见有核细胞增生活跃，原始细胞为40%。最有可能的诊断

- A. 再生障碍性贫血
- B. 白血病
- C. 骨髓增生异常综合征
- D. 传染性单核细胞增多症
- E. 传染性淋巴细胞增多症

31. 魏某，女性，34岁。在服用氯霉素后出现发热，头晕，乏力，心悸，气短，食欲减退，骨髓象示增生活跃，但巨核细胞明显减少。最可能的诊断是

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 白血病
- D. 恶性贫血
- E. 肾性贫血

32. 患者，男，55岁。持续性上腹隐痛3个月，多次查大便隐血试验阳性，食欲不振，消瘦。体检：面色苍白，上腹部有压痛，未触及包块，肝、脾肋下未及。下述哪项检查对确诊有帮助

- A. 纤维胃镜加活检
- B. 肝放射性核素扫描
- C. B型超声检查
- D. 血清胃泌素测定
- E. 胃酸测定

33. 患者男性，28岁。经常出现规律性上腹痛3年，空腹发作，夜间更重，进食可缓解，服抗酸药可止痛。最可能的诊断为

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠球部溃疡
- C. 复合性溃疡
- D. 十二指肠壅积症
- E. 胃黏膜脱垂症

34. 患者男性，56岁。胃溃疡病10年。现胃痛隐隐，喜温喜按，畏寒肢冷，泛吐清水，腹胀便溏，舌淡胖，边有齿痕，苔白，脉迟缓。治疗方剂是

- A. 黄芪建中汤
- B. 活络效灵丹合丹参饮
- C. 化肝煎合左金丸
- D. 一贯煎合芍药甘草汤
- E. 柴胡疏肝散合五磨饮子

35. 患者女性，53岁，已确诊肝癌。1天前突然出现剧烈腹痛，血腹，休克，最可能是并发

- A. 原发性腹膜炎
- B. 急性梗阻性化脓性胆管炎
- C. 结核性腹膜炎
- D. 原发性肝癌破裂
- E. 门静脉血栓形成

36. 46岁男性，因乏力就诊，血红蛋白为68g/L，血压为155/95mmHg，血肌酐为386μmol/L，应考虑诊断为

- A. 贫血
- B. 高血压
- C. 慢性肾衰竭
- D. 急性肾衰竭
- E. 营养不良

37. 男性患者，28岁。1年来阵发性血压升高，发作时有剧烈头痛、面色苍白、心动



过速等。平时血压正常且无症状，应首先考虑做下列哪项检查

- A. 肾动脉造影
- B. 测定 24 小时尿儿茶酚胺和香草基杏仁酸
- C. 24 小时尿 17-羟皮质类固醇
- D. 血浆肾素活性测定
- E. 静脉肾盂造影

38. 男性，56 岁，肝硬化腹水患者。1 周来发热，腹痛，体温 38℃，脉搏 100 次/分，呼吸 26 次/分，踝部可凹性水肿。腹水检查：微黄色，微浑，比重：1.019，细胞数 $0.8 \times 10^9/L$ ，白细胞数 $0.5 \times 10^9/L$ ，分类：中性粒细胞 0.70，淋巴细胞 0.30。可能诊断是

- A. 肝硬化顽固性腹水
- B. 肝硬化合并肝癌
- C. 肝硬化合并结核性腹膜炎
- D. 肝硬化合并自发性腹膜炎
- E. 肝肾综合征

39. 患者男性，50 岁。肝硬化腹水明显，1 周前呕血，黑便。近日烦躁不安，用很多火柴点不着烟，晚间误将鞋作尿盆。轻度黄疸，两手举起时腕部阵发颤抖。应考虑

- A. 脑贫血
- B. 震颤性麻痹
- C. 氮质血症
- D. 安眠药过量
- E. 肝性脑病

40. 患者，女，53 岁。慢性胃炎 4 年。胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，舌红少津，脉细数。治疗应首先考虑的方剂是

- A. 四君子汤加减
- B. 益胃汤加减

- C. 失笑散合丹参饮加减
- D. 柴胡疏肝散加减
- E. 三仁汤加减

41. 男性，45 岁。患胃溃疡已 6 年，近 1 个月来腹痛变为无规律，恶心，腹胀，进食后为甚。胃肠钡餐 X 线检查，胃窦部可见黏膜增粗，并有一 0.4cm×0.3cm 龛影，胃酸正常。本病例可能是

- A. 胃溃疡恶性变
- B. 胃溃疡合并慢性胃炎
- C. 复合性溃疡
- D. 胃溃疡合并黏膜脱垂
- E. 胃溃疡合并幽门梗阻

42. 患者女性，30 岁。出现心悸、气短、心前区不适。心律增快，心率增快与发热不平衡，休息及睡眠时亦快，1 周前有呼吸道感染史，表现为发热、咽痛、咳嗽、全身不适、乏力等，现症见发热微恶寒，头身疼痛，鼻塞流涕，咽痛口渴，口干口苦，小便黄赤，心悸气短，胸闷，舌红苔薄黄，脉浮数。选用的治法为

- A. 清热解毒，宁心安神
- B. 解毒化湿，宁心安神
- C. 滋阴清热，养心安神
- D. 益气养阴，宁心安神
- E. 益气温阳，滋阴通脉

43. 女性患者，40 岁。提早出现的 P'波，形态与窦性 P 波不同；P'-R>0.12 秒；QRS 形态正常；代偿间歇不完全。该患者的诊断为

- A. 室上性心动过速
- B. 房性早搏
- C. 室性早搏



- D. 房颤
- E. 室颤

44. 患者女性, 48岁, 胸痛部位在乳头外, 为刺痛, 发作数秒钟, 含硝酸甘油1~2秒疼痛即消失, 做轻微体力活动亦可缓解。应首先考虑的诊断是

- A. 心绞痛(不典型)
- B. 心脏神经症
- C. 变异型心绞痛
- D. 稳定型心绞痛
- E. 肋间神经痛

45. 患者男性, 56岁。风湿性心脏病20年。现心悸, 喘息不能平卧, 颜面及肢体浮肿, 脘痞腹胀, 形寒肢冷, 大便溏泻, 小便短少, 舌体胖大, 质淡, 苔薄白, 脉沉细无力。治疗方剂是

- A. 生脉散
- B. 肾气丸
- C. 参附汤
- D. 真武汤
- E. 人参养荣汤

46. 60岁女性患者, 既往高血压病史35年。有多饮、多尿、肌无力、周期性麻痹, 实验室检查: 血钾3.0mmol/L, 血钠160mmol/L, 安体舒通试验阳性。该患者考虑诊断为

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 肾动脉狭窄
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 原发性醛固酮增多症
- E. 库欣征

47. 某男, 62岁, 患肺炎, 经抗生素治疗

后好转, 现症见: 干咳少痰, 咳嗽声低, 气短神疲, 身热, 手足心热, 自汗, 心胸烦闷, 口渴欲饮, 舌红, 苔薄黄, 脉细数。其治疗宜首选

- A. 竹叶石膏汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 清营汤
- D. 生脉散合四逆汤
- E. 补肺汤

48. 患者, 男, 34岁。发热恶寒2天, 伴咳嗽, 咳吐黄痰。查体: HR100次/分, 律齐, 右下肺叩诊浊音, 呼吸音降低, 闻及湿啰音。胸片示右下肺炎。痰菌培养示克雷伯杆菌生长。治疗应首选的抗生素是

- A. 大环内酯类
- B. 青霉素G
- C. 三代头孢菌素与氨基糖苷类
- D. 耐青霉素酶的半合成青霉素
- E. 喹诺酮类

49. 患者, 男, 64岁。有肺心病史, 咳喘加重1周, 神志恍惚, 谵语, 烦躁不安, 嗜睡, 颜面发绀, 舌紫暗, 舌苔白腻, 脉滑数。动脉血气分析: PaO₂50mmHg, PaCO₂55mmHg。其诊断是

- A. I型呼吸衰竭痰蒙神窍证
- B. II型呼吸衰竭痰蒙神窍证
- C. I型呼吸衰竭脾肾阳虚证
- D. II型呼吸衰竭脾肾阳虚证
- E. II型呼吸衰竭痰浊阻肺证

50. 患者女性, 63岁。慢性咳喘病史30余年, 1年来出现双下肢浮肿, 1周来咳喘加重, 查体: 发绀明显, 桶状胸, 剑突下可见心尖搏动, 心率119次/分, 律齐, 双肺



可闻及干湿性啰音，肝肋下1cm，双下肢浮肿(+)，血象：白细胞 $12 \times 10^9/L$ ，胸大片显示：肺气肿征，右心室增大，肺纹理增重。应诊断为

- A. 慢性支气管炎
- B. 慢性支气管炎合并肺气肿
- C. 慢性肺源性心脏病代偿期
- D. 慢性肺源性心脏病失代偿期
- E. 支气管哮喘

51. 患者，男，53岁，心悸气短，胸闷，面色晦暗，口唇发绀，肢冷畏寒，甚则喘促不能平卧，咳嗽，吐涎痰，夜难入寐，浮肿，大便稀溏，舌淡红，苔白，脉沉细无力。诊断为病毒性心肌炎。患者应用的方药是

- A. 银翘散
- B. 葛根芩连汤
- C. 天王补心丹
- D. 炙甘草汤
- E. 参附养荣汤

52. 患者男性，58岁。素有小便不利，排尿困难，现尿少尿闭，恶心呕吐，口中尿臭，发热口干而不欲饮，头痛烦躁，严重者可神昏抽搐，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 黄连解毒汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 黄连泻心汤
- D. 黄连阿胶汤
- E. 泻心汤

53. 患者男性，59岁。素有蛋白尿，诊为慢性肾炎，近2个月因工作劳累，有明显疲劳感。查血常规，HGB85g/L，RBC $2.8 \times 10^{12}/L$ ，急查

血肌酐 $345 \mu\text{mol}/L$ ，BUN $16.7 \text{mmol}/L$ ，血钾 $6.7 \text{mmol}/L$ 。应采取的治疗措施是

- A. 口服利尿剂
- B. 肾脏移植
- C. 注射促红细胞生成素
- D. 血液透析
- E. 口服氧化淀粉

54. 患者男性，42岁。20年前因消瘦、乏力就诊，空腹血糖 $9.6 \text{mmol}/L$ ，诊为糖尿病，口服降糖药治疗，后改为胰岛素注射。一年前感冒后出现恶心、呕吐，皮肤瘙痒，口中氨味，考虑为肾衰竭，现乏力明显。复查肾功能血肌酐 $648 \mu\text{mol}/L$ ，其肾功能分期是

- A. 糖尿病早期
- B. 肾贮备功能下降期
- C. 氮质血症期
- D. 肾衰竭期
- E. 尿毒症期

55. 患者女性，74岁。确诊支气管肺癌1个月，拒绝西医治疗，请中医诊治。症见：刺激性咳嗽，偶或痰中带血，甚则咯血不止，心烦，少寐，手足心热，盗汗，口渴，大便秘结，舌质红，苔薄黄，脉细数。治疗宜首选

- A. 生脉饮
- B. 血府逐瘀汤
- C. 导痰汤
- D. 沙参麦冬汤合五味消毒饮
- E. 沙参麦冬汤

56. 患者，男性，54岁。2月前发现左肩胛骨及左上肢内侧疼痛，逐渐加重，伴有低热，2年前胸部X线检查正常。查体：左眼



睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷。X线显示左前第二肋以上至肺尖部有高密度阴影。

诊断应考虑

- A. 肺门淋巴结结核
- B. 急性粟粒型肺结核
- C. 支原体肺炎
- D. 支气管肺癌
- E. 慢性纤维空洞型肺结核

57. 患者女性，40岁。有慢性肾炎病史，现面浮肢肿，身热汗出，口干不欲饮，胸脘痞闷，腹部胀满，纳食不香，尿黄短少，便溏不爽，舌红，苔黄腻，脉滑数。其中医证型是

- A. 痰湿证
- B. 湿浊证
- C. 水湿证
- D. 湿热证
- E. 血瘀证

58. 患儿男性，8岁。尿异常4年，近1年肾功能明显下降，伴有听力、视力异常。最可能的诊断是

- A. Alport综合征
- B. 急性肾炎
- C. 慢性肾炎
- D. 慢性肾衰竭
- E. 肾病综合征

59. 患者男性，36岁。5天前出现眼睑浮肿，就诊于当地医院，尿蛋白阳性，24小时蛋白定量5.1g，血浆白蛋白28g/L，胆固醇6.4mmol/L，三酰甘油4.5mmol/L。应考虑的诊断是

- A. 慢性肾炎
- B. 肾病综合征

- C. 急性肾炎
- D. IgA肾病
- E. 慢性肾衰

60. 患者女性，28岁。尿频、尿急、尿痛3天，现小便频数，灼热刺痛，色黄赤，小腹拘急胀痛，腰痛拒按，恶寒发热，口苦，大便秘结，舌质红，苔薄黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 八正散
- C. 石韦散
- D. 导赤散
- E. 小蓟饮子

61. 患者女性，31岁。时有小便疼痛，肾区不适，夜尿3次。尿常规检查尿蛋白阳性、白细胞5~7/HP，B超示肾外形凹凸不平，两肾大小不等集合系统结构紊乱，肾盂扩张。应考虑的诊断是

- A. 尿道炎
- B. 膀胱炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 肾结核

62. 张某，女，53岁。因与他人争吵服用有机磷农药数口，1小时后送到乡卫生院给予静脉注射阿托品治疗，16小时后病情无好转送往市医院急诊。查体：体温40℃，心率160次/min，浅昏迷，瞳孔等大等圆，直径6mm，烦躁，抽搐，皮肤干燥，膀胱充盈。下列处理错误的是

- A. 停止阿托品应用
- B. 输液
- C. 给予解磷定



- D. 给予地西洋(安定)
- E. 导尿

63. 李某, 男, 33 岁。因天气寒冷, 于房间中放置一煤烟炉取暖, 且门窗紧闭。家人回去时发现其昏倒在地, 遂被送往医院。可能的诊断是

- A. 有机磷农药中毒
- B. 阿托品中毒
- C. 急性一氧化碳中毒
- D. 氯化氢中毒
- E. 苯中毒

64. 李某, 女, 23 岁。因与男友争吵, 服用有机磷农药乐果 10ml, 被家人发现后立即送往医院, 医生进行查体不应该出现

- A. 流涎、多汗等腺体分泌亢进表现
- B. 瞳孔缩小, 肺部湿啰音
- C. 面部肌肉抽动
- D. 口眼喎斜
- E. 心律失常

65. 王某, 男, 67 岁。半个月前因卧室燃烧煤烟炉取暖, 而出现头痛、头晕、恶心、呕吐, 急送往医院就诊, 诊断为一氧化碳中毒, 经治疗后患者出院。现症见: 言语不清, 反应迟钝, 行走不稳, 面无表情, 健忘失眠, 舌淡红, 苔白, 脉沉滑。中医辨证是

- A. 肝风痰浊证
- B. 阴竭阳脱证
- C. 痰浊滞留证
- D. 气虚血瘀证
- E. 痰瘀阻络证

66. 患儿男性, 11 岁。半个月前咽喉肿痛,

4 天前眼睑浮肿、肉眼血尿, 在当地医院诊为急性肾炎, 给予青霉素静点, 自 2 天前小便减少, 每天不到 100ml, 急查血肌酐 $562\mu\text{mol/L}$, $\text{BUN}13\text{mmol/L}$, 治疗应首选的措施是

- A. 静点利尿剂
- B. 口服利尿剂
- C. 血液透析
- D. 腹膜透析
- E. 导尿

67. 患者女性, 面色不华, 但时有潮红, 两手指甲亦无华, 神疲乏力, 畏寒肢冷, 时而午后烘热, 口干, 小便短少, 两腿浮肿如泥, 进而腰股俱肿, 腹大如鼓, 舌胖, 苔薄白, 脉细弱。宜选用的方剂是

- A. 济生肾气丸
- B. 八珍汤
- C. 归脾丸
- D. 玉枢丹
- E. 通关散

68. 患者女性, 55 岁。形体消瘦, 关节变形, 肌肉萎缩, 筋脉拘急, 腰膝酸软无力, 眩晕, 心悸气短, 指甲淡白, 舌淡苔薄, 脉细弱。诊断为类风湿关节炎, 治疗应首选的方剂是

- A. 独活寄生汤
- B. 四妙丸
- C. 羌活胜湿汤
- D. 川芎茶调散
- E. 防风通圣散

69. 患者女性, 38 岁。患类风湿关节炎 1 年, 现午后发热, 盗汗, 口干咽燥, 手足心热, 关节肿胀疼痛, 小便赤涩, 大便秘



结，舌红少苔，脉细数，其中医治法是

- A. 清热利湿，祛风通络
- B. 养阴清热，祛风通络
- C. 祛风散寒，清热化湿
- D. 活血化瘀，祛痰通络
- E. 益肝肾，补气血，祛风湿，通经络

70. 类风湿关节炎患者，现症见：午后发热，口干咽燥，关节肿胀疼痛，小便赤涩，大便秘结，舌质干红，苔少，脉细数。伴纳呆，恶心欲吐，全身困乏无力。其中医证型是阴虚内热证兼湿热，治疗当以丁氏清络饮合下列方剂中的

- A. 三仁汤
- B. 三妙散
- C. 大秦芩汤
- D. 羌活胜湿汤
- E. 薏苡汤

71. 类风湿关节炎患者，发热，口苦，恶心，泛泛欲吐，全身困乏无力，下肢沉重酸胀，浮肿，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 桂枝芍药知母汤
- B. 丁氏清络饮加减
- C. 四妙丸
- D. 身痛逐瘀汤
- E. 指迷茯苓丸

72. 患者发热，口苦，饮食无味，纳呆，恶心，泛泛欲吐，关节肿痛以下肢为重，全身困乏无力，下肢沉重酸胀，浮肿，有关节积液，舌苔黄腻，脉滑数。其中医证型是

- A. 湿热痹阻证
- B. 寒热错杂证

- C. 阴虚内热证
- D. 脾胃虚弱证
- E. 肝肾不足证

73. 患者女性，30岁。全身关节痛伴反复发热3个月，咽喉痛，口腔溃疡，尿蛋白(++)，首先应考虑的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 多发性肌炎
- D. 上呼吸道感染
- E. 风湿性关节炎

74. 患者女性，在某医院诊断为系统性红斑狼疮，长期低热，手足心热，面色潮红而有暗紫斑片，口干咽痛，渴喜冷饮，目赤齿衄，关节肿痛，烦躁不寐，舌质红少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 犀角地黄汤
- B. 玉女煎
- C. 养阴清肺汤
- D. 独活寄生汤
- C. 养阴清肺汤
- E. 身痛逐瘀汤

75. 患者女性，23岁。面部蝶形红斑，高热，不恶寒，满面红赤，皮肤红斑鲜红，咽干，口渴喜冷饮，尿赤而少，关节疼痛，舌红绛，苔黄，脉滑数。其中医治法是

- A. 清心开窍，解毒化瘀
- B. 清热祛风，通络止痛
- C. 清热凉血，活血散瘀
- D. 养阴清热，活血化瘀
- E. 清热解毒，凉血化斑

76. 患者女性，52岁。面部红斑，心悸怔



仲，健忘失眠，多梦，面色不华，肢体麻木，舌质淡，苔薄白，脉细缓。其中医治法是

A. 祛风通络

B. 清热祛风

C. 凉血活血

D. 益气养血

E. 健脾补肾

二、A3/A4 型题

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息，在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(77~79 题共用题干)

患者女性，25 岁。既往健康，突然咯血约 500ml，查体：心肺未见异常，胸 X 线片双肺下野纹理增粗。

77. 首先应考虑的诊断是

A. 急性支气管炎

B. 支气管扩张症

C. 支气管内膜结核

D. 支气管肺癌

E. 急性肺梗死

78. 为明确诊断，可进一步做的检查是

A. 胸 CT

B. 肺功能测定

C. 痰细菌培养+药敏

D. 痰抗酸杆菌涂片

E. 纤维支气管镜检查

79. 目前治疗的关键是

A. 保持呼吸道通畅

B. 应用垂体后叶激素

C. 高效广谱抗生素

D. 尽快做胸 CT 明确出血部位

E. 纤维支气管镜直视下止血

(80~82 题共用题干)

患者男性，46 岁，乙型肝炎 10 年，现出现持续性肝区疼痛，消瘦，发热，食欲不振，

乏力。查体：营养不良，腹部结块。舌质暗红，有瘀斑，苔薄黄，脉弦。

80. 应首先考虑的诊断是

A. 慢性迁延性肝炎

B. 肝癌

C. 肝硬化

D. 慢性肝炎

E. 肝血管瘤

81. 其中医证型是

A. 肝胃不和证

B. 脾胃虚寒证

C. 气滞血瘀证

D. 气血两虚证

E. 痰湿内阻证

82. 其中医治法是

A. 燥湿健脾，化痰和胃

B. 养阴柔肝，软坚散结

C. 清热利湿，化瘀解毒

D. 温中散寒，健脾和胃

E. 疏肝理气，活血化痰

(83~85 题共用题干)

患者男性，40 岁。近日面色萎黄，口唇色淡，神疲乏力，心悸失眠，纳少，大便不成形，舌淡，苔白，脉细弱。查血常规提示缺铁性贫血



83. 其中医辨证是

- A. 脾胃虚弱证
- B. 心气亏虚证
- C. 心脾两虚证
- D. 心血亏虚证
- E. 心肾两虚证

84. 其中医治法是

- A. 温补脾肾，养血安神
- B. 滋补心肾，补气养心
- C. 滋补心肾，养血安神
- D. 益气补血，养心安神
- E. 滋阴养心，健脾安神

85. 其治疗宜首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 无比山药丸
- C. 天王补心丹
- D. 养心汤
- E. 四物汤

(86~88 题共用题干)

患者男性，60岁，突然失语，记忆力衰退。患者表情淡漠，焦虑，伴右侧肢体活动不利，右侧感觉障碍，步态障碍。现症见：智力下降，神情呆滞，懈怠思卧，齿枯发焦，腰酸腿软，头晕耳鸣，舌体瘦小，苔薄，脉沉细。

86. 可能的病证结合诊断是

- A. 血管性痴呆，髓海不足证
- B. 脑出血，心脾两虚证
- C. 脑梗死，心血不足证
- D. 蛛网膜下腔出血，肝肾阴虚证
- E. 腔隙性脑梗死，髓海不足证

87. 中医治法是

- A. 温补脾肾
- B. 补精填髓养神
- C. 补益肝肾
- D. 补益心脾
- E. 滋阴补肾

88. 治疗应首选的方剂是

- A. 七福饮
- B. 还少丹
- C. 沙参麦冬汤
- D. 知柏地黄丸
- E. 地黄饮子

(89~91 题共用题干)

患者女性，20岁。四肢关节疼痛7个月，近2个月出现面颊部对称性红斑，反复发作口腔溃疡。现症见：面色潮红，有暗紫斑片，长期低热，手足心热，口干咽痛，渴喜冷饮，目赤齿衄，关节肿痛，烦躁不寐，舌质红少苔，脉细数。外周血 WBC $2.4 \times 10^9/L$ ，ESR47mm/h。

89. 该患者最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 皮炎
- D. 白塞病
- E. 风湿性关节炎

90. 其中医证型是

- A. 气营热盛
- B. 阴虚内热
- C. 热郁积饮
- D. 脾肾两虚
- E. 瘀热痹阻

91. 其中医治法是



- A. 清热凉血
- B. 养阴清热
- C. 清热蠲饮
- D. 清热活血
- E. 健脾利水

(92~94 题共用题干)

患者，男，65岁，冠心病史6年。胸痛彻背，心痛如绞，胸闷憋气，含服硝酸甘油不缓解，形寒畏冷，四肢不温，冷汗自出，心悸气短，舌质紫暗，苔薄白，脉沉细。

92. 其证型是

- A. 冠心病心绞痛，寒痰痹阻证
- B. 冠心病心绞痛，气阴两虚证
- C. 急性心肌梗死，痰瘀痹阻证
- D. 冠心病心绞痛，气血两虚证
- E. 急性心肌梗死，寒凝心脉证

93. 中医治法为

- A. 辛温通阳，开痹散寒
- B. 益气养阴，活血通络
- C. 通阳泄浊，豁痰开痹
- D. 散寒宣痹，芳香温通
- E. 豁痰活血，理气止痛

94. 首选方药为

- A. 血府逐瘀汤加減
- B. 参附龙牡汤加減
- C. 生脉散合左归饮加減
- D. 生脉散合炙甘草汤加減
- E. 当归四逆汤合苏合香丸加減

(95~97 题共用题干)

患者，男，58岁。长期饮酒，肝掌，黄疸，B超提示肝回声明显增强、不均、光点粗大。腹大胀满，脉络怒张，胁腹刺痛，

面色晦暗黧黑，肋下瘕块，面颈可见红点赤缕，手掌赤痕，口干不欲饮，舌质紫暗，脉细涩。

95. 其西医诊断为

- A. 肝癌
- B. 胃溃疡
- C. 胃癌
- D. 肝血管瘤
- E. 肝硬化

96. 其证候是

- A. 湿热蕴结
- B. 寒湿困脾
- C. 脾肾阳虚
- D. 肝脾血瘀
- E. 肝肾阴虚

97. 应选用的方药为

- A. 中满分消丸合茵陈蒿汤
- B. 调营饮
- C. 附子理中汤合五苓散
- D. 一贯煎合膈下逐瘀汤
- E. 实脾饮

(98~100 题共用题干)

患者，男，53岁。小便不畅，少腹胀满疼痛，小便灼热刺痛，可见血尿，寒热往来，胸胁苦满，舌质暗红，脉弦。诊断为尿路感染。

98. 其中医证型为

- A. 膀胱湿热证
- B. 肝胆郁热证
- C. 脾肾亏虚，湿热屡犯证
- D. 肾阴不足，湿热留恋证
- E. 脾肾阳虚



99. 其中医治法为

- A. 滋阴益肾，清热通淋
- B. 健脾补肾
- C. 疏肝理气，清热通淋
- D. 清热利湿通淋
- E. 温运脾阳，利水消肿

100. 应选用的方药为

- A. 实脾饮
- B. 八正散
- C. 丹栀逍遥散合石苇散
- D. 无比山药丸
- E. 知柏地黄丸



2022 年中西医内科主治医师《基础知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1.【正确答案】 D

【答案解析】 证候：即疾病过程中一定阶段的病位、病因、病性、病势及机体抗病能力的强弱等本质有机联系的反应状态。

2.【正确答案】 D

【答案解析】 昼夜阴阳属性的一般说法是：上午属阳中之阳，下午属阳中之阴，前半夜属阴中之阴，后半夜属阴中之阳。

3.【正确答案】 A

【答案解析】 阳虚则生内寒，出现虚寒证，系阳虚无以制阴而致阴盛，须用“益火（目的或者根本）之源，以消阴翳（临床上虚寒证属阴的范畴）”，补阳以制阴，《内经》称之为“阴病治阳”。

4.【正确答案】 D

【答案解析】 心与肾为相克，肾病传心为相乘，心病传肾为相侮。

5.【正确答案】 B

【答案解析】 心藏神，即心主神志，或称心主神明，或称心藏神。《灵枢》说：“心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也。”所以说心藏神为心主五脏六腑之大主的理论基础。

6.【正确答案】 C

【答案解析】 肺为华盖：肺位于胸腔，左右各一，其位最高，故称“华盖”。

7.【正确答案】 E

【答案解析】 肝的疏泄功能包括：（1）调畅气机；（2）促进脾胃的运化功能和胆汁的分泌排泄；（3）调畅情志；（4）女子的排卵和月经来潮、男子的排精。

8.【正确答案】 D

【答案解析】 肾所藏的精气，包括“先天之精”和“后天之精”。“先天之精”是禀受于父母的生殖之精。“后天之精”是指出生以后，通过脾胃功能，从饮食中生成的水谷之精气，以及脏腑生理活动中化生的精气通过代谢平衡后的剩余部分，藏之于肾。“先天之精”有赖于“后天之精”的不断培育和充养，“后天之精”的化生又依赖于“先天之精”的活力资助。

9.【正确答案】 D

【答案解析】 气的固摄作用表现之一为统摄血液，使其在脉中正常运行，防止其逸出脉外。

10.【正确答案】 D

【答案解析】 风性善行而数变：“善行”是指风邪致病具有病位游移、行无定处的特性，



如行痹。“数变”是指风邪致病具有变幻无常和发病迅速的特性，如风疹之皮疹瘙痒，发无定处，此起彼伏。

11.【正确答案】 C

【答案解析】 过度的恐惧，使肾气不固，气泄于下，临床可见二便失禁，或骨痿、遗精等。

12.【正确答案】 A

【答案解析】 正治，是逆其证候性质而治的一种常用治疗法则，又称逆治。逆，是指采用方药的性质与疾病的性质相反。如辨明疾病的寒热虚实，分别采用“寒者热之”、“热者寒之”、“虚则补之”、“实则泻之”等不同方法去治疗，即为正治。

13.【正确答案】 D

【答案解析】 疠气的致病特点有发病急骤，病情危笃；传染性强，易于流行；一气一病，症状相似这三个特点。六淫邪气共同的致病特点是：1. 外感性；2. 季节性，地域性；3. 转化性；4. 相兼性。二者主要区别在于疠气具有强烈的传染性。

14.【正确答案】 C

【答案解析】 火热为阳邪，其性炎上：火热为阳盛之邪，阳胜则热，故其致病多见高热、烦渴、汗出、脉洪数等症。火性趋上，侵害人体，多在上部，尤以头面为多见，表现为目赤肿痛、咽喉肿痛、口舌生疮糜烂等。

15.【正确答案】 C

【答案解析】 脾胃为生气之源，脾主运化，胃主受纳，共同完成对饮食水谷的消化和

水谷精微的吸收。水谷之精化生水谷之气。

16.【正确答案】 A

【答案解析】 肺与肾的关系，主要表现为水液代谢和呼吸运动两个方面。肾为主水之脏，肺为“水之上源”，肺的宣发肃降和通调水道，有赖于肾的蒸腾气化；而肾的主水功能，亦有赖于肺的宣发肃降和通调水道。

17.【正确答案】 E

【答案解析】 清·汪昂在《本草备要》中有“人之记性，皆在脑中”的记载。

18.【正确答案】 B

【答案解析】 肾的生理功能包括：(1)肾藏精，主生长发育和生殖。(2)肾主水。(3)肾主纳气。肝主疏泄调畅情志。

19.【正确答案】 B

【答案解析】 三焦是上焦、中焦、下焦的合称，为六腑之一，并有“孤府”之称。

20.【正确答案】 A

【答案解析】 人体生长发育及生殖功能的稳定、脏腑经络功能的协调、精气津液的生成及运行输布有序，既有赖于阳气的推动、激发等促进作用，又离不开阴气的宁静、抑制等调控作用，是阴阳二气推动与调控作用相反相成的结果。

21.【正确答案】 A

【答案解析】 气能生血是指血的组成及其生成过程，均离不开气和气的运动变化。因此气虚之人，血液的生成不足，常伴有



血虚。

22.【正确答案】 A

【答案解析】瘀血致病脉象多见细涩、沉弦或结代。

23.【正确答案】 C

【答案解析】过食辛温燥热，使脾胃阴液受损，肠胃积热，可发生口渴、口臭、嘈杂易饥、便秘等症。

24.【正确答案】 A

【答案解析】邪气是发病的重要条件，邪气影响发病的性质、类型与特点、影响病情与病位，某些情况下邪气在发病中起主导作用等方面。

25.【正确答案】 C

【答案解析】内生“五邪”，是指在疾病的发展过程中，由于气血津液和脏腑等生理功能的异常而产生的类似风、寒、湿、燥、火六淫外邪致病的病理现象。由于病起于内，故分别称为“内风”、“内寒”、“内湿”、“内燥”和“内火”等，统称为内生“五邪”。

26.【正确答案】 C

【答案解析】气逆指气机升降失常，或气升之太过，或降之不及，脏腑之气逆上的病理状态。

27.【正确答案】 B

【答案解析】塞因塞用：是以补开塞，即用补益的药物治疗具有虚性闭塞不通症状的病证。适用于因虚而闭阻的真虚假实证。脾虚运化无力是导致的腹部胀满是脾虚为

本，所以应用补益药来开塞。

28.【正确答案】 C

【答案解析】肺者，气之本，魄之处也；心者，生之本，神之变也；脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者，仓廩之本，营之居也；肾者，主蛰，封藏之本，精之处也；肝者，罢极之本，魂之居也。

29.【正确答案】 E

【答案解析】阴阳是自然界事物运动变化的根本规律。

30.【正确答案】 D

【答案解析】《素问·举痛论》原文：余知百病生于气也。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结，九气不同，何病之生？

31.【正确答案】 A

【答案解析】《素问·阴阳应象大论》：其高者，因而越之。

32.【正确答案】 A

【答案解析】故智者之养生也，必顺四时而适寒暑，和喜怒而安居处，节阴阳而调刚柔，如是则僻邪不至，长生久视。（《灵枢·本神》）。

33.【正确答案】 B

【答案解析】太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，桂枝汤主之。



34.【正确答案】C

【答案解析】伤寒，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，白虎加人参汤主之。

35.【正确答案】E

【答案解析】小柴胡汤证以胆热内郁、枢机不利、三焦失畅、脾胃失和为主要病机，当以小柴胡汤加减化裁治之。

36.【正确答案】B

【答案解析】太阴病本证，为脾阳不足，寒湿内盛所致，故除见腹满时痛外，更见食不下，呕吐，下利等，当用理中汤治疗。

37.【正确答案】C

【答案解析】四逆汤证论述了少阴病脉沉，治宜急温。条文以脉代证，提示少阴病施治宜早，切勿拖延。一旦延误施治，则吐利厥逆诸症接踵而至，治亦晚矣。本条体现了中医“治未病”的预防治疗学思想，值得重视。

38.【正确答案】B

【答案解析】防己黄芪汤是风湿兼气虚证的代表方剂。

39.【正确答案】A

【答案解析】黄芪桂枝五物汤的治则：温阳行痹。

40.【正确答案】C

【答案解析】薏苡附子散证的证候：胸中痛剧，四肢逆冷，尚可见舌淡苔白而滑，脉象沉伏，或涩，或微细而迟，或紧细而急。

41.【正确答案】C

【答案解析】原文：妇人宿有癥病，经断未及三月，而得漏下不止，胎动在脐上者，为癥痼害。妊娠六月动者，前三月经水利时，胎也。下血者，后断三月衄也。所以血不止者，其癥不去故也，当下其癥，桂枝茯苓丸主之。

42.【正确答案】C

【答案解析】瓜蒌瞿麦丸方中使用附子者，因下积之冷非暖不消，故以炮附子温肾化气；上浮之焰非滋不息，复用瓜蒌根（天花粉）、薯蓣（山药）润燥生津；水停于内，泛溢周身，则用茯苓健脾渗利水饮；瞿麦渗湿利尿，导水于下。

43.【正确答案】C

【答案解析】温热类温病热盛动风的病机：邪热亢盛，深入厥阴，引动肝风。热灼营阴，扰神窜络为温热类温病营分证治热灼营阴的病机；热入心包，炼液成痰，痰热闭窍为温热类温病热陷心包的病机；血分热毒炽盛，动血耗血，瘀热内阻为温热类温病热盛迫血证的病机；温病日久，真阴耗伤，邪少虚多为温热类温病真阴耗竭证的病机。

44.【正确答案】E

【答案解析】湿温病中，气分湿热日久不解，酿蒸痰浊，蒙蔽心包，而出现了神志的异常。表现的特点是：神识似清似昧，或时清时昧，即使清醒时也表情淡漠，反应迟钝，严重时谵语胡言，亦是温病的危重症。

45.【正确答案】D

【答案解析】温毒类温病是温病的一种特殊类型，由温毒病邪引起，包括大头瘟、烂



喉痧等疾病，多发生于冬春两季。

46.【正确答案】 C

【答案解析】 湿温病是感受湿热病邪引起的，多发生于夏秋雨湿较盛、气候炎热季节的急性外感热病。

47.【正确答案】 A

【答案解析】 温热类温病治疗在清泄邪热的基础上，还要时时顾护阴液。

48.【正确答案】 C

【答案解析】 一般来讲，寒凉药分别具有清热泻火、凉血解毒、滋阴除蒸、泻热通便、清热利尿、清化热痰、清心开窍、凉肝息风等作用；而温热药则分别具有温里散寒、暖肝散结、补火助阳、温阳利水、温经通络、引火归原、回阳救逆等作用。引火归原是温热药的作用，所以选择 C。

49.【正确答案】 A

【答案解析】 十八反包括：乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白及、白蔹；甘草反甘遂、大戟、海藻、芫花；藜芦反人参、丹参、玄参、沙参、细辛、芍药。

50.【正确答案】 E

【答案解析】 与药物用量有关的是：药物性质、剂型、配伍、年龄、体质、病情、季节变化。

51.【正确答案】 C

【答案解析】 生姜治疗胃寒呕吐。有“呕家圣药”之称。

52.【正确答案】 C

【答案解析】 夏枯草

性能：辛、苦，寒。归肝、胆经。

功效：清热泻火，明目，散结消肿。

应用：(1)目赤肿痛、头痛眩晕、目珠夜痛。(2)瘰疬、瘰瘤。(3)乳痈肿痛。

53.【正确答案】 C

【答案解析】 鸦胆子功效：清热解毒，止痢，截疟，腐蚀赘疣。

青蒿功效：清透虚热，凉血除蒸，解暑，截疟。

白头翁功效：清热解毒，凉血止痢。

马齿苋功效：清热解毒，凉血止血，止痢。

黄连功效：清热燥湿，泻火解毒。为治泻痢要药。

54.【正确答案】 E

【答案解析】 大黄功效：泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经，清利湿热。

55.【正确答案】 E

【答案解析】 独活功效：祛风湿，止痹痛，解表。

56.【正确答案】 E

【答案解析】 藿香

性能：辛，微温。归脾、胃、肺经。

功效：化湿，止呕，解暑。为芳香化湿浊要药。

57.【正确答案】 E

【答案解析】 薏苡仁与茯苓二药，共同功效：均能利水渗湿、健脾。同治水肿、小便不利及脾虚诸证。然茯苓性平，药力较强，凡水湿停滞及脾虚诸证无论寒热咸宜。薏苡仁则生用微寒，利水力虽不及茯苓，但兼清热，



凡水湿停滞轻证或兼热者宜用；炒用寒性减而长于健脾止泻，治脾虚泄泻多用。

58.【正确答案】A

【答案解析】吴茱萸功效：散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。

59.【正确答案】A

【答案解析】川楝子

性能：苦，寒。有小毒。归肝、胃、小肠、膀胱经。

功效：行气止痛，杀虫。

应用：(1)肝郁化火所致诸痛证。(2)虫积腹痛。(3)头癣、秃疮。

60.【正确答案】B

【答案解析】山楂功效：消食化积，行气散瘀。

61.【正确答案】C

【答案解析】槟榔功效：杀虫消积，行气，利水，截疟。

62.【正确答案】B

【答案解析】小蓟

性能：甘、苦，凉。归心、肝经。

功效：凉血止血，散瘀解毒消痈。

应用

(1)血热出血证。尤善治尿血、血淋。

(2)热毒疮痈。

63.【正确答案】A

【答案解析】小蓟、地榆、白茅根都属于凉血止血药，三七属于化瘀止血药。

64.【正确答案】E

【答案解析】五灵脂用法：煎服，宜包煎。

65.【正确答案】C

【答案解析】鸡血藤功效：行血补血，调经，舒筋活络。

66.【正确答案】E

【答案解析】半夏与天南星均可用于治疗湿痰、寒痰证。

67.【正确答案】C

【答案解析】桑白皮与葶苈子，共同功效：均能泻肺平喘，利水消肿，同治咳嗽喘满、水肿、小便不利等证。不同功效：桑白皮味甘性寒，清肺消痰而降气平喘，肺热咳嗽多用之；葶苈子苦辛大寒，善泻肺中水饮，且泻肺气之闭塞以利尿消肿，药力颇强，善治咳逆痰多、喘息不得卧。

68.【正确答案】B

【答案解析】磁石功效：镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘。

69.【正确答案】B

【答案解析】石决明与决明子均有清肝明目之功效，皆可用于治疗目赤肿痛、翳障等偏于肝热者。

70.【正确答案】B

【答案解析】麝香功效：开窍醒神，活血通经，消肿止痛。

71.【正确答案】D

【答案解析】人参用法用量：煎服，3~9g；挽救虚脱可用15~30g。宜文火另煎分次口服。野山参研末吞服，每次2g，日服2次。



72.【正确答案】B

【答案解析】肉苁蓉功效：补肾助阳，润肠通便。

73.【正确答案】B

【答案解析】熟地黄功效：补血养阴，填精益髓，炒炭止血。

当归功效：补血调经，活血止痛，润肠通便。

白芍功效：养血敛阴，柔肝止痛，平抑肝阳，止汗。

阿胶功效：补血，滋阴，润肺，止血。

何首乌功效：制用：补益精血。生用：解毒，截疟，润肠通便。

74.【正确答案】A

【答案解析】麻黄根和浮小麦共同的功效是止汗。

75.【正确答案】A

【答案解析】常山为治疗疟疾的要药。

76.【正确答案】D

【答案解析】大黄牡丹汤中，大黄苦寒攻下为君，泻热逐瘀，涤荡肠中湿热瘀结。

77.【正确答案】D

【答案解析】小柴胡汤主治：(1)伤寒少阳证：往来寒热，胸胁苦满，默默不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白，脉弦者；(2)热入血室证：妇人中风，经水适断，寒热发作有时；(3)黄疸、疟疾，以及内伤杂病而见少阳证者。肝脾不和证是四逆散主治病证之一。

78.【正确答案】B

【答案解析】白虎汤主治阳明、气分热盛证。症见：壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力。

79.【正确答案】D

【答案解析】香薷散的功用是祛暑解表，化湿和中。

80.【正确答案】E

【答案解析】趣记：理中丸【人将猪赶】人参、干姜、白术、炙甘草。

方歌：理中丸主温中阳，甘草人参术干姜；吐利腹痛阴寒盛，或加附子更扶阳。

81.【正确答案】D

【答案解析】参苓白术散的功用是益气健脾、渗湿止泻，主治脾虚湿盛证。

82.【正确答案】E

【答案解析】趣记：地黄饮子【贵妇从远东赴沪，尝巴鱼是何味】熟干地黄、山茱萸、石斛、麦门冬、五味子、巴戟天、肉苁蓉、炮附子、官桂、茯苓、菖蒲、远志。

方歌：地黄饮子山茱萸，麦味菖蒲远志茯；苁蓉桂附巴戟天，少入薄荷姜枣服。

83.【正确答案】E

【答案解析】牡蛎散与玉屏风散均具固表止汗之功。但牡蛎散固表敛汗之力较强，主治卫气不固，心阳不潜之自汗、盗汗，属标本兼治之法；玉屏风散健脾益气之力较大，主治表虚自汗或体虚易感风邪者，属治本之法。玉屏风散属治本之法，因此选项E错误。

84.【正确答案】B

【答案解析】趣记：酸枣仁汤【令母熊找草】



酸枣仁、知母、茯苓、川芎、甘草
方歌：酸枣仁汤治失眠，川芎知草茯苓煎；
养血除烦清内热，安然入睡梦乡甜。

85.【正确答案】 E

【答案解析】 苏合香丸具有芳香开窍、行气止痛的作用，主治寒闭证。

86.【正确答案】 B

【答案解析】 越鞠丸组成：香附、川芎、苍术、梔子、神曲各等分。

87.【正确答案】 E

【答案解析】 补阳还五汤中重用生黄芪四两，补益元气，意在气旺则血行，瘀去而络通，为君药。

88.【正确答案】 A

【答案解析】 消风散证因风湿或风热侵袭人体，浸淫血脉，郁于肌肤而致。痒自风来，止痒必先疏风，故用荆芥、防风、牛蒡子、蝉蜕疏风止痒，共为君药。

89.【正确答案】 B

【答案解析】 平胃散的功用是燥湿运脾，行气和胃。

90.【正确答案】 B

【答案解析】 二陈汤主治湿痰证。咳嗽痰多，色白易咯，胸膈痞闷，不欲饮食，恶心呕吐，或头眩心悸，肢体困倦，舌苔白滑，脉滑。

二、B型题

(91~92题共用备选答案)

91.【正确答案】 C

【答案解析】 清营汤【乔莲花选升丹麦主席】犀角(水牛角)、生地黄、麦冬、元参、黄连、银花、连翘、竹叶心、丹参。

92.【正确答案】 A

【答案解析】 犀角地黄汤组成是犀角(水牛角代)、生地黄、芍药、牡丹皮。

(93~94题共用备选答案)

93.【正确答案】 D

【答案解析】 趣记：清胃散——(生母当黄妈)生地黄、黄连、当归身、牡丹皮、升麻。

方歌：清胃散用升麻连，当归生地牡丹全；
或加石膏清胃热，口疮吐衄与牙宣。

94.【正确答案】 E

【答案解析】 龙胆泻肝汤——(黄子龙推木车，当地卸柴草)龙胆草、黄芩、梔子、泽泻、木通、车前子、当归、生地黄、柴胡、生甘草。

方歌：龙胆泻肝梔芩柴，生地车前泽泻偕；
木通甘草当归合，肝经湿热力能排。

(95~96题共用备选答案)

95.【正确答案】 C

【答案解析】 吴茱萸汤主治有三证，病机则同属虚寒之邪上逆犯胃所致。治当温中补虚，降逆止呕。方中吴茱萸上可温胃寒，下可暖肝肾，又能降逆止呕，一药三擅其功而为君。重用生姜为臣，温胃散寒，降逆止呕。佐以人参补益脾胃之虚；佐使以大枣，益气补脾，调和诸药。全方肝、肾、胃同治，温、降、补并施。

96.【正确答案】 E



【答案解析】 当归四逆汤主治血虚寒厥证。桂枝温经散寒，温通血脉；细辛通达表里，温散寒凝，共为君药。当归养血和血；白芍滋养阴血，共为臣药。君臣相伍，一则散寒通脉，一则温补营血。佐入通草，通行经脉。重用大枣与甘草相伍，补中健脾而益气血，又防燥烈伤及阴血。全方温、补、通三者并用，温中有补，补中兼行，扶正祛邪，标本兼顾。

(97~98 题共用备选答案)

97. **【正确答案】** B

【答案解析】 牵正散的功用是祛风化痰，通络止痉。主治风中经络，口眼歪斜。

98. **【正确答案】** E

【答案解析】 小活络丹的功用是祛风除湿，化痰通络，活血止痛。主治风寒湿痹。

(99~100 题共用备选答案)

99. **【正确答案】** A

【答案解析】 藿香正气散的功用是解表化湿，理气和中。

100. **【正确答案】** E

【答案解析】 连朴饮的功用是清热化湿、理气和中。



2022 年中西医内科主治医师《相关专业知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1.【正确答案】 E

【答案解析】青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛和惊风。选项 E 为黄色的主病。故根据题干要求，正确的选项为 E。

2.【正确答案】 B

【答案解析】口唇赤肿而干：多为热极。唇色深红：多属热盛。口唇青黑：多属寒盛、痛极。口唇青紫：多属瘀血症。

3.【正确答案】 B

【答案解析】白睛发黄：为黄疸的主要标志。多由湿热或寒湿内蕴，肝胆疏泄失常，胆汁外溢所致。

4.【正确答案】 D

【答案解析】发作急骤，呼吸深长，息粗声高，唯以呼出为快者，为实喘。多为风寒袭肺或痰热壅肺，痰饮停肺，肺失宣肃，或水气凌心所致。D 为虚喘的表现。

5.【正确答案】 D

【答案解析】散脉：浮而无根，至数不齐，脉力不匀。

6.【正确答案】 D

【答案解析】寸口分候脏腑：左寸候心，右寸候肺，并统括胸以上及头部的疾病；左

关候肝胆，右关候脾胃，统括膈以下、脐以上部位的疾病；两尺候肾，并包括脐以下至足部的疾病。

7.【正确答案】 C

【答案解析】脉搏有力是有神的标志，故有胃即有神。脉之有神是指：脉象有力柔和，节律整齐。

8.【正确答案】 D

【答案解析】阴证的特征性表现有：面色苍白或暗淡，精神萎靡，身重蹇卧，畏冷肢凉，倦怠无力，语声低怯，纳差，口淡不渴，小便清长或短少，大便溏泻气腥，舌淡胖嫩，脉沉迟、微弱、细。除了选项 D 以外，其余各项均为阳证的临床表现，故根据题干所问，正确的选项为 D。

9.【正确答案】 D

【答案解析】阳虚可见于许多脏器组织的病变，临床常见心阳虚证、脾阳虚证、胃阳虚证、肾阳虚证、胞宫(精室)虚寒证以及虚阳浮越证等，并表现有各自脏器的证候特征。

10.【正确答案】 E

【答案解析】血热证的临床表现：身热夜甚，或潮热，口渴，面赤，心烦，失眠，躁扰不宁，甚或狂乱，神昏谵语，或见各



种出血色深红，或斑疹显露，或为疮痍，舌绛，脉数疾等。

11.【正确答案】 B

【答案解析】 痰饮：饮停胃肠；悬饮：饮停胸胁；支饮：饮停心包；溢饮：饮溢四肢。

12.【正确答案】 A

【答案解析】 寒滞胃肠证与胃肠气滞证二者均有气滞的病机，故胃肠气滞证与寒滞胃肠证均可见脘腹痞胀、疼痛、呕泻等症。但寒滞胃肠证有寒邪刺激的病因，有冷痛喜温、恶寒肢冷、脉紧等属寒的表现；胃肠气滞证则以胀痛为主，嗝气、肠鸣、矢气等症明显，而无寒因、寒症。

13.【正确答案】 B

【答案解析】 寒湿困脾证与湿热蕴脾证均因湿邪困脾，脾胃纳运失职所致，可见脘腹痞闷，纳呆呕恶，便溏，肢体困重，面目发黄，苔腻，脉濡等。区别在于兼热、兼寒之不同。前者病性属寒湿，故见舌淡，苔腻白滑，腹痛喜暖，口淡不渴，带下量多清稀，阴黄，脉濡缓等寒湿内停的表现；后者病性属湿热，故有舌质红，苔黄腻，身热不扬，阳黄，脉濡数等湿热内蕴的表现。

14.【正确答案】 A

【答案解析】 (1)以口舌生疮、赤烂疼痛为主者，称为心火上炎证。

(2)兼小便赤、涩、灼、痛者，称为心火下移证，习称为心移热于小肠。

(3)吐血、衄血表现突出者，称为心火迫血妄行证。

(4)以狂躁谵语、神志不清为主症者，称为

热扰心神证或热闭心神证。

15.【正确答案】 B

【答案解析】 阳明腑证的辨证要点：本证以潮热汗出、腹满痛、便秘、脉沉实等为辨证要点。

16.【正确答案】 A

【答案解析】 太阳中风证的辨证要点：本证以恶风、汗出、脉浮缓为辨证依据。

17.【正确答案】 D

【答案解析】 目昏、雀盲、歧视的病因、病机基本相同，多由肝肾亏虚，精血不足，目失充养而致。常见于久病或年老、体弱之人。

18.【正确答案】 C

【答案解析】 骨蒸潮热：午后或夜间潮热，其特点是午后和夜间有低热。有热自骨内向外透发的感觉者，称为骨蒸发热，多属阴虚火旺所致。

19.【正确答案】 E

【答案解析】 手足心汗指病人手足心汗出较多的症状。可因阴经郁热熏蒸，或阳明燥热内结，或脾虚运化失常所致。

20.【正确答案】 E

【答案解析】 胀痛指疼痛带有胀满的症状，是气滞作痛的特点。如胸胁脘腹等处胀痛，时发时止，多属肺、肝、胃肠气滞之证；但头目胀痛，多见于肝阳上亢或肝火上炎的病证。

21.【正确答案】 D



【答案解析】重痛指疼痛伴有沉重感的症状，多因湿邪困阻气机所致。常见于头部、四肢及腰部。但头部重痛，亦可因肝阳上亢、气血上壅所致。

22. **【正确答案】** E

【答案解析】胃脘突然剧痛暴作，出现压痛及反跳痛者，多因胃脘穿孔所致。胃脘疼痛失去规律，痛无休止而明显消瘦者，应考虑胃癌的可能。

23. **【正确答案】** C

【答案解析】头晕且重，如物裹缠，痰多苔腻者，多因痰湿内阻所致。

24. **【正确答案】** A

【答案解析】(1)面色淡黄，枯槁无华，称“萎黄”。常见于脾胃气虚，气血不足者。
(2)面色淡黄而虚浮，称为“黄胖”。属脾气虚弱，湿邪内盛。
(3)若面目一身俱黄，称为“黄疸”。黄而鲜明如橘子色者，属“阳黄”，乃湿热熏蒸为患；黄而晦暗如烟熏者，属“阴黄”，乃寒湿郁滞所致。

25. **【正确答案】** D

【答案解析】呕吐物酸腐，夹杂不化食物，多属伤食，因暴饮暴食，损伤脾胃，宿食不化，胃气上逆所致。

26. **【正确答案】** E

【答案解析】选项 E 是假神患者的表现，故根据题干要求，此题的正确选项为 E。

27. **【正确答案】** C

【答案解析】咽喉腐烂：溃烂成片或凹陷

者，为肺胃热毒壅盛；若腐烂分散浅表者，为肺胃之热尚轻；若溃腐日久，周围淡红或苍白者，多属虚证。

28. **【正确答案】** A

【答案解析】牙宣：龈肉萎缩，牙根暴露，牙齿松动，多属肾虚或胃阴不足。

29. **【正确答案】** A

【答案解析】苔薄白而干：多见于外感风热。

30. **【正确答案】** E

【答案解析】瘦薄舌：多主气血阴液不足。

(1)舌体瘦薄而色淡：多是气血两虚。

(2)舌体瘦薄而色红绛干燥：多见于阴虚火旺，津液耗伤。

31. **【正确答案】** C

【答案解析】抽搐的病因中的全身性疾病：

(1)感染性：如中毒性肺炎、中毒性菌痢、败血症、狂犬病、破伤风、小儿高热惊厥等。

(2)非感染性：缺氧、中毒、代谢性疾病、物理损伤、癔症性抽搐等。

32. **【正确答案】** A

【答案解析】腹部外伤后突发腹痛有休克者应考虑肝、脾破裂。

33. **【正确答案】** E

【答案解析】咳嗽的病因包括：呼吸道疾病、胸膜疾病、心血管疾病、中枢神经因素以及其他原因如胃食管反流病、服用血管紧张素转化酶抑制剂等。



34.【正确答案】 B

【答案解析】 大量咯血常见于空洞型肺结核、支气管扩张和肺脓肿。

35.【正确答案】 E

【答案解析】 个人史包括出生地及居住地区，职业和工作条件，习惯与嗜好，冶游史等。

36.【正确答案】 D

【答案解析】 弥漫性腹肌紧张多见于胃肠道穿孔或实质脏器破裂所致的急性弥漫性腹膜炎，此时腹壁常强直，硬如木板，故称为板状腹。

37.【正确答案】 C

【答案解析】 深部滑行触诊：用于检查腹腔深部的包块和脏器。

38.【正确答案】 D

【答案解析】 脊柱前凸多发生于腰段，见于大量腹水、腹腔巨大肿瘤、髋关节结核及髋关节后脱位等。

39.【正确答案】 D

【答案解析】 脊柱压痛与叩击痛临床意义：正常人的脊柱无压痛与叩击痛，若某一部位有压痛与叩击痛，提示该处有病变，如脊椎结核、脊椎骨折、脊椎肿瘤、椎间盘突出等。

40.【正确答案】 E

【答案解析】 双上眼睑下垂见于重症肌无力、先天性上眼睑下垂。

41.【正确答案】 A

【答案解析】 正常成人心尖搏动位于左锁骨中线内侧 0.5~1.0cm 处。

42.【正确答案】 D

【答案解析】 二尖瓣狭窄时，心尖部可闻及舒张中晚期隆隆样杂音，呈递增型，音调较低而局限，左侧卧位呼气末时较清楚，常伴有第一心音亢进、二尖瓣开放拍击音及舒张期震颤，肺动脉瓣第二心音亢进、分裂；主动脉瓣关闭不全所致的相对性二尖瓣狭窄的杂音，称为奥-弗杂音 (Austin-Flint 杂音)，性质柔和，不伴有第一心音亢进、开瓣音，无震颤。

43.【正确答案】 E

【答案解析】 皮肤弹性与年龄、营养状态、皮下脂肪及组织间隙所含液量有关。

44.【正确答案】 B

【答案解析】 左锁骨上窝淋巴结肿大，多为腹腔脏器癌肿 (胃癌、肝癌、结肠癌等) 转移；右锁骨上窝淋巴结肿大，多为胸腔脏器癌肿 (肺癌、食管癌等) 转移。

45.【正确答案】 B

【答案解析】 满月面容：面圆如满月，皮肤发红，常伴痤疮和小须。见于库欣综合征及长期应用肾上腺皮质激素的患者。

46.【正确答案】 D

【答案解析】 消化道癌症粪便隐血试验呈持续阳性。

47.【正确答案】 E

【答案解析】 急性胰腺炎血清淀粉酶在发病后 12~72 小时达高峰。



48.【正确答案】 B

【答案解析】 健康成人经尿排出的蛋白质总量为 20~80mg/24h。尿蛋白定性试验阳性或定量试验>150mg/24h 称为蛋白尿。

49.【正确答案】 E

【答案解析】 毛细血管脆性增加见于：
(1)毛细血管壁异常：如遗传性出血性毛细血管扩张症、过敏性紫癜、单纯性紫癜及维生素 C 缺乏症；中毒性损害，如败血症、感染性心内膜炎、尿毒症、砷中毒。(2)血小板量与质异常：如原发性或继发性血小板减少性紫癜、血小板无力症。(3)血管性血友病等。

50.【正确答案】 E

【答案解析】 DIC 检查项目：(1)血小板计数。(2)血浆纤维蛋白原测定。(3)3P 试验或血浆纤维蛋白原降解产物测定或 D-二聚体测定。(4)血浆凝血酶原时间测定。(5)纤溶酶原含量及活性测定。(6)抗凝血酶Ⅲ活性测定。(7)血浆因子Ⅷ：C 活性测定。(8)血浆内皮素-1 测定。

51.【正确答案】 B

【答案解析】 室性期前收缩的心电图表现：
(1)提早出现宽大畸形的 QRS-T 波群，其前无提早出现的异位 P 波。
(2)QRS 时限常 $\geq 0.12s$ 。
(3)T 波方向与 QRS 主波方向相反。
(4)常有完全性代偿间歇。

52.【正确答案】 B

【答案解析】 肺容量由 2 个或 2 个以上的肺容积组成。

53.【正确答案】 D

【答案解析】 下消化道内镜检查禁忌证：
(1)肛门、直肠严重狭窄者。
(2)重症痢疾、溃疡性结肠炎及憩室炎等。
(3)严重心肺功能不全、精神失常及昏迷者。
(4)急性弥漫性腹膜炎及腹腔器官穿孔者。
(5)妊娠妇女。

54.【正确答案】 A

【答案解析】 儿童、青春期少年甲状腺吸¹³¹碘率较成年人高，女性高于男性。

55.【正确答案】 E

【答案解析】 周围型肺癌：HRCT 有利于显示结节或肿块形态、边缘、周围状况以及内部结构等，可见分叶征、毛刺征、胸膜凹陷征、空泡征或支气管充气征。

56.【正确答案】 B

【答案解析】 食管癌 X 线钡剂造影可见：
(1)黏膜皱襞改变：由于肿瘤破坏黏膜层，使正常皱襞消失、中断、破坏，形成表面杂乱的不规则影像。
(2)管腔狭窄。
(3)腔内充盈缺损。
(4)不规则的龛影，早期较浅小，较大者表现为长径与食管长轴一致的长形龛影。
(5)受累食管呈局限性僵硬。

57.【正确答案】 E

【答案解析】 苯妥英钠的临床应用是抗癫痫、治疗外周神经痛(三叉、舌咽、坐骨神经痛)、抗心律失常，对癫痫强直阵挛性发作首选，口服吸收不规则，起效慢，半衰期个体差异大。



58.【正确答案】 B

【答案解析】 考查药物作用的特点。由于药物的选择性是相对的，多数情况下治疗作用与不良反应会同时发生，这是药物作用两重性的表现。

59.【正确答案】 D

【答案解析】 作用于受体的药物的基本作用是兴奋作用和抑制作用。

60.【正确答案】 B

【答案解析】 药物作用的选择性是指多数药物在适当剂量时，只对少数器官或组织产生明显作用，而对其他器官或组织的作用较小或不产生作用。

61.【正确答案】 D

【答案解析】 有机磷酸酯中毒的表现是 ACh 大量堆积后产生的 M 样作用、N 样及中枢样症状。解救的首选药是：先迅速注射足量的阿托品以对抗中毒时的 M 样症状及部分中枢样症状，随后马上给予胆碱酯酶复活药，使酶及时恢复活性，两药合用有明显的协同作用。

62.【正确答案】 C

【答案解析】 解热镇痛抗炎药物的共同作用机制是抑制环氧合酶，抑制体内前列腺素的合成。

63.【正确答案】 E

【答案解析】 本题重点考查阿司匹林的不良反应。阿司匹林的不良反应主要包括：①胃肠道反应，易引起消化性溃疡；②凝血功能障碍；③变态反应“阿司匹林哮喘”；④水杨酸反应；⑤瑞夷综合征。

64.【正确答案】 E

【答案解析】 考查重点是利多卡因的药理作用和临床应用。利多卡因为 I B 类抗心律失常药，口服由于首过消除，不能达到有效血药浓度，故常采用静脉注射。主要在肝脏代谢，仅 10% 以原形从肾排出；可轻度阻滞钠通道，抑制 Na^+ 内流和促进 K^+ 外流，使 APD 和 ERP 缩短，但 APD 缩短更为明显，故相对延长 ERP，有利于消除折返。临床主要用于室性心律失常，特别是对急性心肌梗死引起的室性心律失常为首选药。对室上性心律失常基本无效。

65.【正确答案】 D

【答案解析】 本题重点考查普萘洛尔的药理作用。普萘洛尔为 β 肾上腺素受体拮抗剂，主要用于室上性心律失常，对于交感神经兴奋过高、甲状腺功能亢进及嗜铬细胞瘤等引起的窦性心动过速效果良好。

66.【正确答案】 E

【答案解析】 本题主要考查甲状腺激素的生理学作用。缺少甲状腺素的呆小病患者智力愚笨。

67.【正确答案】 A

【答案解析】 传染病的预防：1. 管理传染源，2. 切断传播途径，3. 保护易感人群。

68.【正确答案】 B

【答案解析】 传染病常见的症状和体征：发热、发疹、毒血症、单核-巨噬细胞系统反应等。

69.【正确答案】 A

【答案解析】 HIV 进入机体，主要与辅助 T



淋巴细胞 CD4⁺分子结合而进入靶细胞进行复制,使细胞死亡。

70.【正确答案】 E

【答案解析】 乙型、丙型、丁型肝炎的传染源为急、慢性患者和病毒携带者。

71.【正确答案】 A

【答案解析】 流感外感风热型,方药用银翘散加减。

72.【正确答案】 C

【答案解析】 肾综合征皮肤充血表现为颜面、颈、胸背潮红(三红征)。

73.【正确答案】 B

【答案解析】 治疗伤寒湿热中阻型,方药用王氏连朴饮加减。

74.【正确答案】 C

【答案解析】 记忆的三个基本环节是识记、保持和遗忘、回忆和再认。回忆和再认:回忆是把以前经历过的事物在头脑中重新呈现并加以确认的心理过程。回忆常常以联想的形式出现,联想的种类有接近联想、类似联想、对比联想和因果联想。再认是当经验过的事物再次出现时能够识别确认的过程。

75.【正确答案】 B

【答案解析】 心理应激源可以分为四类,包括躯体性应激源、心理性应激源、社会性应激源、文化性应激源。

76.【正确答案】 B

【答案解析】 心身疾病又称心理生理疾患,

是一类在发病、发展、转归和防治等方面都与心理-社会因素密切相关的躯体疾病。临床典型的心身疾病包括消化性溃疡、神经性厌食、原发性高血压、冠心病、肥胖症、支气管哮喘、偏头痛、肿瘤。

77.【正确答案】 D

【答案解析】 老年人心理发展中常出现的问题有:(1)不适应退休生活;(2)主观健康评价差;(3)性生活问题;(4)对死亡的恐惧。选项 D 属于中年期的问题。

78.【正确答案】 E

【答案解析】 职业群体的心理健康主要是通过提高职业满意度、促进人际关系和谐、实现工作环境优化及劳动组织合理化来达到的。

79.【正确答案】 E

【答案解析】 《医疗事故处理条例》第三十三条规定:有下列情形之一的不属于医疗事故:

- (1)在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取紧急医学措施造成不良后果的;
- (2)在医疗活动中由于患者病情异常或者患者体质特殊而发生医疗意外的;
- (3)在现有医学科学技术条件下,发生无法预料或者不能防范的不良后果的;
- (4)无过错输血感染造成不良后果的;
- (5)因患方原因延误诊疗导致不良后果的;
- (6)因不可抗力造成不良后果的。

80.【正确答案】 B

【答案解析】 《处方管理办法》第五十条规定,处方由调剂处方药品的医疗机构妥善保存。普通处方、急诊处方、儿科处方保



存期限为1年，医疗用毒性药品、第二类精神药品处方保存期限为2年，麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年。

81.【正确答案】B

【答案解析】《医疗用毒性药品管理办法》第九条规定：医疗单位供应和调配毒性药品，凭医师签名的正式处方。每次处方剂量不得超过2日极量。

82.【正确答案】E

【答案解析】我国《刑法》规定了十余个与违反卫生法有关的罪名。

- (1)生产、销售假药、劣药罪；
- (2)生产、销售不符合卫生标准食品的犯罪；
- (3)生产、销售不符合卫生标准的医疗器械、医用卫生材料罪；
- (4)非法行医情节严重的犯罪；
- (5)违反《传染病防治法》的规定，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险罪；
- (6)非法采集、供应血液罪或者制作、供应血液制品罪；
- (7)违反国境卫生检疫罪；
- (8)违反规定造成病菌种、毒种扩散罪；
- (9)医疗事故罪。

另外，法律还规定了玩忽职守的犯罪、危害环境的犯罪等。

83.【正确答案】E

【答案解析】构成损害赔偿的民事责任，要同时具备下列四个条件：

- (1)损害的事实存在；
- (2)行为的违法性；
- (3)行为人有过错；
- (4)损害事实与行为人的过错有直接的因果

关系。

84.【正确答案】E

【答案解析】儒家的养生思想强调“天行健，君子以自强不息”。“仁者寿”、“智者寿”、“欲而不贪”。

85.【正确答案】A

【答案解析】药物治疗的道德要求：

- (1)对症用药，剂量适宜；
- (2)合理配伍；
- (3)节约费用；
- (4)严守法规。

86.【正确答案】E

【答案解析】选项E是属于医学研究伦理审查中人体试验利益冲突的预防的内容。

87.【正确答案】D

【答案解析】医德修养的含义：

- (1)医德认识的提高；
- (2)医德感情的丰富；
- (3)医德意志的形成；
- (4)医德行为和习惯的养成。

88.【正确答案】A

【答案解析】疗效标准：即指医疗行为是否有利于患者疾病的缓解和根除。

二、B型题

(89~90题共用备选答案)

89.【正确答案】B

【答案解析】血虚发热：时有低热，兼面白、头晕、舌淡脉细等症。

90.【正确答案】E



【答案解析】 小儿夏季热：小儿在夏季气候炎热时长期发热不已，兼见烦躁、口渴、无汗、多尿等症，至秋凉时不治自愈，是由于小儿气阴不足，不能适应夏令炎热气候所致。

(91~92 题共用备选答案)

91. **【正确答案】** D

【答案解析】 喘即气喘，指呼吸困难、急迫，张口抬肩，甚至鼻翼煽动，难以平卧。常由肺、心病变及白喉、急喉风等导致，而辨证还与脾、肾有关。喘有虚实之分。

92. **【正确答案】** E

【答案解析】 哮是指呼吸急促似喘，喉间有哮鸣音的症状。多因痰饮内伏，复感外邪所诱发，或因久居寒湿之地，或过食酸咸生冷所诱发。

(93~94 题共用备选答案)

93. **【正确答案】** A

【答案解析】 真热假寒证常有热深厥亦深的特点，故可称作热极肢厥证，古代亦有称阳盛格阴证者。

94. **【正确答案】** B

【答案解析】 真寒假热的实际是阳虚阴盛而阳气浮越，故又称虚阳浮越证，古代亦有称阴盛格阳证、戴阳证者。

(95~96 题共用备选答案)

95. **【正确答案】** D

【答案解析】 主、副试验均无凝集反应(配血完全相适合)，可输血。

96. **【正确答案】** C

【答案解析】 当主试验有凝集，其血绝对不可输用。

(97~98 题共用备选答案)

97. **【正确答案】** D

【答案解析】 弛张热：体温在 39℃ 以上，但波动幅度大，24 小时内体温差达 2℃ 以上，最低时仍高于正常水平。常见于败血症、风湿热、重症肺结核、化脓性炎症等。

98. **【正确答案】** E

【答案解析】 稽留热：体温持续在 39℃ ~ 40℃ 以上，达数日或数周，24 小时波动范围不超过 1℃。见于肺炎链球菌肺炎、伤寒等的高热期。

(99~100 题共用备选答案)

99. **【正确答案】** C

【答案解析】 心脏神经症的胸痛在体力活动后反而减轻。

100. **【正确答案】** D

【答案解析】 胸膜炎、自发性气胸的胸痛则可因深呼吸与咳嗽而加剧。



2022 年中西医内科主治医师《专业知识》 模拟试卷答案解析

一、A1 型题

1. 【正确答案】 A

【答案解析】慢性支气管炎早期肺部 X 线无特殊征象。反复发作引起支气管壁增厚，细支气管或肺泡间质炎症细胞浸润或纤维化，表现为肺纹理增粗、紊乱，呈网状或条索状、斑点状阴影。

2. 【正确答案】 B

【答案解析】慢性支气管炎常继发于病毒感染。常见病原体为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌和葡萄球菌等。

3. 【正确答案】 C

【答案解析】喘息型慢性支气管炎需与支气管哮喘鉴别。喘息型慢性支气管炎一般多见于中老年，咳嗽、咳痰症状较为突出，往往因咳嗽反复发作，迁延不愈而伴有喘息。支气管哮喘患者常有个人或家族过敏性病史，多数自幼得病，早期以哮喘症状为主，突发突止，应用解痉药症状可明显缓解，间歇期一般可无症状。支气管哮喘反复发作多年后并发慢性支气管炎，二者不易鉴别，应全面详细分析病史，以明确诊断。

4. 【正确答案】 E

【答案解析】慢性肺源性心脏病发病机制：1. 肺动脉高压的形成；2. 心脏病变和心力衰

竭；3. 其他重要器官的损害：缺氧和高碳酸血症除影响心脏外，还会导致其他重要器官如脑、肝、肾、胃肠及内分泌系统、血液系统等发生病理改变，引起多器官的功能损害；在心力衰竭（简称心衰）时的体循环静脉系统淤血同样会引起上述脏器的功能损害。

5. 【正确答案】 E

【答案解析】慢性肺源性心脏病并发症主要有肺性脑病、酸碱平衡失调及电解质紊乱、心律失常、休克、消化道出血等。

6. 【正确答案】 E

【答案解析】支气管哮喘发病的体征是有“三凹征”，肺部有广泛哮鸣音，呼吸音延长。

7. 【正确答案】 D

【答案解析】支气管哮喘急性发作期疾病严重程度为中度的临床表现：稍事活动会出现气短的症状，喜坐位，讲话方式为单词式说话，时有焦虑或烦躁，有出汗，呼吸频率增加，可有辅助呼吸肌活动及三凹征，有响亮、弥漫的哮鸣音，脉率为 100 ~ 120 次/min，最初支气管扩张剂治疗后 PEF 占预计值或个人最佳值%为 60% ~ 80%。

8. 【正确答案】 E



【答案解析】

表 1-6 根据哮喘病情控制分级制订治疗方案

治疗方案	第 1 级	第 2 级	第 3 级	第 4 级	第 5 级
哮喘教育/环境控制	哮喘教育、环境控制				
短效 β_2 受体激动剂	按需使用短效 β_2 受体激动剂				
控制性药物	不需使用	选用 1 种	选用 1 种	加用 1 种或以上	加用 1 种或 2 种
		低剂量 ICS	低剂量 ICS 加 LABA	中高剂量 ICS 加 LABA	最小剂量糖皮质激素
		白三烯调节剂	中高剂量 ICS	白三烯调节剂	抗 IgE 治疗
			低剂量 ICS 加白三烯调节剂	缓释茶碱	
			低剂量 ICS 加缓释茶碱		

9.【正确答案】 E

【答案解析】 支气管扩张症辅助检查：高分辨率 CT 较常规 CT 具有更高的空间和密度分辨率，能够显示肺内细微结构，有逐渐取代支气管碘油造影的趋势。

10.【正确答案】 E

【答案解析】 发生缺氧和二氧化碳潴留的主要机制有通气不足、弥散障碍、通气/血流比例失调及氧耗量增加。

11.【正确答案】 A

【答案解析】 当 PaCO_2 升高、pH 正常时，称为代偿性呼吸性酸中毒；若 PaCO_2 升高， $\text{pH} < 7.35$ ，则称为失代偿性呼吸性酸中毒。

12.【正确答案】 B

【答案解析】 急性呼吸窘迫综合征呼吸增快和窘迫。

13.【正确答案】 B

【答案解析】 肺炎主要表现为寒战、高热、咳嗽、咳痰、胸痛、呼吸困难等。

14.【正确答案】 E

【答案解析】 大环内酯类是治疗肺炎支原体感染的首选药物。

15.【正确答案】 A

【答案解析】 发热为肺结核最常见的全身性中毒症状，表现为长期低热，多见于午后。

16.【正确答案】 B

【答案解析】 肺癌按解剖学分类：①中央型肺癌：发生在段支气管至主支气管的癌肿称为中央型肺癌，约占 3/4，以鳞状上皮细胞癌和小细胞未分化癌较多见。②周围型肺癌：发生在段支气管以下的癌肿称为周围型肺癌，约占 1/4，以腺癌较多见。



17.【正确答案】 C

【答案解析】 II型呼吸衰竭的血气特点为： PaO_2 50mmHg。

18.【正确答案】 E

【答案解析】 II型呼衰的患者应给予持续低浓度(75mmHg时，即使无意识障碍也可酌情使用呼吸中枢兴奋剂。

19.【正确答案】 A

【答案解析】 慢性呼吸衰竭-肺肾气虚证证候：呼吸短浅难续，甚则张口抬肩，不能平卧，胸满气短，心悸，咳嗽，痰白如沫，咯吐不利，形寒汗出，舌淡或暗紫，苔白润，脉沉细无力或结代。
治法：补益肺肾，纳气平喘。
方药：补肺汤合参蛤散加减。

20.【正确答案】 B

【答案解析】 慢性呼吸衰竭治疗：心力衰竭和水肿者，可酌情使用利尿剂和强心剂，以及营养支持疗法。

21.【正确答案】 A

【答案解析】 发绀是缺氧最典型的临床表现。

22.【正确答案】 B

【答案解析】 非典型病原体所致肺炎有军团菌、支原体和衣原体。

23.【正确答案】 A

【答案解析】 非感染性肺炎有放射性肺炎和吸入性肺炎。

24.【正确答案】 C

【答案解析】 急性左心衰突发的严重呼吸困难、端坐呼吸、喘息不止、烦躁不安并有恐惧感，呼吸频率可达30~50次/min；频繁咳嗽并咳出大量粉红色泡沫样血痰；极重者可因脑缺氧而神志模糊。

25.【正确答案】 B

【答案解析】 除原有心脏病体征外，一般均心脏扩大、心率加快，并有肺动脉瓣区第二心音(P_2)亢进、心尖区舒张期奔马律和(或)收缩期杂音、交替脉等。

26.【正确答案】 D

【答案解析】 逸搏为被动性异位心律，其他选项均为主动性异位心律。

27.【正确答案】 A

【答案解析】 室性心动过速特点：3个或以上室性期前收缩连发，P波与QRS无固定关系，QRS时限大于0.12s，偶可发生心室夺获或心室融合波，心前区导联QRS波群方向可呈同向性。

28.【正确答案】 C

【答案解析】 三度房室传导阻滞心室率较心房率慢，且P波不能下传可发生于心动周期的任何时段，P与QRS波群无固定关系；干扰性房室脱节心室率较心房率略快，同时P波出现在紧靠QRS波群前后，房室脱节可出现心室夺获。

29.【正确答案】 E

【答案解析】 导致心脏骤停心律失常，心室颤动最多见。

30.【正确答案】 E



【答案解析】二度 I 型室传导阻滞的心电图特点：P-R 间期逐渐延长；与此同时，R-R 间隔相应地逐渐缩短，直到 P 波后无 QRS 波群出现，如此周而复始。

31. **【正确答案】** C

【答案解析】噻嗪类利尿剂可引起低血钾，需定期监测血钾。痛风者禁用，对高尿酸血症及肾功能不全者慎用。

32. **【正确答案】** B

【答案解析】心肌梗死患者实验室检查会有白细胞计数增高、红细胞沉降率增快，心肌坏死标志物(肌红蛋白、肌钙蛋白 I 或 T、CK-MB 等)增高等表现。

33. **【正确答案】** C

【答案解析】心肌梗死患者发生心律失常多在起病 1~2 天，而以 24 小时内最多见，是早期死亡的主要原因。

34. **【正确答案】** A

【答案解析】慢性主动脉瓣关闭不全的最常见病因是风湿性心脏病(简称风心病)，约占 2/3。

35. **【正确答案】** B

【答案解析】心脏瓣膜病-气阴两虚证
证候：心悸气短，倦怠乏力，头晕目眩，面色无华，动则汗出，自汗或盗汗，夜寐不宁，口干，舌质红或淡红，苔薄白，脉细数无力或促、结代。
治法：益气养阴，宁心复脉。
方药：炙甘草汤加味。

36. **【正确答案】** A

【答案解析】感染性心内膜炎的主要诊断标准是 2 次血培养阳性。

37. **【正确答案】** B

【答案解析】扩张型心肌病的主要体征为心脏扩大。

38. **【正确答案】** A

【答案解析】原发性心肌病-邪毒犯心证
证候：身热微恶寒，咽痛身痛，心悸，胸闷或痛，气短乏力，心烦少寐，舌尖红苔薄黄，脉浮数或促、结代。
治法：清热解毒，宁心安神。
方药：银翘散加减。

39. **【正确答案】** A

【答案解析】病毒性心肌炎急性期应注意休息，酌情用抗病毒治疗，必要时使用抗生素。

40. **【正确答案】** D

【答案解析】劳力性呼吸困难是左房室瓣狭窄最常见的早期症状，由左心功能不全引发。

41. **【正确答案】** D

【答案解析】感染性心内膜炎-阴虚火旺证
证候：低热不退，午后或夜间发热，心烦心悸，失眠多梦，胸闷气短，自汗盗汗，手足心热，两额发红，口燥咽干，舌红少津，苔少或光剥，脉细数。
治法：滋阴清热，凉血活血。
方药：青蒿鳖甲汤加减。

42. **【正确答案】** A

【答案解析】肥厚型心肌病常有明显家族



史，是常染色体显性遗传疾病。

43.【正确答案】 B

【答案解析】 自身免疫性胃炎以富含壁细胞的胃体粘膜萎缩为主，可伴有其他自身免疫病。

44.【正确答案】 D

【答案解析】 萎缩胃炎伴重度不典型增生为异常增生，属于癌前病变。肠上皮化生与幽门腺化生是慢性炎症导致胃黏膜不完全再生。

45.【正确答案】 C

【答案解析】 ^{13}C 或 ^{14}C 尿素呼气试验敏感且特异性高，无需胃镜检查，为根除治疗后复查的首选方法。

46.【正确答案】 D

【答案解析】 胃溃疡肝胃不和证应首选柴胡疏肝散合五磨饮子加减。

47.【正确答案】 A

【答案解析】 上消化道出血脾不统血证首选方剂是归脾汤。

48.【正确答案】 B

【答案解析】 糖尿病的基本病机为阴津亏损、燥热偏胜；以阴虚为本，燥热为标，两者互为因果，燥热愈甚则阴愈虚，阴愈虚则燥热愈甚，阴虚燥热，可变证百出。

49.【正确答案】 C

【答案解析】 甲状腺功能亢进症是甲状腺激素合成、分泌过多而引起的甲状腺毒症，包括弥漫性毒性甲状腺肿(Graves病)、多

结节性毒性甲状腺肿、甲状腺自主高功能腺瘤、碘致甲状腺功能亢进症、滤泡状甲状腺癌。以 Graves 病最为常见。

50.【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠期甲亢尽可能地使用小剂量的 ATD 实现控制甲亢的目的。首选丙基硫氧嘧啶(PTU)，因该药不易通过胎盘。

51.【正确答案】 A

【答案解析】 胃十二指肠溃疡是上消化道大出血最常见的病因。

52.【正确答案】 C

【答案解析】 轻型溃疡性结肠炎的首选药物是柳氮磺胺吡啶。

53.【正确答案】 A

【答案解析】 高甘油三酯血症治疗可应用贝丁酸类，如非诺贝特，苯扎贝特，吉非贝齐。

54.【正确答案】 E

【答案解析】 早期胃癌的特点是仅累及黏膜及黏膜下层。

55.【正确答案】 C

【答案解析】 正常成年男女体液总量分别占体重的 60% 及 55% 左右。

56.【正确答案】 E

【答案解析】 人体 Na^+ 总量约占体重的 0.15%，即 45~50mmol/kg。

57.【正确答案】 A

【答案解析】 普查原发性肝癌最简单有效的



方法是 AFP。

58.【正确答案】 D

【答案解析】 首选滋阴水清肝饮合鳖甲煎丸。

59.【正确答案】 A

【答案解析】 原发性肝癌合并肝硬化者占 50%~90%。肝细胞恶变可能在肝细胞再生过程中发生，即肝细胞损害引起再生或不典型增生。

60.【正确答案】 E

【答案解析】 肝活组织检查尤其适用于代偿期肝硬化的早期诊断。

61.【正确答案】 D

【答案解析】 血浆渗透压正常范围为 280~310mOsm/(kg·H₂O)，一般低于 280mOsm/(kg·H₂O)或高于 310mOsm/(kg·H₂O)，分别称为低渗或高渗血症。

62.【正确答案】 D

【答案解析】 血淀粉酶起病后 6~12 小时开始升高，血清淀粉酶超过正常值 3 倍可确诊。淀粉酶的高低不一定反映病情轻重，出血坏死型胰腺炎淀粉酶值可正常或低于正常。

63.【正确答案】 A

【答案解析】 肝郁气滞证治则是疏肝利胆，行气止痛。

64.【正确答案】 B

【答案解析】 主要病因是胆道系统疾病。

65.【正确答案】 A

【答案解析】 等渗性失水的病因主要有①胃肠道丢失：呕吐、腹泻、胃肠梗阻等。②经皮肤丢失：如大面积烧伤的早期等渗出性皮肤病变。③组织间液贮积：胸腹腔炎性渗出液的引流，大量放胸、腹水等。

66.【正确答案】 D

【答案解析】 水过多和水中毒是稀释性低钠血症的病理表现。

67.【正确答案】 C

【答案解析】 低钠血症指血清钠 < 135mmol/L，仅反映在血浆中的浓度降低，并不一定表示体内总钠量的丢失，总体钠可正常或者稍有增加。

68.【正确答案】 C

【答案解析】 转移性低钠血症表现为总体钠正常，细胞内液钠增多，血清钠减少。

69.【正确答案】 C

【答案解析】 潴钠性高钠血症以神经精神症状为主要临床表现，症状的轻重与血钠升高的速度和程度有关。

70.【正确答案】 B

【答案解析】 低钾血症是指血清钾 < 3.5mmol/L。

71.【正确答案】 A

【答案解析】 代谢性酸中毒是由细胞外液的 H⁺ 相对过多，或者是 HCO₃⁻ 丧失过多而引起的。

72.【正确答案】 E

【答案解析】 酸碱度正常值为 7.35~7.45，



平均 7.40。pH 增高 (pH>7.45) 提示碱血症；pH 降低 (pH<7.35) 则为酸血症；pH 正常只说明血液中的酸度在正常范围内，不能排除酸碱的平衡失调的可能。

73.【正确答案】 C

【答案解析】秋水仙碱为治疗痛风急性发作的特效药，可抑制炎性细胞趋化，对控制炎症、疼痛有特效。

74.【正确答案】 E

【答案解析】短暂性脑缺血发作病位在经络，其主要病机是气虚血瘀，气虚为本，血瘀为标。血瘀是 TIA 发生发展的核心，更有痰浊与瘀血互结而致病者，肝阳亦有夹痰、夹瘀而上扰者，凡此不可一概而论，临床宜细审之。

75.【正确答案】 A

【答案解析】TIA 的临床表现最常见的是运动障碍，对只出现肢体一部分或一侧面部感觉障碍、视觉丧失或失语发作病例，诊断 TIA 必须慎重；有些症状如麻木、头晕很常见，但不一定表明是 TIA。

76.【正确答案】 C

【答案解析】脑栓塞的病因心源性最常见，占脑栓塞的 60%~75%，最多见的直接原因是慢性心房纤颤，造成心房附壁血栓脱落，约占心源性栓子的半数以上，此栓子引起的脑栓塞常易复发。

77.【正确答案】 B

【答案解析】腔隙性梗死的病理表现是梗死灶呈不规则的圆形、卵圆形，直径多在 3~4mm，病灶多分布在基底节区，大标本可

见腔隙为含液体的腔洞样小软化灶，病变血管可见透明变性。

78.【正确答案】 D

【答案解析】腔隙性梗死的病灶主要分布于基底节区、放射冠、丘脑和脑干，以基底节区发病率最高。

79.【正确答案】 D

【答案解析】高血压合并小动脉硬化，是脑出血最常见的病因。

80.【正确答案】 C

【答案解析】CT 检查是诊断脑出血安全有效的方法，为临床上脑出血疑似病例的首选检查。

81.【正确答案】 E

【答案解析】癫痫的病因十分复杂，大多数患者是由脑内外多种疾病所引起，仍有许多尚未清楚。1) 遗传；2) 先天性疾病：①皮质发育障碍如灰质异位、巨脑畸形等；②脑穿通畸形；③脑积水；④脑性瘫痪；⑤脑面血管瘤病等；⑥结节性硬化症常以癫痫为主要临床症状。3) 遗传代谢性疾病：如苯丙酮尿酸症、神经节苷脂沉积症、线粒体脑病等。4) 中枢神经系统感染：包括细菌性、病毒性、寄生虫性颅内感染。5) 脑血管疾病：如出血性脑卒中、脑栓塞等。6) 其他颅脑疾病：颅脑外伤、脑脱髓鞘疾病、脑肿瘤及围生期损伤。7) 全身性疾病：心血管疾病(高血压脑病等)、急慢性肾衰竭、肺性脑病、代谢及内分泌障碍(胰岛细胞瘤致低血糖等)、电解质紊乱(低血钙等)、缺氧(一氧化碳中毒等)及中毒等。



82.【正确答案】 E

【答案解析】 阿尔茨海默病的心肝火旺证治宜清心平肝，醒神开窍；方药为天麻钩藤饮合安宫牛黄丸。

83.【正确答案】 A

【答案解析】 血管炎可发生在类风湿关节炎患者关节外的任何组织。

84.【正确答案】 B

【答案解析】 喷洒农药时要穿质厚的长袖上衣及长裤，扎紧袖口、裤管，戴口罩、手套。如衣服被污染要及时更换并清洗皮肤。凡接触农药的器物均需用清水反复冲洗。盛过农药的容器绝不能再盛食物。接触农药过程中出现头晕、胸闷、流涎、恶心、呕吐等有机磷中毒先兆时应立即就医。

85.【正确答案】 B

【答案解析】 血尿常为起病的首发症状和患者的就诊原因，几乎所有的患者都有血尿。

86.【正确答案】 C

【答案解析】 中医病机是湿热蕴结下焦，肾与膀胱气化不利。

87.【正确答案】 C

【答案解析】 再生障碍性贫血是一种骨髓造血功能衰竭症，主要表现为骨髓造血功能低下、全血细胞减少和贫血、出血、感染症状。临床上主要根据骨髓穿刺及骨髓活检查用于确诊再障。

88.【正确答案】 E

【答案解析】 化疗药物不易通过血-脑屏障，隐藏在中枢神经系统的白血病细胞不能被

有效杀伤。

89.【正确答案】 C

【答案解析】 热毒壅盛证的首选治疗方剂是清瘟败毒饮。

90.【正确答案】 C

【答案解析】 是由于血小板不能维持血管内皮的完整性而导致的。

二、B型题

(91~92题共用备选答案)

91.【正确答案】 C

【答案解析】 血液透析用于清除血液中分子量较小和非脂溶性的毒物(如苯巴比妥、水杨酸类、甲醇、茶碱、乙二醇和锂等)。

92.【正确答案】 B

【答案解析】 血液净化一般用于血液中毒物浓度明显增高、中毒严重、昏迷时间长、有并发症和经积极支持疗法病情日趋恶化者。

(93~94题共用备选答案)

93.【正确答案】 B

【答案解析】 出血见于阿司匹林、氢氯噻嗪及抗肿瘤药物等中毒。

94.【正确答案】 E

【答案解析】 血液凝固障碍可由水杨酸类、肝素或双香豆素过量、敌鼠和蛇毒咬伤中毒等引起。

(95~96题共用备选答案)

95.【正确答案】 D

【答案解析】 有机磷杀虫药急性中度中毒：



M 样症状加重，出现肌纤维颤动等 N 样症状，ChE 活力为 30%~50%。

96.【正确答案】 E

【答案解析】 有机磷杀虫药急性重度中毒：除有 M、N 样症状外，具有肺水肿、呼吸衰竭、脑水肿、昏迷四项中任一表现，全血或红细胞 ChE 活力<30%。

(97~98 题共用备选答案)

97.【正确答案】 B

【答案解析】 急性一氧化碳中毒—痰浊阻滞证

证候：呆傻少语或言语不清，反应迟钝，行走不稳，面无表情，两目直视，健忘失眠，恐惧妄想，甚至谵语昏迷，舌淡红苔白，脉沉滑或沉伏。

治法：健脾祛湿，化痰开窍。

方药：半夏白术天麻汤加减。

98.【正确答案】 D

【答案解析】 急性一氧化碳中毒—肝风痰浊证

证候：头痛眩晕，恶心呕吐，四肢乏力，视物不清，或口唇樱桃红色，甚则昏迷抽搐，两目直视，白睛色青，舌质淡，苔白腻，脉弦滑。

治法：芳香化浊，豁痰开窍，平肝息风。

方药：涤痰汤加减。

(99~100 题共用备选答案)

99.【正确答案】 A

【答案解析】 有钠水潴留容量依赖性高血压患者可选用噻嗪类利尿药。

100.【正确答案】 B

【答案解析】 对肾素依赖性高血压应首选血管紧张素转换酶抑制剂。



2022 年中西医内科主治医师《专业实践能力》 模拟试卷答案解析

一、A2 型题

1. 【正确答案】 B

【答案解析】 肾病综合征为一组常见于肾小球疾病的临床综合征。临床特征为：①大量蛋白尿($\geq 3.5\text{g}/24\text{h}$)；②低白蛋白血症($\leq 30\text{g/L}$)；③水肿；④高脂血症。

2. 【正确答案】 B

【答案解析】 慢性心力衰竭是由于任何原因的初始心肌损伤(如心肌梗死、心肌病、血流动力学负荷过重、炎症等)，引起心肌结构和功能的变化，最后导致心室泵血和/或充盈功能低下的临床综合征。主要表现是呼吸困难和疲乏引起的活动耐力降低，和/或液体潴留导致的肺淤血与外周性水肿。患者属慢性心力衰竭气阴亏虚证，证候：心悸，气短，倦怠乏力，面色苍白，动辄汗出，自汗或盗汗，头晕，面颧暗红，夜寐不安，口干，舌质红或淡红，苔薄白，脉细数无力或结或代。

3. 【正确答案】 A

【答案解析】 发生在妊娠初期的甲亢，经 PTU 治疗控制甲亢症状后，可选择在妊娠 4~6 个月时做甲状腺次全切除。

4. 【正确答案】 B

【答案解析】 溃疡性结肠炎之脾胃虚弱证
证候：大便时溏时泻，迁延反复，粪便带

有黏液或脓血，食少，腹胀，肢体倦怠，神疲懒言，舌质淡胖或边有齿痕，苔薄白，脉细弱或濡缓。

5. 【正确答案】 D

【答案解析】 肺癌之气阴两虚证

证候：咳嗽无力，有痰或无痰，痰中带血，神疲乏力，时有心悸，汗出气短，口干，发热或午后潮热，手足心热，纳呆腹胀，便干或稀，舌质红苔薄，或舌质胖嫩有齿痕，脉细数无力。

治法：益气养阴，化痰散结。

方药：沙参麦冬汤加减。

6. 【正确答案】 C

【答案解析】 缺铁性贫血辅助检查：血象：平均红细胞体积(MCV) $< 80\text{fl}$ ；平均红细胞血红蛋白量(MCH) $< 27\text{pg}$
铁代谢：血清铁 $< 8.95\mu\text{mol/L}$ ，总铁结合力升高($> 64.44\mu\text{mol/L}$)；转铁蛋白饱和度降低($< 15\%$)

7. 【正确答案】 D

【答案解析】 系统性红斑狼疮之瘀热痹阻证
证候：手足瘀点累累，斑疹斑块暗红，两手白紫相继，两腿青斑如网，脱发，口糜，口疮，鼻衄，肌衄，关节肿痛，月经愆期，小便短赤，有蛋白尿、血尿，低热或自觉烘热，烦躁多怒，苔薄舌红，舌光红刺或



边有瘀斑，脉细弦或涩数。

治法：清热凉血，活血散瘀。

方药：犀角地黄汤加减。

8.【正确答案】 C

【答案解析】慢性肺源性心脏病之肺肾气虚证

证候：呼吸浅短难续，声低气怯，甚则张口抬肩，倚息不能平卧，咳嗽，痰白清稀如沫，胸闷，心慌形寒，汗出，舌淡或暗紫，脉沉细微无力，或有结代。

治法：补肺纳肾，降气平喘。

方药：补肺汤加减。

9.【正确答案】 C

【答案解析】脑出血之痰热腑实，风痰上扰证

证候：半身不遂，舌强语謇或不语，口眼喎斜，偏身麻木，口黏痰多，腹胀便秘，头晕目眩，舌红苔黄腻或黄厚燥，脉弦滑。

治法：通腑泄热，化痰理气。

方药：星萎承气汤加减。

10.【正确答案】 A

【答案解析】类风湿关节炎之痰瘀互结，经脉痹阻证

证候：关节肿痛且变形，屈伸受限，或肌肉刺痛，痛处不移，皮肤失去弹性，按之稍硬，肌肤紫暗，面色黧黑，或有皮下结节，肢体顽麻，舌质暗红或有瘀点、瘀斑，苔薄白，脉弦涩。

治法：活血化瘀，祛痰通络。

方药：身痛逐瘀汤合指迷茯苓丸加减。伴见血管炎、脉管炎者，合用四妙勇安汤以清热解毒，活血养阴；痛剧者，加乳香、延胡索、地鳖虫等。

11.【正确答案】 A

【答案解析】帕金森病之气血两虚证

证候：肢体震颤日久，震颤程度严重，颈项僵直，或肢体拘痉，活动减少，行走不稳，气短乏力，头晕眼花，自汗，口角流涎，舌胖，有齿痕，舌质暗淡，苔薄白或白腻，脉细无力。

治法：益气养血，息风通络。

方药：八珍汤合天麻钩藤饮加减。

12.【正确答案】 D

【答案解析】缺铁性贫血病因：1. 损失过多；2. 摄入不足；3. 吸收不良：游离铁主要在十二指肠及小肠上段黏膜吸收，吸收不良可导致缺铁性贫血。如胃大部切除术及胃空肠吻合术后，由于食物不经过十二指肠，影响了正常铁的吸收；萎缩性胃炎因长期缺乏胃酸，导致铁的吸收不良；长期腹泻不但影响铁吸收，且随着大量肠上皮细胞脱落而失铁。

13.【正确答案】 D

【答案解析】根据患者外阴瘙痒，体重偏胖，且实验室检查血糖 13mmol/L，尿糖(++)，诊断患者为2型糖尿病。二甲双胍适用于无明显消瘦的2型糖尿病患者。

14.【正确答案】 C

【答案解析】脑血栓形成之痰湿壅闭心神证

证候：突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开；痰涎壅盛，静而不烦，四肢欠温；舌淡，苔白滑而腻，脉沉。

治法：辛温开窍，豁痰息风。

方药：急用苏合香丸灌服，继用涤痰汤加减。



15.【正确答案】D

【答案解析】急性呼吸窘迫综合征之热毒袭肺证

证候：喘促气急或张口抬肩、不能平卧，高热烦渴，面唇发绀，舌红绛，苔薄白或薄黄，脉洪数。

16.【正确答案】C

【答案解析】病毒性心肌炎之心阴虚损证

证候：心悸胸闷，口干心烦，失眠多梦，或有低热盗汗，手足心热，舌红，无苔或少苔，脉细数或促、结代。

治法：滋阴清热，养心安神。

方药：天王补心丹加减。

17.【正确答案】C

【答案解析】短暂性脑缺血发作(transient-ischemic attack, TIA)是指历时短暂且经常反复发作的脑局部供血障碍，以相应供血区局限性和短暂性神经功能缺失为特点的一种脑血管病。每次发作历时短暂，持续数分钟至1小时，在24小时内即完全恢复。颈内动脉系统TIA，持续时间较短，易进展为完全性卒中。常见症状为发作性单肢无力或轻偏瘫及对侧面部轻瘫，当主侧半球受累时可见失语症，也可有失读、失写症等。

18.【正确答案】D

【答案解析】腔隙性梗死的诊断以下标准可资参考：①中年以后发病，有长期高血压病史；②临床表现符合腔隙综合征之一；③CT或MRI影像学检查可证实存在与神经功能缺失一致的病灶；④EEG、腰椎穿刺或DSA等均无肯定的阳性发现；⑤预后良好，多数患者可在短期内恢复。

19.【正确答案】D

【答案解析】考虑患者出现肺上沟癌压迫颈部交感神经引起的同侧霍纳(Homer)综合征(眼睑下垂、眼球内陷、瞳孔缩小、额部少汗)。故诊断为支气管肺癌。

支气管肺癌之气滞血瘀证

证候：咳嗽不畅，咳痰不爽，胸胁胀痛或刺痛，面青唇暗，大便秘结，舌质暗紫或有瘀斑，脉弦或涩。

治法：活血散瘀，行气化滞。

方药：血府逐瘀汤加减。

20.【正确答案】A

【答案解析】心脏骤停之元阳暴脱证

证候：神志恍惚，或昏聩不语，面色苍白，四肢厥冷，舌质淡润，脉微细欲绝。

治法：回阳固脱。

方药：独参汤或四味回阳饮加减。

21.【正确答案】C

【答案解析】急性胰腺炎之肝郁气滞证

证候：突然中上腹痛，痛引两胁，或向右肩背部放射，恶心呕吐，口干苦，大便秘结，舌淡红，苔薄白，脉弦细或紧。

治法：疏肝利胆，行气止痛。

方药：小柴胡汤加减。

22.【正确答案】C

【答案解析】该患者为甲亢，甲亢时甲状腺摄¹³¹I率测定正常值：3小时为5%~25%，24小时为20%~45%，高峰在24小时出现。甲亢时甲状腺摄¹³¹I率增高，3小时大于25%，24小时大于45%，且高峰前移。使用硫脲嘧啶类药物是目前治疗甲亢采取的主要方法，他巴唑作用机理主要为抑制甲状腺激素的合成。结合患者的情况，治疗



首选他巴唑。

23.【正确答案】 C

【答案解析】 体重为 60kg 的成人，轻度失水（失水量占体重的 2%~3%）需补液 1200ml；中度失水（3%~6%）需补液 1800~3600ml；重度失水需补 3600ml 以上。根据题干可知，该患者为中度失水，所以 C 选项为最佳答案。

24.【正确答案】 C

【答案解析】 结合患者的关节症状以及实验室检查血沉升高，类风湿因子阳性，考虑该患者为类风湿关节炎。

25.【正确答案】 D

【答案解析】 类风湿性关节炎痰瘀互结，经脉痹阻证

证候：关节肿痛且变形，屈伸受限，或肌肉刺痛，痛处不移，皮肤失去弹性，按之稍硬，肌肤紫暗，面色黧黑，或有皮下结节，肢体顽麻，舌质暗红或有瘀点、瘀斑，苔薄白，脉弦涩。

治法：活血化瘀，祛痰通络。

方药：身痛逐瘀汤合指迷茯苓丸加减。

26.【正确答案】 A

【答案解析】 系统性红斑狼疮气营热盛证

证候：高热，满面红赤，皮肤红斑鲜红，咽干，口渴喜冷饮，尿赤而少，关节疼痛，舌红绛，苔黄，脉滑数或洪数。

治法：清热解毒，凉血化斑。

方药：清瘟败毒饮加减。

27.【正确答案】 B

【答案解析】 脾肾阳虚证

证候：全身浮肿，面色苍白，畏寒肢冷，腰脊冷痛，神疲，纳少，便溏，遗精，阳痿，早泄，或月经失调，舌质嫩淡胖，边有齿痕，脉沉细或沉迟无力。

治法：温补脾肾。

方药：附子理中丸或济生肾气丸加减。

28.【正确答案】 C

【答案解析】 尿路感染脾肾亏虚，湿热屡犯证

证候：小便淋漓不已，时作时止，每于劳累后发作或加重，尿热，或有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。

治法：健脾补肾。

方药：无比山药丸加减。

29.【正确答案】 C

【答案解析】 肾病综合征临床特征为：①大量蛋白尿（ $\geq 3.5\text{g}/24\text{h}$ ）；②低白蛋白血症（ $\leq 30\text{g}/\text{L}$ ）；③水肿；④高脂血症。结合题干给出的信息，最可能诊断为肾病综合征。

30.【正确答案】 B

【答案解析】 白血病：临床表现：贫血、发热及出血。骨髓象：典型表现为有核细胞增生明显活跃或极度活跃，主要是白血病性原始细胞，原始细胞 $> 30\%$ ，甚至超过 90%。

31.【正确答案】 B

【答案解析】 结合题干服用氯霉素的诱因，以及题干中的症状诊断该患者为药物性再障。



32.【正确答案】A

【答案解析】胃镜结合黏膜活检是诊断胃癌最可靠的手段。

凡有下列情况者，应高度警惕胃癌，并及时进行胃肠钡餐X线检查、胃镜和活组织病理检查，以明确诊断。

- (1)40岁以后开始出现中上腹不适或疼痛，无明显节律性并伴明显食欲不振和消瘦者。
- (2)胃溃疡患者，经严格内科治疗而症状仍无好转者。
- (3)慢性萎缩性胃炎伴有肠上皮化生及轻度不典型增生，经内科治疗无效者。
- (4)X线检查显示胃息肉>2cm者。
- (5)中年以上患者，出现不明原因贫血、消瘦和粪便隐血持续阳性者。
- (6)胃大部切除术后10年以上者。

33.【正确答案】B

【答案解析】DU空腹痛和/或午夜痛，腹痛多于进食或服用抗酸药后缓解，DU多发生于十二指肠球部。

34.【正确答案】A

【答案解析】该患者为消化性溃疡的脾胃虚寒证。

脾胃虚寒证

证候：胃痛隐隐，喜温喜按；畏寒肢冷，泛吐清水，腹胀便溏，舌淡胖边有齿痕，苔白，脉迟缓。

治法：温中散寒，健脾和胃。

方药：黄芪建中汤加減。

35.【正确答案】D

【答案解析】结合患者的症状：血腹、休克，考虑为肝癌破裂。

36.【正确答案】C

【答案解析】慢性肾衰竭在CRF的代偿期和失代偿早期，患者可以无任何症状，或仅有乏力、腰酸、夜尿增多等轻度不适；少数患者可有食欲减退、代谢性酸中毒及轻度贫血。结合题干给的信息，首先考虑诊断为慢性肾衰。

37.【正确答案】B

【答案解析】嗜铬细胞瘤：可出现阵发性或持续性血压升高，阵发性血压升高时还可伴心动过速、出汗、头痛、面色苍白等症状，历时数分钟或数天，一般降压药无效，发作间隙血压正常。血压升高时测血或尿中儿茶酚胺及其代谢产物香草基杏仁酸(VMA)有助于诊断。

38.【正确答案】D

【答案解析】肝硬化腹腔积液为漏出液，合并自发性腹膜炎为渗出液，以中性粒细胞增多为主；结核性腹膜炎为渗出液，腺苷脱氨酶(ADA)增高；肿瘤性腹腔积液比重介于渗出液和漏出液之间，腹腔积液LDH/血液LDH>1，可找到肿瘤细胞。

39.【正确答案】E

【答案解析】肝性脑病是肝硬化最严重的并发症，亦是最常见的死亡原因。主要临床表现为人格行为失常、意识障碍、昏迷。

40.【正确答案】B

【答案解析】慢性胃炎-胃阴不足证

证候：胃脘隐隐作痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。

治法：养阴益胃，和中止痛。

方药：益胃汤加減。



41.【正确答案】A

【答案解析】结合病史以及现症考虑该患者为胃溃疡恶性变。因为患者胃溃疡病史比较长，并且目前的检查发现胃窦部位有一个0.4cm×0.3cm 龛影，所以考虑有恶变的情况。

42.【正确答案】A

【答案解析】病毒性心肌炎-热毒侵心证
证候：发热微恶寒，头身疼痛，鼻塞流涕，咽痛口渴，口干口苦，小便黄赤，心悸气短，胸闷或隐痛，舌红苔薄黄，脉浮数或结、代。

治法：清热解毒，宁心安神。

方药：银翘散加减。

43.【正确答案】B

【答案解析】房性早搏①提早出现的P'波，形态与窦性P波不同；②P'-R>0.12秒；③QRS形态正常，亦可增宽(室内差异性传导)或未下传；④代偿间歇不完全。

44.【正确答案】B

【答案解析】含服硝酸甘油在1~2分钟后开始起作用，而题干“含硝酸甘油1~2秒疼痛即消失”，显然不是硝酸甘油的作用，而题干患者“为刺痛，做轻微体力活动可缓解”，故考虑为心脏神经症。

45.【正确答案】C

【答案解析】

心脏瓣膜病-心肾阳虚证

证候：心悸，喘息不能平卧，颜面及肢体浮肿，或伴胸水、腹水，脘痞腹胀，形寒肢冷，大便溏泻，小便短少，舌体胖大，质淡，苔薄白，脉沉细无力或结代。

治法：温补心肾，化气行水。

方药：参附汤合五苓散加减。

46.【正确答案】D

【答案解析】原发性醛固酮增多症：女性多见。以长期高血压伴顽固性低血钾为特征，可有多饮、多尿、肌无力、周期性麻痹等。实验室检查有低血钾、高血钠、血浆肾素活性降低，血尿醛固酮增多。安体舒通试验阳性具有诊断价值。

47.【正确答案】A

【答案解析】肺炎正虚邪恋证

证候：干咳少痰，咳嗽声低，气短神疲，身热，手足心热，自汗或盗汗，心胸烦闷，口渴欲饮，或虚烦不眠，舌红，苔薄黄，脉细数。

治法：益气养阴，润肺化痰。

方药：竹叶石膏汤加减。

48.【正确答案】C

【答案解析】克雷伯杆菌肺炎常选二、三代头孢菌素类与氨基糖苷类联合用药，如头孢噻肟钠或头孢他啶联合妥布霉素或阿米卡星。但要注意耳、肾毒性。

49.【正确答案】B

【答案解析】I型呼吸衰竭的血气特点为PaO₂<60mmHg，PaCO₂≤50mmHg。II型呼吸衰竭的血气特点为：PaO₂<60mmHg，PaCO₂>50mmHg。

慢性呼吸衰竭-痰蒙神窍证

证候：呼吸急促，伴痰鸣，神志恍惚，或谵语，或烦躁不安，或嗜睡，甚则抽搐、昏迷，面紫绀，舌暗紫，苔白腻，脉滑数。根据题干，属于II型呼吸衰竭痰蒙神窍证。



50.【正确答案】D

【答案解析】慢性肺源性心脏病肺、心功能失代偿期(急性发作期)

(1)呼吸衰竭

1)症状:呼吸困难加重,夜间为甚,常有头痛、失眠、食欲下降,但白天嗜睡,甚至出现表情淡漠、神志恍惚、谵妄等肺性脑病的表现。

2)体征:明显发绀,球结膜充血、水肿,严重时可有视网膜血管扩张、视乳头水肿等颅内压升高的表现。腱反射减弱或消失,出现病理反射;因高碳酸血症出现周围血管扩张的表现,如皮肤潮红、多汗。

(2)右心衰竭

1)症状:心悸、食欲不振、腹胀、恶心等。

2)体征:周围性发绀,颈静脉怒张,心率增快,可出现心律失常,可闻及三尖瓣区舒张期杂音。肝大且有压痛,肝-颈静脉反流征阳性,下肢水肿,重者可有腹水。少数患者可出现肺水肿及全心衰竭的体征。

51.【正确答案】E

【答案解析】根据患者的临床症状可以判断属于病毒性心肌炎的阴阳两虚证,所以本题选择E项。

阴阳两虚证

证候:心悸气短,胸闷或痛,面色晦暗,口唇发绀,肢冷畏寒,甚则喘促不能平卧,咳嗽,咳吐涎痰,夜难入寐,浮肿,大便稀溏,舌淡红,苔白,脉沉细无力或促、结、代。

治法:益气温阳,滋阴通脉。

方药:参附养荣汤加味。

52.【正确答案】B

【答案解析】素有小便不利,现尿少尿闭,

舌苔黄腻,脉滑数,故为慢性肾衰竭的湿热证,应选黄连温胆汤。

53.【正确答案】D

【答案解析】HGB85g/L, RBC 2.8×10^{12} /L, 急查血肌酐 $345 \mu\text{mol/L}$, BUN 16.7mmol/L , 血钾 6.7mmol/L ,符合血液透析指征,所以应采取血液透析。

54.【正确答案】D

【答案解析】肾衰竭期,血肌酐显著升高(约为 $451 \sim 707 \mu\text{mol/L}$),复查肾功能血肌酐 $648 \mu\text{mol/L}$,所以选D。

55.【正确答案】D

【答案解析】支气管肺癌,症见:刺激性咳嗽,偶或痰中带血,甚则咯血不止,心烦,少寐,手足心热,盗汗,口渴,大便秘结,舌质红,苔薄黄,脉细数。辨证为阴虚毒热,治法:养阴清热,解毒散结。方药:沙参麦冬汤合五味消毒饮。

56.【正确答案】D

【答案解析】患者有肺上沟癌压迫颈部交感神经所致同侧霍纳(Horner)综合征(眼睑下垂、眼球内陷、瞳孔缩小、额部少汗等)的表现,且结合X线检查可考虑为支气管肺癌。

57.【正确答案】D

【答案解析】面浮肢肿,身热汗出,口干不欲饮,尿黄短少,便溏不爽,舌红,苔黄腻,脉滑数,所以中医证型是湿热证。

58.【正确答案】A

【答案解析】Alport综合征常起病于青少年



(多在 10 岁以前), 患者有肾(血尿、轻至中度蛋白尿及进行性肾功能损害)、眼(球形晶状体等)、耳(神经性耳聋)异常, 并有阳性家族史(多为性连锁显性遗传)。

59.【正确答案】 B

【答案解析】 肾病综合征临床症状: ①大量蛋白尿($\geq 3.5\text{g}/24$ 小时); ②低白蛋白血症($\leq 30\text{g}/\text{L}$), 24 小时蛋白定量 5.1g , 血浆白蛋白 $28\text{g}/\text{L}$, 所以选 B。

60.【正确答案】 B

【答案解析】 本题小便频数, 灼热刺痛, 色黄赤, 苔薄黄腻, 脉滑数为膀胱湿热证, 所以选八正散。

61.【正确答案】 D

【答案解析】 患者时有小便疼痛, 肾区不适, 尿蛋白阳性, 应考虑慢性肾盂肾炎。

62.【正确答案】 D

【答案解析】 患者体温 40°C , 心率 160 次/min, 浅昏迷, 瞳孔等大等圆, 直径 6mm, 烦躁, 抽搐, 皮肤干燥, 膀胱充盈, 应立即停用阿托品。可给予解磷定, 静脉输液增加尿量促进毒物排出, 尿潴留可以予以导尿处理。

63.【正确答案】 C

【答案解析】 患者使用煤烟炉, 易产生 CO, 且门窗紧闭, 通风不良, 故最可能的诊断为急性一氧化碳中毒。

64.【正确答案】 D

【答案解析】 有机磷杀虫药中毒的主要临床表现有: 1) 毒蕈碱样症状: 又称为 M 样症

状。临床表现可有: ①腺体分泌增加表现: 大汗、多泪和流涎; ②平滑肌痉挛表现: 瞳孔缩小, 胸闷、气短、呼吸困难, 恶心、呕吐、腹痛、腹泻; ③括约肌松弛表现: 大小便失禁; ④气道分泌物明显增多: 表现咳嗽、气促, 双肺有干啰音或湿啰音, 严重者发生肺水肿。2) 烟碱样症状: 又称 N 样症状。①由于乙酰胆碱堆积在横纹肌神经-肌肉接头处, 出现肌纤维颤动, 全身紧缩或压迫感, 甚至全身骨骼肌强直性痉挛; 骨骼肌过度兴奋后就会出现抑制, 发生肌力减退甚至呼吸肌麻痹引起呼吸停止。②乙酰胆碱还可刺激交感神经节和肾上腺髓质, 出现血压升高和心律失常。3) 中枢神经系统症状: 由于乙酰胆碱在脑内蓄积, 出现头晕、头痛、倦怠、烦躁不安、言语不清、不同程度的意识障碍, 重者发生脑水肿甚至呼吸中枢麻痹。

65.【正确答案】 C

【答案解析】 患者经治疗后出院, 现为中毒后遗症。辨证为痰浊滞留证。

证候: 呆傻少语或言语不清, 反应迟钝, 行走不稳, 面无表情, 两目直视, 健忘失眠, 恐惧妄想, 甚至谵语昏迷, 舌淡红苔白, 脉沉滑或沉伏。

治法: 健脾祛湿, 化痰开窍。

方药: 半夏白术天麻汤加减。

66.【正确答案】 C

【答案解析】 小便减少, 每天不到 100ml, 急查血肌酐 $562\mu\text{mol}/\text{L}$, BUN $13\text{mmol}/\text{L}$, 符合透析指征, 所以首选血液透析。

67.【正确答案】 A

【答案解析】 系统性红斑狼疮-脾肾两虚证



证候：面色不华，但时有潮红，两手指甲亦无华色，神疲乏力，畏寒肢冷，时而午后烘热，口干，小便短少，两腿浮肿如泥，进而腰股俱肿，腹大如鼓，舌胖、舌偏红或偏淡均有，苔薄白或薄腻，脉弦细、细数、细弱。

治法：滋肾填精，健脾利水。

方药：济生肾气丸加减。

68.【正确答案】 A

【答案解析】 类风湿关节炎-肝肾亏损，邪痹筋骨证

证候：形体消瘦，关节变形，肌肉萎缩，骨节烦疼、僵硬，活动受限，筋脉拘急，或筋惕肉瞤，腰膝酸软无力，眩晕，心悸气短，指甲淡白，舌淡苔薄，脉细弱。

治法：益肝肾，补气血，祛风湿，通经络。

方药：独活寄生汤加减。

69.【正确答案】 B

【答案解析】 类风湿关节炎-阴虚内热证

证候：午后或夜间发热，盗汗或兼自汗，口干咽燥，手足心热，关节肿胀疼痛，小便赤涩，大便秘结，舌质干红，少苔，脉细数。

治法：养阴清热，祛风通络。

70.【正确答案】 B

【答案解析】 类风湿关节炎-阴虚内热证

证候：午后或夜间发热，盗汗或兼自汗，口干咽燥，手足心热，关节肿胀疼痛，小便赤涩，大便秘结，舌质干红，少苔，脉细数。

治法：养阴清热，祛风通络。

方药：丁氏清络饮加减。若兼湿热者，当合以三妙散清热祛湿。

71.【正确答案】 C

【答案解析】 类风湿关节炎-湿热痹阻证

证候：发热，口苦，饮食无味，纳呆或有恶心，泛泛欲吐，关节肿痛以下肢为重，全身困乏无力，下肢沉重酸胀，浮肿或有关节积液，舌苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿，祛风通络。

方药：四妙丸加减。

72.【正确答案】 A

【答案解析】 类风湿关节炎-湿热痹阻证

证候：发热，口苦，饮食无味，纳呆或有恶心，泛泛欲吐，关节肿痛以下肢为重，全身困乏无力，下肢沉重酸胀，浮肿或有关节积液，舌苔黄腻，脉滑数。

治法：清热利湿，祛风通络。

方药：四妙丸加减。

73.【正确答案】 B

【答案解析】 患者全身关节疼痛，且长期伴有发热，并有口腔溃疡，尿蛋白(++)，表明存在肾功能损伤，所以考虑为系统性红斑狼疮。关节痛是系统性红斑狼疮常见的症状之一，约90%的患者在病程中出现各种热型的发热，30%患者在急性期出现口腔溃疡伴轻微疼痛，且狼疮性肾炎是SLE最常见和严重的临床表现。

74.【正确答案】 B

【答案解析】 系统性红斑狼疮-阴虚内热证

证候：长期低热，手足心热，面色潮红而有暗紫斑片，口干咽痛，渴喜冷饮，目赤齿衄，关节肿痛，烦躁不寐，舌质红少苔或苔薄黄，脉细数。

治法：养阴清热。

方药：玉女煎合增液汤加减。



75.【正确答案】 E

【答案解析】 系统性红斑狼疮-气营热盛证
证候：高热，不恶寒，满面红赤，皮肤红斑鲜红，咽干，口渴喜冷饮，尿赤而少，关节疼痛，舌红绛，苔黄，脉滑数或洪数。
治法：清热解毒，凉血化斑。
方药：清瘟败毒饮加减。

76.【正确答案】 D

【答案解析】 系统性红斑狼疮-气血两亏证
证候：心悸怔忡，健忘失眠，多梦，面色不华，肢体麻木，舌质淡，苔薄白，脉细缓。
治法：益气养血。

二、A3/A4 型题

(77~79 共用题干)

77.【正确答案】 B

【答案解析】 患者突然大量咯血，考虑为支气管扩张症。支气管扩张症是以慢性咳嗽，咯大量脓痰(或)合并反复咯血为主要表现的疾病。部分患者以反复咯血为唯一症状。临床上称为“干性支气管扩张”。

78.【正确答案】 A

【答案解析】 胸部 CT 对支气管扩张症的诊断具有相当特异性。

79.【正确答案】 A

【答案解析】 支气管扩张症的治疗重在防治呼吸道感染，治疗成功的关键在于呼吸道引流通畅和有效的抗菌药物治疗。

(80~82 共用题干)

80.【正确答案】 B

【答案解析】 对有肝病史的中年患者，尤其

是男性患者，如有不明原因的肝区疼痛、消瘦、进行性肝肿大，均应考虑有肝癌的可能。题中患者长期乙肝病史，现肝区疼痛，消瘦，腹部结块，故考虑为肝癌。

81.【正确答案】 C

【答案解析】 患者舌质暗红，有瘀斑，苔薄黄，脉弦，为气滞血瘀证。

82.【正确答案】 E

【答案解析】 原发性肝癌之气滞血瘀证
证候：两胁胀痛，腹部结块，推之不移，脘腹胀闷，纳呆乏力，噎气泛酸，大便不实，舌质红或暗红，有瘀斑，苔薄白或薄黄，脉弦或涩。
治法：疏肝理气，活血化瘀。
方药：逍遥散合桃红四物汤加减。

(83~85 共用题干)

83.【正确答案】 C

【答案解析】 缺铁性贫血之心脾两虚证
证候：面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，毛发干脱，爪甲脆脆，舌淡胖，苔薄，脉濡细。
治法：益气补血，养心安神。
方药：归脾汤或八珍汤加减。

84.【正确答案】 D

【答案解析】 缺铁性贫血之心脾两虚证
证候：面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，毛发干脱，爪甲脆脆，舌淡胖，苔薄，脉濡细。
治法：益气补血，养心安神。
方药：归脾汤或八珍汤加减。

85.【正确答案】 A



【答案解析】 缺铁性贫血之心脾两虚证
证候：面色苍白，倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，少气懒言，食欲不振，毛发干脱，爪甲脆脆，舌淡胖，苔薄，脉濡细。
治法：益气补血，养心安神。
方药：归脾汤或八珍汤加减。

(86~88 共用题干)

86. **【正确答案】** A

【答案解析】 血管性痴呆的诊断要点：①痴呆符合 DSM-I-R 的诊断标准，主要表现为认知功能明显下降以及 2 个以上认知功能障碍，其严重程度已干扰日常生活，并经神经心理学测试证实。②临床检查有局灶性神经系统症状和体征，符合 CT、MRI 相应病灶，可有或无卒中史。③痴呆与脑血管病密切相关，痴呆发生于卒中后 3 个月，并持续 6 个月以上；或认知功能障碍突然加重，或波动，或呈阶梯样逐渐发展。中医辨证为髓海不足证，可见智力下降，神情呆滞，记忆力和计算力下降，懈怠思卧，齿枯发焦，腰酸腿软，头晕耳鸣，舌瘦质淡红，脉沉细弱。

87. **【正确答案】** B

【答案解析】 血管性痴呆之髓海不足证：
证候：智力下降，神情呆滞，记忆力和计算力下降，懈怠思卧，齿枯发焦，腰酸腿软，头晕耳鸣，舌瘦质淡红，脉沉细弱。
治法：补精填髓养神。
方药：七福饮加减。

88. **【正确答案】** A

【答案解析】 血管性痴呆之髓海不足证：
证候：智力下降，神情呆滞，记忆力和计算力下降，懈怠思卧，齿枯发焦，腰酸腿

软，头晕耳鸣，舌瘦质淡红，脉沉细弱。
治法：补精填髓养神。
方药：七福饮加减。

(89~91 共用题干)

89. **【正确答案】** B

【答案解析】 根据患者面颊部对称性红斑，反复发作口腔溃疡，四肢关节疼痛等临床症状体征，考虑患者为系统性红斑狼疮。

90. **【正确答案】** B

【答案解析】 系统性红斑狼疮之阴虚内热证
证候：长期低热，手足心热，面色潮红而有暗紫斑片，口干咽痛，渴喜冷饮，目赤齿衄，关节肿痛，烦躁不寐，舌质红少苔或苔薄黄，脉细数。
治法：养阴清热。
方药：玉女煎合增液汤加减。

91. **【正确答案】** B

【答案解析】 系统性红斑狼疮之阴虚内热证
证候：长期低热，手足心热，面色潮红而有暗紫斑片，口干咽痛，渴喜冷饮，目赤齿衄，关节肿痛，烦躁不寐，舌质红少苔或苔薄黄，脉细数。
治法：养阴清热。
方药：玉女煎合增液汤加减。

(92~94 共用题干)

92. **【正确答案】** E

【答案解析】 心肌梗死-寒凝心脉证
证候：胸痛彻背，心痛如绞，胸闷憋气，形寒畏冷，四肢不温，冷汗自出，心悸短气，舌质紫暗，苔薄白，脉沉细或沉紧。
治法：散寒宣痹，芳香温通。
方药：当归四逆汤合苏合香丸加减。



93.【正确答案】D

【答案解析】心肌梗死-寒凝心脉证

证候：胸痛彻背，心痛如绞，胸闷憋气，形寒畏冷，四肢不温，冷汗自出，心悸短气，舌质紫暗，苔薄白，脉沉细或沉紧。

治法：散寒宣痹，芳香温通。

方药：当归四逆汤合苏合香丸加减。

94.【正确答案】E

【答案解析】心肌梗死-寒凝心脉证

证候：胸痛彻背，心痛如绞，胸闷憋气，形寒畏冷，四肢不温，冷汗自出，心悸短气，舌质紫暗，苔薄白，脉沉细或沉紧。

治法：散寒宣痹，芳香温通。

方药：当归四逆汤合苏合香丸加减。

(95~97 共用题干)

95.【正确答案】E

【答案解析】根据长期饮酒史，肝掌，黄疸，B超提示肝回声明显增强、不均、光点粗大，诊断为肝硬化。

96.【正确答案】D

【答案解析】肝硬化-肝脾血瘀证

证候：腹大胀满，脉络怒张，胁腹刺痛，面色晦暗黧黑，肋下癥块，面颈胸壁等处可见红点赤缕，手掌赤痕，口干不欲饮，或大便色黑，舌质紫暗，或有瘀斑，脉细涩。

治法：活血化瘀，化气行水。

方药：调营饮加减。

97.【正确答案】B

【答案解析】肝硬化-肝脾血瘀证

证候：腹大胀满，脉络怒张，胁腹刺痛，

面色晦暗黧黑，肋下癥块，面颈胸壁等处可见红点赤缕，手掌赤痕，口干不欲饮，或大便色黑，舌质紫暗，或有瘀斑，脉细涩。

治法：活血化瘀，化气行水。

方药：调营饮加减。

(98~100 共用题干)

98.【正确答案】B

【答案解析】尿路感染-肝胆郁热证

证候：小便不畅，少腹胀满疼痛，小便灼热刺痛，有时可见血尿，烦躁易怒，口苦口黏，或寒热往来，胸胁苦满，舌质暗红，可见瘀点，脉弦或弦细。

治法：疏肝理气，清热通淋。

方药：丹栀逍遥散合石苇散加减。

99.【正确答案】C

【答案解析】尿路感染-肝胆郁热证

证候：小便不畅，少腹胀满疼痛，小便灼热刺痛，有时可见血尿，烦躁易怒，口苦口黏，或寒热往来，胸胁苦满，舌质暗红，可见瘀点，脉弦或弦细。

治法：疏肝理气，清热通淋。

方药：丹栀逍遥散合石苇散加减。

100.【正确答案】C

【答案解析】尿路感染-肝胆郁热证

证候：小便不畅，少腹胀满疼痛，小便灼热刺痛，有时可见血尿，烦躁易怒，口苦口黏，或寒热往来，胸胁苦满，舌质暗红，可见瘀点，脉弦或弦细。

治法：疏肝理气，清热通淋。

方药：丹栀逍遥散合石苇散加减。