

# 2019临床执业（助理）医师资格考试

## 网友回忆版（执业）



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

# 第一单元

## A1 型选择题(1—71 题)

### 答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 不属于慢性风湿性心脏病病变的是  
A. 心肌间质小瘢痕形成  
B. 心包纤维素渗出  
C. 主动脉瓣增厚、缩短、变形  
D. McCallum 斑形成  
E. 二尖瓣增厚、缩短、变形
- 疾病监测的目的不包括  
A. 验证病因假设  
B. 预测疾病流行  
C. 评级预防效果  
D. 描述疾病分布  
E. 监测疾病暴发
- $CD_4^+$  T 细胞发挥抗病毒作用的主要机制不包括  
A. 辅助抗体产生  
B. 杀伤被感染细胞  
C. 产生免疫记忆  
D. 辅助  $CD_8^+$  T 细胞  
E. 分泌细胞因子
- 队列研究的观察终点是  
A. 观察对象出现了预期的结果  
B. 观察对象因非研究因素退出研究  
C. 整个研究工作结束  
D. 观察对象死于车祸等意外  
E. 随访者与观察对象失去了联系
- 关于酶活性的叙述,正确的是  
A. 关键酶的活性不易被调节  
B. 25℃ 时 TaqDNA 聚合酶活性最高  
C. 酶活性检测可用于疾病的诊断  
D. 多数酶最适 pH 在 8.0  
E. 缺少氯离子时唾液淀粉酶失去活性
- 蛋白质中对 280nm 紫外光吸收最强的氨基酸残基是  
A. 谷氨酸  
B. 赖氨酸  
C. 丙氨酸  
D. 组氨酸  
E. 色氨酸
- 提出“大医精诚”的我国古代医学家是  
A. 张仲景  
B. 陈实功  
C. 孙思邈  
D. 扁鹊  
E. 董奉
- 骨肉瘤最重要的组织学特点是  
A. 细胞核多形  
B. 血管内瘤栓  
C. 肿瘤性成骨  
D. 细胞异型性明显  
E. 核分裂象多见
- 通过替代途径激活补体的免疫球蛋白是  
A. IgM  
B. IgD  
C. IgG2  
D. IgA  
E. IgG1
- 疫苗接种记录保留的最低年限是  
A. 不得少于 5 年  
B. 不得少于 2 年  
C. 不得少于 3 年  
D. 不得少于 6 年  
E. 不得少于 8 年
- 迷走神经兴奋引起胃窦部 G 细胞分泌的递质是  
A. 盐酸  
B. 内因子  
C. 胃蛋白酶  
D. 碱性黏液





- C. 胆道狭窄  
E. 腹腔内粘连严重
27. MHC - II 类分子不表达于什么细胞  
A. 巨噬细胞  
B. 树突状细胞  
C. B 细胞  
D. 未活化的 T 细胞  
E. 血管内皮细胞
28. 结合胆红素的特点为  
A. 呈间接反应  
B. 不溶于水  
C. 穿透细胞膜能力大  
D. 经肾脏滤过, 随尿液排出  
E. 分子形成特定卷曲结构
29. 胸骨角两侧平对的结构是  
A. 第 1 肋  
B. 第 2 肋  
C. 第 3 肋  
D. 第 4 肋  
E. 第 5 肋
30. 原发性高血压可逆性细动脉改变  
A. 血管壁平滑肌萎缩  
B. 血管纤维化  
C. 血管痉挛  
D. 内膜下蛋白性物质沉积  
E. 血管腔狭窄
31. 可快速产热但持续短时间的激素是  
A. 皮质醇  
B. 醛固酮  
C. 甲状腺激素  
D. 乙酰胆碱  
E. 肾上腺素
32. 细菌荚膜主要功能  
A. 增强细菌的毒力  
B. 抵抗宿主细胞吞噬  
C. 繁殖作用  
D. 黏附作用  
E. 运动器官
33. NHL 淋巴瘤最常发生部位  
A. 结肠  
B. 直肠  
C. 胃  
D. 回肠  
E. 十二指肠
34. 60kg 体重的正常成年人的血量为  
A. 2.8 ~ 4.0L  
B. 4.2 ~ 4.8L  
C. 5.0 ~ 7.0L  
D. 7.0 ~ 8.0L  
E. 10 ~ 20L
35. 癔症性瘫痪最重要的治疗方法是  
A. 镇静  
B. 针灸治疗  
C. 心理治疗 + 药物治疗  
D. 暗示疗法  
E. 中医中药治疗
36. 心理社会因素在发病、发展过程中起重要作用的躯体器质性疾病称为  
A. 心理疾病  
B. 神经症  
C. 转换性障碍  
D. 心身疾病  
E. 躯体疾病
37. 对医务人员进行道德评价的首要标准是看其医疗行为是否有利于  
A. 患者疾病的缓解和康复  
B. 医学科学的发展和社会的进步  
C. 人类生存环境的保护和改善  
D. 减轻患者及其家庭的经济负担  
E. 优生和人群的健康、长寿
38. 原核生物基因表达调控的基本结构单元是  
A. 增强子  
B. 密码子  
C. 转录因子  
D. 启动子  
E. 操纵子
39. 结节性甲状腺肿的病理特点是  
A. 滤泡上皮高柱状  
B. 滤泡上皮增生与复旧不一致  
C. 结节边界清楚、包膜完整  
D. 滤泡小而一致  
E. 结节常为多个, 大小相等
40. “人际和谐”的特点一般不包括  
A. 乐于助人  
B. 乐于交往  
C. 宽以待人  
D. 自我完善

- E. 不卑不亢
41. 能耗竭递质,导致骨骼肌神经-肌接头处传递效应降低的物质是
- A.  $\alpha$ -银环蛇毒  
B. 新斯的明  
C. 筒箭毒碱  
D. 黑寡妇蜘蛛毒  
E. 有机磷农药
42. 描述暴发疫情严重性的最佳指标是
- A. 死亡率  
B. 续发人数  
C. 发病人数  
D. 罹患率  
E. 患病人数
43. 下列不属于行政处罚的是
- A. 警告  
B. 行政拘留  
C. 责令停产、停业  
D. 查封、扣押  
E. 罚款
44. 医师被医疗机构限制处方权的情形是
- A. 休病假期间  
B. 参加离岗培训期间  
C. 不按规定使用药品说明书  
D. 外出会诊期间  
E. 出现超常处方3次以上且无正当理由
45. 卫生保健的公平性是指卫生服务的利用
- A. 以市场经济规律为导向  
B. 以社会阶层为导向  
C. 以收入多少为导向  
D. 以支付能力为导向  
E. 以需要为导向
46. 在医疗费用控制措施中,不属于控制医疗服务提供方措施的是
- A. 设置最高支付限额  
B. 按服务单元付费  
C. 总额预付制  
D. 按人头预付方式  
E. 按病种给付方式
47. 急性肾功能不全少尿期出现高钾血症的主要原因是
- A. 钾摄入过多  
B. 肾排钾减少  
C. 输入过多库存血  
D. 分解代谢增强,钾从细胞内溢出  
E. 代谢性酸中毒,钾从细胞内溢出
48. 对未取得第一类精神药品处方资格擅自开具该类药品处方、尚未造成严重后果的医师,应当给予的行政处罚是
- A. 吊销医师执业证书  
B. 没收违法所得  
C. 警告,暂停其执业活动  
D. 罚款  
E. 限制其处方权
49. 胃小弯最低点弯度明显折转处是
- A. 中间沟  
B. 贲门切迹  
C. 幽门  
D. 贲门  
E. 角切迹
50. 组织损伤后,由其邻近的健康细胞分裂增生完成修复的过程
- A. 分化  
B. 机化  
C. 增生  
D. 再生  
E. 化生
51. 下列不属于上皮组织肿瘤的是
- A. 肺腺癌  
B. 胃淋巴瘤  
C. 肝腺瘤  
D. 乳腺导管内乳头状瘤  
E. 宫颈鳞状细胞癌
52. 雌激素结合的受体类别是
- A. G蛋白偶联受体  
B. 离子通道受体  
C. 细胞内受体  
D. 细胞因子受体  
E. 酪氨酸激酶受体
53. 艾滋病患者最常见的机会感染是
- A. 隐球菌脑膜炎  
B. 带状疱疹  
C. 念珠菌肺炎  
D. 肺孢子菌肺炎  
E. E细胞病毒食管炎
54. 脂肪酸 $\beta$ -氧化的限速步骤是

- A.  $\beta$ -羟脂酰 CoA 硫解  
B.  $\beta$ -羟脂酰 CoA 脱氢  
C. 脂酰 CoA 线粒体转运  
D.  $\beta$ -烯脂酰 CoA 加水  
E. 脂酰 CoA 脱氢
55. 外阴鳞状上皮增生局部治疗的主要药物是  
A. 糖皮质激素  
B. 抗病毒药物  
C. 雄激素  
D. 雌激素  
E. 抗生素
56. 很少引起 AIDS 患者机会性感染的病原体是  
A. EB 病毒  
B. 弓形虫  
C. 新型隐球菌  
D. 卡氏肺孢子虫  
E. 巨细胞病毒
57. 黄曲霉毒素 B<sub>1</sub> 的靶器官主要是  
A. 脾  
B. 肝  
C. 心  
D. 肺  
E. 脑
58. 血浆晶体渗透压的主要生理作用是  
A. 决定血浆的总渗透压  
B. 维持毛细血管内外的水平衡  
C. 影响血浆总量  
D. 影响组织液的生成量  
E. 保持细胞内外的水平衡
59. 根据《突发公共卫生事件应急条例》，卫生行政部门应当对医疗机构采取责令改正、通报批评、给予警告处理的情形是  
A. 未建立突发事件信息发布制度  
B. 未对突发事件开展流行病学调查  
C. 未向社会发布突发事件信息  
D. 未及时诊断不明原因疾病  
E. 未履行突发事件报告职责
60. 血管壁异常所致出血的特点是  
A. 关节腔出血  
B. 肌肉出血  
C. 皮肤黏膜出血  
D. 内脏出血  
E. 迟发出血
61. “感知自己有可能成为某疾病或危险因素的受害者”，体现了健康信念模式中的  
A. 感知行为障碍  
B. 感知采纳行为的益处  
C. 感知严重性  
D. 感知易感性  
E. 自我效能
62. 高血压患者遵从医嘱服药的强化因素  
A. 患者的经济条件足以支付较高的医药费  
B. 患者对治疗高血压采取积极态度  
C. 患者能方便地就医、取药  
D. 患者在按医嘱服药后血压得到有效控制  
E. 患者知晓服药能有效控制血压
63. 从公共卫生伦理的角度，为因防治雾霾而对产生工业污染的企业采取限制政策的正当性进行伦理辩护的理论是  
A. 福利主义  
B. 境遇主义  
C. 自由主义  
D. 功利主义  
E. 社群主义
64. 患者因腹泻引起尿量减少的主要机制是  
A. 血浆晶体渗透压升高，血管升压素分泌减少  
B. 血浆胶体渗透压降低，血管紧张素分泌减少  
C. 血浆胶体渗透压降低，血管紧张素分泌增加  
D. 血浆晶体渗透压降低，醛固酮分泌增加  
E. 血浆晶体渗透压升高，血管升压素分泌增加
65. 引起心输出量减少的因素是  
A. 甲状腺功能减退  
B. 运动  
C. 贫血  
D. 焦虑  
E. 妊娠
66. 在选择和确定疾病的诊疗方案时，告知患者病情并最终由其决定，体现的是  
A. 协同一致原则  
B. 有利原则  
C. 患者至上原则  
D. 知情同意原则  
E. 最优化原则
67. 医疗机构执业许可证应于校验期满前定期限内向登记机关申请办理校验手续，该期限是  
A. 1 个月  
B. 半年

- C. 15 天  
D. 3 个月  
E. 10 天
68. 360 度评估是指由员工本人、领导、下属、同事和顾客等从全方位、各个角度来评估员工的方法。按照心理评估的分类,这种方法属于
- A. 调查法  
B. 会谈法  
C. 心理测验法  
D. 观察法  
E. 临床评定量表
69. 确定对某传染病接触者留验、检疫或医学观察期限,主要依据该传染病的
- A. 潜伏期  
B. 传染期  
C. 病原携带期  
D. 恢复期  
E. 临床症状期
70. 医务人员遵从临终患者和家属的请求,给予减轻痛苦的维持治疗,直至生命自行终止。这种做法属于
- A. 积极安乐死  
B. 非自愿安乐死  
C. 医助自杀  
D. 消极安乐死  
E. 主动安乐死
71. 某医学科研人员将处于试验阶段的药物用于临床并向患者收取费用,该做法主要违背的医学科研伦理要求是
- A. 敢于创新  
B. 规范操作  
C. 精益求精  
D. 动机纯正  
E. 公私兼顾

## A2 型选择题 (72 - 129 题)

## 答 题 说 明

每一道考题下面是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

72. 男,33 岁。消化性溃疡反复发作并出血 3 年,在出血 1 周,内科治疗无效行手术治疗。术中见胃皱襞显著增厚,组织病理学检查发现明显的壁细胞增生。最可能导致上述病理改变的内源性物质是
- A. 转化生长因子  $\alpha$   
B. 促胃液素  
C. 促胰液素  
D. 生长抑素  
E. 乙酰胆碱
73. 8 月某日,某单位聚餐有 80% 聚餐者先后因腹痛、腹泻就诊。大部分患者有上腹和脐周阵发性绞痛,继而腹泻,5~20 次/天,粪便呈洗肉水样血水便。调查发现聚餐的主要食物为盐水虾及近海贝类等。引起该食物中毒的病原菌可能是
- A. 沙门氏菌属  
B. 副溶血性弧菌  
C. 肉毒梭菌  
D. 葡萄球菌  
E. 变形杆菌属
74. 某厂工人经常接触职业性有害因素。该地区疾病预防控制中心 (CDC) 每年对该厂工人进行职业健康检查,以尽早发现病损并及时处理。CDC 进行的此项工作属于
- A. 健康监护  
B. 临床治疗  
C. 职业卫生学现场调查  
D. 病因预防  
E. 预防性卫生监督
75. 男,45 岁。左膝关节肿胀伴积液,经穿刺抽出清亮液体。2 天后出现寒战、高热、膝关节剧痛。查体: T 39.5℃,膝关节肿胀并有压痛,实验室检查: WBC  $15.0 \times 10^9/L$ 。左膝关节 X 线片见软组织肿胀、关节间隙增宽。此关节积液中主要的渗出成分依次是
- A. 纤维素、脓液  
B. 脓液、纤维素  
C. 浆液、纤维素  
D. 脓液、浆液  
E. 浆液、脓液
76. 男,35 岁。反复咳嗽伴呼吸困难 20 年,再发 1 天,

- 吸入“万托林”或口服“氨茶碱片”后可缓解。查体：双肺闻及干啰音。外周血-WBC  $7.8 \times 10^9/L$ , E 0.15。与该病发生关系最密切的免疫球蛋白是
- A. IgE  
B. IgM  
C. IgA  
D. IgD  
E. IgG
77. 女, 30 岁。孕 40 周, 无剖宫产适应证, 但产妇及家属坚决要求剖宫产。术后新生儿出现呼吸困难, 诊断新生儿湿肺, 家属对提出质疑。主治医师称, 产妇本不该手术, 自然分娩该病发生的概率较低, 这些信息已告知且产妇及家属已签字。但家属认为: 医生是权威, 应由医生决定是否进行手术, 如果医生讲清楚剖宫产会导致新生儿湿肺, 我们不会再坚持。本案例中, 该医师违背的临床诊疗伦理要求是
- A. 履行知情同意手续  
B. 药品合理配伍  
C. 患者利益至上  
D. 医护精诚协作  
E. 认真做好术前准备
78. 女, 35 岁。下肢严重挤压伤 2 小时。查体: BP 105/70mmHg, 实验室检查: 血清  $K^+ 6.0\text{mmol/L}$ ,  $Na^+ 138\text{mmol/L}$ ,  $Cl^- 105\text{mmol/L}$ 。该患者最可能出现的酸碱平衡紊乱是
- A. 细胞外液碱中毒、尿液呈酸性  
B. 细胞外液酸中毒、尿液呈酸性  
C. 细胞外液酸中毒、尿液呈碱性  
D. 细胞内液碱中毒、尿液呈酸性  
E. 细胞外液碱中毒、尿液呈碱性
79. 女, 45 岁。类风湿性关节炎 5 年, 予改变病情抗风湿药及小剂量激素治疗, 疾病仍然处于高活动状态, 关节骨破坏发展。此时可考虑选用的细胞因子拮抗治疗是
- A. 抗 CD5 单抗  
B. 抗 EGFR 抗体  
C. 抗 L23 单抗  
D. 抗 HER-2 抗体  
E. 抗 TNF- $\alpha$  单抗
80. 刘女士 2 周前经剖宫产产下一女婴, 产后奶水不足令孩子啼哭不止; 加之家里老人身体不好, 婴儿及产妇的照顾和护理也是问题, 刘女士因此萌生了悲观厌世的想法。对于医护人员来说, 为了解患者的心理状况, 比较简便的心理评估工具为
- A. TAT(主题统觉测验)  
B. H-RB(神经心理成套测验)  
C. SDS(自评抑郁量表)  
D. EPQ(艾森克人格问卷)  
E. MMPI(明尼苏达多相人格调查表)
81. 女, 35 岁。来医院健康体检。查体: BP 130/80mmHg, 身高 165cm, 体重 75kg, 肝脾肋下未触及。实验室检查: ALT 75U/L, AST 40U/L, Y-GT 40U/L。B 超: 中度脂肪肝。该患者肝内蓄积的甘油三酯的主要来源是
- A. 小肠细胞合成  
B. 生酮氨基酸转变  
C. 肝细胞合成  
D. 脂肪组织转运  
E. 脂肪组织分解
82. 女, 65 岁。腹部下坠感伴腰酸 1 年余, 发现外阴有肿物脱出 6 个月。G<sub>4</sub>P<sub>3</sub>。妇科查体: 患者平卧用力向下屏气时, 可见宫颈和部分宫体脱出阴道口。与该病变发生关系最密切的结构是
- A. 骶结节韧带  
B. 子宫主韧带  
C. 子宫圆韧带  
D. 子宫阔韧带  
E. 卵巢固有韧带
83. 男, 65 岁。逐渐出现语速迟缓、语量减少、口语不流利和找词困难, 但能理解家人和医生的指令。受损可能性最大的部位是
- A. 中央后回的下部  
B. 中央前回的上部  
C. 中央旁小叶的前部  
D. 额下回的后部  
E. 缘上回的上部
84. 女, 45 岁。接触性阴道流血 3 月余。妇科检查: 宫颈前唇有直径约 2cm 菜花状赘生物。镜下见异型细胞浸润性生长, 巢状排列, 可见病理核分裂象。最可能先转移到的器官是
- A. 子宫旁淋巴结  
B. 腹股沟淋巴结  
C. 肺  
D. 盆腔  
E. 脑
85. 女婴, 11 个月。人工喂养为主。体检发现血 Hb 偏低。目前最适宜添加的辅食是

- A. 肝泥  
C. 米粉  
E. 苹果泥
- B. 鸡蛋羹  
D. 西红柿泥
86. 女, 35 岁。进行性四肢乏力 1 年, 早晨较轻, 下午加重。既往有胸腺瘤病史, 否认甲状腺功能亢进症病史。运动疲劳试验阳性。目前临床考虑为重症肌无力, 给予胆碱酯酶抑制剂后症状缓解, 但随之最可能出现的新症状是  
A. 腹泻  
C. 瞳孔扩大  
E. 呼吸困难
- B. 心动过速  
D. 口干
87. 女, 18 岁。发热、咽痛伴阵发性刺激性咳嗽 1 周, 咳少量黏痰。查体: T 39℃, 左肺可闻及少量湿啰音。胸部 X 线片示左上肺淡薄片状阴影。血白细胞总数及中性粒细胞计数正常。经阿奇霉素治疗 7 天后复查胸部 X 线片示病灶大部分吸收。最可能感染的病原体是  
A. 肺炎链球菌  
B. 结核分枝杆菌  
C. 腺病毒  
D. 肺炎支原体  
E. 金黄色葡萄球菌
88. 刘某有家族遗传病史, 怀孕后担心胎儿健康, 到某医疗机构进行遗传病诊断。后因医疗纠纷投诉至卫生监督机构。经查, 该医疗机构未取得遗传病诊断资质。根据规定, 负责遗传病诊断许可的卫生行政部门是  
A. 县级卫生行政部门  
B. 设区的市级卫生行政部门  
C. 各级卫生行政部门  
D. 国务院卫生行政部门  
E. 省级卫生行政部门
89. 男, 75 岁。车祸致多发骨折及脾破裂, 行脾切除术后 5 天, 卧床制动。今晨突发胸闷气促, 伴意识不清。查体: T 37.4℃, P 105 次/分, R 25 次/分, BP 94/58mmHg, SaO<sub>2</sub> 90%。引起该患者上述表现最可能的原因是  
A. 自发性气胸  
B. 急性左心衰竭  
C. 心肌梗死  
D. 脑出血  
E. 肺栓塞
90. 对某无工业污染山村的儿童生长发育和疾病发病状况的调查发现, 该地区部分儿童身体发育有迟缓和智力低下, 除此外, 未发现其他异常。当地儿童所患的疾病最可能是  
A. 碘缺乏病  
C. 铅中毒  
E. 氟中毒
- B. 砷中毒  
D. 碘缺乏病
91. 某交通警察, 工龄 10 余年。上班时间主要是站在街上指挥交通, 他长期工作最有可能引起的工作有关疾病是  
A. 滑囊炎  
B. 肩周炎  
C. 下肢静脉曲张  
D. 慢性肝炎  
E. 慢性胃炎
92. 男, 75 岁。因呼吸衰竭去世。既往病史: 记忆力进行性下降, 时间定向力障碍, 命名不能, 双手失用, 近 6 个月完全卧床。脑 MRI 示双侧海马萎缩。去世后尸检除肺部损伤外, 还可见脑组织异常的 beta 淀粉样斑块。导致这种异常蛋白质形成的生化基础是  
A. 蛋白质亚基数目减少  
B. 氨基酸的排列顺序改变  
C. 编码该蛋白质的基因序列突变  
D. 蛋白质某些氨基酸改变  
E. 蛋白质空间结构改变
93. 一位体重 60kg 的女患者, 因外伤引起急性出血约 2 000ml, 经手术止血并在应用晶体液和人造胶体液补足血容量(血压已稳定)的基础上, 宜输注下列何种血制品  
A. 红细胞悬液(添加剂红细胞)  
B. 保存全血  
C. 洗涤红细胞  
D. 新鲜冰冻血浆  
E. 新鲜全血
94. 男, 23 岁。大四学生, 自述从上大学开始出现与人沟通时紧张、心慌、表达不流畅的现象; 因临近毕业需要面试, 前来寻求心助。心理治疗师布置了一个面试的现场其直接面对“面试官”陈述自己的职业倾向和胜任能力。这种治疗方法为  
A. 系统脱敏法  
B. 示范法  
C. 催眠疗法  
D. 厌恶疗法

- E. 满灌疗法
95. 男, 35 岁。劳累后发热、咳嗽、咳脓性痰 3 天, 呼吸困难 1 天。查体: T 38.9℃, R 30 次/分, 口唇发绀, 右下肺叩诊呈浊音, 呼吸音略低。引起该患者低氧血症的主要机制是
- A. 限制性通气功能障碍  
B. 肺泡通气量下降  
C. 生理无效腔增加  
D. 弥散功能障碍  
E. 通气/血流比例失衡
96. 王女士, 44 岁。体质指数为 27.1kg/m<sup>2</sup>, 她意识到自己体重超重, 打算通过运动控制体重, 但总是觉得没有适合自己的运动方式, 迟迟没有开始行动。按照行为改变阶段理论划分, 王女士处于行为改变的
- A. 行动阶段  
B. 无打算阶段  
C. 准备阶段  
D. 打算阶段  
E. 行为维持阶段
97. 某市一双苯厂车间发生连续爆炸后, 苯类污染物污染了附近的河流, 市政府决定立即在全市停止供应源于被污染河流的自来水。市政府的做法遵循的公共卫生伦理原则是
- A. 社会公正原则  
B. 信息公开原则  
C. 社会公益原则  
D. 互助协同原则  
E. 全民参与原则
98. 李某系县医院内科主治医师, 在执业活动中因有违反《抗菌药物临床应用管理办法》规定的情形, 被医院取消了抗菌药物处方权。该情形是
- A. 使用非限制使用级抗菌药物  
B. 紧急情况下未经批准越级使用抗菌药物  
C. 抗菌药物考核不合格  
D. 使用限制使用级抗菌药物  
E. 未参加抗菌药物规范化培训
99. 女, 30 岁。因胸闷、胸痛到某医院做冠状动脉 CT 检查, 注射造影剂后患者立即出现休克, 经抢救无效死亡, 医患双方发生纠纷。后经鉴定, 认为患者死亡系临床中极为少见的造影剂过敏所致。根据《医疗事故处理条例》, 该事件性质属于
- A. 医疗事故, 医方承担主要责任  
B. 医疗意外, 医方不承担责任  
C. 医疗事故, 医方承担轻微责任  
D. 医疗事故, 医方承担全部责任  
E. 医疗事故, 医方承担次要责任
100. 女孩, 10 岁。全身水肿 2 周。尿蛋量 4.5g/24h, 血浆白蛋白 20g/L, 血脂升高行肾脏穿刺活检, 光镜下肾小球未见异常。电镜下肾小球最可能的病理变化是
- A. 脏层上皮细胞足突消失  
B. 系膜区电子致密物沉积  
C. 上皮下驼峰样电子致密物沉积  
D. 基底膜弥漫性增厚  
E. 基底膜内电子致密物沉积
101. 男, 70 岁。咳嗽、咳痰、喘息 10 余年, 再发加重 2 周。查体: 双肺底部可闻及少许湿啰音, 动脉血气分析: pH 7.30, PaCO<sub>2</sub> 70mmHg, PaO<sub>2</sub> 46mmHg。入院后立即给予持续低流量鼻导管吸氧。采取此吸氧方式最重要的目的是
- A. 保持 CO<sub>2</sub> 对呼吸中枢的刺激  
B. 保持低氧及 CO<sub>2</sub> 对呼吸中枢的刺激  
C. 保持低氧对呼吸中枢的刺激  
D. 保持 CO<sub>2</sub> 对颈动脉体化学感受器的刺激  
E. 保持低氧对颈动脉体化学感受器的刺激
102. 女, 27 岁。因分娩大出血急需输血。当地血站距医院较远无法及时提供, 其他医院也无血液可供调剂。医院按照临时采血规程和技术标准采集血液, 挽救了患者生命。事后医院依法在规定时间内向当地卫生行政部门进行了报告, 该时限是
- A. 15 天  
B. 5 天  
C. 1 天  
D. 10 天  
E. 3 天
103. 男, 70 岁。被诊断为抑郁障碍。某天得知其一位老朋友是心理治疗师, 心想熟人好办事, 遂向其求助, 但却遭到了拒绝。该心理治疗师拒绝提供服务所依据的心理治疗
- A. 回避原则  
B. 中立原则  
C. 真诚原则  
D. 耐心原则  
E. 保密原则
104. 某乡有 4 万人, 约 1 万户。欲抽样调查 4 000 人, 按该乡家庭人口登记名册, 以户为单位, 随机抽取第 1 户, 随后每间隔 10 户再抽取 1 户, 对被抽到的家庭进行调查。这种抽样方法称为
- A. 单纯随机抽样

- B. 系统抽样  
C. 整群抽样  
D. 多级抽样  
E. 分层抽样
105. 欲描述某省 2010 年鼻咽癌患者的职业构成情况,宜绘制的统计图是  
A. 普通线图  
B. 半对数线图  
C. 直方图  
D. 直条图  
E. 圆图
106. 男,50 岁。突发车祸,急诊就医。查体:右足下垂和足背外侧感觉消失。X 线片示右胫、腓骨多段骨皮质不连续。该病变最可能损伤的神经是  
A. 闭孔神经  
B. 股神经  
C. 腓总神经  
D. 隐神经  
E. 胫神经
107. 男,12 岁。因注意力不集中、学习困难而求助心理治疗师。心理治疗师给他一些散乱的木块,要求其尽可能快地将这些木块拼成一个物件。这种心理测验属于  
A. 言语测验  
B. 操作测验  
C. 问卷测验  
D. 主观测验  
E. 投射测验
108. 女,60 岁。突发右小腿疼痛 2 天。既往脑梗死 3 年,长期卧床。查体:右小腿肿胀且有深压痛。B 超显示腓静脉血栓形成。血液回流受阻可能性最大的血管是  
A. 小隐静脉  
B. 大隐静脉  
C. 股内侧浅静脉  
D. 旋髂浅静脉  
E. 股外侧浅静脉
109. 男,50 岁。反复咳嗽、咳痰 5 年余,咳白色黏痰,晨起明显,受凉后加重,秋冬季症状明显。本次加重 3 天,吸烟史 10 余年,约 20 支/天,饮酒史 20 余年,其支气管黏膜活检最主要的炎症细胞是  
A. 嗜酸性粒细胞  
B. 淋巴细胞  
C. 中性粒细胞  
D. 巨噬细胞  
E. 肥大细胞
110. 男,35 岁。反复发热、头痛伴消瘦 3 个月。查体:颈抵抗(+),双侧克氏征(-)。实验室检查:结核感染 T 细胞检测(+),脑脊液抗酸染色(+)。胸部 CT 示双肺多发斑点、小结节影(双上肺为著)。给予异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇四联治疗。若患者长期应用上述四联治疗,最可能缺乏的维生素是  
A. 维生素 B<sub>2</sub>  
B. 维生素 B<sub>12</sub>  
C. 维生素 B<sub>1</sub>  
D. 维生素 B<sub>6</sub>  
E. 维生素 B<sub>3</sub>
111. 男,50 岁。呕血、黑便 1 天。乙肝病史 20 年。查体:P 112 次/分, BP 85/55mmHg。可见蜘蛛痣、肝掌,结膜苍白,巩膜黄染。腹膨隆,腹壁静脉曲张,肝肋下未触及,脾肋下 1cm,质软,移动性浊音(+)。该患者呕血、黑便最可能的原因是  
A. 溃疡型胃癌  
B. 急性胃炎  
C. 慢性胃溃疡癌变  
D. 应激性溃疡  
E. 食管胃底静脉曲张破裂
112. 女,35 岁。双睑下垂 9 个月,吞咽困难、言语不清 3 个月。新斯的明试验阳性,胸部 CT 示胸腺增生。自身抗体在该病病理过程中所识别的抗原是  
A. 内啡肽  
B. 乙酰胆碱  
C. 内啡肽受体  
D. 脑啡肽受体  
E. 乙酰胆碱受体
113. 为探索胃癌发病的危险因素,研究者选择 2015 年 3 月至 2016 年 3 月间确诊的胃癌患者 206 例,同时选取与病例同性别、年龄相近、居住在同村的非肿瘤居民 206 名进行调查,设研究属于  
A. 队列研究  
B. 社区试验研究  
C. 病例对照研究  
D. 临床试验研究  
E. 现况调查
114. 男,35 岁。劳累时突发胸痛 6 小时,喘憋,不能平卧。既往体健。查体:T 37.2℃, P 110 次/分, R 26 次/分, BP 100/70mmHg。双肺可闻及细湿啰音,心律齐,心电图示 I、aVL、V<sub>1</sub>~V<sub>6</sub> 导联 ST 段弓背向上抬高。患者喘憋的主要生理异常是  
A. 体力或精神负担过大

- B. 心肌收缩力下降  
C. 肺部感染  
D. 心脏后负荷增加  
E. 心脏前负荷增加
115. 某研究员在其发表的一篇文章中使用了他人的部分图表及数据,但未加注明,后被杂志社撤稿。该研究员的做法违背的医学科研伦理要求是  
A. 知情同意  
C. 知识公开  
E. 团结协作  
B. 敢于怀疑  
D. 诚实严谨
116. 男,75 岁。腹胀、便秘、食欲不振半年,无腹痛、腹泻、便血,无呕吐,既往体健。查体:T 36.5℃,P 80 次/分,R 18 次/分,BP 140/80mmHg,双肺呼吸音清,心律齐,腹软,无压痛,Murphy 征阴性,腹部 B 超提示胆囊萎缩。可能受影响的情况是  
A. 蛋白质分解  
B. 单糖吸收  
C. 脂肪分解产物吸收  
D. 蛋白质分解产物吸收  
E. 淀粉类食物消化分解
117. 女婴,10 个月。由母亲抱至儿童保健门诊接受常规体检。护士教其母亲抚爱孩子的方法和频率,并告知建立依恋关系和防止分离焦虑的重要性。此时护士所依据的婴幼儿期心理卫生的原则是  
A. 促进运动能力  
B. 促进大脑发育  
C. 增进母爱  
D. 母乳喂养  
E. 充足的睡眠
118. 男,53 岁。在最近的一次体检中发现背部皮下有一黄豆大小的包块,体检报告建议他去相关科室进一步检查。专科检查后,告诉他不是大问题,如不放心可以观察一段时间,看此包块是否增大再作处理。为此患者吃不下饭、睡不好觉,出现了焦虑反应。调整其不良情绪的方法中,不恰当的为  
A. 调整期望目标  
B. 改变生活环境  
C. 学习放松方法  
D. 改变认知方式  
E. 应用心理防御
119. 女,30 岁。自服安定药 100 粒,由家属送入院。查体:意识模糊,言语不清,四肢肌力差。血气分析:PaO<sub>2</sub> 49mmHg, PaCO<sub>2</sub> 53mmHg。引起该患者血气变化的主要机制是  
A. 通气/血流比例升高  
B. 阻塞性通气功能障碍  
C. 弥散功能  
D. 解剖分流增加  
E. 肺泡通气量下降
120. 女,55 岁。进行性加重的双手笨拙和走路不稳 2 年,每天饮用黄酒 3 两已 30 余年。其父亲有类似症状。查体:神志清楚,肢体肌张力降低,四肢肌力 5 级,痛觉和关节位置觉正常,病理征未引出。指鼻试验阳性,轮替动作不能,醉酒步态。该患者的病变部位最可能是  
A. 运动皮质  
B. 基底节  
C. 中脑  
D. 脑桥  
E. 小脑
121. 调查某地区 200 名女大学生的血清总蛋白含量,其均数为 75.7g/L 标准差 3.1g。算得 95% 参考值范围为(69.62,81.78)g/L,则该地区大约有  
A. 95% 女大学生血清总蛋白含量高于 69.62g/L  
B. 5% 女大学生血清总蛋白含量低于 81.78g/L  
C. 2.5% 女大学生血清总蛋白含量高于 69.62g/L  
D. 2.5% 女大学生血清总蛋白含量高于 81.78g/L  
E. 5% 女大学生血清总蛋白含量低于 69.62g/L
122. 患者因原发性醛固酮增多症住院治疗,科室医护人员在其床头卡上的姓名标注为“原醛症”。医护人员的做法违背的医学伦理学基本原则是  
A. 尊重原则  
B. 不伤害原则  
C. 公益原则  
D. 公正原则  
E. 有利原则
123. 女,23 岁。遵医嘱需肌内注射,在注射室内尚有男患者时,护士让该患者露出臀部进行注射,引起她的不满,护士则认为来看病就无须避嫌。该护士的观点和做法违背的伦理原则  
A. 公正原则  
B. 尊重原则  
C. 不伤害原则  
D. 公益原则  
E. 有利原则
124. 男,35 岁。CT 检查:纵隔的后下部有一 5cm × 3cm 的边界清晰的肿块。手术切除该肿块时最可能损伤的后纵隔结构是  
A. 主动脉弓  
B. 胸腺  
C. 胸交感干  
D. 膈神经  
E. 上腔静脉

125. 男, 50 岁。转移性右下腹痛伴发热 2 天。糖尿病病史 10 年。查体: T 38.5°C, P 110 次/分, R 20 次/分, BP 130/90mmHg。血常规 WBC  $19.2 \times 10^9/L$ , N 0.91。给予补液、抗感染治疗。入院 2 小时后患者出现腹痛加重伴烦躁不安。T 40°C, P 132 次/分, R 28 次/分, BP 75/50mmHg, 全腹肌紧张, 板状腹。该患者最可能发生的休克是
- A. 神经源性休克  
B. 心源性休克  
C. 失血性休克  
D. 感染性休克  
E. 过敏性休克
126. 女, 65 岁。左手示指外伤后 11 天, 肌肉痉挛 3 天。查体: 神志清, 查体合作, 苦笑面容。左手示指指尖可见伤口, 已结痂。最可能感染的病原体是
- A. 破伤风梭菌  
B. 金黄色葡萄球菌  
C. 产气荚膜梭菌  
D. 艰难梭菌  
E. 大肠埃希菌
127. 男, 16 岁。在一次考试中成绩很差, 使他很受打击、情绪低落。老师告诉他没关系, 这次考试只是一次阶段性考核, 还可以通过复习将不会的知识点搞清楚, 该生的情绪因此得到很大改善。导致其情绪改善的主要原因是
- A. 改变了认知  
B. 调整了防御方式  
C. 改变了环境  
D. 增强了意志  
E. 学会了放松
128. 某医疗机构发现 1 例鼠疫患者, 其病情特殊, 传染性明显高于以往, 医师怀疑发生菌株变异, 计划将该菌株送往上级实验室进一步研究。关于该菌株的运输说法正确的是
- A. 经省级卫生行政部门批准后方可运输  
B. 在疾病预防控制机构指导下由医疗机构送往上级实验室  
C. 由医疗机构和上级实验室共同委托第三方运输  
D. 由医疗机构直接送往上级实验室  
E. 由上级实验室自行来采取
129. 女, 62 岁。间断咳嗽, 咳少量白黏痰 10 年。查体: 双肺呼吸音粗, 未闻及干湿性啰音。血常规正常。胸部 X 线片示肺纹理增粗紊乱, 肺功能示 FEV<sub>1</sub> 占预计值 83%, FEV<sub>1</sub>/FVC = 67% (舒张后)。该患者最可能的诊断是
- A. 支气管哮喘  
B. 特发性肺纤维化  
C. 支气管肺结核  
D. 慢性阻塞性肺疾病  
E. 支气管扩张

## A3/A4 型选择题 (130—138 题)

## 答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

## (130—132 题共用题干)

男, 48 岁。因右胫骨平台骨折术后软组织感染 1 月余入院治疗。骨科主治医师王某建议进行专家会诊。会诊后决定采用保守治疗, 既避免手术治疗造成软组织的进一步损伤, 又能节约费用。治疗期间患者经常出现紧张、焦虑, 害怕出现组织坏死甚至截肢等严重后果, 影响睡眠和康复。

130. 针对该患者的紧张焦虑, 最适合的心理干预技术是
- A. 冲击  
B. 梦的分析

- C. 厌恶疗法  
D. 系统脱敏法  
E. 放松训练

131. 本案例中, 专家会诊决定的治疗方案体现的临床诊断伦理原则是

- A. 保密守信原则  
B. 患者至上原则  
C. 公平公正原则  
D. 知情同意原则  
E. 最优化原则

132. 骨科主治医师应当对患者实施的医学措施是

- A. 精神障碍治疗  
B. 心理健康指导

- C. 精神障碍鉴定
- D. 精神障碍诊断
- E. 精神障碍检查

(133—135 题共用题干)

某医师进行一项随机对照临床试验,以观察三种降血糖药物 A、B、C 的临床疗效,结果如下表。

三种药物的临床疗效

药物合计	有效	无效
A 120	99	21
B 119	78	41
C 120	77	43

133. 该资料的类型为
- A. 多项有序分类资料
  - B. 定量资料
  - C. 等级资料
  - D. 二项分类资料
  - E. 多项无序
134. 该研究设计方案的类型为
- A. 配对设计
  - B. 队列研究
  - C. 随机区组设计
  - D. 病例对照研究
  - E. 完全随机设计
135. 若要判断 A、B、C 三种药物降血糖的效果是否不同,应选用的统计分析方法是
- A. 秩和检验
  - B. 直线回归分析
  - C. t 检验
  - D. F 检验

- E.  $\chi^2$  检验

(136—138 题共用题干)

女,28 岁。妊娠 2 个月,到某大学附属医院妇产科接受人工流产手术,接诊医师在给患者检查时,旁边有 10 多位男女见习医学生。患者要求见习医学生出去,被接诊医师拒绝,随后医师边操作边给医学生讲解。术后患者质问医师为何示教未事先告知,医师认为患者在医院无隐私,后患者以隐私权被侵犯为由,要求当地卫生行政部门进行处理。

136. 基于该案例,下列说法符合伦理的是
- A. 临床教学观摩应征得患者同意
  - B. 患者应无条件配合接诊医师的教学工作
  - C. 对于不接受临床示教的患者不应做人工流产手术
  - D. 教学医院的患者没有拒绝临床教学观摩的权利
  - E. 教学医院就诊的患者没有要求保护隐私的权利
137. 基于该案例,该患者就诊期间未被满足的心理需要为
- A. 尊重的需要
  - B. 生理的需要
  - C. 归属与爱的需要
  - D. 自我实现的需要
  - E. 安全的需要
138. 基于该案例,卫生行政部门给予当事医师警告处分。处分的依据是
- A. 医师法
  - B. 药品管理法
  - C. 行政处罚法
  - D. 母婴保健法
  - E. 精神卫生法

B1 型选择题 (139—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(139—140 题共用备选答案)

- A. 急性巨核细胞白血病
- B. 急性单核细胞白血病

- C. 急性早幼粒细胞性白血病
- D. 急性粒细胞白血病部分分化型
- E. 急性淋巴白血病

139. 细胞化学染色变现为髓过氧化物酶( + + + )、糖原染色( - )的疾病是

140. 细胞化学染色变现为非特异性( + ),可被氟化钠抑制的疾病是

(141—142 题共用备选答案)

- A. 尿细菌培养加药物敏感试验
- B. 尿红细胞形态分析
- C. 尿脱落细胞检查
- D. 尿道分泌物涂片
- E. 尿液成分分析

141. 有助于肾小球肾炎诊断的检查是

142. 有助于膀胱肿瘤诊断的检查是

(143—144 题共用备选答案)

- A. 血尿
- B. 肾小球酸中毒
- C. 白蛋白尿
- D. 白细胞尿
- E. 肾性糖尿

143. 糖尿病肾病多表现为

144. 微小病变型肾病多表现为

(145—146 题共用备选答案)

- A. 窦性心动过缓
- B. 室性早搏
- C. 房室传导阻滞
- D. 体位性低血压
- E. 房颤

145. 糖尿病治疗神经病变可引起

146. 甲亢心脏病最常见的心律失常

(147—148 题共用备选答案)

- A. 直腿抬高试验
- B. 拾物试验
- C. Mills 征
- D. Hoffmann 征
- E. 抽屉试验

147. 对于腰椎结核诊断有意义的是

148. 对交叉韧带损伤诊断有意义的是

(149—150 题共用备选答案)

- A. NYHA 分级Ⅲ级
- B. Killip 分级Ⅱ级
- C. NYHA 分级Ⅱ级
- D. Killip 分级Ⅲ级
- E. 前临床心衰阶段

149. 女,65岁。持续胸痛6小时,伴呼吸困难,不能活动。查体:BP 150/70mmHg,双肺底可闻及少量湿啰音,心率104次/分,心律齐。心电图示I、aVL、V<sub>1</sub>~V<sub>6</sub>导联ST段抬高约0.2~0.6mV。该患者的心功能分级是

150. 男,65岁。6个月前急性前壁心肌梗死,5个月来呼吸困难逐渐加重,稍活动即感气喘。查体:BP 130/60mmHg,双肺底可闻及多量细湿啰音,可随体位变化,心率90次/分,心律齐。该患者的心功能分级是



## 第二单元

### A1 型选择题(1—53 题)

#### 答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 隐睾最严重的后果是
  - A. 睾丸扭转
  - B. 睾丸炎
  - C. 不育
  - D. 睾丸恶变
  - E. 睾丸萎缩
2. 肾病综合征的诊断标准不包括
  - A. 血清白蛋白  $< 30\text{g/L}$
  - B. 高血压
  - C. 水肿
  - D. 高脂血症
  - E. 尿蛋白  $> 3.5\text{g}/24\text{h}$
3. 抗利尿激素来源于
  - A. 腺垂体
  - B. 下丘脑的视上核和室旁核
  - C. 垂体柄中间部
  - D. 神经垂体
  - E. 漏斗部
4. 流行性脑脊髓膜炎病原体的特点是
  - A. 革兰染色阳性双球菌
  - B. 革兰染色阴性双球菌
  - C. 革兰染色阳性杆菌
  - D. 革兰染色阴性弧菌
  - E. 革兰染色阴性杆菌
5. 成人股骨头最主要的血供来源是
  - A. 干骺端上侧动脉
  - B. 股骨干滋养动脉分支
  - C. 髂外侧动脉
  - D. 圆韧带内的小凹动脉
  - E. 干骺端下侧动脉
6. 颈静脉过度充盈并于深呼吸气时更明显,最可能的原因是
  - A. 全心衰竭
  - B. 左心衰竭
  - C. 上腔静脉血栓形成
  - D. 肥厚型梗阻性心脏病
  - E. 心包积液
7. 阵发性室上性心动过速的根治措施
  - A. 直流电复律
  - B. 经食道超速起搏
  - C. 口服长效  $\beta$  受体拮抗剂
  - D. 口服长效维拉帕米
  - E. 射频消融术
8. 孟氏 (Monteggia) 骨折的 X 线
  - A. 桡骨干下 1/3 骨折合并尺骨
  - B. 尺骨干上 1/3 骨折合并下尺骨
  - C. 尺骨干上 1/3 骨折合并桡骨
  - D. 尺骨干下 1/3 骨折合并桡骨
  - E. 桡骨干上 1/3 骨折合并尺骨
9. 下列引起白细胞减少的疾病,发病机制不属于粒细胞破坏或消耗的是
  - A. 脾功能亢进
  - B. 类风湿性关节炎
  - C. 系统性红斑狼疮
  - D. 巨幼细胞贫血
  - E. 败血症
10. 与胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤(胃 MALT 淋巴瘤)发病有关的感染是
  - A. Hp 感染
  - B. HPV 感染
  - C. HIV 感染
  - D. EBV 感染
  - E. HTLV - I 感染
11. 下列不属于缺铁性贫血患者组织缺铁表现的是

- 
- A. 口角炎、舌炎  
B. 毛发干枯、脱落  
C. 匙状甲  
D. 心悸、气短  
E. 异食癖
12. 常规血液透析的禁忌证是  
A. 肺部感染  
B. 新发脑出血  
C. 急性左心衰竭  
D. 糖尿病  
E. 高血压
13. 男性外伤所致骨盆骨折易发生  
A. 精囊损伤  
B. 膀胱损伤  
C. 尿道球部损伤  
D. 输尿管损伤  
E. 后尿道损伤
14. 甲状腺激素不足可引起  
A. 巨人症  
B. 单纯性甲状腺肿  
C. 肢端肥大症  
D. 黏液性水肿  
E. 矮小症
15. 发现有人晕倒时,确认所处环境安全后应立即采取的措施是  
A. 进行胸外按压  
B. 行人工呼吸  
C. 报警  
D. 大声呼叫救援  
E. 判断意识是否清楚
16. 易逆性抗胆碱酯酶药的作用为  
A. 与 AchE 形成二甲胺基甲酰化复合物  
B. 生成更为稳定的单烷氧基磷酰 AchE  
C. 与 AchE 形成磷酰化复合物  
D. 药物可引起 AchE 明显“老化”  
E. 形成磷酰化复合物不能自行水解
17. 髌关节后脱位的常见体征  
A. 髌关节外旋  
B. 髌关节伸直  
C. 髌关节外展  
D. 患肢延长  
E. 大转子移位
18. 单纯二尖瓣狭窄患者发生活动后心悸,呼吸困难的主要机制是  
A. 左心室射血阻力增大  
B. 左心房排血受阻  
C. 左心室收缩力降低  
D. 左心室容量负荷过重  
E. 血容量增多
19.  $\beta$  肾上腺素受体阻断药的药理作用是  
A. 加快房室传导  
B. 减慢心率  
C. 松弛支气管平滑肌  
D. 迅速增强心肌收缩力  
E. 增加脂肪分解
20. 治疗不稳定型心绞痛不恰当的措施是  
A. 静脉滴注尿激酶  
B. 皮下注射低分子肝素  
C. 口服阿司匹林  
D. 口服阿托伐他汀  
E. 静脉滴注硝酸异山梨酯
21. 下列疾病导致左心室前负荷增加的是  
A. 肺动脉高压  
B. 二尖瓣狭窄  
C. 高血压  
D. 肺动脉瓣狭窄  
E. 主动脉瓣关闭不全
22. 下列不属于急性一氧化碳中度中毒表现的是  
A. 判断力降低  
B. 腹痛  
C. 运动失调  
D. 视物模糊  
E. 全身乏力
23. 口服药物被肠壁和肝脏代谢后进入体循环的药量明显减少的现象称为  
A. 重吸收  
B. 首过消除  
C. 首剂效应  
D. 生物转化  
E. 肠肝循环
24. 下列表现最能提示非肾小球源性血尿的是  
A. 尿红细胞呈多形性  
B. 红细胞形态均一  
C. 尿沉渣见红细胞管型  
D. 没有血凝块  
E. 没有肉眼血尿

25. 溢出性蛋白尿的主要成分为
- A. IgG
  - B. 单克隆轻链蛋白
  - C. 白蛋白
  - D.  $\beta_2$  微球蛋白
  - E. Tamm - Horsfall 蛋白
26. 对诊断甲状腺破坏所致甲状腺毒症有重要意义的表现是
- A. 甲状腺肿大
  - B. 血  $T_3$ 、 $T_4$   $\uparrow$ ，甲状腺摄 $^{131}\text{I}$ 率明显 $\downarrow$
  - C. 血  $T_3$ 、 $T_4$   $\uparrow$ ，甲状腺摄 $^{131}\text{I}$ 率明显 $\uparrow$
  - D. TgAb 与 TPOAb 常明显 $\uparrow$
  - E. TSH 明显 $\downarrow$
27. 下列属于冠状动脉粥样硬化性心脏病主要危险因素的是
- A. 脑力劳动者
  - B. 生活节奏感
  - C. 肥胖
  - D. 进取心强
  - E. 长期饮酒
28. 最容易出现缺血性骨坏死的骨折是
- A. 股骨颈骨折
  - B. 股骨转子间骨折
  - C. 胫骨干骨折
  - D. 桡骨远端骨折
  - E. 肱骨外科颈骨折
29. 脊髓型颈椎最常见的临床表现
- A. 恶心呕吐
  - B. 四肢无力，行走及持物不稳
  - C. 眩晕，头痛
  - D. 颈肩痛，压头试验阳性
  - E. 猝倒，视觉障碍
30. 肾挫伤的急诊处理是
- A. 肾修补
  - B. 留置导尿
  - C. 手术探查
  - D. 肾穿刺引流
  - E. 严密观察，暂保守治疗
31. 下列最符合心脏压塞诊断的是
- A. 心浊音界向两侧扩大
  - B. 胸闷，气短症状
  - C. 胸骨左缘第 3、4 肋间闻及刮擦样音
  - D. Ewart 征
  - E. 心音遥远、脉压小，颈静脉怒张、低血压
32. 胫骨中段闭合性骨折发生骨筋膜室综合征，处理不当常造成的严重后果为
- A. 创伤性关节炎
  - B. 损伤性骨化
  - C. 缺血性骨坏死
  - D. 急性骨萎缩
  - E. 缺血性肌挛缩
33. 目前我国发生肝衰竭的最重要的病因是
- A. 遗传
  - B. 酒精
  - C. 病毒
  - D. 药物
  - E. 免疫
34. 单纯肩关节前脱位手法复位后应立即采取的措施是
- A. 持续牵引
  - B. 三角巾悬吊
  - C. 肩关节功能锻炼
  - D. 石膏外固定
  - E. 夹板外固定
35. 治疗右心室梗死所致低血压的最关键措施是
- A. 扩张冠状动脉
  - B. 利尿治疗
  - C. 补充血容量
  - D. 控制心室率
  - E. 强心治疗
36. 我国 75 岁以下人群心力衰竭的主要病因是
- A. 高血压
  - B. 心房颤动
  - C. 冠心病
  - D. 心脏瓣膜病
  - E. 心肌病
37. 肾小球疾病最主要的发病机制是
- A. 肾小球高灌注
  - B. 高血压
  - C. 过敏反应
  - D. 血脂异常
  - E. 免疫异常
38. 主动脉瓣狭窄的杂音特点是
- A. 递增型
  - B. 递减型
  - C. 一贯型
  - D. 先增强后减弱

- E. 先减弱后增强
39. B系急性淋巴细胞白血病(B-ALL)最常出现的免疫分子标志是
- A. CD2  
B. CD34  
C. CD19  
D. CD38  
E. CD7
40. 关于急性乳腺炎的预防,下列正确的是
- A. 避免乳汁淤积  
B. 使用抗生素  
C. 局部冷敷  
D. 切开引流  
E. 婴儿含乳头睡觉
41. 慢性肺心病最常见的酸碱失衡类型是
- A. 代谢性酸中毒  
B. 代谢性碱中毒  
C. 呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒  
D. 呼吸性碱中毒  
E. 呼吸性酸中毒
42. 支气管哮喘患者发作时禁用的药物是
- A. 吗啡  
B. 氨茶碱  
C. 沙丁胺醇  
D. 泼尼松  
E. 肾上腺素
43. 下列哪一个脏器通常不发生凝固性坏死
- A. 子宫  
B. 肠  
C. 肾  
D. 脑  
E. 肺
44. 中年女性,胃癌术后7天。术后出现左下肢肿胀,骨伤痛明显
- A. 大隐静脉曲张  
B. 深静脉瓣膜功能不全  
C. 血栓性脉管炎  
D. 下肢动脉硬化  
E. 深静脉血栓形成
45. 贫血性梗死常见于
- A. 肺、脾  
B. 脑、心  
C. 肾、肝  
D. 肠、肺  
E. 心、肾、脑和脾
46. 药物副反应是指
- A. 在剂量过大或药物在体内蓄积过多时发生的不良反应  
B. 停药后血药浓度已降至阈浓度以下时残存的药
- 理效应
- C. 药物除治疗目的之外的其他作用  
D. 反应性质与药物原有效应无关用药理拮抗药解救无效  
E. 类先天遗传异常所致的反应
47. 慢性阻塞性肺疾病最主要的病理生理特征是
- A. 气道结构重塑  
B. 肺泡通气量下降  
C. 持续性气流受限  
D. 肺泡弹性回缩力减退  
E. 明显的肺外效应
48. 下列疾病所致的肺动脉高压中最主要由低氧血症所致的是
- A. 肺血栓栓塞  
B. 结缔组织病  
C. COPD  
D. 特发性肺动脉高压  
E. 心源性肺水肿
49. COPD 气道炎症最主要的效应细胞是
- A. 肥大细胞  
B. 嗜酸性粒细胞  
C. 中性粒细胞  
D. 巨噬细胞  
E. 淋巴细胞
50. 停药后血浆中药物浓度虽已降至阈浓度以下时仍显现的药理作用称为
- A. 耐受性  
B. 后遗效应  
C. 特异质反应  
D. 副作用  
E. 停药反应
51. 下列哪项不是精神分裂症的临床表现
- A. 被控制感  
B. 强制性思维  
C. 幻觉  
D. 意识障碍  
E. 影响妄想
52. 激活胰液中胰蛋白酶原的是
- A. 脂肪酸  
B. 胆盐  
C. 蛋白水解产物  
D. 肠激酶  
E. 糜蛋白酶
53. 激活糜蛋白酶原的是
- A. 肠致活酶  
B. 胰蛋白酶  
C. 盐酸  
D. 组胺  
E. 辅酯酶

A2 型选择题 (54—110 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

54. 男,28 岁,阵发性心悸,头痛,大汗 3 月余,多在体位变化,情绪激动时发作,体重减轻约 5kg,发作时面色苍白,多汗,血压最高时达 230/120mmHg,心率 96 次/分,静注酚妥拉明后 1 分钟血压可降至 150/100mmHg,肾上腺 CT 示右肾上腺有一直径约 5cm 类球形占位。最可能的诊断是
- A. 原发性醛固酮增多症  
B. 甲状腺功能亢进  
C. 嗜铬细胞瘤  
D. 肾病综合征  
E. 库欣综合征
55. 男,17 岁。双下肢出血点伴关节痛 2 周,水肿 1 周。实验室检查:尿红细胞 30 ~ 40/HP,尿蛋白 4.2g/d,血浆白蛋白 28g/L,肾免疫病理示 IgA 沉积于系膜区,其病因诊断为
- A. IgA 肾病  
B. 狼疮肾炎  
C. 过敏性紫癜肾炎  
D. 乙肝病毒相关性肝炎  
E. 原发性肾病综合征
56. 某患者术后禁食 3 天,仅从静脉输入大量 5% 葡萄糖液维持机体需要,此患者最容易发生
- A. 高血钾                      B. 低血钾  
C. 高血钠                      D. 高血钙  
E. 低血钙
57. 女,20 岁。发作性呼吸困难 3 年,曾肺功能检查诊断:“支气管哮喘”,控制使用吸入糖皮质激素 + 长效  $\beta_2$  受体激动剂,3 天来症状加重,连续吸入短效  $\beta_2$  受体激动剂效果欠佳。此时患者应首先采取的措施是
- A. 再次吸入糖皮质激素 + 长效  $\beta_2$  受体激动剂  
B. 继续吸入短效  $\beta_2$  受体激动剂  
C. 口服糖皮质激素  
D. 口服氨茶碱  
E. 口服抗生素
58. 女,62 岁。反复咳嗽、喘息 15 年,1 个月前搬入新居后再发加重。口服茶碱类药物有所缓解。查体:双肺呼吸音低,呼气相延长。胸部 X 线片未见明显异常,肺功能检查示  $FEV_1/FVC = 56%$ ,舒张试验示  $FEV_1$  改善率 12%。该患者应首先考虑的诊断是
- A. 慢性阻塞性肺疾病  
B. 支气管哮喘  
C. 慢性充血性心力衰竭  
D. 过敏性肺炎  
E. 嗜酸性粒细胞性支气管炎
59. 男,30 岁。反酸、烧心 2 个月。无吞咽困难,大便正常。查体:无贫血貌,腹部查体未见异常。予奥美拉唑治疗,应用该药的目的是
- A. 通过抑制胃泌素分泌,抑制胃酸分泌  
B. 通过拮抗胆碱受体,抑制胃酸分泌  
C. 中和胃酸,提高胃内 pH 值  
D. 通过拮抗  $H_2$  受体,抑制胃酸分泌  
E. 通过抑制  $H^+ - K^+ - ATP$  酶,抑制胃酸分泌
60. 男,45 岁。HBsAg 阳性 10 年,乏力、纳差、尿黄 7 天。查体:巩膜中度黄染,肝肋下 1cm,质软。实验室检查:ALT 460U/L, TBil 84 $\mu$ mol/L, HBV - DNA  $6.2 \times 10^6$  拷贝/ml,抗 HAVIgM(-),抗 HEV(-),抗 HCV(-)。该患者最重要的治疗药物是
- A. 替诺福韦酯  
B. 利巴韦林  
C. 促肝细胞生长素  
D. 异甘草酸美注射液  
E. 茵栀黄口服液
61. 男,60 岁。剧烈胸痛 2.5 小时。心电图示 II、III、aVF、 $V_5 \sim V_6$  导联 ST 段弓背向上抬高 0.4mV,此时最可能升高的实验室检查指标是
- A. 肌钙蛋白 I  
B. 天门冬氨酸氨基转移酶  
C. 乳酸脱氢酶  
D. 肌酸激酶同工酶  
E. 肌红蛋白
62. 男,20 岁。因躁狂发作入院,表现为动作增多,语速加快,滔滔不绝,言语夸大,好管闲事。入院后

给予口服碳酸锂 1.0g/d,2 天后出现恶心、呕吐、和轻微手抖,无意识障碍。应立即采取的措施是

- A. 血液透析  
B. 停药,检查血锂浓度  
C. 行胃镜检查  
D. 加用卡马西平  
E. 洗胃
63. 女,20 岁。1 周前出现发热,鼻塞伴乏力,T 38℃ 左右,轻度咳嗽,无痰咳,3 天前感活动时憋气、心悸,症状逐渐加重,既往体健。查体:T 37.2℃,BP 90/70mmHg,双肺可闻及湿啰音,心脏轻度向左扩大,心率 120 次/分,心律齐,S<sub>1</sub> 减弱,可闻及奔马律。血 cTn I (+)。最可能的诊断是
- A. 急性心肌梗死  
B. 急性心包炎  
C. 肺炎  
D. 病毒性心肌炎  
E. 扩张型心肌病
64. 女,15 岁。肉眼血尿伴水肿 1 周。20 天前患皮肤脓疱疮,抗感染治疗好转。查体:BP 150/90mmHg,颜面及双下肢水肿。实验室检查:血 Hb 112g/L,WBC 6.8 × 10<sup>9</sup>/L,N 0.70,SCr 130μmol/L,ASO 滴度升高,C3 降低。尿沉渣镜检 RBC 满视野,WBC 5~8/HP。尿蛋白(+++)。最可能的诊断是
- A. 肾病综合征  
B. 急进性肾小球肾炎  
C. 急性肾盂肾炎  
D. 急性肾小球肾炎  
E. IgA 肾病
65. 男,20 岁。踢球时突然过性意识丧失,后自行恢复。发作时无四肢抽搐和口吐白沫。超声心动图示舒张期室间隔与后壁厚度之比为 1.7,SAM 现象阳性。该患者意识丧失最可能的原因是
- A. 血管迷走性晕厥  
B. 体位性低血压  
C. 肥厚型梗阻性心肌病  
D. 限制型心肌病  
E. 瘰疬
66. 男,80 岁。高血压病史 10 余年,长期服用钙通道阻滞剂,1 个月前因血压控制不满意加用美托洛尔 25mg bid,近 1 周觉乏力、倦怠、间断黑矇。查体:BP 110/70mmHg,心率 50 次/分,心律不齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音。心电图示 PR 间期逐渐延长直至 QRS 波群脱落,最恰当的处理是
- A. 将美托洛尔调整为 25mg qd  
B. 将美托洛尔调整为 12.5mg bid  
C. 植入永久起搏器  
D. 停用美托洛尔  
E. 将美托洛尔更换为地尔硫革 30mg tid
67. 男孩,2 岁。车祸受伤致左大腿疼痛、活动明显受限 2 小时。查体:左大腿中段肿胀,异常活动。X 线片示左股骨中段骨不连续,重叠 2cm,向外成角 5°,无明显旋转。最适宜的治疗方法是
- A. 切开复位内固定  
B. 小夹板外固定  
C. 垂直悬吊牵引  
D. 石膏外固定  
E. 闭合复位内固定
68. 男,50 岁,湖北渔民。腹胀、乏力、纳差 3 年,尿少、全身浮肿 1 个月。无饮酒史及病毒性肝炎史。查体:T 36.2℃,慢性病容,消瘦,巩膜无黄染,有蜘蛛痣,腹膨隆,脾肋下平脐,腹水征(+),下肢凹陷性水肿。最可能的诊断是
- A. 丙肝肝硬化  
B. 结核性腹膜炎  
C. 乙型肝炎肝硬化  
D. 血吸虫病  
E. 结肠癌
69. 男,60 岁。无痛性肉眼血尿 2 个月,尿中偶有血块,伴膀胱刺激症状。B 超见膀胱右侧壁见一枚 1.5cm × 2cm 带蒂软组织影。应考虑的诊断是
- A. 膀胱结石  
B. 腺性膀胱炎  
C. 膀胱异物  
D. 膀胱憩室  
E. 膀胱肿瘤
70. 男,35 岁。因发热 5 天,尿少 1 天,于 1 月 10 日就诊。查体:T 37.8℃,P 108 次/分,BP 80/55mmHg,面部潮红,球结膜充血水肿,腋下可见出血点。实验室检查:血 WBC 19 × 10<sup>9</sup>/L,异型淋巴细胞 15%,尿蛋白(+++)。首先考虑的诊断是
- A. 急性肾盂肾炎  
B. 肾综合征出血热  
C. 伤寒  
D. 钩端螺旋体病  
E. 流感
71. 男,65 岁。活动时胸痛 1 年,加重 1 个月。查体:胸骨右缘第 2 肋间可闻及 4/6 级收缩期喷射性杂

音,向颈部传导。该患者最合理的治疗措施是

- A. 口服硝酸酯类药物
- B. 口服  $\beta$  受体拮抗剂
- C. 冠状动脉介入治疗
- D. 口服钙通道阻滞剂
- E. 主动脉瓣置换术

72. 男,70 岁。双手指间关节疼痛 2 年,每天晨僵数分钟。查体:T 36.6℃,P 70 次/分,R 18 次/分,BP 100/70mmHg,皮肤未见皮疹,心肺腹未见异常,双手远端指间关节 Heberden 结节,双手近端指间关节骨性膨大。血沉正常,ASO(-),RF(-)。可选择的一线治疗药物是

- A. 秋水仙碱
- B. 甲氨蝶呤
- C. 柳氮磺吡啶
- D. 双氯芬酸钠
- E. 青霉素

73. 男,20 岁。车祸撞伤右上腹部 1 小时。查体:T 37.0℃,P 110 次/分,R 20 次/分,BP 90/70mmHg。痛苦貌,皮肤苍白,右上腹皮肤瘀斑,触痛明显,移动性浊音(+).抢救首选的扩容液体是

- A. 低分子右旋糖酐
- B. 10% 葡萄糖溶液
- C. 浓缩红细胞
- D. 5% 葡萄糖溶液
- E. 平衡盐溶液

74. 女,60 岁。心悸、多汗、消瘦 2 年。症状加重伴咽痛、发热 1 周。恶心、呕吐、腹泻 1 天。查体:T 40.2℃,P 180 次/分,大汗淋漓,甲状腺弥漫性 II 度肿大,可闻及血管杂音。不适当的处理措施是

- A. 抗甲状腺药物
- B. 复方碘溶液
- C. 积极控制感染
- D. 糖皮质激素
- E. 使用阿司匹林降温

75. 男,35 岁。发热时眼痛、腹泻半天。查体:T 39.2℃,BP 120/70mmHg,腹软,左下腹压痛(+),反跳痛(-)。实验室检查:血 WBC  $12 \times 10^9/L$ ,N 0.85,L 0.15。粪镜检 WBC 40/HP,RBC 2/HP。最可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 霍乱
- D. 急性细菌性痢疾

E. 急性阿米巴痢疾

76. 男,45 岁。发作性头痛、心悸、大汗 2 年,发作时血压 230/130mmHg,平素血压不高。对诊断最有帮助的是发作时测定尿

- A. 17-羟皮质类固醇
- B. 醛固酮
- C. 17-酮类固醇
- D. 游离皮质醇
- E. 儿茶酚胺

77. 男,60 岁。因社区获得性肺炎入院,应用莫西沙星治疗。已知莫西沙星的表观分布容积(Vd)值为 4L/kg。为了使患者血药浓度尽快达到有效治疗的稳态血药浓度 5mg/L,需要静脉给予患者的负荷剂量为

- A. 40mg/kg
- B. 15mg/kg
- C. 10mg/kg
- D. 20mg/kg
- E. 5mg/kg

78. 男,70 岁。劳累后突发畏寒,高热伴右侧腰痛 1 天。无尿频、尿急、尿痛。查体:右肾区叩击痛(+).尿沉渣镜检 WBC 30~40/HP,RBC 5~8/HP。为明确诊断,下列应首选的检查是

- A. 血培养
- B. 静脉肾盂造影
- C. 尿找肿瘤细胞
- D. 清洁中段尿培养+药敏
- E. 肾脏 B 超

79. 男,30 岁。右侧腰腹部阵发性疼痛伴恶心、呕吐 1 天。尿常规:RBC 20~30/HP。腹部卧位 X 线平片未见异常。超声示右肾积水,右输尿管上段扩张,下段因肠道气体干扰无法显示。为明确诊断,应首选的检查是

- A. 核素肾显像
- B. MRU
- C. 泌尿系 CT 平扫
- D. 尿培养
- E. 逆行肾盂造影

80. 女,78 岁。反复胸痛 1 周,加重 2 天。症状发作与活动无关,刚发病时,胸痛伴血压升高,就诊当天胸痛伴血压降低,呼吸困难不能平卧。心电图示  $V_1 \sim V_6$  导联 ST 段压低 0.5mV。实验室检查:cTnI 30.5ng/ml。以下治疗原则正确的是

- A. 症状稳定 2 周后介入评估
- B. 2 小时内进行介入评估

- C. 不能进行介入评估  
D. 72 小时内进行介入评估  
E. 24 小时内进行介入评估
81. 女, 70 岁。间断水肿 3 年, 加重伴乏力 1 个月。糖尿病病史 20 年, 高血压病史 17 年。查体: BP 175/85mmHg, 心率 85 次/分, 心律齐, 双下肢中度水肿。实验室检查: SCr  $465\mu\text{mol/L}$ , 血钾  $5.8\text{mmol/L}$ 。尿 RBC(-), 蛋白(+++)。以下不适宜选用的降压药物是
- A. 血管紧张素 II 受体拮抗剂  
B.  $\alpha$  受体拮抗剂  
C. 钙通道阻滞剂  
D. 袢利尿剂  
E.  $\beta$  受体拮抗剂
82. 女, 65 岁。急性前壁心肌梗死后 2 个月复诊。日常活动感气短, 有时心悸, 无黑蒙、晕厥。超声心动图示左室前壁节段性运动减弱, 室壁瘤形成, 左室扩大, LVEF 30%。心电图示窦性心律, 不完全性右束支传导阻滞, QRS 时限 0.10s。追问病史: 心梗发作时曾因室颤行电除颤一次。就诊后建议该患者植入心脏转复除颤器, 其依据是
- A. LVEF 30%  
B. 不完全性右束支传导阻滞  
C. 室壁瘤形成  
D. 曾发生过室颤  
E. 仍有心肌缺血
83. 男, 20 岁。外伤后大腿肌肉内血肿、右膝关节肿痛半天。自幼常于伤后出血不止, 其舅有类似病史。该患者最可能的凝血功能检查异常是
- A. 凝血因子 VII 缺乏  
B. 纤维蛋白原缺乏  
C. TT 延长  
D. APTT 延长  
E. PT 延长
84. 女, 30 岁。误服有机磷杀虫药 600ml 后出现恶心, 呕吐, 流涕, 全身湿冷, 双侧瞳孔呈针尖样 1 小时来诊。经初步洗胃, 胆碱酯酶复能药、阿托品治疗后症状缓解, 但继之出现躁动, 因而停用静脉阿托品 16 小时后患者上述症状再次出现, 呼吸心跳停止, 心肺复苏抢救成功。患者心跳骤停的原因最可能是
- A. 中毒性心肌炎  
B. 中间型综合征  
C. 阿托品减量过快  
D. 迟发性神经病变  
E. 呼吸肌受累致呼吸、循环衰竭
85. 男孩, 3 岁。发现右上腹部包块 2 周。无腹痛、腹胀, 大便正常, 无肉眼血尿。查体: 右上腹部可触及直径约 8cm 包块, 表面光滑, 质地较硬, 无压痛, 可活动。首先考虑的疾病是
- A. 肾结核  
B. 神经母细胞瘤  
C. 多囊肾  
D. 肾积水  
E. 肾母细胞瘤
86. 男, 50 岁。乏力, 腹胀伴尿黄 1 月余, 15 年前检查 HBsAg(+), 肝功能反复异常, 但未诊治。既往有食管胃底静脉曲张破裂出血史。查体: 皮肤巩膜重度黄染, 肝掌及蜘蛛痣(+), 腹水征(+)。实验室检查: ALT  $250\text{U/L}$ , TBil  $320\mu\text{mol/L}$ , HBsAg(+), PTA 18%。最可能的诊断是
- A. 慢性肝炎急性发作  
B. HBsAg 携带者  
C. 慢性肝衰竭  
D. 急性肝衰竭  
E. 亚急性肝衰竭
87. 女, 50 岁。1 小时前跌倒右手掌着地受伤, 右肩疼痛, 肿胀, 功能障碍。查体: 将患肘紧贴胸壁时, 手掌不能搭到健侧肩部。此体征为
- A. Dugas 征  
B. Mills 征  
C. Finkelstein 征  
D. Thomas 征  
E. Froment 征
88. 女, 15 岁。1 周前体检时发现心律不齐。平素无不适, 活动耐力正常。查体: P 56 次/分。心率随呼吸节律明显变化, 吸气时心率加快, 呼气时减慢。心电图示窦性心律, RR 间期不等, 最长 RR 间期与最短 RR 间期之差大于 0.12 秒。该患者的心律不齐提示
- A. 急性心肌炎  
B. 心血管神经症  
C. 房室传导阻滞  
D. 病态窦房结综合征  
E. 无病理意义
89. 男, 70 岁。活动后气短进行性加重 3 年, 突发心悸伴喘憋 2 小时。既往陈旧性前壁心肌梗死 4 年。查体: P 96 次/分, BP 160/70mmHg。端坐位, 双肺可闻及湿啰音。心率 125 次/分, 心律绝对不齐, S<sub>1</sub> 强弱不等。控制该患者心律失常的首选药物是

- A. 地尔硫革                      B. 利多卡因  
C. 普罗帕酮                      D. 维拉帕米  
E. 胺碘酮
90. 男, 50 岁。车祸致左小腿骨折, 断端外露, 创口出血。查体: T 36.6°C, P 96 次/分, BP 140/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 96 次/分, 心律齐, 腹软, 无压痛, 现场急救人员行临时夹板固定, 其最主要的目的是
- A. 防止休克  
B. 预防脂肪栓塞  
C. 避免搬运过程中加重损伤  
D. 减少出血  
E. 便于手术复位
91. 男, 60 岁。活动时胸痛 1 年, 胸痛发作时休息 5 分钟左右即可自行缓解。既往糖尿病病史 10 年, 实验室检查: LDL-C 3.52mmol/L。冠脉造影显示左冠状动脉回旋支近段狭窄 80%。该患者控制 LDL-C 的目标是低于
- A. 1.81mmol/L                      B. 2.07mmol/L  
C. 2.59mmol/L                      D. 4.14mmol/L  
E. 3.37mmol/L
92. 女, 60 岁。6 小时前突发胸骨后持续性疼痛, 疼痛剧烈, 压榨性。含服 1 片硝酸甘油后有短暂减轻, 继之胸痛持续加重。既往有高血压病史。查体: BP 130/70mmHg, 双肺呼吸音清, 心率 86 次/分, 心律齐,  $A_2 > P_2$ 。心电图:  $V_1 \sim V_6$  导联 ST 段压低 0.4mV。实验室检查: 血 cTnI (+)。该患者不宜采取的治疗措施是
- A. 皮下注射低分子肝素  
B. 口服氯吡格雷  
C. 静脉滴注硝酸甘油  
D. 口服阿司匹林  
E. 静脉滴注尿激酶
93. 女, 35 岁。乏力、面色苍白 1 月余。血常规: Hb 86g/L, WBC  $3.6 \times 10^9/L$ , Plt 0.014, 给予口服铁剂治疗 1 周时可出现的血液指标变化是
- A. MCHC 上升                      B. Plt 上升  
C. RBC 上升                      D. WBC 上升  
E. Ret 上升
94. 男孩, 6 岁。发热、头痛、呕吐 2 天, 昏迷 1 小时于 1 月 8 日入院。查体: BP 90/60mmHg。神志不清, 颈抵抗 (+), 皮肤发花, 可见多处瘀点瘀斑, 双侧瞳孔扩大, 对光反射迟钝。下列处理不正确的是
- A. 吸氧及心电监护  
B. 腰穿做脑脊液检查  
C. 静脉补液并注射血管活性药  
D. 静脉滴注甘露醇  
E. 瘀点瘀斑涂片染色
95. 女, 35 岁。双侧颈部淋巴结肿大 1 月余, 发热 1 周。既往体健。查体: T 38.1°C, 双侧颈部可触及数个肿大淋巴结, 最大者 2cm × 2cm, 质韧, 无触痛。左颈部淋巴结活检见正常结构消失, 代之以均一中-大型淋巴细胞浸润。免疫组化: CD20 (+), CD30 (-), CD5 (-)。最可能的诊断是
- A. 弥漫性大 B 细胞淋巴瘤  
B. 霍奇金淋巴瘤  
C. 套细胞淋巴瘤  
D. 滤泡性淋巴瘤  
E. 间变性大细胞淋巴瘤
96. 男, 80 岁。2 小时前车祸致左肩部受伤, 疼痛、活动受限。既往高血压病史 20 年, 冠心病、心衰病史 10 年。查体: T 36.6°C, P 100 次/分, R 20 次/分, BP 180/80mmHg, 双下肺少许湿啰音, 心率 100 次/分, 频发早搏, 腹软, 无压痛。左肩畸形, 局部皮肤肿胀。X 线示左肱骨外科颈处数个骨碎块, 移位不明显。首选的治疗方法是
- A. 尺骨鹰嘴外展位骨牵引  
B. 三角巾悬吊  
C. 切开复位外固定架固定  
D. 切开复位髓内针固定  
E. 切开复位钢板固定
97. 男, 60 岁。体检发现血钙 2.9mmol/L, 进一步检查发现 PTH 及尿钙升高, 血磷 0.8mmol/L。为明确诊断, 最特异的辅助检查是
- A. 颈部 B 超  
B. 颈部 X 射线  
C. 颈部  $^{99m}Tc$ MIBI  
D. 颈部 CT  
E. 颈部 MRI
98. 女, 75 岁。10 小时前出现胸骨后疼痛, 逐渐加重, 休息不能缓解。2 小时前逐渐出现呼吸困难, 咳少量泡沫样痰。查体: 端坐位, 口唇轻度发绀。心电图示  $V_1 \sim V_6$  导联 QS 型、ST 段抬高 0.3mV。该患者最可能出现的体征还有
- A. 三凹征                      B. 双肺湿啰音  
C. 肝肿大                      D. 下肢水肿

- E. 颈静脉怒张
99. 女,70岁。今晨家属发现不能唤醒送来急诊。既往:2型糖尿病病史25年,格列美脲4mg qd治疗;高血压病史20年,硝苯地平缓释片30mg qd治疗;3年前发现颈动脉狭窄(75%)。查体:T 36.2℃,P 106次/分,R 26次/分,BP 146/70mmHg,皮肤湿冷。患者应首先进行的检查是
- 快速血糖测定
  - 心肌酶谱
  - 电解质测定
  - 头颅CT
  - 心电图
100. 男,55岁。高血压5年,头痛频繁发作1周。嗜烟酒,肥胖。血糖轻度升高。超声心动图示左心室壁轻度增厚。降压宜首选的药物是
- 硝苯地平
  - 普萘洛尔
  - 氢氯噻嗪
  - 依那普利
  - 哌唑嗪
101. 男,60岁。左侧腰部胀痛伴间歇性无痛性肉眼血尿3月余。IVU可见左肾中盏充盈不全。首先考虑的疾病是
- 肾盂癌
  - 肾盂肾炎
  - 肾黄色肉芽肿
  - 肾盏结石
  - 肾结核
102. 男,30岁。间断水肿3年,血压升高4个月。查体:BP 165/95mmHg,双下肢轻度水肿。尿沉渣镜检 RBC 30~35/HP,尿蛋白定量 1.5g/24h。SCr 135 $\mu$ mol/L,Alb 42g/L。患者降压治疗首选的药物是
- 血管紧张素转换酶抑制剂
  - $\alpha$ 受体拮抗剂
  - $\beta$ 受体拮抗剂
  - 钙通道阻滞剂
  - 利尿剂
103. 男,30岁。发现右肾积水1个月。既往有肺结核史,已治愈。查体:消瘦体型。尿液结核菌涂片:抗酸杆菌(+)。该疾病最常见的临床症状为
- 腰痛
  - 发热
  - 贫血
  - 尿频、尿急、尿痛
  - 盗汗
104. 女30岁。因反复肾绞痛住院。查体:双肾区叩痛明显。实验室检查:尿红细胞(++),血尿酸及尿尿酸增高。B超示双肾多发结石,双肾轻度积水,KUB(-)。该病最常见的病因是
- 动物蛋白摄入过多
  - 饮酒过量
  - 原发性尿酸代谢障碍
  - 肿瘤溶解综合征
  - 药物抑制尿酸排泄
105. 男,70岁。胆囊切除术后第2天静脉输液中突发喘憋1小时,不能平卧。当日静脉补液量3500ml,总出量1500ml。既往陈旧性前壁心肌梗死5年,高血压病史20年。查体:T 36.5℃,BP 160/60mmHg。双肺可闻及湿啰音及哮鸣音,心率97次/分,心律齐。血气分析示 PaO<sub>2</sub> 60mmHg,PaCO<sub>2</sub> 35mmHg。该患者喘憋的最可能原因是
- 肺血栓栓塞
  - 急性肺水肿
  - 支气管哮喘
  - 气胸
  - 再发心肌梗死
106. 女,30岁。尿频、尿痛、腰部胀痛3天。T 37.4℃。此时最有助于鉴别肾盂肾炎与膀胱炎的化验检查结果是
- 尿培养及菌落计数阳性
  - 尿涂片革兰染色发现细菌
  - 尿有蛋白及白细胞
  - 尿中有脓细胞
  - 尿常规见白细胞及白细胞管型
107. 女,55岁。气促、腹胀进行性加重2年。既往有结核病病史10余年。查体:BP 90/70mmHg,心界不大,心率87次/分,心律齐,心音减低,可闻及心包叩击音。腹部膨隆,肝肋下5cm,脾肋下未触及,移动性浊音阳性。最可能的诊断是
- 肝硬化失代偿期
  - 急性渗出性心包炎
  - 慢性粒细胞白血病
  - 冠心病
  - 缩窄性心包炎
108. 男,70岁。阵发性胸痛5年余。症状发作时可于心尖部闻及3/6级收缩期吹风样杂音,症状缓解杂音消失。产生此杂音的最可能原因是
- 乳头肌功能不全
  - 合并风湿性心脏瓣膜病

- C. 腱索断裂  
D. 二尖瓣环扩张  
E. 合并退行性心脏瓣膜病
109. 男, 35 岁。腹泻 1 天, 于 8 月 10 日来诊。腹泻 10 余次, 水样便, 呕吐数次, 无发热、腹痛及里急后重。2 天前曾去海滨旅游。查体: T 36.1°C, P 110 次/分, BP 74/40mmHg。精神萎靡, 烦躁, 皮肤弹性差, 肠鸣音活跃。实验室检查: 血 Hb 158g/L, WBC  $12 \times 10^9/L$ 。粪常规: WBC 0~2/HP, 无红细胞。为快速诊断, 应首先进行的检查是  
A. 粪便动力及制动试验  
B. 血培养  
C. 血生化检查  
D. 结肠镜检查  
E. 粪隐血
110. 男, 60 岁。双侧颈部淋巴结肿大 2 个月, 发热半个月, 最高体温 38.2°C。经检查双侧颈部及腋窝多发肿大淋巴结, 最大者直径 4cm, 其他部位淋巴结无异常。淋巴结病理检查诊断为血管免疫母细胞 T 细胞淋巴瘤。首选的治疗是  
A. 化疗 + 放疗  
B. 手术  
C. 放疗  
D. 化疗  
E. 手术 + 化疗

A3/A4 型选择题 (111—139 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(111—112 题共用题干)

男, 45 岁。头痛、视物模糊 3 月余。查体: 视力明显减退, 视野缺损。查血  $T_3$ 、 $T_4$ 、TSH 降低, 血 ACTH、皮质醇降低。

111. 最可能的诊断是

- A. 肾上腺肿瘤  
B. 垂体肿瘤  
C. 甲状腺癌  
D. 艾迪生病  
E. 库欣病

112. 进一步应做的检查是

- A. 肾上腺 CT  
B. 脑血管造影  
C. 甲状腺 ECT  
D. 垂体 MRI  
E. 胸部 X 线片

(113—114 题共用题干)

男, 60 岁。水肿、蛋白尿 3 个月。既往患糖尿病 3 年, 高血压 2 年。实验室检查: ESR 43mm/h, Hb 80g/L, TP 79g/L, Alb 30g/L, SCr  $152 \mu\text{mol/L}$ 。尿沉渣镜检 RBC 0~2/HP, 尿蛋白 (+)。尿蛋白定量 7.6g/24h, 尿蛋白分析提示以小分子蛋白为主。

113. 该患者最可能的诊断是

- A. 多发性骨髓瘤肾损害

- B. 糖尿病肾病  
C. 乙型肝炎病毒相关性肾炎  
D. 良性小动脉性肾硬化症  
E. 原发性小血管炎肾损害

114. 应首先做的检查是

- A. 抗中性粒细胞胞浆抗体  
B. 骨髓穿刺、血尿免疫固定电泳  
C. 乙肝病病毒标志物  
D. 双肾 B 超  
E. 肾穿刺活检

(115—116 题共用题干)

女, 35 岁。头晕 3 年, 夜尿增多 1 年。查体: BP 180/110mmHg, 无特殊体貌。实验室检查: 血钾 2.8mmol/L, 血肾素活性和血管紧张素降低, 醛固酮水平增高。CT 示右肾上腺 1.0cm 椭圆形低密度占位。

115. 诊断首先考虑

- A. 肾上腺转移瘤  
B. 垂体微腺瘤  
C. 醛固酮瘤  
D. 库欣综合征  
E. 嗜铬细胞瘤

116. 拟行手术治疗, 术前控制血压的最佳药物是

- A. 螺内酯  
B.  $\alpha$  受体拮抗剂

- C. 氨苯蝶啶  
D. 氢氯噻嗪  
E.  $\beta$ 受体拮抗剂

## (117—119 题共用题干)

男,15岁。咽痛、发热1周,双下肢对称性紫癜伴腹痛及关节痛3天。实验室检查:血Hb 125g/L,WBC  $10.5 \times 10^9/L$ ,Plt  $110 \times 10^9/L$ ,凝血时间正常,粪隐血(+)

117. 最可能的诊断是  
A. 免疫性血小板减少症  
B. 血小板无力症  
C. 急性白血病  
D. 过敏性紫癜  
E. 血友病
118. 该患者最有可能出现异常结果的检查是  
A. 活化部分凝血活酶时间  
B. 骨髓细胞染色体检查  
C. 血小板聚集功能  
D. 骨髓细胞学检查  
E. 毛细血管脆性试验
119. 首选的治疗措施是  
A. 应用糖皮质激素  
B. 应用抗纤溶药物  
C. 输注血小板  
D. 输注纯化凝血因子  
E. 联合化疗

## (120—121 题共用题干)

男,20岁。1型糖尿病病史10年,平时每天4次胰岛素强化治疗。近2天发热、咽痛,食欲不佳,进食少,自行停用胰岛素。晨起家属发现患者不能正确回答问题,急诊就诊。查体:T 38.5℃,精神差,轻度脱水貌。实验室检查:血钠 140mmol/L,血钾 4.5mmol/L,血糖 25mmol/L,血pH 7.25。尿酮体(+++)

120. 目前该患者合理的胰岛素使用方案是  
A. 恢复4次胰岛素皮下注射治疗  
B. 静脉大剂量短效胰岛素治疗  
C. 皮下胰岛素泵治疗  
D. 静脉小剂量短效胰岛素治疗  
E. 使用基础胰岛素皮下注射治疗
121. [假设信息]该患者经胰岛素及补液治疗后,尿量增加至40~50ml/h。为纠正电解质及酸碱平衡紊乱,此时应采取的治疗措施是  
A. 补碱、补钾、补钠治疗  
B. 补碱、补钾治疗

- C. 补钠、补钙治疗  
D. 补碱、补钠治疗  
E. 补钾、补钠治疗

## (122—123 题共用题干)

男,40岁。持续高热8天,伴恶心、纳差、腹泻。查体:皮肤巩膜无黄染,前胸部可见散在的淡红色斑丘疹,脾肋下可触及,质软、有压痛。实验室检查:血WBC  $3.2 \times 10^9/L$ ,N 0.72,L 0.25,E 0,Plt  $120 \times 10^9/L$ 。ALT 108U/L,TBil  $12 \mu\text{mol/L}$ 。

122. 最可能的诊断是  
A. 伤寒  
B. 细菌性痢疾  
C. 急性无黄疸型肝炎  
D. 肾综合征出血热  
E. 流行性斑疹伤寒
123. 为确定诊断,最有意义的检查是  
A. 粪培养  
B. 外斐试验  
C. 汉坦病毒特异性抗体  
D. 肝炎病毒标志物  
E. 血培养

## (124—125 题共用题干)

男,40岁。出现排尿后尿道灼痛并溢出白色黏液6个月。会阴部及腰背都酸痛,性欲减退,乏力。前列腺按摩液检查:卵磷脂小体少量,白细胞20~30/HP。

124. 首先考虑的疾病是  
A. 膀胱炎  
B. 尿道炎  
C. 尿路结石  
D. 慢性前列腺炎  
E. 肾结核
125. 不应采用的治疗方法是  
A. 应用活血化瘀、清热解毒的中成药  
B. 热水坐浴及理疗  
C. 抗菌药物治疗  
D. 定期前列腺按摩  
E. 抗结核治疗

## (126—127 题共用题干)

女,65岁。劳累后心绞痛病史2年,近1周胸痛发作频繁。2小时前因情绪激动再次发作,疼痛较前加剧,含服硝酸甘油不缓解,伴恶心。糖尿病病史8年。心电图:II、III、aVF导联ST段弓背向上抬高伴T波倒置。

126. 最有助于明确诊断的实验室检查是  
A. 尿淀粉酶

- B. 尿酮体
- C. 血肌酸激酶
- D. 血肌钙蛋白
- E. 血淀粉酶

127. 患者就诊过程中出现头晕、黑矇, BP 70/60mmHg, 心率 35 次/分。给予阿托品治疗后症状无改善。需立即给予的治疗措施是

- A. 营养心肌治疗
- B. 植入临时心脏起搏器
- C. 抗凝治疗
- D. 植入永久心脏起搏器
- E. 硝酸酯类药物治疗

(128—130 题共用题干)

男, 35 岁。弯腰活动后出现腰部、臀部疼痛, 腰部活动受限, 左小腿麻木。经卧床休息半个月症状略有缓解。查体: 腰部压痛, 左外踝及足外侧痛觉减退, 左侧踝反射减弱, 左下肢直腿抬高试验(±)。

128. 最可能受累的神经是

- A. L<sub>3</sub>
- B. L<sub>4</sub>
- C. S<sub>1</sub>
- D. L<sub>2</sub>
- E. L<sub>5</sub>

129. 为明确诊断, 最有价值的检查是

- A. X 线片
- B. MRI
- C. 核素扫描
- D. B 超
- E. 肌电图

130. 最可能的诊断是

- A. 腰肌劳损
- B. 腰椎间盘突出症
- C. 腰椎管狭窄症
- D. 梨状肌综合征
- E. 腰椎结核

(131—133 题共用题干)

男, 40 岁。间断喘憋 1 年余。活动量多时较明显, 2 天来喘憋明显加重, 在夜间憋醒。1 周前咽痛、发热, 服用“感冒药”后好转。既往: 心脏有杂音, 具体情况不详。查体: T 38.2℃, BP 130/40mmHg, 高枕卧位, 双肺可闻及细湿啰音, 心界向左下扩大, 心率 80 次/分, 心律齐, 主动脉瓣第一听诊区可闻及收缩期杂音, 主动脉瓣第二听诊区可闻及舒张期吹风样递减型杂音。尿常规检查可见镜下血尿。

131. 该患者最不可能出现的体征是

- A. 奇脉
- B. 甲床线状出血

- C. 睑结膜出血点
- D. 杄状指
- E. 脾大

132. 为进一步明确诊断, 应重点选择检查

- A. 胸部 X 线片
- B. 免疫学检查
- C. 心电图
- D. 心肌酶
- E. 血培养

133. 患者应采取的治疗措施为

- A. 脾切除
- B. 抗凝治疗
- C. 心包穿刺术
- D. 大剂量糖皮质激素治疗
- E. 早期充分使用抗生素

(134—135 题共用题干)

男, 20 岁。左腰部被刺后伤口持续溢出淡红色液体 2 小时。查体: P 110 次/分, BP 95/70mmHg。左上腹有压痛, 无肌紧张及反跳痛。

134. 诊断首先应考虑

- A. 脾破裂
- B. 胰腺损伤
- C. 肝破裂
- D. 胃穿孔
- E. 肾损伤

135. 最重要的治疗措施为

- A. 立即手术探查
- B. 静脉应用抗生素, 观察
- C. 持续导尿, 观察尿量颜色变化
- D. 补液抗休克治疗
- E. 绝对卧床 2 周以上

(136—137 题共用题干)

男, 40 岁。间断发热、腹泻 3 个月。体温最高达 38.8℃, 腹泻 4~6 次/天, 水样便, 体重下降 5kg。有静脉吸毒史。查体: T 38.6℃, 消瘦, 肺部未闻及干湿性啰音, 腹软, 无明显压痛及反跳痛, 肝脾肋下未及。

136. 最可能的诊断是

- A. 慢性阿米巴痢疾
- B. 艾滋病
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 慢性细菌性痢疾
- E. 肺结核

137. 对明确诊断最有价值的检查是

- A. 血常规
- B. 血清抗体
- C. 粪培养
- D. 胸部 X 线片
- E. 粪常规

## (138—139 题共用题干)

女,30岁。面部皮疹、发热1个月,水肿1周。查体:T 37.8℃,BP 160/100mmHg。颜面可见充血性皮疹,腹部移动性浊音(+),双下肢中度凹陷性水肿。血常规:Hb 96g/L,WBC  $3.1 \times 10^9/L$ ,Plt  $67 \times 10^9/L$ 。尿沉渣镜检RBC满视野,WBC 8~10/HP。尿蛋白定量4.2g/24h。肾功能正常,血C3下降。

138. 首先考虑的诊断是

- A. 原发性小血管炎肾损害
- B. 乙型肝炎病毒相关性肾炎

- C. 狼疮肾炎
- D. 过敏性紫癜性肾炎
- E. 急性肾小球肾炎

139. 为明确诊断,最有价值的实验室检查是

- A. 血IgA及IgE
- B. 血抗中性粒细胞胞浆抗体
- C. 血抗链球菌溶血素“O”
- D. 乙肝病毒标志物
- E. 血抗核抗体及抗双链DNA抗体

## B1型选择题(140—150题)

## 答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

## (140—142 题共用备选答案)

- A. 抗核抗体
- B. 抗双链DNA抗体
- C. 抗Sm抗体
- D. 抗CCA抗体
- E. 抗中性粒细胞质抗体

140. 与狼疮肾损害关系最密切的自身抗体是

141. 系统性红斑狼疮的标志性抗体是

142. 类风湿性关节炎的特异性抗体是

## (143—144 题共用备选答案)

- A. 中上腹痛、体重下降、贫血
- B. 上腹痛、饥饿及夜间进食后缓解
- C. 上腹痛、呕逆
- D. 反酸、烧心、胸骨后疼痛
- E. 右上腹痛、黄疸、贫血

143. 十二指肠溃疡的典型临床表现

144. 胃食管反流病的典型临床表现

## (145—146 题共用备选答案)

- A. 小肠液
- B. 胆汁
- C. 胰液
- D. 唾液
- E. 胃液

145. 对食物消化能力最强,功能全面的消化液是

146. 缺乏时易引起脂肪泻的消化液是

## (147—148 题共用备选答案)

- A. 结核分枝杆菌
- B. 病毒
- C. 肺炎克雷伯杆菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 肺炎链球菌

147. 男,26岁。高热、右胸痛3天,胸部X线示右下肺大片状阴影,该患者感染的病原体可能是

148. 女,30岁。低热、干咳1个月,胸部X线示后上肺尖后段淡薄的阴影,该患者感染的病原体可能是

## (149—150 题共用备选答案)

- A. 格列本脲
- B. 瑞格列奈
- C. 二甲双胍
- D. 胰岛素
- E. 普萘洛尔

149. 能抑制肠道对葡萄糖的吸收,主要用于2型糖尿病伴肥胖的药物是

150. 糖尿病伴有严重感染首选的药物是

# 第三单元

## A1 型选择题 (1—56 题)

### 答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 急性阑尾炎手术治疗后最常见的并发症是  
A. 阑尾残株炎  
B. 粘连性肠梗阻  
C. 切口感染  
D. 出血  
E. 粪瘘
- 某患者血气分析显示  $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ ,  $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 。对该结果发生机制的解释最正确的是  
A. 阻塞性通气功能障碍  
B. 肺脏生理无效腔减少  
C. 弥散功能障碍  
D. 限制性通气功能障碍  
E. 肺泡通气量下降
- 慢性阻塞性肺疾病的体征不包括  
A. 呼吸音减弱  
B. 支气管呼吸音  
C. 心音遥远  
D. 桶状胸  
E. 呼气相延长
- 急性阑尾炎手术后尿潴留,下列处理措施首选  
A. 耻骨上膀胱穿刺  
B. 无菌导尿后拔除尿管  
C. 协助起床,试行自行排尿  
D. 应用利尿剂  
E. 留置导尿 4~5 天
- 直肠指检可触及条索状物,挤压时条索状物的肛旁端有脓性分泌物流出。最可能的诊断是  
A. 肛瘘  
B. 内痔  
C. 外痔  
D. 直肠癌  
E. 直肠息肉
- 支气管哮喘急性发作患者,提示病情危重的情况是  
A. 三凹征  
B. 双肺满布哮鸣音  
C. 胸部 X 线片示肺充气过度  
D. 呼气峰流速 (PEF) 显著下降  
E.  $\text{PaCO}_2$  增高
- 肠外营养时,使用大量高渗葡萄糖作为单一的能源会引起  
A. 糖异生活跃  
B. 静息能量消耗降低  
C. 肝脏脂肪浸润  
D. 去甲肾上腺素分泌减少  
E. 蛋白质分解减少
- 择期手术患者,手术前需要进行特殊准备的是  
A. 血红蛋白  $120\text{g/L}$   
B. 空腹血糖  $5.6\text{mmol/L}$   
C. 血压  $160/100\text{mmHg}$   
D. 血小板  $100 \times 10^9/\text{L}$   
E. 白细胞  $7.0 \times 10^9/\text{L}$
- 早期胃癌是指  
A. 侵及黏膜下层及肌层的癌  
B. 直径小于  $2\text{cm}$  的癌  
C. 无局部淋巴结转移的癌  
D. 癌灶局限于黏膜层及黏膜下层  
E. 无临床症状的癌
- 易引起二重感染的主要原因是  
A. 联合使用抗菌药物  
B. 致病菌量过多  
C. 使用免疫抑制剂  
D. 营养不良  
E. 全身免疫力降低
- 下列胃镜检查的描述中,对慢性萎缩性胃炎诊断最有意义的是  
A. 胃黏膜粗糙不平,可见出血点/斑  
B. 胃黏膜糜烂  
C. 胃黏膜红白相同,邹襞增粗

- D. 胃黏膜苍白平坦,黏膜血管透见  
E. 胃黏膜充血,呈花斑状
12. 下述各项不符合肺心病的体征是  
A. 肝颈静脉回流征阳性  
B. 颈静脉怒张  
C. 剑突下心脏搏动增强  
D. 肺动脉瓣区第二心音亢进  
E. 心脏浊音界向左下扩大
13. 吸入性肺脓肿最具特征性的临床症状是  
A. 咳嗽伴胸痛  
B. 咳嗽伴咯血  
C. 畏寒、高热  
D. 呼吸困难  
E. 咳大量脓臭痰
14. 慢性阻塞性肺疾病所致 I 型呼吸衰竭最主要的机制是  
A. 肺内分流  
B. 肺弥散功能降低  
C. 肺通气量下降  
D. 肺通气血流比例失衡  
E. 阻塞性通气功能障碍
15. 原发性肠套叠绝大部分发生于  
A. 婴幼儿  
B. 老年  
C. 儿童  
D. 青年  
E. 中年
16. 下列检查中,适用于筛查轻微肝性脑病的检查是  
A. 头颅 MRI  
B. 数字连接试验  
C. 血氨  
D. 头颅 CT  
E. 脑电图
17. 择期手术患者术前考虑支持治疗时,其血白蛋白水平一般应低于  
A. 32g/L  
B. 33g/L  
C. 34g/L  
D. 31g/L  
E. 30g/L
18. 肠易激综合征特征性的临床表现是  
A. 腹痛及便血  
B. 腹痛或腹部不适伴排便习惯改变  
C. 腹胀及里急后重  
D. 大便变细  
E. 便秘及排便困难
19. 处理肝外伤措施中,相对不重要的是  
A. 损伤处放置引流管  
B. 术中结扎局部断裂的血管和胆管  
C. 早期全身应用维生素 K  
D. 去除失去活力的肝组织  
E. 同时进行手术治疗与抗休克治疗
20. 急性呼吸窘迫综合征患者接受气管插管、机械通气治疗时,为改善氧合,最主要的措施是  
A. 延长吸呼比  
B. 增加呼气末正压通气水平  
C. 增加压力控制通气的预设压力水平  
D. 增加吸氧浓度  
E. 增加潮气量
21. 慢性失血性贫血的外周血实验室检查特点是  
A. 大细胞正色素性贫血  
B. 小细胞低色素性贫血  
C. 小细胞正色素性贫血  
D. 大细胞低色素性贫血  
E. 正细胞正色素性贫血
22. 关于低血钙的临床表现,错误的是  
A. Chvostek 征阳性  
B. 手足搐搦  
C. 头痛、肌无力  
D. 腱反射亢进  
E. 口周和指尖麻木及针刺感
23. 原发性肝癌常见的临床表现不包括  
A. 便秘  
B. 肝区疼痛  
C. 肝大  
D. 黄疸  
E. 消瘦
24. 法洛三联症的小儿,出现明显青紫时提示  
A. 右心室肥厚的程度加重  
B. 主动脉骑跨的程度加大  
C. 室间隔缺损的部位扩大  
D. 室间隔缺损的大小增大  
E. 肺动脉狭窄的程度加重
25. 医疗机构从业人员的基本行为规范是  
A. 以人为本  
B. 人道行医  
C. 大医精诚  
D. 救死扶伤  
E. 为人民健康服务
26. 医疗机构临床用血文书不包括  
A. 输血过程和输血后疗效评价意见  
B. 献血员信息  
C. 输血记录单  
D. 患者输血适应证的评估

- E. 输血治疗知情同意书
27. 对涉及人的生物医学研究进行伦理审查的根本目的是
- A. 保护受试者的尊严和权利
  - B. 维护研究机构的科研利益
  - C. 尊重研究者的基本权利
  - D. 确保医学科研的规范性
  - E. 保护受试者的经济利益
28. 医学伦理学的研究对象是
- A. 医德基本实践
  - B. 医德基本理论
  - C. 医学道德关系
  - D. 医学道德难题
  - E. 医德基本规范
29. 诊断高血压依据的血压值的测量方法为
- A. 未用降压药的情况下, 3 次或 3 次以上非同日血压值的均值
  - B. 未用降压药的情况下, 2 次或 2 次以上同日血压值的均值
  - C. 用降压药的情况下, 2 次或 2 次以上非同日血压值的均值
  - D. 用降压药的情况下, 2 次或 2 次以上同日血压值的均值
  - E. 休息 5 分钟后测定的血压值
30. 腹部缝合伤口的拆线时间是
- A. 3~5 天
  - B. 7~9 天
  - C. 10~12 天
  - D. 13 天
  - E. 14 天
31. 属于尿液溢出性蛋白的是
- A. 白蛋白
  - B.  $\beta$ -球蛋白
  - C.  $\gamma$ -球蛋白
  - D. 凝血因子
  - E. 肌红蛋白
32. 治疗骨折不可轻易切开复位内固定, 最主要的原因是
- A. 大血管, 引起肢体坏死
  - B. 损伤神经, 引起肢体瘫痪
  - C. 术中发生意外
  - D. 影响骨折血运, 导致延迟愈合或不愈合
  - E. 手术后发生感染, 形成骨髓炎
33. 对于骨关节炎的治疗, 优先考虑
- A. 对乙酰氨基酚
  - B. 糖皮质激素
  - C. 非甾体抗炎药
  - D. 氨基葡萄糖
  - E. 手术
34. 非特异性酯酶(+), 不被氟化钠(NaF)抑制见于
- A. 急性巨核细胞白血病
  - B. 急性早幼粒细胞白血病
  - C. 急性单核细胞白血病
  - D. 慢性粒细胞白血病
  - E. 急性淋巴细胞白血病
35. 感染性心内膜炎不符合的是
- A. 早期易出现严重贫血
  - B. 可有低热
  - C. 可伴有脾大
  - D. 心脏杂音性质可变
  - E. 皮肤黏膜可出现瘀点
36. 下列有关慢性阻塞性肺疾病急性发作最常见的原因是
- A. 接触过敏原
  - B. 接触香烟烟雾
  - C. 气候变化
  - D. 空气污染
  - E. 感染
37. 引起抗利尿激素分泌最重要的因素是
- A. 循环血量减少
  - B. 血浆晶体渗透压增高
  - C. 血浆胶体渗透压增高
  - D. 动脉血压降低
  - E. 疼痛刺激
38. 婚前医学检查, 对确诊患有严重遗传病不宜生育者正确的处理方法是
- A. 可以结婚, 但需要采取长效避孕措施或者实施结扎手术
  - B. 可以结婚, 但需提交书面声明, 保证不生育
  - C. 不能结婚
  - D. 可以结婚, 但必须符合晚婚规定
  - E. 《婚姻法》未明确规定禁止结婚的, 可以结婚
39. 桡骨头半脱位的治疗措施是
- A. 手法复位不必固定
  - B. 切开复位内固定
  - C. 切开复位韧带修复
  - D. 手法复位外固定
  - E. 切开复位外固定

40. 疫苗接种处方应保存几年
- A. 2 年                      B. 3 年  
C. 1 年                      D. 4 年  
E. 5 年
41. 关于艾滋病高危人群以下哪项错误
- A. 50 岁以上的人  
B. 男性同性恋  
C. 性乱者  
D. 静脉药瘾者  
E. 多次输血者
42. 伸直型桡骨下端骨折的畸形是
- A. 垂腕型                      B. 银叉型  
C. 尺偏型                      D. 爪型  
E. 僵硬型
43. 慢性活动性胃炎相关的主要因素是
- A. HP  
B. 饮酒  
C. 饮食和环境因素  
D. 应激  
E. 药物
44. 脑膜炎双球菌有不同的菌群,目前我国流行的菌群以下列哪群为主
- A. A 群                      B. B 群  
C. C 群                      D. D 群  
E. E 群
45. 髋关节后脱位的典型畸形是髋关节
- A. 屈曲、内收、内旋  
B. 屈曲、内收、外旋  
C. 屈曲、外展、内旋  
D. 屈曲、外展、外旋  
E. 屈曲、外旋
46. 肠梗阻老年人肠扭转最常见的部位是
- A. 横结肠                      B. 升结肠  
C. 乙状结肠                      D. 小肠  
E. 十二指肠
47. 不属于猩红热患儿皮疹特点的是
- A. 皮疹呈鸡皮样,触之砂纸感  
B. 常有散在糠屑样脱皮  
C. 在腋窝、腹股沟等皮肤皱褶处皮疹稀疏  
D. 常在 24 小时内遍及全身  
E. 疹间皮肤亦呈红色
48. 股骨颈骨折,如果该患者后期出现股骨头坏死,最主要的原因是
- A. 股深动脉损伤  
B. 旋股内侧动脉损伤  
C. 小凹动脉损伤  
D. 闭孔动脉损伤  
E. 旋股外侧动脉损伤
49. 社区获得性肺炎的病原体中,最常见的革兰阴性杆菌是
- A. 肺炎克雷伯杆菌  
B. 大肠埃希菌  
C. 军团菌  
D. 流感嗜血杆菌  
E. 厌氧菌
50. 肠梗阻的典型临床表现是
- A. 腹痛、腹胀、呕血、黑便、肠鸣音亢进  
B. 腹痛、腹胀、呕吐、停止肛门排便排气、肠型、肠鸣音亢进  
C. 腹痛、腹胀、呕吐、胃型  
D. 腹痛、腹胀、腹泻、停止排气排便  
E. 腹痛、腹胀、呕吐、停止排气排便
51. 黄体功能不全患者,月经 5~6 天刮宫的病理表现是
- A. 增殖期与分泌期并存  
B. 增殖期内膜  
C. 分泌期内膜  
D. 单纯型内膜  
E. 复杂型内膜
52. 当急性左心衰患者发生急性肺水肿时,下列哪项药物可缓解病情
- A. 洋地黄  
B. 利尿药  
C. 钙离子拮抗药  
D. 血管紧张素转换酶抑制剂  
E.  $\beta$  受体阻滞剂
53. 高血压伴双侧肾动脉狭窄的患者不宜使用的降压药是
- A. 血管紧张素转换酶抑制剂  
B. 利尿剂  
C.  $\beta$  受体拮抗剂  
D. 钙通道阻滞剂  
E.  $\alpha$  受体拮抗剂
54. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎中增生的主要细胞是
- A. 肾球囊壁层上皮细胞及毛细血管内皮细胞

- B. 肾小球毛细血管内皮细胞及系膜细胞
- C. 肾球囊脏层上皮细胞及系膜细胞
- D. 肾小球周围的成纤维细胞及系膜细胞
- E. 肾球囊脏层上皮细胞及壁层上皮细胞

55. 下列情况不适宜用无创正压通气处置的是
- A. 心源性肺水肿
  - B. 昏迷
  - C. 有创机械通气的序贯治疗

- D. 慢性阻塞性肺疾病急性加重
- E. 急性呼吸窘迫综合征

56. 可释放组胺引起哮喘反应的白细胞是
- A. 单核细胞
  - B. 嗜酸性粒细胞
  - C. 中性粒细胞
  - D. 淋巴细胞
  - E. 嗜碱性粒细胞

A2 型选择题 (57—122 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

57. 男,30 岁。排便次数增多、大便带血 1 个月。无腹痛、发热,无体重变化。查体:T 36.5℃,P 80 次/分,R 18 次/分,BP 120/80mmHg。浅表淋巴结未触及。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。腹软,无压痛,肝脾肋下未触及。直肠指检:触及一个柔软光滑有蒂包块,直径约 1cm,指套带血。最可能诊断是

- A. 结肠癌
- B. 直肠息肉
- C. 血栓性外痔
- D. 肛窦炎
- E. 直肠癌

58. 一患者坚信他的思想变成了声音,不仅自己听见了,坚信别人也听见了,这是

- A. 思维被广播
- B. 读心症
- C. 思维扩散
- D. 被洞悉感
- E. 思维化声

59. 女,6 岁。诊断为单纯肾病综合征,病程突发腰痛,尿呈洗肉水,最可能是

- A. 泌尿道感染
- B. 肾结石
- C. 肾静脉血栓形成
- D. 电解质紊乱
- E. 肾衰竭

60. 女,30 岁。面色苍白、乏力 1 年,皮肤出血点 2 周。查体:神志清,巩膜轻度黄染,肝肋下未触及,脾肋下 2cm。血常规:Hb 60g/L,RBC  $1.8 \times 10^{12}/L$ ,WBC  $4.6 \times 10^9/L$ ,Plt  $12 \times 10^9/L$ ,Ret 0.12。Coombs 试验(+)。尿 Rous 试验(-)。骨髓细胞

学检查:红系、巨核系明显增生,全片见巨核细胞 96 个,未见产板型巨核细胞。最可能的诊断是

- A. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症
- B. Evans 综合征
- C. 巨幼细胞贫血
- D. 血栓性血小板减少性紫癜
- E. 弥散性血管内凝血

61. 男,45 岁。间断头晕 1 月余。1 个月前在一次情绪激动后自觉头晕,休息后缓解,当时测血压 150/95mmHg,自测血压有时增高,有时正常。建议采取的措施为

- A. 进行低或中等强度的等张运动
- B. 每日食盐量不少于 6g
- C. 膳食中脂肪量控制在总热量的 50% 以下
- D. 体质指数控制在  $26\text{kg}/\text{m}^2$  以内
- E. 减少体育锻炼

62. 女,35 岁。间断黏液脓血便 2 年,伴里急后重,大便每天 3 次,反复应用多种抗生素治疗,症状无明显缓解,最有可能诊断的是

- A. 慢性细菌性痢疾
- B. 阿米巴痢疾
- C. 肠伤寒
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 肠易激综合征

63. 女,30 岁。停经 12 周,阴道不规则流血 3 天,下腹隐痛。妇科检查:宫底平脐,质软,未触及胎体,未闻及胎心。尿妊娠试验阳性。应首先考虑的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 稽留流产

- C. 死胎  
D. 羊水过多  
E. 葡萄胎
64. 男孩, 3岁。面色苍黄1个月, 易疲乏, 食欲减退。体检: 肝肋下3cm, 质中, 脾肋下1.5cm。查血常规: Hb 83g/L, RBC  $2.28 \times 10^{12}/L$ , MCV 97fl, MCH 36pg, MCHC 36%。最可能的诊断是  
A. 溶血性贫血  
B. 再生障碍性贫血  
C. 缺铁性贫血  
D. 巨幼细胞贫血  
E. 感染性贫血
65. 女, 28岁, 经产妇。曾足月分娩2次。月经周期正常, 经量中等。查阴道前后壁明显膨出, 重度颗粒型宫颈糜烂, 宫口松, 子宫后倾, 正常大, 附件未见异常。患者要求避孕, 最合适的避孕方法是  
A. 口服短效避孕药  
B. 阴茎套避孕  
C. 外用避孕药  
D. 宫内节育器  
E. 安全期避孕
66. 女, 31岁。结婚5年未孕, 月经规律。妇科检查: 子宫正常大小, 双侧附件正常。男方精液检查正常。本例应首先进行  
A. 阴道脱落细胞学检查  
B. 输卵管通畅检查  
C. 宫颈黏液结晶  
D. 子宫内膜病理检查  
E. 子宫输卵管造影
67. 女, 2岁。面色苍白2个月, 易疲乏, 时而烦躁, 纳差。体检: 肝肋下3cm, 质中, 脾肋下1.5cm。查血常规: Hb 86g/L, RBC  $3.45 \times 10^{12}/L$ , MCV 68fl, MCH 20pg, MCHC 26%。最可能的诊断是  
A. 叶酸缺乏性贫血  
B. 再生障碍性贫血  
C. 缺铁性贫血  
D. VitB<sub>12</sub>缺乏性贫血  
E. 生理性贫血
68. 男, 1岁。发热6天, 呕吐、精神萎靡2天, 脑脊液WBC  $1000 \times 10^6/L$ , 多核0.7, 蛋白质1.3g/L, 糖1.2, 氯化物90, 潘氏试验阳性, 诊断是  
A. 颅内占位  
B. 化脓性脑膜炎  
C. 蛛网膜下腔出血  
D. 结核性脑膜炎  
E. 病毒性脑膜炎
69. 女, 65岁。夜尿增多3年, 乏力4个月。曾服用“龙胆泻肝丸”5年。查体: BP 145/90mmHg, 贫血貌。实验室检查: 血Hb 74g/L, SCr  $220 \mu\text{mol}/L$ 。尿比重1.010, 尿糖(+), 尿蛋白(+), 尿RBC 2~3/HP。  
B 超声双肾萎缩。其肾功能减退最主要的原因是  
A. 慢性肾盂肾炎  
B. 慢性间质性肾炎  
C. 慢性肾小球肾炎  
D. 糖尿病肾病  
E. 高血压肾损害
70. 女, 62岁, 活动时心前区闷痛3年, 加重4天, 休息4~5分钟后缓解, 每天发作1~2次, 近4天症状加重, 每天发作3~4次, 每次发作持续时间13~19分钟, 3年来规律服用阿司匹林和单硝酸异山梨酯, 糖尿病病史10年, 吸烟23余年, 血总胆固醇6.5mmol/L, 肌钙蛋白I正常, 心电图II、III、aVF导联ST段下斜型压低0.3mV, 就目前临床资料, 该患者最可能的诊断是  
A. 非ST段抬高型心肌梗死  
B. 初发型心绞痛  
C. 变异型心绞痛  
D. 恶化型心绞痛  
E. 静息型心绞痛
71. 男, 30岁。因甲状腺功能亢亢进行甲状腺切除, 术后第二天出现手足抽搐。最可能的原因是  
A. 喉上或喉返神经损伤  
B. 甲状旁腺功能低下  
C. 甲状腺功能低下  
D. 甲状腺危象  
E. 喉头水肿
72. 女, 25岁, 教师, 淋雨后畏寒、高热3天, 右胸痛2天, 深吸气时加剧, 查体: T 39.5℃, BP 80/50mmHg, P 110次/分, R 35次/分, 巩膜轻度黄染, 右下肺叩诊浊音, 右下肺可闻及支气管呼吸音, 心率110次/分, 心律不齐, 偶有早搏, 中上腹轻度压痛, 肢端湿冷, 此患者除抗感染治疗外, 应首先采取的诊疗措施是  
A. 急诊腹部B超检查  
B. 静脉注射碳酸氢钠  
C. 胸腹部CT检查  
D. 机械通气治疗

E. 液体复苏

73. 男, 36 岁。饱食后突感上腹部剧痛, 迅速扩展至全腹, 伴恶心、呕吐, 呕吐后腹痛无减轻, 发病 2 小时后来院急诊。体检: 痛苦面容, 血压 85/50mmHg, P 124 次/分, 全腹肌紧张, 压痛、反跳痛, 肠鸣音消失, WBC  $16 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞比例 0.90, 既往身体健康, 无消化性溃疡史, 有胆石症病史。最可能的诊断是

- A. 急性胰腺炎
- B. 急性胆管炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 十二指肠溃疡穿孔
- E. 急性肠梗阻

74. 女, 68 岁, 农民。2 年前无明显诱因出现双腕、双手关节和双膝、踝、足、跖趾关节肿痛, 伴晨僵, 时间约 30 分钟, 疼痛以夜间明显, 影响行动。实验室检查: 血沉 55mm/h, RF(+); 关节 X 线检查: 双手骨质疏松, 腕部关节间隙变窄。最可能的诊断是

- A. 类风湿性关节炎
- B. 骨性关节炎
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 干燥综合征
- E. 银屑病关节炎

75. 男, 60 岁。20 年前曾患肝炎。近 2 个月来食欲缺乏、消瘦, 肝区疼痛明显。查体: 轻度黄疸, 面部有蜘蛛痣, 腹膨隆, 肝肋下 2cm、剑下 4cm, 质硬, 压痛, 脾肋下 3cm, 移动性浊音阳性。拟诊为肝癌。现首先应检测的是

- A. 血氨
- B. 甲胎蛋白
- C. 血清胆红素
- D. 人血白蛋白
- E. 血清 ALT 和 AST

76. 男, 60 岁。腹泻、便秘交替, 粪便带血 6 个月。体重减轻 5g。查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 80 次/分, 心律齐, 腹软, 无压痛。血常规: Hb 120g/L, WBC  $15.6 \times 10^9/L$ , N 0.86。结肠镜检查于乙状结肠见溃疡性病灶。超声内镜提示病灶侵犯肠壁浆膜, 肠周无肿大淋巴结。该患者 TNM 分期中 T 分期考虑为

- A. T<sub>4</sub>
- B. T<sub>2</sub>

C. T<sub>3</sub> D. T<sub>3</sub>

E. T<sub>1</sub>

77. 男, 75 岁。间断上腹痛 20 年, 加重伴黑便 1 个月。查体: T 36.5°C, P 90 次/分, BP 120/80 mmHg。消瘦, 全身表浅淋巴结未触及, 上腹部深压痛, 无肌紧张、反跳痛。血常规: Hb 85g/L, WBC  $8.6 \times 10^9/L$ , Plt  $120 \times 10^9/L$ 。胃镜检查显示胃窦部 4cm × 3cm 溃疡型胃癌。超声内镜提示肿瘤浸润至固有肌层。腹部 CT 提示幽门上、下淋巴结肿大。该患者所患疾病的临床 TNM 分期是

- A. T<sub>2</sub>N<sub>3</sub>M<sub>0</sub>
- B. T<sub>2</sub>N<sub>2</sub>M<sub>0</sub>
- C. T<sub>1</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub>
- D. T<sub>3</sub>N<sub>2</sub>M<sub>0</sub>
- E. T<sub>2</sub>N<sub>1</sub>M<sub>0</sub>

78. 男, 75 岁。左下肢间歇性跛行 3 年, 疼痛加重 1 个月。既往高血压病史 8 年, 冠心病病史 5 年, 曾行冠脉支架植入术。查体: BP 150/90mmHg。左足苍白, 左足及左下肢皮温明显降低, 左足背动脉、腘动脉搏动消失, 左股动脉可触及搏动, 最可能的诊断是

- A. 血栓闭塞性脉管炎
- B. 动脉硬化性闭塞症
- C. 血栓性浅静脉炎
- D. 深静脉血栓形成
- E. 急性动脉栓塞

79. 男, 45 岁。双下肢疼痛加重 1 年, 加重 1 个月。1 年前出现双下肢疼痛, 行走一段距离后明显, 休息后好转, 1 个月来症状加重, 双下肢疼痛剧烈且持续, 以夜间更著。既往体健, 吸烟史 20 年, 20 余支/天。查体: T 36.5°C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 80 次/分, 律齐, 腹软, 无压痛。双下肢皮温略低, 感觉正常, Buerger 试验 (+)。该患者拟诊断为“血栓闭塞性脉管炎”, 其诊断分期为

- A. II<sub>a</sub> 期
- B. I 期
- C. II 期
- D. III<sub>b</sub> 期
- E. IV 期

80. 男, 65 岁。常年有咳嗽, 咳少量白痰。近 4 个月咳嗽加剧, 偶有血痰、乏力、低热, 抗感染治疗效果不显著。胸部 X 线检查未见异常。患者吸烟 18 年, 每天 1 包。最可能诊断是

- A. 慢性咽喉炎
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管肺癌
- E. 肺炎

81. 患儿,6岁,双下肢烧伤,双下肢有水疱,剧痛,其烧伤深度面积为
- A. 浅Ⅱ°,42%                      B. 深Ⅱ°,46%  
C. 深Ⅱ°,40%                      D. 浅Ⅱ°,46%  
E. 浅Ⅱ°,40%
82. 男,45岁。幼时曾患百日咳。近3个月有咳嗽、咳痰,近2天咳大量脓痰,今天早晨出现咯血。最有可能的诊断是
- A. 肺炎  
B. 支气管扩张  
C. 肺结核  
D. 慢性阻塞性肺疾病  
E. 肺癌
83. 男,60岁。反复咳嗽、咳痰伴喘息30年,5年前出现逐渐加重的呼吸困难,诊断为
- A. 肺炎                                  B. 支气管扩张  
C. 肺结核                                D. 慢性阻塞性肺疾病  
E. 肺癌
84. 某患者因腹泻、呕吐入院。心电图:ST段水平压低,T波倒置,U波增高,最可能的病因是
- A. 高钾血症  
B. 低钾血症  
C. 高钙血症  
D. 洋地黄效应  
E. 洋地黄中毒
85. 男,60岁。进行性吞咽困难半年,入院经X线钡餐透视诊断为食管癌。该病最常见的组织学类型
- A. 鳞状细胞癌  
B. 腺癌  
C. 未分化癌  
D. 腺鳞癌  
E. 小细胞癌
86. 女,67岁。体检发现血压高,平素无不适,其父亲于50岁时死于急性心肌梗死。查体:血压155/100mmHg,实验室检查血清总胆固醇5.9mmol/L,对该患者高血压的诊断应为
- A. 1级,高危  
B. 2级,高危  
C. 2级,很高危  
D. 2级,中危  
E. 1级,很高危
87. 男,55岁。因急性阑尾炎穿孔入院。行阑尾切除术后第6天,出现发热,体温上升至39.0℃,伴有腹泻及里急后重。查体:心肺未见明显异常,手术切口无红肿、渗出。此时首选的检查是
- A. 粪常规  
B. 胸部X线片  
C. 直肠指诊  
D. 腹部X线片  
E. 腹部B超
88. 男,65岁。因腹水服用利尿剂2周。3天来出现少语寡言及随地便溺。5年前诊断为肝硬化。目前行为异常的原因首先考虑为
- A. 神经症  
B. 脑血管意外  
C. 肝性脑病  
D. 电解质紊乱  
E. 代谢性酸中毒
89. 男,21岁。车祸致左髌关节受伤,出现左髌部疼痛、外展、外旋、屈曲畸形,弹性固定,正确的诊断是
- A. 股骨颈骨折  
B. 髌关节后脱位  
C. 股骨转子间骨折  
D. 髌关节中心性脱位  
E. 髌关节前脱位
90. 男,40岁。腹泻1天,约20多次,“米水样”便,继之呕吐数次,无明显发热及腹痛。查体:T 36℃,P 120次/分,BP 60/40mmHg,意识模糊,重度脱水貌,腹软,无压痛,肠鸣音活跃。实验室检查:粪镜检未见白细胞,悬滴法观察粪便中细菌穿梭样运动,碱性蛋白陈水镜养有细菌生长。引起本病的病原体是
- A. 弯曲菌                                B. 霍乱弧菌  
C. 志贺菌                                D. 大肠埃希菌  
E. 沙门菌
91. 男性患者,因骨折和脾破裂入院,术后卧床制动,第5天患者出现胸闷、呼吸困难。查体:T 37.4℃,BP 83/57mmHg,R 23次/分,SaO<sub>2</sub> 90%,心率103次/分,患者最可能的诊断是
- A. 急性左心衰                        B. 肺栓塞  
C. 右心衰                                D. 急性心梗  
E. 脑出血
92. 8个月婴儿发热。体温高达39℃,咽红,精神尚好,静点3天头孢唑啉及双黄连,第4天热退,但患儿皮肤出现红色斑丘疹,颈部及躯干明显,既往

- 曾用过头孢唑啉,诊断最可能为
- A. 麻疹  
B. 药疹  
C. 风疹  
D. 幼儿急疹  
E. 荨麻疹
93. 男,18岁。右大腿下端肿痛1个月,表皮温度高,静脉怒张,X线片示右股骨下端有边界不清的骨质破坏区,有Codman三角表现,诊断是
- A. 骨转移瘤  
B. 骨巨细胞瘤  
C. 骨肉瘤  
D. 骨软骨瘤  
E. 骨炎
94. 男,36岁。慢性上腹痛12年,上腹胀,呕吐3天,缺失最明显的电解质是
- A. 磷酸盐  
B. 镁离子  
C. 钾离子  
D. 碳酸氢盐  
E. 钙离子
95. 男,26岁。高热伴右胸痛1天,胸片示右肺下叶实变影,其内可见多发气囊,感染的病原体是
- A. 肺炎链球菌  
B. 肺炎克雷伯杆菌  
C. 结核分枝杆菌  
D. 病毒  
E. 金黄色葡萄球菌
96. 女,30岁。发热、咳嗽5天,WBC  $3 \times 10^9/L$ ,胸片显示右下肺纹理增多,呈“毛玻璃状”阴影,血清学检测特异IgG抗体(+),感染的病原体是
- A. 肺炎链球菌  
B. 肺炎克雷伯杆菌  
C. 结核分枝杆菌  
D. 病毒  
E. 金黄色葡萄球菌
97. 中年女性,胃癌术后7天。术后出现左下肢肿胀,骨伤痛明显,其诱因是
- A. 大隐静脉曲张  
B. 深静脉瓣膜功能不全  
C. 血栓性脉管炎  
D. 浅静脉血栓形成  
E. 深静脉血栓形成
98. 老年女性,CT显示右肾肿块 $9\text{cm} \times 7\text{cm}$ ,考虑恶性肿瘤,然后选择如何治疗
- A. 化疗、放疗  
B. 免疫治疗  
C. 肿瘤切除  
D. 根治性肾切除  
E. 中医中药
99. 男,44岁。3年来常在感冒后出现血尿,不伴尿频、尿急尿痛等症状,血尿反复发作,无水肿,BP 150/100mmHg,间歇期尿RBC 3~5/HP,尿蛋白(++),无肾脏病家族史,该患者治疗措施不恰当的是
- A. 限制食盐摄入  
B. 药物首选ACEI类药物  
C. 低蛋白饮食,动物蛋白为优  
D. 避免使用氨基糖苷类药物  
E. 足量糖皮质激素
100. 男,30岁。被膜下脾破裂2小时,不口渴,入院后排尿1次,约300ml,未见肉眼血尿。查体:P 96次/分,BP 90/65mmHg。为迅速改善组织灌注,应首选
- A. 红细胞悬液  
B. 新鲜冰冻血浆  
C. 平衡盐液  
D. 全血  
E. 羟乙基淀粉溶液
101. 男,60岁。间断上腹痛3年,饱餐后突发全腹剧痛2小时,伴大汗。既往类风湿性关节炎病史6年,常年服用双氯芬酸钠治疗。查体:T 36.5℃,P 80次/分,R 20次/分,BP 140/80mmHg。急性痛苦面容,面色苍白、大汗。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音。全腹部压痛,腹肌紧张。最可能的病变部位是
- A. 结肠  
B. 胃  
C. 食管  
D. 胆囊  
E. 空肠
102. 男,45岁。受凉后畏寒、发热5天,咳嗽、咳黄脓痰,无咯血。既往有糖尿病病史。胸部X线片示右下肺大片实变阴影,入院后症状加重,伴气促,烦躁,四肢湿冷。查体:R 34次/分,BP 85/50mmHg,右肺呼吸音减弱,可闻及细湿啰音,心率120次/分,未闻及杂音。首先考虑的诊断是
- A. 重症肺炎  
B. 肺真菌病  
C. 急性肺血栓栓塞症  
D. 肺结核  
E. 肺脓肿

103. 男, 60岁。乏力、纳差、眼黄、皮肤瘙痒3周, 大便色白, 体重下降3kg。既往体健, 偶有饮酒。查体: T 36.5°C, P 80次/分, R 18次/分, BP 120/80mmHg。皮肤巩膜明显黄染, 未见肝掌及蜘蛛痣。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软, 上腹可触及边界不清包块, 不随呼吸移动, 无压痛。应首先考虑的诊断是
- 胆囊结石
  - 急性化脓性胆管炎
  - 胰腺癌
  - 胆总管结石
  - 急性肝炎
104. 女, 28岁。腹痛、发热、呕吐1天。查体: T 38.9°C, P 120次/分, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率120次/分, 心律齐。右下腹麦氏点压痛、反跳痛(+)。血常规: Hb 120g/L, WBC  $10.2 \times 10^9/L$ , N 1.85, Plt  $202 \times 10^9/L$ 。行阑尾切除术, 手术标本病理检查可见阑尾壁各层大量弥漫性浸润的细胞是
- 淋巴细胞
  - 巨噬细胞
  - 嗜碱性粒细胞
  - 嗜酸性粒细胞
  - 中性粒细胞
105. 男, 35岁。间断咳嗽, 咳痰伴咯血20年, 最多1次咯血200ml。行高分辨率CT检查右肺中叶支气管囊状扩张, 其余肺叶未见明显异常。今天再次咯血, 量约100ml, 给予静脉注射垂体后叶素治疗, 效果欠佳, 该患者宜选择的最佳治疗措施是
- 病变肺叶肺动脉栓塞
  - 继续静脉滴注止血药
  - 支气管镜下止血
  - 换用酚妥拉明静脉滴注
  - 手术切除病变肺叶
106. 女, 58岁。排便习惯改变6个月, 便中带血3周。查体: 腹平软, 未触及包块。移动性浊音(-), 肠鸣音正常。直肠指诊: 直肠前壁距肛缘4cm菜花型肿物, 侵及直肠1/4周径肿物直径2cm, 指套染血。该患者最可能的诊断是
- 溃疡性结肠炎
  - 结肠息肉
  - 肠结核
  - 慢性细菌性痢疾
  - 直肠肿瘤
107. 男, 13岁。右足底被铁钉刺伤, 已清创, 伤口已愈合。7天后发热、咳嗽、咀嚼无力、多痰, 局部肌肉紧张, 继而频繁四肢抽搐, 一般镇静药治疗无效。为保证患者安全, 应立即采取的治疗措施是
- 在扩大清创+注射TAT
  - 气管切开
  - 大剂量青霉素治疗+肠外营养
  - 隔离+避光刺激
  - 高压氧
108. 女, 35岁。转移性右下腹疼痛5天, 伴畏寒、发热2天。查体: T 38.5°C, P 90次/分, R 21次/分。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 全腹肌紧张, 有明显压痛和反跳痛, 麦氏点压痛明显, 肠鸣音消失, 腹腔穿刺抽出脓性液体, 细菌培养结果左右可能为
- 大肠埃希菌
  - 溶血性链球菌
  - 铜绿假单胞菌
  - 金黄色葡萄球菌
  - 变形杆菌
109. 男, 60岁。上腹部不适1年, 无反酸、嗝气、呕吐, 无腹泻。查体: T 36.5°C, P 80次/分, R 18次/分, BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛, 胃镜检查: 胃体部黏膜灰白色, 血管透见, 胃黏膜活组织病理检查: 胃体腺体明显减少, 为进一步明确诊断, 应进行的实验室检查是
- 血胃泌素
  - 血抗线粒体抗体
  - 血胃蛋白酶原I/II比例
  - 血壁细胞抗体
  - 粪找幽门螺杆菌
110. 女, 50岁。间歇性上腹痛伴皮肤巩膜黄染半年, 再次发作2天。查体: T 36.5°C, P 80次/分, BP 120/80mmHg。皮肤巩膜明显黄染, 未见肝掌、蜘蛛痣。右上腹压痛, 无明显肌紧张和反跳痛。B超检查示胆囊管内多发泥沙样结石, 胆总管略扩张。最恰当的手术方式是
- 胆肠吻合术
  - 胆囊切除、胆总管探查术
  - 胆囊造瘘、胆总管探查术
  - 胆囊造瘘术
  - 腹腔镜胆囊切除术

111. 女, 65 岁。持续性上腹痛 1 天。查体: T 38.4℃。巩膜无黄染。心肺无异常。上腹部压痛。肠鸣音减退。实验室检查: Hb 120g/L, WBC  $15.4 \times 10^9/L$ , Plt  $154 \times 10^9/L$ ; 血淀粉酶 860U/L, LDH 456U/L。腹部 B 超: 胆总管内径 0.6cm, 末端及胰腺因气体干扰显示不清。对患者的诊断及指导治疗最有意义的辅助检查是
- A. 腹部 X 线平片  
B. 腹部增强 CT  
C. 心电图  
D. 经内径逆行胆胰管造影  
E. 超声心动图
112. 女, 50 岁。腹痛伴剧烈呕吐 2 天, 诊断为轻症急性胰腺炎, 身高 160cm, 体重 60kg, 予禁食, 按基本需要量计算全胃肠外营养, 其每天需要的总热量约为
- A. 1 200kcal  
B. 2 000kcal  
C. 2 800kcal  
D. 1 600kcal  
E. 2 400kcal
113. 女, 50 岁。2 天前因肺炎入院, 给予吸氧、静脉滴注抗生素、止咳、化痰等治疗。1 天来出现呼吸困难, 烦躁, 呼吸急促。动脉血气分析: pH 7.44, PaCO<sub>2</sub> 65mmHg, PaO<sub>2</sub> 55mmHg, BE<sup>-</sup> 3mmol/L。目前对血气分析的判断, 最准确的是
- A. 代谢性酸中毒  
B. I 型呼吸衰竭  
C. 呼吸性酸中毒  
D. II 型呼吸衰竭  
E. 呼吸性酸中毒合并呼吸性碱中毒
114. 男, 30 岁。车祸致腹部闭合性损伤 5 小时, 查体发现有下列阳性表现, 其中提示腹部空腔脏器破裂的最主要依据是
- A. 肝浊音界消失  
B. 腹部压痛并反跳痛  
C. 腹肌紧张  
D. 肠鸣音消失  
E. 腹式呼吸减弱
115. 女, 45 岁。左下肢沉重感伴浅静脉扩张, 长时间站立加重, 休息后减轻, 既往高血压病史 5 年, 查体: 左下肢小腿内侧局部皮肤色素沉着, 皮下可触及硬结, 大隐静脉瓣膜功能试验(+), 最可能的诊断是
- A. 动脉硬化性闭塞症  
B. 原发性深静脉瓣膜功能不全  
C. 动静脉瘘  
D. 原发性下肢静脉曲张  
E. 下肢血栓性浅静脉曲张
116. 男, 60 岁。进食哽噎感 2 月余。上消化道 X 线钡剂造影示中段食管管壁充盈缺损, 为明确诊断, 应首选的检查是
- A. 胸部 CT  
B. 胸部 X 线片  
C. 胃镜  
D. PET-CT  
E. 食管拉网细胞学检查
117. 女, 50 岁。2 周前无明显诱因出现中上腹隐痛, 皮肤巩膜黄染, 小便呈浓茶样, 1 周前腹痛缓解, 皮肤黄染减退, 无皮肤瘙痒。实验室检查: ALT 90U/L, 尿胆红素(+), 该患者最可能的疾病与胰头癌的鉴别诊断要点是
- A. 黄疸无波动  
B. 血清淀粉酶改变  
C. 皮肤有无瘙痒  
D. 尿胆红素阳性  
E. 肝功能改变
118. 女, 35 岁。发现颈前包块 3 年, 半年来有所增大, 无不适症状, 既往体健, 查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 甲状腺右叶触及 2.5cm × 2cm 肿物, 质硬, 边界不清, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心率 80 次/分, 心律齐, 腹软, 无压痛。超声提示甲状腺右叶下段 2.1cm × 1.9cm 实性占位, 边缘不规则, 内有细小钙化, 为患者进行手术治疗的依据是
- A. 易激发甲亢  
B. 有恶性可能  
C. 包块半年内有所增大  
D. 易伴发出  
E. 包块大小
119. 男, 30 岁。反复干咳 3 年, 间断发作, 发作时口服多种抗生素无效, 可自行缓解, 曾行肺功能检查结果正常, 近 2 周来再次出现咳嗽, 凌晨常咳醒, 不伴喘息。查体: 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 胸部 X 线片未见异常, 为明确诊断, 首选检查是
- A. 支气管激发试验  
B. 血 IgE 检测

- C. 胸部 CT  
D. 心电图  
E. 动脉血气分析

120. 男, 30 岁。剧烈活动后突发胸痛 1 小时。查体: P 98 次/分, R 25 次/分, 急性病容, 呼吸浅快。右肺叩诊鼓音, 听诊呼吸音消失, 左肺呼吸音正常。最可能的诊断是

- A. 胸腔积液  
B. 支气管哮喘  
C. 自发性气胸  
D. 肺气肿  
E. 肺栓塞

121. 女, 25 岁。右鼻翼皮肤红肿、疼痛 5 天, 中心有脓头, 自行挑破、挤压、排脓。1 天后局部肿胀加重伴寒战、高热、头痛, 逐渐神志不清。查体: T 39℃, P 90 次/分, BP 100/60mmHg。最可能的诊

断是

- A. 化脓性海绵状静脉窦炎  
B. 面部蜂窝织炎  
C. 眼眶内化脓性炎症  
D. 菌血症  
E. 面部疖

122. 女, 25 岁。突发呼吸困难 2 天。发病前有鼻痒、喷嚏症状, 既往有类似病史。查体: R20 次/分, 双肺呼吸相略延长, 未闻及干湿性啰音, 心率 90 次/分, 心律齐。该患者行肺功能检查最可能的异常是

- A. 功能残气量减少  
B. 肺活量下降  
C. 肺总量下降  
D. FEV<sub>1</sub>/FVC% 下降  
E. 一氧化碳弥散量下降

### A3/A4 型选择题 (123—139 题)

#### 答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

#### (123—124 题共用题干)

男, 50 岁。高热、全身酸痛、咳嗽 2 天入院, 咳少量脓痰, 既往体健。查体: T 39.8℃, P 69 次/分, R 30 次/分, BP 90/60mmHg, 口唇发绀, 双下肢可闻及湿啰音, 血 WBC  $12.8 \times 10^9/L$ , N 0.85, 胸部 X 线片示双下肺斑片状阴影, 无空洞, 右侧少量胸腔积液, 血气分析是 I 型呼吸衰竭。

123. 该患者如采用单药治疗, 下列药物中首选的是

- A. 头孢曲松  
B. 左氧氟沙星  
C. 奥司他韦  
D. 万古霉素  
E. 碳青霉烯类

124. 考虑治疗方案时, 应特别注意覆盖的病原体是

- A. 肺炎链球菌  
B. 金黄色葡萄球菌  
C. 病毒  
D. 革兰阴性杆菌  
E. 军团菌

#### (125—126 题共用题干)

女, 68 岁。下腹痛、腹泻半年, 呈隐痛, 无明确定位, 近 2 月来感乏力, 便中带血, 入院检查。查体: 口唇面色苍白, 右下腹压痛, 可触及 5cm × 3cm, 边界欠清的包块, 质地硬, 轻压痛, Hb 78g/L。

125. 为明确诊断, 最有价值的检查方法是

- A. 纤维结肠镜检查  
B. 大便潜血试验  
C. 钡剂灌肠检查  
D. 直肠指诊  
E. CEA 测定

126. 该患者最可能的诊断是

- A. 结肠息肉  
B. 结肠癌  
C. 溃疡性结肠炎  
D. 肠结核  
E. 肠梗阻

#### (127—129 题共用题干)

2008 年发生 200 例某病人, 在 2008 年年初已知有 800 例病人, 年内因该病死亡 40 例, 年中人口数 1 000 万, 如果该病的发生和因该病死亡的事件均匀分布在全年, 则

127. 2008 年该病的发病率(1/10 万)是



- A. 2.0
- C. 10.0
- E. 0.4
- B. 8.0
- D. 1.6

128. 2008 年期间该病的患病率(1/10 万)是

- A. 0.4
- C. 1.6
- E. 2.0
- B. 8.0
- D. 10.0

129. 2008 年期间该病的死亡率(1/10 万)是

- A. 2.0
- C. 10.0
- E. 0.4
- B. 8.0
- D. 1.6

**(130—131 题共用题干)**

男,40 岁。患十二指肠球部溃疡穿孔,急症上腹正中切口行胃大部切除术,切口内置乳胶片引流。

130. 一般拔除引流片的时间为术后

- A. 9~10 天
- C. 7~8 天
- E. 5~6 天
- B. 1~2 天
- D. 3~4 天

131. 正常情况下,该患者拆线时间应为术后

- A. 5~6 天
- C. 12 天以上
- E. 3~4 天
- B. 10~12 天
- D. 7~9 天

**(132—133 题共用题干)**

女,50 岁。对称性多关节肿痛 3 年,晨僵 2 小时,实验室检查:RF 阳性,双手 X 线片示近端指间关节面虫蚀样改变,关节间隙狭窄。

132. 应首先考虑的诊断是

- A. 反应性关节炎
- C. 类风湿性关节炎
- E. 痛风性关节炎
- B. 强直性脊柱炎
- D. 骨关节炎

133. 可用于治疗该患者的药物是

- A. 维拉帕米
- C. 青霉素
- E. 来氟米特
- B. 头孢菌素
- D. 维生素 C

**(134—135 题共用题干)**

男,72 岁。突发胸痛、胸闷喘憋 8 小时。查体:BP 165/95mmHg,R 30 次/分,端坐呼吸。双肺可闻及广泛湿啰音及散在哮鸣音。心率 126 次/分,心律齐,心脏各瓣膜区未闻及杂音。ECG 示:V<sub>1</sub>~V<sub>5</sub>。导联 ST 段抬高。动脉血气分析:pH 7.38,PaO<sub>2</sub> 75mmHg,

PaCO<sub>2</sub> 40mmHg。

134. 该患者最可能的诊断为

- A. 变异性心绞痛
- C. 细菌性肺炎
- E. 急性心肌梗死
- B. 急性心包炎
- D. 稳定性心绞痛

135. 患者治疗后 2 周出现发热胸痛,查外周血象白细胞增高,查体可闻及心包摩擦音和胸膜摩擦音,考虑的诊断是

- A. 急性心包炎
- C. 细菌性肺炎
- E. 心肌梗死后综合征
- B. 再发心肌梗死
- D. 肺栓塞

**(136—137 题共用题干)**

女,65 岁。刺激性咳嗽 1 个月,发现痰中带血丝 1 周,胸部 X 线片示右肺上叶周围型结节影,大小约 2.5cm×2.5cm,边界不清,有短毛刺,既往体健,无其他肺部疾病史,吸烟 20 年,10~20 支/天。

136. 应首选的检查是

- A. 支气管镜
- C. 胸部 B 超
- E. 胸腔镜
- B. 纵隔镜
- D. 胸部 CT

137. 该患者最可能的诊断是

- A. 肺癌
- C. 肺结核
- E. 肺脓肿
- B. 肺真菌感染
- D. 肺错构瘤

**(138—139 题共用题干)**

女,50 岁。2 小时前烧伤双侧臀部、双下肢(不包括双足),皮肤明显红肿,疼痛较剧,伤处布满大小水疱,内含黄色液体,去疱皮见创面红润、潮湿。血压等生命体征正常。

138. 估计该患者烧伤深度及面积是

- A. III°,47%
- C. 浅 II°,40%
- E. 深 II°,47%
- B. II°,40%
- D. 浅 II°,47%

139. 其初期处理中不适合的是

- A. 清创后创面全部包扎
- C. 大水疱消毒,抽去液体
- E. 按烧伤输液公式补液
- B. 保留小水疱,消毒,不包扎
- D. 注射破伤风抗毒素

## B1 型选择题 (140—150 题)

## 答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

## (140—141 题共用备选答案)

- A. 慢性肺脓肿
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 慢性纤维空洞性肺结核
- D. 过敏性支气管肺曲霉病
- E. 支气管扩张

140. 男,45 岁,间断咳嗽、咳脓痰 10 余年。查体:双上肺可闻及湿啰音,可见杵状指。胸部 X 线片示双下肺多个囊状透亮区,部分可见液平。最可能的诊断是
141. 男,60 岁。间断咳嗽、咳脓痰 10 余年。查体:双上肺可闻及湿啰音。胸部 X 线片示双上肺多个透亮区,未见液平,双侧肺门上提。最可能的诊断是

## (142—143 题共用备选答案)

- A. 低钾血症
- B. 高钾血症
- C. 高钠血症
- D. 低钙血症
- E. 低钠血症

142. 大量输注葡萄糖和胰岛素时容易发生的电解质紊乱是
143. 心电图可出现 T 波高尖的电解质紊乱是

## (144—146 题共用备选答案)

- A. 动力性肠梗阻
- B. 绞窄性肠梗阻
- C. 低位肠梗阻
- D. 急性完全性肠梗阻
- E. 慢性肠梗阻

144. 肠管呈代偿性肥厚并可引起低渗性缺水的原因是
145. 肠管迅速膨胀,肠管变薄,可引起等渗性缺水的原因是
146. 持续性腹痛便秘,肠鸣音减弱或消失,有腹膜刺激征的是

## (147—148 题共用备选答案)

- A. 碱性磷酸酶
- B. 谷氨酸氨基转移酶
- C. 甲胎蛋白
- D. 白蛋白
- E. 丙氨酸氨基转移酶

147. 反映肝硬化肝功能减退的指标是
148. 继发性肝癌一般不会发生变化的指标是

## (149—150 题共用备选答案)

- A. 突发上腹痛并扩展至全腹剧痛,腹肌紧张,全腹压痛、反跳痛
- B. 心率快、面色苍白、尿少、血压降低
- C. 餐后上腹疼痛,呕吐大量酸臭残食,查体可见胃蠕动波
- D. 上腹痛失去节律性,服用抑酸剂无效,粪隐血持续阳性
- E. 反酸、烧心

149. 提示胃溃疡患者发生癌变的典型表现是
150. 提示消化性溃疡并发幽门梗阻的表现是

## 第四单元

### A1 型选择题 (1—39 题)

#### 答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 全血在保存期内,仍可保持功能的血液成分是  
A. 红细胞  
B. 凝血因子 V  
C. 白细胞  
D. 血小板  
E. 凝血因子 VII
- 感染性心内膜炎最常累及的部位是  
A. 室间隔缺损处  
B. 心脏瓣膜  
C. 动静脉瘘  
D. 房间隔缺损处  
E. 未闭动脉导管
- 下列不属于戒断综合征表现的是  
A. 肢体震颤  
B. 情绪改变  
C. 幻觉或错觉  
D. 失眠  
E. 近记忆增强
- 下列属于川崎病诊断标准的是  
A. 卡介苗接种处发红  
B. 球结膜充血伴脓性分泌物  
C. 肛周皮肤发红、脱皮  
D. 肝脾肿大  
E. 指/趾末端膜状脱皮
- 躁狂发作的睡眠障碍特点是  
A. 早醒  
B. 多梦  
C. 睡眠浅  
D. 睡眠减少  
E. 入睡困难
- 诊断神经性厌食时, BMI 不高于  
A.  $18.5\text{kg}/\text{m}^2$   
B.  $17.5\text{kg}/\text{m}^2$   
C.  $25.0\text{kg}/\text{m}^2$   
D.  $22.5\text{kg}/\text{m}^2$   
E.  $15.5\text{kg}/\text{m}^2$
- 6 个月以后婴儿容易发生小细胞低色素性贫血的最主要原因是  
A. 添加淀粉类食品过多  
B. 膳食总热量不足  
C. 生长发育需要量增大  
D. 未及时添加含铁丰富的辅食  
E. 人工喂养铁的吸收率低
- 关于多囊卵巢综合征的内分泌特征,错误的是  
A. 胰岛素过多  
B. 雌酮过多  
C. 雄激素过多  
D. 孕酮过多  
E. LH/FSH 比值升高
- 属于卵巢上皮性肿瘤的是  
A. 畸胎瘤  
B. 颗粒细胞瘤  
C. 卵黄囊瘤  
D. 浆液性肿瘤  
E. 纤维瘤
- 孕足月活胎不能经阴道试产的胎方位是  
A. 枕左后位  
B. 枕右横位  
C. 肩左前位  
D. 骶左前位  
E. 枕左前位
- 与传导下肢本体感觉相关的结构是  
A. 内侧纵束  
B. 孤束  
C. 薄束  
D. 楔束  
E. 脊髓丘脑束
- 与子宫不直接相连的韧带是  
A. 主韧带  
B. 圆韧带  
C. 宫骶韧带  
D. 骨盆漏斗韧带  
E. 卵巢固有韧带
- 下列不属于未足月胎膜早破 (PPROM) 高危因素的是  
A. 生殖道感染

- B. 子宫过度膨胀  
C. PPRM 史  
D. 前置胎盘  
E. 宫颈功能不全
14. 根据受伤机制,将头部受力部位对侧的脑损伤称为  
A. 贯通伤  
B. 传导伤  
C. 着力点伤  
D. 对冲伤  
E. 切线伤
15. 可导致慢性胎儿窘迫的是  
A. 前置胎盘大出血  
B. 羊水过多  
C. 脐带绕颈  
D. 胎盘早剥  
E. 胎盘功能减退
16. 常引起子宫内膜增生的卵巢肿瘤是  
A. 卵黄囊瘤  
B. 纤维瘤  
C. 畸胎瘤  
D. 颗粒细胞瘤  
E. 浆液性肿瘤
17. 心源性脑梗死的最主要病因是  
A. 感染性心内膜炎  
B. 慢性心力衰竭  
C. 冠心病  
D. 心房颤动  
E. 心肌梗死
18. 新生儿缺氧缺血性脑病最主要的治疗是  
A. 早期运动功能训练  
B. 早期维持血糖、血气、血循环正常  
C. 新生儿期后的治疗  
D. 早期应用脱水剂加细胞营养药物  
E. 早期应用神经抑制剂
19. 高血压脑出血最好发于  
A. 小脑  
B. 中脑  
C. 脑桥  
D. 基底节  
E. 脑室
20. 马尾的组成主要是  
A. 骶神经根围绕终丝而形成  
B. 腰、骶神经根围绕终丝而形成  
C. 腰神经根围绕终丝而形成  
D. 骶、尾神经根围绕终丝而形成  
E. 腰、骶、尾神经根围绕终丝而形成
21. 妊娠期母体心排出量最高时较未孕时增加约  
A. 28%  
C. 10%  
E. 15%
22. 隐匿型维生素 D 缺乏性手足抽搐症持有阳性体征是  
A. 布氏征  
C. 巴氏征  
E. 霍夫曼征
23. 外伤性亚急性硬脑膜下血肿发生的时间是  
A. 1 天~3 周  
C. 2 天~3 周  
E. 1 周~3 周
24. 提示胎盘功能低下的情况是  
A. 孕妇尿雌三醇明显增高  
B. NST 反应型  
C. 孕妇尿雌激素/肌酐比值明显增加  
D. 孕妇血清人胎盘催乳素明显增加  
E. OCT 阳性
25. 关于急性盆腔炎性疾病的处理,正确的是  
A. 病情好转,盆腔脓肿存在者,继续观察  
B. 可根据经验选择抗生素治疗  
C. 喹诺酮类药物可作为首选药物  
D. 需反复行妇科检查评估治疗效果  
E. 放置宫内节育器者,应立即取出
26. 精索静脉曲张,左侧多于右侧的主要原因不是  
A. 左侧呈直角注入左肾静脉  
B. 乙状结肠压迫  
C. 入肾静脉处瓣膜发育不全  
D. 静脉壁的平滑肌薄弱  
E. 左肾下垂
27. 腹膜返折以上直肠癌早期淋巴转移的主要途径是  
A. 向直肠上动脉旁淋巴结转移  
B. 向腹股沟淋巴结转移  
C. 向髂内淋巴结转移  
D. 向直肠下动脉旁淋巴结转移  
E. 向侧方淋巴结转移
28. 苯丙酮尿症早治疗的主要目的是  
A. 减少皮肤湿疹  
B. 控制惊厥  
C. 防止智力发育落后  
D. 使头发及皮肤颜色转为正常  
E. 减少尿臭味

29. 下列乳腺癌病理类型中,预后最差的是
- A. 浸润性小叶癌
  - B. 黏液癌
  - C. 小管癌
  - D. 乳头湿疹样癌
  - E. 导管内癌
30. 升结肠癌的主要临床表现为
- A. 黑便
  - B. 里急后重
  - C. 贫血
  - D. 便秘
  - E. 肠梗阻
31. 胸腔手术后可判断为内出血的情况是:从胸腔引流管每小时引流出的血液量超过
- A. 150ml
  - B. 50ml
  - C. 100ml
  - D. 75ml
  - E. 125ml
32. 关于肠梗阻临床表现的描述,正确的是
- A. 低位肠梗阻腹胀及腹痛不明显
  - B. 低位小肠梗阻 X 线检查可见多个气液平
  - C. 高位肠梗阻呕吐物多为粪性
  - D. 高位肠梗阻较低位肠梗阻腹胀明显
  - E. 低位肠梗阻呕吐症状出现早
33. 胃癌扩散至横结肠,其最可能的转移方式属于
- A. 血性转移
  - B. 淋巴转移
  - C. 直接浸润
  - D. 跳跃转移
  - E. 腹膜种植转移
34. 甲状腺切除术后发生了饮水呛咳,是术中损伤了
- A. 颈丛神经
  - B. 喉返神经
  - C. 喉上神经内支
  - D. 副神经
  - E. 喉上神经外支
35. 风湿性疾病中以唾液腺炎症为主要病理改变的疾病是
- A. ANCA 相关血管炎
  - B. 系统性硬化症
  - C. 系统性红斑狼疮
  - D. 类风湿性关节炎
  - E. 干燥综合征
36. 门静脉高压症患者出现食管胃底曲张静脉破裂大出血,易并发
- A. 肝性脑病
  - B. 急性肾衰竭
  - C. 急性肝衰竭
  - D. 肺水肿
  - E. 急性心力衰竭
37. 关于小儿时期白细胞总数的特点,正确的是
- A. 婴儿期约  $10 \times 10^9/L$
  - B. 1 个月时平均  $15 \times 10^9/L$
  - C. 1 周时平均为  $20 \times 10^9/L$
  - D. 3 岁时接近成人水平
  - E. 出生时为  $(20 \sim 30) \times 10^9/L$
38. 儿童正常血钾型周期性瘫痪发病时,治疗首选
- A. 静脉滴注葡萄糖酸钙
  - B. 静脉滴注氯化钠
  - C. 胰岛素
  - D. 胰高血糖素
  - E. 静脉滴注氯化钾
39. 肺炎链球菌肺炎合并肺炎旁积液的患者,需要考虑胸水引流的情况是
- A. 胸水呈血性
  - B. 胸水 LDH 升高
  - C. 胸水有核细胞分类以多核细胞为主
  - D. 胸水血清白蛋白梯度增加
  - E. 胸水细菌培养阳性

A2 型选择题(40—104 题)

答题说明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

40. 患者频繁照镜子,感到自己的眼睛和鼻子都比原来大了一倍,该症状是
- A. 幻视
  - B. 非真实感
  - C. 错觉
  - D. 视物变形症
  - E. 幻触
41. 3 月龄以下婴儿患化脓性脑膜炎,最主要的特点是
- A. 喷射性剧烈呕吐
  - B. 高热
  - C. 缺乏典型临床症状
  - D. 脑膜刺激征阳性

- E. 强直-阵挛性惊厥
42. 男孩, 2岁。PPD 试验 72 小时显示硬结直径 21mm。最有可能的是
- A. 4 周内接种了卡介苗  
B. 过去患过结核病  
C. 出生时接种了卡介苗  
D. 1 周内接触了开放性肺结核患者  
E. 正在患结核病
43. 女, 35 岁。宫内节育器避孕 10 年, 阴道不规则流血 2 个月, 要求取环, 妇科检查: 外阴阴道充血, 阴道少量流血, 伴异味, 宫颈光滑, 子宫及双侧附件未触及异常, 下列处理不正确的是
- A. 需先治疗生殖道炎症  
B. 血 hCG 检查排除妊娠  
C. 取样同时建议刮宫  
D. 需血止后 3~7 天取环  
E. 取环前需盆腔超声检查
44. 女, 25 岁。近半年来反复担心自己会拿刀具伤人, 害怕自己会拿锋利的菜刀剪刀伤害家人。自己知道这些想法不合理, 努力控制不去想, 但非常痛苦。该患者最可能的诊断是
- A. 抽动障碍  
B. 强迫障碍  
C. 精神分裂症  
D. 恐惧性焦虑障碍  
E. 广泛性焦虑障碍
45. 男, 70 岁。2 年来经常不能完整叙述新近发生的事情, 且常常无中生有地讲述了一些从未发生过的事情。患者意识清楚, 但经常记错时间和地点。最可能的症状是
- A. 急性脑综合征  
B. 脑衰弱综合征  
C. 遗忘综合征  
D. 精神自动症  
E. 紧张综合征
46. 女, 25 岁。初产妇, 妊娠 40 周, 阵发性下腹痛 6 小时, 自然破膜 5 小时, 羊水清。胎心 110 次/分, 宫口开大 2cm, 头先露。产时胎心监护显示多次晚期减速。此时最恰当的处理是
- A. 静滴缩宫素  
B. 立即行剖宫产术  
C. 吸氧并继续观察产程  
D. 宫颈注射地西洋
- E. 静滴硫酸镁
47. 女婴, 2 个月。过期产, 出生体重 4kg, 出生后吃奶慢, 便秘, 大便 6~7 天 1 次, 至今黄疸尚未完全消退。检查: 哭声低哑, 手脚凉, 腹部膨隆。最可能的诊断是
- A. 先天性甲状腺功能减退症  
B. 新生儿肝炎综合征  
C. 低血糖  
D. 习惯性便秘  
E. 先天性巨结肠
48. 初产妇, 30 岁。妊娠 30 周, 视物模糊 1 天, 孕前体健。查体: BP 160/105mmHg, 胎心率 150 次/分, 双下肢明显水肿。蛋白尿定量 2g/24h。最可能的诊断是
- A. 妊娠合并慢性肾炎  
B. 妊娠期高血压  
C. 重度子痫前期  
D. 轻度子痫前期  
E. 子痫
49. 男, 70 岁。乏力、纳差 2 个月。近一个月睡眠不佳。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 巩膜黄染。腹软, 肝肋下未触及, 脾肋下 2cm, 无压痛。实验室检查: ALT 105U/L, Alb 29g/L, HBV-DNA  $3.15 \times 10^2$  拷贝/ml。腹部 B 超: 脾脏轻度肿大, 肝脏边缘不光滑, 实质回声不均匀, 腹腔中等量积液。目前不宜给予的治疗药物是
- A. 水飞蓟宾  
B. 甘草酸二铵  
C. 地西洋  
D. 多烯磷脂酰胆碱  
E. 恩替卡韦
50. 女, 25 岁。妊娠 8 周出现剧烈呕吐, 呕吐数次胃内容物后呕出鲜血 100ml, 诊断考虑是
- A. 消化性溃疡  
B. 急性胃炎  
C. 食管贲门黏膜撕裂综合征  
D. 食管胃底静脉曲张破裂  
E. 食管炎
51. 女, 30 岁。月经不规律, 自测基础体温高温相已持续 22 天, 宫颈黏液涂片结果显示典型椭圆小体。该患者处于
- A. 月经前期  
B. 月经期

- C. 接近排卵期  
D. 排卵后期  
E. 早孕期
52. 初孕妇, 30 岁。妊娠 38 周, 双胎妊娠, 双头位。产程进展顺利, 第 1 个胎儿娩出后, 第 2 个胎儿胎心音突然消失, 伴有阴道多量流血, 腹部见子宫轮廓清楚, 宫底达脐上 3 指。此时最可能发生的情况是  
A. 胎盘早剥  
B. 子宫破裂  
C. 先兆子宫破裂  
D. 前置胎盘  
E. 羊水栓塞
53. 女孩, 15 岁。下腹疼、坠胀不适 5 个月。月经规律, 末次月经 20 天前。经腹部 B 超检查显示子宫大小正常, 右侧附件区有一囊实性肿物  $8\text{cm} \times 8\text{cm} \times 6\text{cm}$ , 边界清。AFP  $475\mu\text{g/L}$ 。最可能的诊断是  
A. 卵巢无性细胞瘤  
B. 卵巢颗粒细胞瘤  
C. 畸胎瘤  
D. 卵巢卵黄囊瘤  
E. 卵巢浆液性囊腺瘤
54. 小儿, 体重 3.5kg, 前囟 1.5cm, 俯卧位时能抬头 1~2 秒, 会哭叫。最可能的年龄是  
A. 5 个月  
B. 1 个月  
C. 2 个月  
D. 3 个月  
E. 4 个月
55. 女, 55 岁。阴道少量流血 1 月余, 妇科检查: 宫颈糜烂样, 触血 (+), 宫体正常大小, 双侧附件正常。宫颈细胞学检查结果为 HSIL, HPV 33 (+)。进一步的处理是  
A. 宫颈活组织检查  
B. 全子宫切除术  
C. 广泛性全子宫切除术  
D. 广泛性子官切除 + 盆腔淋巴结切除术  
E. 宫颈锥形切除术
56. 男孩, 1 岁半。1 天前流清涕, 今晨低热, 2 小时后体温升高达  $39.7^{\circ}\text{C}$ , 突发全身强直阵挛性惊厥, 面色发绀, 意识丧失, 持续 1 分钟自行停止。数分钟后患儿完全清醒, 精神良好。查体: 颈无抵抗, 双侧巴氏征 (+)。血常规: Hb  $116\text{g/L}$ , WBC  $7.5 \times 10^9/\text{L}$ , N 0.70, Plt  $150 \times 10^9/\text{L}$ 。最可能的诊断是  
A. 复杂型热性惊厥  
B. 癫痫  
C. 单纯型热性惊厥  
D. 化脓性脑膜炎  
E. 病毒性脑炎
57. 女, 50 岁。18 天内呕血 2 次, 之后大便发黑。乙肝病史 28 年。贫血貌, 浅表淋巴结未触及, 皮肤蜘蛛痣和出血点。腹软, 肝未触及, 腹水征 (+)。肾功能正常。胃镜检查见食管静脉曲张。最适宜的治疗方法是  
A. 脾切除、胃底食管下端周围血管离断术  
B. 脾切除、脾肾静脉分流术  
C. 门腔静脉侧侧吻合分流术  
D. 经颈静脉肝内门体分流术  
E. 远端脾肾静脉分流术
58. 女, 30 岁。妊娠 36 周, 心悸气短 3 天, 无咽痛、咳嗽等不适。既往体健。查体: BP  $120/73\text{mmHg}$ , 心界明显扩大, 心律不齐, 频发早搏。心脏超声: 心脏扩大, 左室、左房为著, 室壁运动减弱, 射血分数 34%。最可能的诊断是  
A. 先天性心脏病  
B. 妊娠期高血压性心脏病  
C. 风湿性心脏病  
D. 围产期心肌病  
E. 病毒性心肌炎
59. 女, 55 岁。接触性阴道流血 2 个月。妇科检查: 宫颈下唇可见菜花样肿物, 大小  $2.5\text{cm} \times 2.0\text{cm}$ , 阴道左后侧穹隆部可触及界限不清的质硬结节。宫颈活体检查示鳞癌。该患者阴道部位病灶最可能是  
A. 血行转移  
B. 直接蔓延  
C. 阴道原发  
D. 淋巴转移  
E. 种植转移
60. 女, 35 岁。继发性痛经 5 年, 加重 1 年, 平素月经规律, 结婚 8 年, 近 2 年未避孕,  $G_0P_0$ 。妇科检查: 左附件区囊肿, 直径约 6cm, 活动度差, 触痛, CA125  $86/\text{ml}$ , 最佳的处理是  
A. 注射 GnRH- $\alpha$   
B. 手术治疗  
C. 期待疗法  
D. 口服避孕药  
E. 服用孕三烯酮
61. 男, 60 岁。结肠癌术后 1 天, 半夜出现兴奋躁动、钻到病床下, 大声说阎王派小鬼来抓他了, 不认识家人, 白天昏睡。该患者最可能的状态是  
A. 躁狂状态  
B. 痴呆状态  
C. 应激状态  
D. 抑郁状态  
E. 谵妄状态

62. 男,45岁。自幼年起反复发作哮喘,哮喘常于春季发作,发作时伴有咳少量白痰,症状均于休息数天后自行缓解。3天前受凉后哮喘再次发作,逐渐加重。动脉血气分析:pH 7.43,PaCO<sub>2</sub> 35mmHg,PaO<sub>2</sub> 55mmHg。下列处理措施中不正确的是
- A. 静脉滴注糖皮质激素  
B. 无创通气  
C. 静脉补液  
D. 吸氧是 SpO<sub>2</sub> 维持在 90% 以上  
E. 联合使用支气管舒张剂
63. 男,20岁。反复发作全身抽搐伴神志丧失1年。约1个月发作1次,从未服药治疗。既往有脑外伤史。查体:未见明显神经系统阳性体征。对该患者的发作性症状的正确处理原则是
- A. 首选多药物联合治疗  
B. 首选大剂量冲击  
C. 每日总量一次服用  
D. 首选单药治疗  
E. 服药物后不发作即停药
64. 女婴,9个月。发热、咳嗽3天,喘憋半天。查体:T 37.8℃,P 180次/分,R 60次/分,精神烦躁,鼻翼扇动,三凹征阳性,双肺布满中小水泡音,心律齐,心音低钝,未闻及杂音,肝肋下3.5cm,前凶平,最可能的诊断是
- A. 支气管哮喘  
B. 支气管异物  
C. 毛细支气管炎  
D. 支气管肺炎合并中毒性脑病  
E. 支气管肺炎合并心力衰竭
65. 女,25岁。进行性全身无力1年余。晨起时无力症状较轻,活动后加重。否认甲亢病史。查体:未见明显的肌肉萎缩及肌张力异常,四肢肌力4级,四肢腱反射正常,肌疲劳试验阳性。最可能的诊断是
- A. 周期性瘫痪  
B. 急性脊髓炎  
C. 多发性肌炎  
D. 重症肌无力  
E. 吉兰-巴雷综合征
66. 男孩,7岁。颜面水肿伴尿少10天,肉眼血尿合并腰痛2天。查体:水肿较重,腹胀,移动性浊音阳性,右侧肾区叩击痛阳性。血常规:Hb 156g/L,WBC 12.6 × 10<sup>9</sup>/L,Plt 658 × 10<sup>9</sup>/L。纤维蛋白原65g/L,D-二聚体升高明显。血浆白蛋白10g/L,血胆固醇9.56mmol/L,肌酐49μmol/L,尿常规:蛋白(++),红细胞满视野,畸形率约50%,最可能的诊断是
- A. IgA 肾病  
B. 肾病综合征合并肾静脉血栓形成  
C. 肾病综合征合并肾小管功能障碍  
D. 急性感染后肾炎合并肾功能不全  
E. 肾病综合征合并泌尿道感染
67. 男,30岁。肛门周围胀痛伴发热4天。排便时疼痛加重。查体:肛门周围皮肤发红、压痛明显。最可能的诊断是
- A. 直肠后间隙脓肿  
B. 直肠黏膜下脓肿  
C. 骨盆直肠间隙脓肿  
D. 肛管括约肌间隙脓肿  
E. 肛周皮下脓肿
68. 男婴,2个月。生后4周出现呕吐,有时呈喷射性,多发生于喂奶后半小时内,呕吐物不含胆汁,吐后食欲好,体重明显下降。最可能的诊断是
- A. 胃食管反流  
B. 慢性胃炎  
C. 十二指肠溃疡  
D. 肠套叠  
E. 先天性肥厚性幽门狭窄
69. 新生儿,足月顺产,出生体重3.3kg,无新生儿窒息。开奶的时间为
- A. 2~3小时  
B. 24小时  
C. 12小时  
D. 15分钟至2小时内  
E. 6小时
70. 女婴,9个月。腹泻3~4天,大便每天10余次,呈稀水样,伴呕吐,每天2~3次。查体:皮肤稍干,弹性差,心音低钝。入院时最重要的处理是
- A. 给肠黏膜保护剂  
B. 控制感染  
C. 给肠道微生态制剂  
D. 纠正水、电解质紊乱  
E. 给止吐药
71. 男,40岁。头痛、偶伴间断喷射性呕吐3个月,癫痫发作1次,近1周末头痛症状加重。查体:P 56次/分,BP 160/95mmHg。双侧视神经盘水肿,眼底可见出血,右眼外展不全。临床诊断为颅内压增高,其最有价值的诊断依据是

- A. 右侧展神经麻痹  
B. 剧烈头痛  
C. 喷射性呕吐  
D. 视神经盘水肿  
E. 癫痫
72. 女, 50 岁。近半年左手活动不灵, 看电视时出现每秒 4~6 次的节律性颤动, 随意运动时减轻, 入睡后完全消失。患者的颤动症状为  
A. 意向性震颤      B. 动作性震颤  
C. 舞蹈样动作      D. 手足徐动症  
E. 静止性震颤
73. 经产妇, 35 岁。妊娠 40 周, 规律宫缩 8 小时, 近 2 小时产程无进展。静滴缩宫素后, 产妇烦躁不安, 腹痛加重, 腹部拒按, 出现病理缩复环。胎心 90 次/分, 宫口扩张 2cm,  $S^{-1}$ 。最可能的诊断是  
A. 胎膜早破伴感染      B. 子宫破裂  
C. 先兆子宫破裂      D. 羊水栓塞  
E. 重度胎盘早剥
74. 女, 35 岁。阴道脓性分泌物增多伴外阴瘙痒 1 周。半月前有不洁性交史。妇科检查: 宫颈充血、水肿、触痛。分泌物涂片革兰染色阴性双球菌。最可能感染的病原体是  
A. 假丝酵母菌      B. 大肠埃希菌  
C. 链球菌      D. 淋病奈瑟菌  
E. 铜绿假单胞菌
75. 女婴, 4 个月。1 个半月前诊断为化脓性脑膜炎, 抗生素治疗 3 周后病情平稳出院。近 1 周患儿出现烦躁哭闹、呕吐, 家长发现头颅进行性增大, 前囟饱满扩大, 头皮静脉扩张, 头颅 CT 示脑室系统扩大。最可能的诊断是  
A. 脑室管膜炎  
B. 脑水肿  
C. 硬脑膜下积液  
D. 脑积水  
E. 抗利尿激素异常分泌综合征
76. 女孩, 3 岁。反复肺炎 5 次。查体: 身体瘦弱。胸骨左缘第 3~4 肋间闻及 4/6 级全收缩期杂音, 传导广泛, 伴震颤,  $P_2$  亢进。最符合患儿目前情况的血流动力学改变是  
A. 肺循环血量增加  
B. 肺动脉压正常  
C. 体循环血量增加  
D. 右向左分流  
E. 无分流
77. 男, 40 岁。自述近 1 年来工作压力大, 几乎每晚睡前后都要辗转许久才能入睡, 但稍有响动就醒。非常苦恼。每晚给予口服劳拉西泮 1mg, 睡眠有改善。该患者合理使用苯二氮草类药物的原则是  
A. 小剂量和长疗程  
B. 小剂量和短疗程  
C. 小剂量临时使用  
D. 足剂量和长疗程  
E. 足剂量和短疗程
78. 男孩, 4 岁。发热 2 天, 皮疹 1 天, 伴咽部疼痛。查体:  $T 39.2^{\circ}\text{C}$ , 全身皮肤弥漫性出血, 伴密集针尖大小丘疹, 咽红, 扁桃体 II 度肿大, 可见少许渗出。血常规  $\text{Hb } 135\text{g/L}$ ,  $\text{WBC } 12.6 \times 10^9/\text{L}$ ,  $\text{N } 0.65$ ,  $\text{Plt } 250 \times 10^9/\text{L}$ 。CRP 15mg/L。最可能的诊断是  
A. 幼儿急疹      B. 麻疹  
C. 丘疹样荨麻疹      D. 水痘  
E. 猩红热
79. 女, 55 岁。阴道脱出肿物 10 天。平卧屏气用力后检查, 宫颈脱出阴道口, 宫体仍在阴道内。根据我国的标准, 该患者子宫脱垂的分度是  
A. III 度      B. II 度轻型  
C. I 度轻型      D. II 度重型  
E. I 度重型
80. 3 女, 25 岁。阴道分泌物增多 5 天,  $G_1P_0$ 。妇科检查: 阴道分泌物呈灰白色、稀薄状、有腥臭味, 阴道黏膜无明显充血。支持该疾病诊断的检查结果是  
A. 胺臭味试验阴性  
B. 阴道分泌物  $\text{pH} < 4.5$   
C. 阴道分泌物镜检白细胞较多  
D. 线索细胞阳性  
E. 阴道分泌物镜检可见阴道毛滴虫
81. 女, 25 岁。停经 77 天, 晨起恶心伴呕吐、厌油腻 30 天, 尿频 1 周。平素月经规律。最可能的诊断是  
A. 妊娠剧吐      B. 急性胃炎  
C. 病毒性肝炎      D. 肾盂肾炎  
E. 早孕反应
82. 健康婴儿, 前囟约 1.5cm, 未出牙, 身长 60cm, 体重 6kg, 能笑出声, 不能辨认熟人和陌生人, 不能独坐。最可能的月龄是  
A. 8 个月      B. 6 个月  
C. 2 个月      D. 4 个月  
E. 10 个月

83. 女, 25 岁。停经 19 周。剧烈腹痛、发热 1 天, 无阴道流血。血常规: WBC  $14 \times 10^9/L$ , N 0.76。B 超提示单胎妊娠合并子宫肌瘤, 直径 10cm。最可能的诊断是子宫肌瘤合并
- A. 囊性变  
B. 感染  
C. 肉瘤变  
D. 玻璃样变  
E. 红色样变
84. 新生儿, 23 天。发热 3 天, 吃奶差。查体: T  $39^\circ\text{C}$ , 精神差, 前囟饱满, 脐部可见脓性分泌物。对诊断最有意义的检查是
- A. 血降钙素原  
B. 血培养 + 脑脊液  
C. 头颅 CT  
D. 血常规 + CRP  
E. 血电解质
85. 新生儿, 足月顺产, 出生体重 3 000g。1 分钟 Apgar 评分: 呼吸 0, 心率 1, 皮肤颜色 1, 弹足底反应 1, 肌张力 1, 以下处理措施中, 属于初步复苏步骤的是
- A. 气管插管, 正压通气  
B. 肾上腺素经脐静脉注入  
C. 清理呼吸道  
D. 胸外心脏按压  
E. 生理盐水扩容
86. 男, 70 岁。晨起时出现说话不流利, 只能讲一两个简单的字, 但能理解别人言语, 也能理解书写的东西, 读出来有困难。既往有高血压、高血脂病史。查体: 言语不利, 四肢肌力正常。病变部位应在优势半球
- A. 缘上回  
B. 顶叶角回  
C. 颞上回后部  
D. 额下回后部  
E. 颞中回后部
87. 男, 40 岁。从 3 米高处坠落后短暂昏迷 20 分钟。查体: P 70 次/分, BP 125/70mmHg。神志清楚, 左眶青紫, 左鼻孔流出血性液体, 神经系统无明显阳性体征。头颅 CT 发现少量颅内积气。应采取的处理措施是
- A. 填塞鼻腔压迫止血  
B. 应用抗生素预防性治疗  
C. 冲洗鼻腔  
D. 开颅手术止血  
E. 腰穿释放血性脑脊液
88. 早产儿, 胎龄 32 周。生后 3 小时出现呼吸困难、呻吟。胸部 X 线片示双肺透亮度降低, 毛玻璃样改变。应立即给予的处理是
- A. 地塞米松  
B. 持续气道正压通气  
C. 头罩吸氧  
D. 纠正酸中毒  
E. 抗生素
89. 女, 25 岁, 初产妇。妊娠 39 周, 规律宫缩 8 小时, 无头盆不称, 胎心 148 次/分, 宫口开大 3cm, S<sup>+1</sup>。目前应做的是
- A. 静推地西泮  
B. 继续观察产程进展  
C. 静滴缩宫素  
D. 人工破膜  
E. 静滴硫酸镁
90. 女, 60 岁。晨起后突感右上肢无力, 持物掉落, 伴言语不利, 休息半小时后缓解。既往有高血压、糖尿病病史。查体: 未见脑神经异常, 四肢运动、感觉及共济运动正常。最可能的诊断是
- A. 低血糖  
B. 短暂性脑缺血发作  
C. 高血压脑病  
D. 癫痫单纯部分性发作  
E. 脑出血
91. 男孩, 5 岁。因体格和智力发育落后来诊。查体: 身材矮小、眼距宽、鼻梁低。外耳小、头围小、骨龄落后于年龄、通贯手, 胸骨左缘第 2~3 肋间可闻及 3/6 级收缩期杂音。确诊需要做的检查是
- A. 染色体核型分析  
B. 尿有机酸测定  
C. 头颅 CT  
D. 超声心动图  
E. 血清 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、TSH 检测
92. 健康女婴, 4 个月, 母乳喂养。每天每公斤体重需要的热量是
- A. 95kcal  
B. 110kcal  
C. 115kcal  
D. 105kcal  
E. 80kcal
93. 男, 44 岁。4 年来劳累后气促, 曾诊为哮喘, X 线片示前上纵隔类圆形阴影压迫气管, 最可能的诊断
- A. 肺癌  
B. 淋巴瘤  
C. 心包囊肿  
D. 神经源性肿瘤  
E. 胸骨后甲状腺肿
94. 男, 4 岁。因高热盗汗及干咳 3 个月入院, 体检: T  $38^\circ\text{C}$ , 消瘦, 面色苍白, 两肺呼吸音清, OT 试验(++) , 中性粒细胞稍高, 血培养(-), 胸片示肺门

淋巴结肿大,可能的诊断是

- A. 败血症
- B. 肺不张
- C. 原发型肺结核
- D. 急性风湿热
- E. 大叶性肺炎

95. 女, 25 岁。2 年来常在遇到不高兴的事情时, 生气哭闹, 出现四肢强直和抽搐样表现, 发作时能听清楚家人的呼唤, 不语, 流眼泪, 无唇舌咬伤和大小便失禁。本次因再次出现类似发作就诊。入院查体: 呼之不应, 不时四肢抽搐样发作, 瞳孔无散大, 对光反射存在。最可能的诊断是

- A. 分离(转换)障碍
- B. 恐惧性焦虑障碍
- C. 原发性癫痫
- D. 抑郁障碍
- E. 创伤后应激障碍

96. 男孩, 8 岁。少尿、肉眼血尿 3 天。查体: BP 130/105mmHg。尿常规: 尿蛋白(++), RBC(+++ +)。可能与该患儿发病相关的疾病是

- A. 手足口病
- B. 麻疹
- C. 肺炎链球菌肺炎
- D. 肺炎支原体肺炎
- E. 脓皮病

97. 初孕妇, 25 岁。身高 160cm, 体重 65kg, 妊娠 32 周。查体: BP 150/100mmHg。宫高 24cm(脐上 1 指), 腹围 85cm, 临床诊断为子痫前期。最可能的情况是

- A. 胎儿生长受限
- B. 胎儿畸形
- C. 正常发育
- D. 营养过剩胎儿
- E. 巨大胎儿

98. 女, 25 岁。孕 40 周, 拟行剖宫产手术。既往体健, 无输血史, 入院后化验血 Hb 70g/L, 术前给予输注悬浮红细胞, 开始输注 30 分钟后, 患者出现皮肤潮红、出汗, 呼吸困难, 视物模糊。查体: T 36.5℃, 会厌水肿。应首先考虑的输血不良反应是

- A. 输血相关循环超负荷
- B. 过敏反应
- C. 输血相关性移植物抗宿主病
- D. 细菌污染反应
- E. 急性溶血性输血反应

99. 男孩, 6 岁。少尿、肉眼血尿 3 天。3 周前曾患化脓性扁桃体炎。查体: BP 130/105mmHg。尿常规: 尿蛋白(++), RBC(+++ +), 该病活动期的主要治疗措施是

- A. 使用激素和免疫抑制剂
- B. 采用透析疗法
- C. 补充液体
- D. 使用利尿剂
- E. 休息和控制感染

100. 女, 30 岁。人工流产后后闭经 7 个月, 无腹痛, 既往月经规律, 尿妊娠试验阴性, 基础体温双相型。最可能的诊断是

- A. Asherman 综合征
- B. Sheehan 综合征
- C. 闭经-溢乳综合征
- D. 空蝶鞍综合征
- E. 多囊卵巢综合征

101. 男婴, 3 个月。腹泻 2 个月。大便 3~4 次/天, 有时 5~6 次/天, 稀水状或糊状, 无脓血, 食欲佳, 精神好。生后一直母乳喂养。查体: 体重 5.8kg, 面部湿疹, 心肺腹查体正常。最可能的诊断是

- A. 病毒性肠炎
- B. 失氯性腹泻
- C. 细菌性肠炎
- D. 生理性腹泻
- E. 真菌性肠炎

102. 男孩, 5 岁。头痛、精神差 10 天, 偶伴呕吐, 加重 5 小时。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 12 次/分, BP 120/70mmHg。双侧视神经盘水肿, 四肢肌力 3 级。此时应首选的检查是

- A. 脑血管造影
- B. 头颅超声
- C. 头颅 CT
- D. 脑电图
- E. 头颅 MRI

103. 初孕妇, 25 岁。妊娠 14 周, 少量阴道流血 1 天。妇科检查: 阴道少量暗红色血液, 宫口未开, 子宫大小与孕周相符。该患者最可能的诊断是

- A. 早期流产
- B. 难免流产
- C. 先兆流产
- D. 稽留流产
- E. 不全流产

104. 女, 25 岁。停经 57 天, 阴道少量流血 3 天。尿妊娠试验阳性, 盆腔超声示宫腔内“落雪状”回声。最可能的诊断是

- A. 黏膜下子宫肌瘤
- B. 葡萄胎
- C. 妊娠滋养细胞肿瘤
- D. 双胎妊娠
- E. 稽留流产

## A3/A4 型选择题 (105—138 题)

## 答 题 说 明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息,在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

## (105—106 题共用题干)

男婴,1 个月。腹胀、便秘 1 个月。查体:腹部明显隆起,腹壁静脉显露明显,肠鸣音较活跃,肛门指检时排出恶臭气体及大便,腹部立位 X 线平片可见多个阶梯状液平。

105. 首先考虑的诊断是

- A. 坏死性小肠结肠炎
- B. 先天性巨结肠
- C. 功能性便秘
- D. 先天性肠旋转不良
- E. 胎粪塞综合征

106. 为明确诊断,首选的检查是

- A. 钡剂灌肠检查
- B. 腹部 B 超
- C. 直肠肌层活检
- D. 直肠黏膜活检
- E. 肛门直肠测压

## (107—109 题共用题干)

女,30 岁。阴道不规则流血 20 天,咳嗽 5 天。半年前行人工流产,吸出物见到绒毛组织。妇科检查:子宫如 40 天妊娠大小,质软,双侧附件区均可触及大小约 5cm 的囊性包块,胸部 X 线片示双侧中下野多发棉球状阴影。

107. 对明确诊断意义最大的检查是

- A. 胸部 CT
- B. 血功能
- C. 脑 MRI
- D. 血  $\beta$ -hCG
- E. 盆腔超声

108. 首先考虑的诊断是

- A. 绒癌
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 葡萄胎
- D. 先兆流产
- E. 稽留流产

109. 主要的治疗方式是

- A. 药物流产
- B. 保胎治疗
- C. 手术治疗
- D. 放射治疗
- E. 化学治疗

## (110—112 题共用题干)

男,20 岁。坚持认为自己的父亲已经被人害死了,而那个朝夕陪伴自己的父亲只是看起来像父亲的一个人冒充的,家人劝说也不能改变他的看法。

110. 该患者最可能的症状是

- A. 近事遗忘
- B. 虚构
- C. 错构
- D. 远事遗忘
- E. 妄想

111. 该症状最常见于

- A. 抑郁症
- B. 分离(转换)障碍
- C. 强迫障碍
- D. 双相障碍
- E. 精神分裂症

112. 最适宜的治疗药物是

- A. 银杏叶片
- B. 利培酮
- C. 丙戊酸钠
- D. 碳酸锂
- E. 帕罗西汀

## (113—115 题共用题干)

男孩,1 岁 3 个月。面色苍黄 2 个月。原可独走,现站立不稳。生后母乳喂养,未添加辅食。查体:表情呆滞,四肢抖动,舌苔薄,呈地图状。血常规: Hb 88g/L, RBC  $2.1 \times 10^{12}/L$ 。

113. 最可能的诊断是

- A. 营养性巨幼细胞性贫血
- B. 脑性瘫痪
- C. 苯丙酮尿症
- D. 缺铁性贫血
- E. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症

114. 为明确诊断,首选的检查是

- A. 头颅 CT
- B. 血清叶酸、维生素 B<sub>12</sub> 测定
- C. 血苯丙氨酸测定

- D. 血清铁蛋白测定
- E. 血清钙、磷、碱性磷酸酶测定

115. 最适当的治疗是
- A. 低苯丙氨酸饮食
  - B. 肌注维生素 B<sub>12</sub>
  - C. 口服铁剂
  - D. 康复治疗
  - E. 肌注维生素 D

(116—118 题共用题干)

患儿,5岁。8月入院,发热、呕吐、腹泻4天。每天排便血便11次左右。查体:T 39.0℃,BP 74/50mmHg,神清,脱水貌,心肺(-)。腹软,肝脾未及,左下腹压痛(+),反跳痛(-)。实验室检查:血 WBC  $18.0 \times 10^8/L$ ,中性粒细胞 0.86,淋巴 0.14。粪便镜检:WBC 20个/HP,RBC 5个/HP。

116. 可能有助确诊的常用检查为
- A. 粪便找阿米巴滋养体
  - B. 粪培养找霍乱杆菌
  - C. 粪便动力试验
  - D. 腹部 X 线片
  - E. 粪便培养
117. 目前最重要的抢救措施是
- A. 小剂量肝素抗 DIC
  - B. 补充血容量
  - C. 加用升压药
  - D. 选用抗病毒治疗
  - E. 纠正酸中毒
118. 该病急性期的肠溃疡特征是
- A. 溃疡呈烧瓶状口小底大
  - B. 溃疡表浅呈地图状
  - C. 溃疡呈长椭圆形与肠的长轴平行
  - D. 溃疡边缘呈环堤状隆起
  - E. 溃疡呈环形与肠的长轴垂直

(119—121 题共用题干)

女孩,2岁。因体检发现心脏杂音就诊,平素体健。查体:胸骨左缘第2肋间闻及2/6级喷射性收缩期杂音,第二心音固定分裂,ECG:电轴右偏,V<sub>1</sub>导联呈rsR波型。

119. 最可能的诊断是
- A. 肺动脉瓣狭窄
  - B. 动脉导管未闭
  - C. 法洛四联症
  - D. 室间隔缺损

- E. 房间隔缺损

120. 其心脏杂音产生的机理是

- A. 二尖瓣相对狭窄
- B. 血流通过缺损处
- C. 三尖瓣相对狭窄
- D. 主动脉瓣相对狭窄
- E. 肺动脉瓣相对狭窄

121. 血流动力学改变表现为

- A. 左心房增大
- B. 左心房、左心室增大
- C. 左心室增大
- D. 右心房、右心室增大
- E. 左心房、左心室、右心室增大

(122—123 题共用题干)

女,60岁。绝经7年,阴道淋漓流血19天。高血压病史5年,糖尿病病史8年,G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>,妇科检查:外阴阴道无异常,宫颈光滑,子宫正常大小。双侧附件区无异常。超声示子宫内膜0.8cm。回声不均匀,内膜血流较丰富。

122. 为明确诊断,应进行的检查是

- A. 阴道镜活检
- B. 腹腔镜探查
- C. 盆腔 MRI 检查
- D. 宫颈细胞学检查
- E. 诊断性刮宫

123. 最可能的诊断是

- A. 卵巢癌
- B. 子宫内膜癌
- C. 宫颈癌
- D. 子宫内膜息肉
- E. 老年性阴道炎

(124—126 题共用题干)

男孩,1岁。近2个月夜间睡眠打鼾,侧卧好转,感冒时加重。

124. 病因首先考虑

- A. 咽扁桃体肿大
- B. 腭扁桃体肿大
- C. 鼻炎
- D. 喉炎
- E. 鼻窦炎

125. 造成患儿睡眠打鼾的呼吸系统解剖生理基础是

- A. 肺通气储备少
- B. 肺活量小

- C. 气体弥散量小
- D. 咽腔狭小
- E. 潮气量小

126. 患儿近日出现感冒发烧症状,打鼾加重,无呼吸暂停。这时最典型的体征是

- A. 发绀
- B. 双肺细湿啰音
- C. 呼气相哮鸣音
- D. 三凹征
- E. 气促

(127—129 题共用题干)

男,15岁。1个月前因学习退步被班主任批评后,渐起入睡困难,早醒,伴有情绪低落,自觉能力差,对前途悲观绝望,怀疑同学看不起他,嘲笑他,常自责,觉得对不起父母的培养,称活得太累,计划趁家人不备自杀。有时焦躁不安,用拳头砸墙发泄情绪。

127. 该患者目前的诊断是

- A. 精神分裂症
- B. 焦虑障碍
- C. 应激相关障碍
- D. 双相障碍
- E. 抑郁发作

128. 目前首选的治疗方法是

- A. 心境稳定剂合并电抽搐
- B. 电抽搐合并抗抑郁药
- C. 电抽搐合并抗精神病药
- D. 电抽搐合并抗焦虑药
- E. 心境稳定剂合并抗精神病药

129. 如果在治疗过程中患者出现好管闲事、兴奋话多、自我感觉良好,应调整治疗方案为

- A. 加大抗抑郁药剂量
- B. 减少抗抑郁药剂量继续维持
- C. 抗抑郁药合并抗精神病药
- D. 抗抑郁药合并苯二氮䓬类
- E. 心境稳定剂治疗为主

(130—132 题共用题干)

女,30岁。妊娠35周,发现血压升高3周,今晨突然腹痛,呈持续性,阴道有少量流血。查体:P 112次/分,BP 150/98mmHg。子宫张力大,宫底前壁压痛明显。胎心 100次/分。尿蛋白(+++)。

130. 最可能的诊断是

- A. 早产临产
- B. 子宫破裂

- C. 先兆子宫破裂
- D. 前置胎盘
- E. 胎盘早剥

131. 此时最适宜的处理是

- A. 使用硫酸镁抑制宫缩后继续妊娠
- B. 给予 $\beta$ 受体兴奋剂抑制宫缩,加强胎儿监护
- C. 给予降压止痛后密切观察
- D. 剖宫产终止妊娠
- E. 静脉滴注缩宫素引产

132. 该患者最容易发生的并发症是

- A. 胎盘粘连
- B. 子宫破裂
- C. 子痫
- D. DIC
- E. 心力衰竭

(133—135 题共用题干)

男,50岁。车祸致枕部着地,昏迷1小时。查体:P 50次/分,R 12次/分,BP 170/100mmHg。右枕部头皮挫伤灶。GCS 5分,瞳孔左:右=4mm:2mm,左侧对光反射消失,右侧肢体偏瘫。

133. 对诊断最有价值的检查是

- A. 头颅超声
- B. 腰椎穿刺
- C. 脑血管造影
- D. 头颅CT
- E. 头颅X线平片

134. 如患者颅脑损伤为左额极、颞极脑挫裂伤伴颅内血肿,最可能的损伤机制是

- A. 挥鞭伤
- B. 坠落伤
- C. 挤压伤
- D. 减速性损伤
- E. 加速性损伤

135. 最应该采取的治疗措施

- A. 冬眠疗法
- B. 大剂量糖皮质激素
- C. 腰椎穿刺放脑脊液减压
- D. 绝对卧床
- E. 急诊开颅手术

(136—138 题共用题干)

女,30岁。妊娠33周,反复阴道流血3次,量少于月经量,无腹痛不适,臀位,胎心正常。G<sub>5</sub>P<sub>0</sub>。曾人工流产4次。

136. 最可能的诊断是

- A. 早产临产

- B. 胎盘早剥
- C. 前置胎盘
- D. 先兆早产
- E. 生理性子宫收缩

137. 目前应采取的处理措施是

- A. 抗感染
- B. 立即剖宫产
- C. 前列腺素引产

- D. 抑制宫缩
- E. 静滴缩宫素引产

138. 该孕妇在临产后最容易发生的情况是

- A. 出血
- B. 胎儿窘迫
- C. 死产
- D. 子宫破裂
- E. 羊水栓塞

**B1 型选择题 (139—150 题)**

**答 题 说 明**

以下提供若干组试题,每组试题共用在此题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

**(139—140 题共用备选答案)**

- A. 基础体温呈双相型,下降缓慢
- B. 基础体温呈双相型,上升缓慢
- C. 基础体温呈双相型,持续高温期
- D. 基础体温呈双相型,高温期短于 11 天
- E. 基础体温呈单相型

139. 女,15 岁。阴道淋漓流血 2 个月。既往月经不规律,周期长短不一。尿妊娠试验阴性。其基础体温最可能是

140. 女,35 岁。近半年经期延长至 8~10 天,月经第 3~4 天量多。既往月经规律,周期 28 天。8 年前顺产分娩。其基础体温最可能是

**(141—142 题共用备选答案)**

- A. 左氧氟沙星
- B. 头孢曲松钠
- C. 阿昔洛韦
- D. 苄星青霉素
- E. 庆大霉素

141. 早期梅毒首选的治疗药物是

142. 孕期淋病首选的治疗药物是

**(143—144 题共用备选答案)**

- A. 潜伏期延长
- B. 第二产程延长
- C. 活跃期延长
- D. 活跃期停滞
- E. 正常产程

143. 初产妇,30 岁。妊娠 38 周,宫口开大 10cm,头先露, $S^{+3}$ 。3 小时后查胎心 110 次/分。最可能的诊断是

144. 初产妇,25 岁。妊娠 40 周,临产 10 小时。宫口开大 6cm,已破水,头先露, $S^{+1}$ 。5 小时后查胎心 142 次/分,宫口仍为 6cm。最可能的诊断是

**(145—147 题共用备选答案)**

- A. 21 天
- B. 8 天
- C. 5 天
- D. 10 天
- E. 15 天

145. 风疹隔离至出疹后

146. 麻疹隔离至出疹后

147. 麻疹并发肺炎隔离至出疹后

**(148—150 题共用备选答案)**

- A. 单侧眼睑下垂
- B. 单侧额纹消失
- C. 单侧鼻唇沟浅
- D. 单侧舌肌萎缩
- E. 单侧角膜反射消失

148. 单侧三叉神经损害可出现的表现是

149. 单侧动眼神经损害可出现的表现是

150. 单侧舌下神经损害可出现的表现是