

2019年口腔执业助理医师资格考试真题精选及详解 (回忆版)

一、A1型选择题 (每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案。)

1. 含较多味蕾的结构是 ()。

- A. 丝状乳头
- B. 菌状乳头
- C. 轮廓乳头
- D. 叶状乳头
- E. 结缔组织乳头

【答案】 C

【解析】

人类口腔有味蕾约4000个,每个菌状乳头味蕾群、叶状乳头味蕾群、轮廓乳头味蕾群分别含有3个、30个、250个左右的味蕾。

2. 在脱矿层表面细菌侵入小管繁殖,小管扩张呈串珠状的是 ()。

- A. 透明层
- B. 脱矿层
- C. 细菌侵入层
- D. 坏死崩解层
- E. 暗层

【答案】 C

【解析】

细菌侵入层位于脱矿层表面,细菌侵入小管并繁殖,有的小管被细菌所充满,小管扩张呈串珠状。

3. 慢性盘状红斑狼疮的病理变化不包括 ()。

- A. 上皮表面角化,可见角质栓塞
- B. 上皮基底细胞液化
- C. 上皮血管扩张,可见玻璃样血栓
- D. 上皮血管周有中性粒细胞浸润
- E. 血管周围有类纤维蛋白沉积

【答案】 D

【解析】

慢性盘状红斑狼疮镜下所见:上皮表面有过度角化或者不全角化。粒层明显,角化层可有剥脱,有时可见角质栓塞;棘层萎缩变薄,有时可见上皮钉突增生、伸长;基底细胞发生液化变性,上皮与

固有层之间可形成裂隙和小水疱，基底膜不清晰；上皮下结缔组织内有淋巴细胞浸润，毛细血管扩张，管壁不整，血管内可见玻璃样血栓，血管周围有PAS阳性，管周有淋巴细胞浸润；胶原纤维发生类纤维蛋白变性，纤维水肿、断裂；基底膜可增厚。上述病理变化不一定同时存在。

4. 牙龈因失去食物按摩废用萎缩是由于（ ）。

- A. 牙冠轴面突度过大
- B. 牙冠轴面突度过小
- C. 牙冠轴面无突度
- D. 牙冠殆外展隙不明显
- E. 以上均不对

【答案】 A

【解析】

牙冠轴面突度过大，导致牙龈长时间失去食物按摩作用而造成废用性萎缩。

5. 排列于腮腺浅叶前缘的解剖结构不包括（ ）。

- A. 面横动脉
- B. 面神经颞支
- C. 腮腺导管
- D. 面神经颊支
- E. 面神经下颌支

【答案】 E

【解析】

腮腺浅叶前缘神经血管排列从上向下依次为：面横动脉、面神经颞支、面神经上颊支、腮腺导管、面神经下颊支及下颌缘支。

6. 慢性牙周炎晚期才出现的临床表现是（ ）。

- A. 牙龈炎症
- B. 牙松动
- C. 附着丧失
- D. 牙槽骨吸收
- E. 牙周袋形成

【答案】 B

【解析】

慢性牙周炎患者除有主要特征：牙周袋形成、牙龈炎症、牙周附着丧失、牙槽骨吸收外，晚期常可出现其他伴发病变和症状，如：①牙齿移位；②由于牙松动、移位和龈乳头退缩，造成食物嵌塞；③由于牙周支持组织减少，造成继发性殆创伤；④牙龈退缩使牙根暴露，对温度刺激敏感，甚至发生根面龋；⑤深牙周袋内脓液引流不畅时，或身体抵抗力降低时，可发生急性牙周脓肿；⑥深牙周袋接近根尖时，可引起逆行性牙髓炎；⑦牙周袋溢脓和牙间隙内食物嵌塞，可引起口臭。

7. 属于颞下颌关节骨关节病的是（ ）。

- A. 双板区撕裂
- B. 关节盘前移位
- C. 关节囊扩张
- D. 关节盘前附着断裂
- E. 髁突囊样变

【答案】 E

【解析】

骨关节疾病类或骨关节炎：影像学和关节内镜等检查可以发现关节骨、软骨和关节盘的退行性改变。X线片可见骨质吸收、破坏、增生硬化、囊样变等。可伴有关节盘穿孔。

8. 目前最多采用的牙龈翻瓣术切口是（ ）。

- A. 内斜切口
- B. 外斜切口
- C. 垂直切口
- D. 保留龈乳头切口
- E. 弧形切口

【答案】 A

【解析】

内斜切口是翻瓣术中最关键的切口，也是目前采用最多的切口。其优点是：将袋内壁的上皮和炎症组织切除；保留相对完好的袋外侧面的角化龈；形成的龈瓣边缘薄，易于贴附牙面和骨面，愈合后牙龈外形良好。

9. 右下游离缺失最后一个牙往近中倾斜放什么卡环？（ ）

- A. 回力卡环
- B. RPI卡环
- C. 圈形卡环
- D. 联合卡环
- E. 延长卡环

【答案】 C

【解析】

圈形卡环多用于远中孤立的磨牙上，上颌磨牙向近中颊侧倾斜、下颌磨牙向近中舌侧倾斜者。

二、B1型题（以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某一个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。）

1.（共用备选答案）

- A. 上颌第一双尖牙
- B. 上颌第二双尖牙

- C.上颌第一磨牙
- D.下颌第一磨牙
- E.下颌第一双尖牙

1. 距离上颌窦最近的牙是（ ）。

【答案】 C

【解析】

上颌第一磨牙根尖距上颌窦底壁最近，上颌第二磨牙次之，第二前磨牙与第三磨牙再次之。

2. 有近中舌沟的牙是（ ）。

【答案】 E

【解析】

下颌第一双尖牙即下颌第一前磨牙殆面：横嵴将殆面分成较大的远中窝和较小的近中窝。近中沟跨过边缘嵴至舌面，称为近中舌沟。

2. (共用备选答案)

- A.鼻畸形整复术
- B.腭裂整复术
- C.牙槽突植骨术
- D.正畸矫治器
- E.唇裂整复术

1. 双侧唇腭裂欲恢复牙弓形态和改善鼻畸形应采用（ ）。

【答案】 D

【解析】

针对严重的完全性唇裂伴有腭裂及鼻畸形的患者，术前应先行正畸治疗，利用矫治器的方法，恢复伴有腭裂患者的牙弓形态，改善或减轻裂侧鼻小柱过短和鼻翼塌陷，为唇裂修复手术尽可能创造有利的硬组织条件。

2. 最可能导致双侧唇腭裂患者上颌骨发育不足的是（ ）。

【答案】 B

【解析】

腭裂手术对上颌骨发育有影响，手术年龄越小，手术损伤对上颌骨发育影响越大。研究结果表明年龄小行腭成形术对上颌骨发育的影响主要表现为牙弓的宽度方面；对上颌骨的前后向和高度影响不大。