

330 妇产科学

基础知识

一、A1

1. 胎儿急性缺氧的原因，哪项是正确的

- A. 脐带脱垂
- B. 脐带过长
- C. 妊娠合并慢性高血压病
- D. 胎盘功能不全
- E. S/D 升高

2. 关于胎膜早破，下列哪项正确

- A. 孕 34 周前破水
- B. 胎头入盆前破水
- C. “见红”前破水
- D. 规律宫缩前破水
- E. 宫口开大 2cm 前破水

3. 确诊胎膜早破最可靠的指标是什么

- A. 阴道分泌物pH 为 7
- B. 阴道内液体涂片干燥后可见椭圆小体
- C. 自诉阴道有液体流出
- D. 阴道涂片可见大量脂肪颗粒
- E. B 超提示 AFI < 5cm

4. 关于均小骨盆，哪项是正确的

- A. 胎儿不大，头盆相称，宫缩好，可以试产
- B. 胎儿较大，宫缩好，可以试产
- C. 均小骨盆，均应剖宫产分娩
- D. 臀位，胎儿正常大小，可以试产
- E. 临产已 4 个小时，宫口开大 3cm，先露未入盆，应给缩宫素加强宫缩
5. 关于持续性枕后位下列哪项是对的
- A. 胎头枕骨位于母体骨盆的前方
- B. 占头位分娩的大多数
- C. 因开始即以枕横位衔接与内旋转无关
- D. 绝大多数顺利分娩
- E. 因胎头枕骨持续不能转向前方，至分娩后期仍位于母体骨盆后方，常造成难产
6. 枕横(后)位分娩机转哪项是错误的
- A. 枕部如能向前转 90° 或 135° 呈枕前位而自然分娩
- B. 枕部到达中骨盆向后行 90° 或 45° 内旋转呈正枕后位分娩
- C. 枕后位的产瘤发生在顶骨附近
- D. 持续性枕后位多因胎头仰伸不良所致
- E. 胎头多以枕横位或枕后位衔接
7. 胎头浮，后顶骨先嵌入骨盆入口，矢状缝偏前，应考虑
- A. 前不均倾
- B. 后不均倾
- C. 骨盆入口狭窄
- D. 枕横位

E. 枕后位

8. 有关沙眼衣原体的描述，哪项不正确

A. 感染途径以性传播为主

B. 常与淋病混合感染

C. 主要感染柱状上皮及移行上皮，可向深层侵犯

D. 近年来此病的发病率有上升趋势

E. 宫颈炎最常见

9. 有关尖锐湿疣，叙述错误的是

A. 妊娠期易患尖锐湿疣

B. 早孕期应终止妊娠

C. 症状比非妊娠期更严重

D. 病毒在怀孕期间会加速复制，可引起宫颈上皮瘤

E. 胎儿经过产道会发生感染，使婴幼儿患上尖锐湿疣或口部乳头瘤病

10. 有关妊娠合并急性胆囊炎哪项不正确

A. 胆囊炎以妊娠晚期更多见

B. 妊娠期雌孕激素的作用有利于胆结石形成

C. 临床上妊娠合并胆囊炎最常见

D. 妊娠合并急性胆囊炎非手术治疗多数有效

E. 于妊娠早、中期可行腹腔镜切除胆囊

11. 最容易导致胎儿形态发育异常的时期是

A. 受精前

B. 受精后的 8 天内

C. 受精后的 1~3 周

D. 受精后的 2~10 周

E. 胎儿期

12. 以下哪些辅助检查结果显示与胎儿生长发育受限不符

A. B 型超声常提示羊水过少

B. B 型超声常过早发现胎盘 III 级

C. 超声多普勒孕晚期 S/D < 3

D. 胎儿生物物理评分常出现 4~6 分

E. NST 无反应型

13. 有关产前诊断中的常用检查方法, 错误的是

A. B 型超声诊断法

B. 母体血清甲胎蛋白与绒毛膜促性腺激素

C. 羊膜腔穿刺术

D. CT 检查

E. 胚胎植入前诊断

14. 我国围产期定义, 下列哪项正确

A. 妊娠满 28 周至产后 4 周

B. 妊娠满 20 周至产后 4 周

C. 妊娠满 24 周至产后 1 周

D. 妊娠满 28 周至产后 1 周

E. 胚胎形成至产后 1 周

15. 临产后子宫收缩的特点, 哪项不正确

A. 节律性

B. 对称性

C. 极性

D. 缩复性

E. 子宫下段的收缩力最强

16. 下列哪项正确

A. 胎儿双顶径为两侧顶骨隆突间的距离

B. 正常足月胎儿双顶径的平均值为 10cm

C. 双顶径是胎头的最小横径

D. 枕额径指胎儿额部至枕骨隆突的距离

E. 枕下前凶径为胎头最大径线

17. 关于输卵管妊娠，下列哪项是正确的

A. 常发生在间质部

B. 子宫增大情况与停经天数相符

C. 阴道流血多，易致失血性休克

D. 后穹窿穿刺阴性可否定输卵管妊娠

E. 子宫内膜的形态学变化与孕卵是否存活及绒毛的活力有关

18. 输卵管妊娠最常见的原因是

A. 输卵管炎症

B. 子宫内膜异位症

C. 输卵管发育异常

D. 输卵管结扎手术后

E. 宫内节育器放置后

19. 各种流产的临床特点，下列哪项描述是不正确的

A. 稽留流产：胎儿或胚胎死亡未排出子宫腔，子宫小于停经孕周

- B. 完全流产:腹痛, 出血多, 并有组织排出
 - C. 难免流产: 阴道出血大于月经量, 伴腹阵痛
 - D. 先兆流产: 宫口未开, 子宫大小同孕周, 阴道出血少
 - E. 不全流产: 宫口有组织, 子宫小于孕周
20. 妊娠高血压综合征(妊高征)治疗有效的血镁离子浓度是
- A. 0.7~1.0mmol/L
 - B. 0.5~0.75mmol/L
 - C. 1.0~1.7mmol/L
 - D. 1.7~3.0mmol/L
 - E. 3.0~4.5mmol/L
21. 以下哪项不是妊娠高血压综合征(妊高征)的病因
- A. 子宫胎盘缺血
 - B. 母胎免疫失衡
 - C. 全身小动脉痉挛
 - D. NO 合成或释放功能障碍
 - E. 多基因遗传不能排除
22. 有关 HELLP 综合征, 以下哪项是错误的
- A. 以溶血、肝酶升高、血小板减少为特点
 - B. 可能与自身免疫机制有关
 - C. 常合并妊娠期糖尿病
 - D. 15%的患者可以不合并妊高征
 - E. 母儿病死率明显增高
23. 有关妊娠期肝内胆汁淤积症, 以下哪项说法是错误的

- A. 临床上以瘙痒和黄疸为特征
 - B. 有明显的地域和种族差异
 - C. 遗传因素决定患者的易患性
 - D. 雌激素是导致本病的唯一因素
 - E. 非遗传因素决定此病的严重程度
24. 治疗淋病的首选药物是
- A. 头孢曲松
 - B. 青霉素钠盐
 - C. 红霉素
 - D. 克林霉素
 - E. 多西环素（强力霉素）
25. 产前出血中，哪种情况一旦发生胎儿死亡率极高
- A. 前置胎盘
 - B. 胎盘早剥
 - C. 宫颈息肉
 - D. 前置血管破裂
 - E. 边缘血窦破裂
26. 有关产褥抑郁症哪项正确
- A. 通常在产后 1 周内出现症状
 - B. 约 70%患者于产后 3 个月内痊愈
 - C. 约有 40%复发
 - D. 其第二代的认知能力可能受到一定影响
 - E. 抗抑郁药物如阿米替林可进入乳汁，故产褥期禁用

27. 有关妊娠合并糖尿病的处理原则，下列哪项是错误的

- A. 如血糖控制不满意，终止妊娠前应用促肺成熟药物
- B. 轻者口服降糖药，病情较重者需用胰岛素
- C. 认真进行饮食控制，并给予维生素、钙和铁剂
- D. 已有继发于糖尿病肾功能受损者，应及早终止妊娠
- E. 器质性病变较轻或血糖控制较好者，可在严密监护下继续妊娠

28. 下列描述哪项正确

- A. 胎盘由羊膜、平滑绒毛膜、底蜕膜组成
- B. 胎儿附属物包括胎盘、脐带、胎膜和羊水
- C. 蜕膜板是由底蜕膜组成的
- D. 胚胎发育到第 6 周，才形成三级绒毛干
- E. 以上均不正确

29. 关于骨盆外测量哪项正确

- A. 骶耻外径指耻骨联合上缘至第 5 腰椎棘突上
- B. 骶耻外径正常值为 20~22cm
- C. 坐骨结节间径为两坐骨结节外侧缘的距离
- D. 对角径为耻骨联合下缘至骶岬上缘中点的距离
- E. 对角径即为骨盆的真结合径

30. 从宫颈癌前病变到癌的演变时间为

- A. 10 年左右
- B. 5 年左右
- C. 不一定
- D. 1 年以内

E. 2 年左右

31. TBS 关于癌前病变的术语为

A. 高度和低度鳞状上皮内病变

B. 宫颈鳞状上皮内瘤变

C. 非典型鳞状上皮细胞

D. 非典型增生

E. 核异质细胞

32. 子宫肌瘤的症状与下述哪项关系最密切

A. 肌瘤的大小

B. 肌瘤生长的部位

C. 肌瘤肉瘤变

D. 肌瘤钙化

E. 肌瘤的数目

33. 有关子宫内膜癌以下哪项不正确

A. 子宫内膜癌发病率接近甚至超过宫颈癌

B. 可分为雌激素依赖型和非依赖型

C. 与长期应用 HRT 无关

D. 内膜病理学是诊断子宫内膜癌的最准确方法

E. 不孕、绝经延迟、肥胖、高血压、糖尿病是子宫内膜癌的高发因素

34. 子宫肌瘤是激素依赖性肿瘤，下列哪项说法不正确

A. 子宫局部雌激素过度刺激促进子宫肌瘤的发生发展

B. 雌激素和孕激素共同导致肌瘤的发生发展

C. 大剂量孕激素可抑制肌瘤生长

D. PRL 可通过局部自分泌，旁分泌途径与子宫肌瘤组织上的受体结合，促进子宫肌瘤

E. 孕激素和孕激素受体调节子宫肌瘤细胞的分裂活动

35. 卵巢肿瘤组织形态复杂的原因，以下哪项不正确

A. 卵巢的组织结构具有潜在的富于发展的多能性

B. 生发上皮来自原始的体腔上皮

C. 卵巢在胚胎发生时期和泌尿系统相近，中肾组织可迷路进入卵巢

D. 苗勒管形成卵巢、输卵管、子宫等器官

E. 卵巢来自胚胎生殖嵴

36. 下列哪种维生素缺乏可能与葡萄胎的发生有关

A. 维生素 A

B. 维生素 B

C. 维生素 C

D. 维生素 D

E. 维生素 K

37. 生育年龄妇女测正常月经周期基础体温的变化，下列哪项描述正确

A. 可以确定排卵时间

B. 可以确定黄体功能

C. 排卵日体温升高

D. 排卵前体温稍低

E. 基础体温升高是排卵的可靠标志

38. 避孕用皮下埋植剂的成分为

A. 炔诺酮

B. 炔雌醇

C. 左炔诺孕酮

D. 甲地孕酮

E. 黄体酮

39. 以下哪个部位与中骨盆是否狭窄有关

A. 骶结节韧带

B. 骶棘韧带

C. 骶髂关节活动度

D. 骶尾关节活动度

E. 坐骨结节间径

40. 始基卵泡不含以下哪种成分

A. 一个初级卵泡

B. 来自生发上皮的梭形颗粒细胞

C. 来自卵巢网的梭形颗粒细胞

D. 卵泡液

E. 一层基底膜

41. 以下关于雌激素生理功能的说法，哪个不正确

A. 对副中肾管衍变而来的组织无促进发育作用

B. 对成骨细胞功能有促进作用

C. 改善血脂构成

D. 刺激垂体分泌催乳素

E. 使真皮增厚，改善皮肤弹性和血供

42. 大阴唇是以下哪个韧带的止点

- A. 骨盆漏斗韧带
- B. 阔韧带
- C. 主韧带
- D. 骶韧带
- E. 圆韧带

43. 右侧卵巢动脉分支于以下哪个动脉

- A. 子宫动脉
- B. 髂内动脉
- C. 髂外动脉
- D. 腹主动脉
- E. 髂总动脉

44. 关于输卵管，哪个说法是不对的

- A. 全长 8~14cm
- B. 伞端有拾卵作用
- C. 输卵管壁由浆膜层、平滑肌层、黏膜层组成
- D. 正常情况下，卵细胞在峡部受精
- E. 输卵管黏膜层受性激素影响，有周期性变化

45. 关于盆腔淋巴回流，下列说法哪项是正确的

- A. 阴道上段淋巴回流主要入腹股沟淋巴结
- B. 阴道上段淋巴主要汇入闭孔淋巴结和髂内淋巴结
- C. 阴道上段淋巴主要汇入闭孔淋巴结和髂外淋巴结
- D. 阴道上段淋巴主要汇入骶前淋巴结
- E. 外生殖器淋巴汇入腹股沟深淋巴结

46. 关于阴道，下列哪项正确

- A. 阴道壁是由黏膜、肌层和纤维组织膜构成的
- B. 阴道黏膜由复层鳞状上皮覆盖，有腺体可以分泌黏液
- C. 阴道肌层外面的纤维组织膜，含少量的弹性纤维和平滑肌纤维
- D. 阴道壁富有静脉丛，局部受损易出血或形成血肿
- E. 妊娠期阴道壁弹性较未孕时差

47. 下列说法哪项是正确的

- A. 子宫峡部其上端因解剖上较狭窄，又称解剖学内口
- B. 子宫峡部其下端因解剖上较狭窄，又称解剖学内口
- C. 子宫峡部其上端因由宫腔内膜转换为宫颈黏膜，又称组织学内口
- D. 子宫峡部在非孕期长 7~8cm
- E. 子宫峡部在孕期不延长

48. 关于骨盆哪项是正确的

- A. 女型骨盆入口横径较前后径稍短，耻骨弓较宽
- B. 扁平型骨盆骶骨长而骨盆深
- C. 类人猿型骨盆入口、中骨盆和出口的横径均缩短，前后径稍长
- D. 男型骨盆出口较宽大
- E. 均小骨盆的妇女绝对不可能阴道分娩

49. 与子宫内膜癌预后关系最为密切的是

- A. 年龄
- B. 肥胖
- C. 子宫内膜癌发生部位
- D. 盆腔淋巴结转移

E. 肌层浸润

50. 卵巢性激素生物合成途径中，哪项是终末产物

A. 孕烯醇酮

B. 去氢表雄酮

C. 睾酮

D. 雄烯二酮

E. 雌二醇

51. 子痫抽搐的主要原因是

A. 血尿素氮、尿酸、肌酐增高

B. 代谢性酸中毒

C. 颅内出血

D. 颅内小动脉痉挛、脑水肿

E. 呼吸性酸中毒

52. 不孕症是指婚后

A. 1 年未受孕

B. 性生活正常，1 年未受孕

C. 性生活正常，2 年未受孕

D. 性生活正常，未避孕，1 年未受孕

E. 未避孕，性生活正常，2 年未受孕

53. 黄体功能不足的特点是排卵后至下次月经来潮时间

A. <14 天

B. 12~14 天

C. <16 天

D. 14~16 天

E. <12 天

54. 下列哪项与子宫脱垂的发生无关

A. 肛提肌

B. 卵巢固有韧带

C. 主韧带

D. 子宫骶骨韧带

E. 圆韧带

55. 下列哪种细菌不是阴道正常菌群

A. 乳杆菌

B. 棒状杆菌

C. 葡萄球菌

D. 衣原体

E. B 族链球菌

56. 关于子宫腺肌病的描述，下面哪项是正确的

A. 子宫腺肌病病理特点是在肌层内出现内膜的腺体和间质

B. 子宫腺肌病主要靠药物治疗

C. 子宫腺肌病的主要临床表现是原发性痛经

D. 子宫腺肌瘤有假包膜

E. 子宫腺肌病随年龄增长不断发展

57. 绝经过渡期阴道流血最常见原因是

A. 排卵性功血

B. 无排卵性功血

C. 黏膜下肌瘤

D. 生殖道外伤

E. 子宫内膜息肉

58. 关于雌激素的描述，下列哪项错误

A. 排卵前达第一峰值

B. 黄体成熟时雌激素形成第二高峰

C. 雌激素第二高峰低于第一高峰

D. 经期雌激素水平低于绝经后水平

E. 绝经后女性雌激素主要是雌酮

59. 关于激素的叙述，下列哪项错误

A. 低水平的雌激素反馈性刺激下丘脑分泌 FSHRH

B. 血液中不断增高的雌激素抑制下丘脑分泌 FSHRH

C. 大量的雌激素抑制下丘脑分泌 LHRH

D. LH 分泌的骤增刺激成熟卵泡破裂发生排卵

E. 卵巢主要分泌雌二醇

60. 女，23 岁。因停经 42 天，少量阴道流血 2 天，尿妊娠试验阳性，行人工流产术，吸刮出少量组织，未见绒毛，以下处理哪项是错误的

A. 立即收住院观察

B. 立即行 B 超检查

C. 监测 HCG 的变化

D. 嘱回家观察，腹痛随诊

E. 刮出的组织立即送病理检查

61. 35 岁女性，G1P1，阴道分泌物多伴腰酸。妇科检查：宫颈肥大，颗粒状突起，波及面积约占宫颈面积的 2/3，细胞学检查正常，其最佳治疗方法为
- A. 宫颈锥切
 - B. 局部药物治疗
 - C. 宜全身抗炎治疗
 - D. 冷冻
 - E. LEEP
62. 女，48 岁。外阴瘙痒 3 年，查体发现大阴唇、阴唇间沟处出现皮肤增厚，色素增加，皮肤纹理突出。并散在皲裂、溃疡。局部应用皮质激素软膏，症状缓解。该女可能有
- A. 外阴白癣风
 - B. 外阴白化病
 - C. 外阴鳞状上皮细胞增生
 - D. 滴虫阴道炎
 - E. 念珠菌阴道炎
63. 孕 35 周，G4P2，两胎均于孕 35 周左右胎死宫内，本次孕期诊为妊娠期糖尿病，关于处理，下列哪项是不适宜的
- A. 住院，监测血糖水平
 - B. 促肺成熟后，24 小时剖宫产
 - C. 监测餐后 2 小时血糖
 - D. 加强胎心监护
 - E. B 超检查

64. 34 周妊娠，血压升高、双下肢水肿半个月，伴头晕、眼花 3 天就诊。查体：脉搏 110 次/分，血压 160/110mmHg (21.3/14.7 kPa)，宫高 28cm，腹围 94cm，尿蛋白 (++)，水肿 (+++)，尿比重 1.025，以下哪项治疗不正确

- A. 先扩容，后利尿
- B. 20%甘露醇 250ml 快速滴注
- C. 呋塞米(速尿)20mg
- D. 5%葡萄糖 1 000ml+25%硫酸镁 60ml 以 1~2g/小时静滴
- E. 完善生化检查了解肝肾功能

65. 女，30 岁。G1P0，孕 38 周，患风湿性心脏病，心功能 I~II 级，胎儿估计 2 700g，宫口开全 20 分钟，先露头，降至+3，胎位 LOT，分娩时处理正确的是

- A. 剖宫产术
- B. 吗啡皮内注射
- C. 侧切待其自然分娩
- D. 助产缩短第二产程
- E. 胎儿娩肩肌注麦角新碱预防产后出血

66. 初孕妇，36+2 周妊娠，Pre-eclampsia 重度，最恰当的处理原则是

- A. 立即行剖宫产术
- B. 人工破膜引产
- C. 积极治疗待其自然临产
- D. 积极治疗后及时终止妊娠
- E. 积极治疗 1 周后，终止妊娠

67. 女，24 岁。7 天前因 40 天妊娠行药物流产，今晨突然左下腹痛，并肛门坠胀感，腹泻 2 次急诊来院，首先的处理是

- A. 测量血压，脉搏，监测生命体征
- B. 补液治疗
- C. 妇科内诊检查
- D. 后穹窿穿刺
- E. 查血/尿 HCG

68. 孕 36 周，G3P1，腹痛. 8 小时，伴阴道出血 6 小时。查体：血压 80/50mmHg，脉搏 120 次/分，宫高 36cm，放松不好，胎心 100 次/分，宫口开大 1cm，最恰当的处理是

- A. 头皮牵引术
- B. 人工破膜术
- C. 即刻行剖宫产术
- D. 静脉滴注缩宫素（催产素）加速产程
- E. 人工破膜及缩宫素静脉滴注加速分娩

69. 女，35 岁。孕 39 周，G1P0，无痛性阴道出血 5 小时，1 小时前出现不规律宫缩，阴道出血量约 500ml，腹部检查 ROA，胎头高浮，胎心 160 次/分，耻骨联合上可闻胎盘杂音。该患者最恰当的处理是

- A. 止血药
- B. 开放静脉，行阴道检查
- C. 立即行剖宫产
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 人工破膜后头皮牵引，促分娩

70. 28 岁经产妇，足月产后第 2 日，患者诉阵发性下腹痛，阴道流血量不多，无恶心、呕吐，无腹泻及便秘。检查宫底脐下 2 指，无压痛，腹部不胀。下列哪项表现或辅助检查对明确诊断有帮助

- A. 哺乳时下腹痛加剧
- B. 腹部听诊肠鸣音
- C. 腹部 X 线检查
- D. 血常规检查
- E. 腹部 B 超检查

71. 28 岁经产妇，足月产后第 2 日，患者诉阵发性下腹痛，阴道流血量不多，无恶心、呕吐，无腹泻及便秘。检查宫底脐下 2 指，无压痛，腹部不胀。可能的诊断为

- A. 急性腹膜炎
- B. 肠梗阻
- C. 产后宫缩痛
- D. 肠痉挛
- E. 盆腔炎

72. 28 岁经产妇，足月产后第 2 日，患者诉阵发性下腹痛，阴道流血量不多，无恶心、呕吐，无腹泻及便秘。检查宫底脐下 2 指，无压痛，腹部不胀。恰当的治疗为

- A. 抗生素治疗
- B. 止痛药物
- C. 先观察，若疼痛严重，给予解痉止痛药物
- D. 给予缩宫药

E. 按揉子宫

73. 初产妇，28 岁。定期做产前检查，B 超示胎儿发育无异常，妊娠 31 周，腹部触诊发现先露部宽大不规则，浮，胎心 136 次/分，血压正常。诊断首先考虑

A. 臀位

B. 横位

C. 头位

D. 胎儿畸形

E. 双胎

74. 初产妇，28 岁。定期做产前检查，B 超示胎儿发育无异常，妊娠 31 周，腹部触诊发现先露部宽大不规则，浮，胎心 136 次/分，血压正常。根据以上结果，最恰当的处理是

A. 立即行外倒转术

B. 膝胸卧位

C. 任其自然发展

D. 给予镇静药

E. 口服沙丁胺醇（舒喘灵）

75. 初产妇，28 岁。定期做产前检查，B 超示胎儿发育无异常，妊娠 31 周，腹部触诊发现先露部宽大不规则，浮，胎心 136 次/分，血压正常。孕 39 周，产妇要求剖宫产，医生的正确处理方案是

A. 同意孕妇要求

B. 不同意孕妇要求

C. 结合孕妇情况及检查结果考虑合适的分娩方式

D. 劝孕妇等待阴道自然分娩

E. 给予缩宫素引产

76. 初产妇，28岁。定期做产前检查，B超示胎儿发育无异常，妊娠31周，腹部触诊发现先露部宽大不规则，浮，胎心136次/分，血压正常。复查骨盆出口7.5cm，胎儿双顶径8.9cm，足先露，应选择哪种分娩方式

A. 阴道自然分娩

B. 臀牵引

C. 臀助产

D. 剖宫产

E. 后出头产钳助产

77. 45岁，绒癌患者，阴道淋漓出血8个月，G2P1，12年前足月分娩一健康男婴，血 β -HCG 12万U/L，X线胸片提示病灶单个直径 <3 cm。依照国内分期为

A. IIA期

B. IIB期

C. IIIA期

D. IIIB期

E. IV期

78. 45岁，绒癌患者，阴道淋漓出血8个月，G2P1，12年前足月分娩一健康男婴，血 β -HCG 12万U/L，X线胸片提示病灶单个直径 <3 cm。依照WHO预后因素评分表，此患者应归属哪个组

A. 低危组

B. 中危组

C. 高危组

D. 中-低危组

E. 中-高危组

79. 29 岁，G1P0，卵巢恶性肿瘤患者。下列哪种情况可以选择保留生育功能的手术方式

- A. 上皮性癌 I c、G1 (对侧卵巢未侵及)
- B. 交界性肿瘤 II 期 (对侧卵巢侵及)
- C. Krukenberg tumor
- D. 上皮性癌 I b、G3 (对侧卵巢侵及)
- E. 生殖细胞肿瘤 I 期 (对侧卵巢未侵及)

80. 29 岁，G1P0，卵巢恶性肿瘤患者。患者术后加用化疗，出现肺间质纤维化，由于下列哪种化疗药物引起

- A. 环磷酰胺
- B. 顺铂
- C. 紫杉醇(紫素)
- D. 博来霉素
- E. 卡铂

81. 21 岁女性，因原发闭经就诊，检查乳房不发育，内外生殖器幼稚型，无阴毛，肛查子宫发育不良，双附件（一）。最可能的诊断应该是

- A. 子宫性闭经
- B. 垂体性闭经
- C. 下丘脑性闭经
- D. Swyer 综合征
- E. Testicular feminization 综合征

82. 21 岁女性，因原发闭经就诊，检查乳房不发育，内外生殖器幼稚型，无阴毛，肛查子宫发育不良，双附件（一）。该病的特点是

- A. FSH 水平过高，E2 低
- B. FSH 水平过低，E2 正常
- C. LH/FSH 升高，T 高
- D. PRL 水平过高，E2 低
- E. 与 21 羟化酶缺陷有关

83. 女，32 岁。继发痛经逐渐加重，月经周期正常，量中等。结婚 2 年，未避孕未怀孕。妇科检查外阴阴道正常，宫颈光滑，子宫后位，稍大，活动不好。双附件增厚。B 超见子宫稍大，肌壁有短线回声，双附件非纯囊肿，与周围组织粘连。诊断是

- A. 子宫腺肌病
- B. 子宫肌瘤，双卵巢子宫内膜异位囊肿
- C. 卵巢肿物
- D. 子宫腺肌病、双卵巢子宫内膜异位囊肿
- E. 子宫腺肌病、卵巢生理性囊肿

84. 女，32 岁。继发痛经逐渐加重，月经周期正常，量中等。结婚 2 年，未避孕未怀孕。妇科检查外阴阴道正常，宫颈光滑，子宫后位，稍大，活动不好。双附件增厚。B 超见子宫稍大，肌壁有短线回声，双附件非纯囊肿，与周围组织粘连。治疗应选择

- A. 根治术
- B. 半根治术，术后内分泌治疗
- C. 保守手术，术后内分泌治疗

D. 期待妊娠

E. 内分泌治疗

85. 受精后第几天植入开始

A. 2~3 天

B. 5~6 天

C. 8~9 天

D. 11~12 天

E. 2 周后

86. 受精后第几天植入结束

A. 2~3 天

B. 5~6 天

C. 8~9 天

D. 11~12 天

E. 2 周后

87. 关于子宫内膜癌的分期，宫颈受累属

A. 0 期（原位癌）

B. I 期

C. II 期

D. III 期

E. IV 期

88. 关于子宫内膜癌的分期，局限在宫体属

A. 0 期（原位癌）

B. I 期

C. II期

D. III期

E. IV期

89. 关于子宫内膜癌的分期，侵犯附件属

A. 0期（原位癌）

B. I期

C. II期

D. III期

E. IV期

90. 关于子宫内膜癌的分期，侵犯膀胱黏膜属

A. 0期（原位癌）

B. I期

C. II期

D. III期

E. IV期

91. 黄体期中期血中水平较低的激素为

A. 雌激素

B. 孕激素

C. 前列腺素

D. 黄体生成素

E. 雄激素

92. 使宫颈黏液呈羊齿状结晶的是

A. 雌激素

- B. 孕激素
- C. 前列腺素
- D. 黄体生成素
- E. 雄激素

93. 使子宫肌层对催产素敏感性降低的是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 前列腺素
- D. 黄体生成素
- E. 雄激素

94. 宫骶韧带

- A. 起于子宫角，止于腹股沟管
- B. 从宫颈后面外上方绕过直肠到达第 2、3 骶椎前的筋膜
- C. 位于阔韧带下方，固定宫颈位置
- D. 起于宫颈前方，向前呈弓形绕过膀胱外侧
- E. 是覆盖在子宫前后壁的腹膜的延伸

95. 主韧带

- A. 起于子宫角，止于腹股沟管
- B. 从宫颈后面外上方绕过直肠到达第 2、3 骶椎前的筋膜
- C. 位于阔韧带下方，固定宫颈位置
- D. 起于宫颈前方，向前呈弓形绕过膀胱外侧
- E. 是覆盖在子宫前后壁的腹膜的延伸

二、多选题

96. 决定分娩的要素，下列叙述哪几项正确

- A. 产力
- B. 产道
- C. 胎儿
- D. 精神因素
- E. 文化程度

97. 有关释放孕激素 IUD 的避孕机制，正确的回答是

- A. 不影响排卵
- B. 抑制子宫内膜增生，使之变薄，不利于着床
- C. 改变宫腔环境，不利于着床
- D. 使宫颈黏液变黏稠，不利于精子通过
- E. 影响精子生存

98. 下列哪些情况应行“三合诊”检查

- A. 盆腔子宫内膜异位症
- B. 宫颈癌
- C. 早孕
- D. 卵巢肿瘤
- E. 急性盆腔炎

99. 宫颈细胞学检查结果为 ASOUS 的患者，其处理可以选择

- A. 重复 2 次宫颈细胞学涂片
- B. 立即行阴道镜检查
- C. 宫颈物理治疗

D. 高危型 HPV 的 DNA 检测

E. 宫颈锥切

100. 急性盆腔炎可以表现为

A. 急性子宫内膜炎

B. 输卵管积脓

C. 卵巢囊肿

D. 肝包膜周围炎症 (fitz-hugh-curtis) 综合征

E. 输卵管积水